

FRIDERICI  
HOFFMANNI  
MEDICINÆ  
RATIONALIS SYSTEMATICÆ

TOMI QUARTI,

Quo specialis Morborum pathologia, & huic superstructa  
solida therapia cum medendi Methodo cautelis  
Clinicis, & Morborum enarrationibus  
adjuncta Epicrisi, exhibentur

PARS QUARTA  
DOCTRINAM MORBORUM

*Ex viscerum labe partiumque solidarum atonia perspicua &  
demonstrativa methodo tradens.*



VENETIIS, MDCCXXXVIII.

APUD SEBASTIANUM COLETI.

*SUPERIORUM PERMISSU, AC PRIVILEGIO.*

FOR THE  
TREATMENT OF  
MEDICAL

## ACKNOWLEDGMENTS

## ACKNOWLEDGMENTS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
 LIBRARY  
 540 EAST 57TH STREET  
 CHICAGO, ILL. 60637

NOT A L. U. C. 2 3 4 5 6

DOCT. GINAM. MORDOUM

9. The following are the names of the persons who have been appointed to the various committees of the Board of Directors:

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*)  
 2. *Chlorophyll b* (Chl *b*)  
 3. *Carotenoids* (Car)  
 4. *Phenolics* (Phen)  
 5. *Proteins* (Pro)  
 6. *Lipids* (Lip)  
 7. *Cellulose* (Cel)  
 8. *Hemicellulose* (Hem)  
 9. *Lignin* (Lig)  
 10. *Other* (Oth)

ATTACHED: 21 THIRTY

• *Explain the importance of the*

...and the fact that the *in vitro* and *in vivo* results are in good agreement.

# DEDITÆ ARTIS SALUTARIS

Studio asclepiadarum progenici stipendium hoc  
septimum confert octavum si Deus vitam  
viresque prorogat vocet.

FRIDERICUS HOFFMANNUS.

## PRÆFATIO.

**T**herapiae rationalis tomum quartum sectori peritię medicę cupido jam exhibeo paulo tardius, quam promiseram, ob incrementos quotidie occupationes in senio, quo vires corporis non parum decrescere ineipiunt. Complectitur hic tomus ægitudines, quæ paulo longius protrahuntur admodumque difficilem recipiunt sanationem; unde etiam chronicarum nomine veniunt, & recte duplicis esse generis statuuntur, quarum alia a solidorum motu nimis adauso nascuntur, ut fere sunt spasmodico-convulsivæ, in præcedente jam tomo pestratae; alia contra a solidarum partium mortificum imbecillitate tonoque ac robore dejecto, & abhinc dependente languidiori fluidorum motu oriuntur, quarum indolem & effectus jam describere propositum est. Scire autem licet, hos morbos iterum dupliciter esse considerandos: alii quippe, qui mentem ac sensus afficiunt, in suprema corporis parte sedem suam ac domicilium constituunt, quorum naturam, causas & medendi methodum in prioribus hujus voluminis capitibus paulo accuratius evolvere annisi sumus; reliquos, qui ex viscerum medii & infimi ventris, quæ vitalium humorum elaborationi ac depurationi serviunt, atonia ortum trahunt, in posterioribus capitibus accuratiori tam pathologicæ quam therapeutice considerationi subjecimus. Atque hi morbi in universum ejus sunt naturæ ac conditionis, ut ob lentiores & vacillantem sanguinis & humorum circuitum stagnationes, vasorum obstructions & indurationes, adeoque labem solidis partibus & visceribus inferant vitæ insensissimam, quæ profecto difficillime expugnatur. Quare etiam horum morborum sanatio summam medentis prudentiam & accuratorem appropriatorum summeque efficacium remedium cognitionem desiderat; siquidem in nullo morborum genere ars nostra magis se manifestat, ac in cura chronicarum affectionum, quia sub his parum potens natura haud facile vitium, altius insidens, suis viribus excutit, quum contra confiteri omnino oporteat, artem in acutis parum valere; utpote in harum curatione plus sibi natura vindicet, & ibi medicus sæpe spectatorem tantum agat. Neque hæc veritas anti-

quos

quos rei medicæ scriptores lauit, ex quibus vel unicuique Cornelium CEL-  
SUM in testimonium vocare lubet, ejus verba, quibus libro III. præ-  
fatur, non alienum puto hic recensere: *Id nullo quidem, inquit, mor-  
bo plus ars quam natura sibi vindicare potest, utpote cum repugnante natura  
nihil medicina proficiat; magis tamen ignoscendum medico est, si minus pro-  
ficiat in acutis, quam in longis: ibi enim breve spatium est, intra quod, si  
quod auxilium non profuit, aeger extinguitur, hic deliberationi & mutationi  
remediorum tempus patet.* Ad hoc adsertum paulo clarius intelligendum  
multum juvabit, quando ad naturam, quæ ab antiquissimo artis nostræ  
parente in pluribus locis morborum medicatrix salutatur, attentius ad-  
vertentes quid possit quidque valeat in acutis & valde gravibus affectio-  
nibus, rite perscrutemur. Naturæ autem nomine hoc loco non sapiens  
quoddam, corpori animantium insidens & functiones ejus dirigens prin-  
cipium; sed nos in felicioris seculi medici luce constituti, nihili aliud,  
quam jugem ac perennem sanguinis & humorum per compagem corporis  
mere vasculosam in orbem motum, a cordis & vasorum omnis gene-  
ris systaltica vi dependentem intelligimus; cujus beneficio corpus in se  
corruptioni expositum per continuam heterogenearum partium subtra-  
ctionem a putredine vindicatur. Et hic motus vere vitalis, qui a rebus  
& mere naturalibus & externis, potissimumque ab aere & alimentis,  
recte id pronuntiante HIPPOCRATE, profisciscitur, non modo sani-  
tatem conservat, sed etiam ad sanationem morborum multum valet.  
Nam intensior & celerior in acutis redditus ipsam causam, quæ febrem  
inducit, brevi & certo tempore, per congrua emunctoria eam expel-  
lendo, tollit & sæpius ægritudines periculi plenissimas, ipsam pestem,  
inflammatorias & exanthematicas febres, sua sponte, parum adjuvan-  
te medico, feliciter persanat. Res vero longe aliter se habet in longis  
affectionibus, ubi languidior & tardior sanguinis circuitus ad ingignen-  
dos morbos, accumulando materiam excrementitiâ, multum contri-  
buit. Tantum enim abest, ut causæ morbificæ, altius vitalibus parti-  
bus insidenti, elidendæ & foras eliminandæ sufficiat, ut omnino opus  
sit medico, qui consilio & auxilio succurrens efficacibus remediis mate-  
riam valeudini insensam ad excretionem præparet, pertinaces obstru-  
ctiones solvat, & sanguinis segntiorem motum augendo, per aperta  
emunctoria, quæ noxia sunt proferbere contendat. In morbis igitur  
chronicis, tum avertendis, tum sanandis & levandis, medicus omnino  
artis præstantiam quam optime potest ostendere, & nominatim quidem  
in diuturnis febribus, in morbo melancholico-hypochondriaco, cachex-  
ia, tabe, hydropse, scorbuto; lue venerea, asthma convulsivo;  
gonorrhœa & fluore albo inveterato, sphacelo, morbo nigro Hippocri-  
tæmoptysi, cruento vomitu & hujus generis pluribus; quæ ope natu-  
ræ nunquam sanescunt, sed utique desideratissimam medici opem postu-  
lant. Quicumque itaque in ejusmodi morbis præ aliis laude quidquam  
digni efficere potest, is certe aliis præferendus & præstantissimus habendus  
erit. Verum, sicut peritia medici in hisce morbis quam maxime se  
prodit;



prodit; ita etiam ignorantia & imperitia, si quis non recte eos tractare novit, se manifestat. Certe, si veritatem non dissimulare debemus, inter perpaucos eminenti mihi, qui in contumaciis hisce morbis, quid noceat vel prosit recte judicare valent: pauci quoque sunt, qui intimas eorum causas, ad quas tollendas omnis medentis dirigi debet intentio, & sedes, ubi consistunt & tyrannidem suam exercent, vere perspectas habent; multominus appropriata & efficacia adversus eos remedia norunt. Surrexerunt nostra tempestate, qui ex plethora atque ex sanguinis excretionibus deficientibus & suppressis omnem chronicarum passionum originem derivare summo studio contendunt, quum tamen, ac altius perspecta, magis a boni sanguinis defectu, feri excrementitii colluvie & copia, debilitate generis nervosi & viscerum labe, earum origo & symptomatum causa sit derivanda. Ex qua falsa theoria, perversa demum medendi ratio processit; siquidem fere omnis generis chronicos morbos per venesectionem in pede crebrius instituendam & per medicamenta, quae fluxum sanguinis, praesertim in viris haemorrhoidalem promovere, & avertere & persanare sibi persuasum habent, effectum tamen minus auspicio succedente. Nam ubi nec sanguinis est abundantia, neque natura ad istum fluxum est disposita, frustraneus est omnis labor, quin potius non semel sed saepius observavi, diu continuata hac methodo tractatos aegros in pathentata hypochondriaca, a quibus liberi antea fuerunt, incidisse, vel ipsa ipsa longe pertinacior reddita fuisse. Quod si enim nimia sanguinis profusione robur partibus, quae digestioni, sanguificationi & salutaribus excretionibus servant, subtrahitur, vis alimentorum digestrix imminuitur, & crudi humores abeunt in sanguinem, qui dein ad intestinum rectorum plus justo appulsus & exitum ibi non inveniens dolentes caecas haemorrhoides, stagnationes & molestas in osse sacro dorsoque tensiones & spasmos praeritat; ut hinc facile sit intellecto, hanc quidem medendi methodum non propterea carere suo usu, minus tamen esse universalem, sed pro ratione corporum & causarum morbosarum valde limitandam. Quum itaque ex falsis suppositis hypothesebus & praepjudicatis opinionibus ordinario falsae conclusiones & perversa judicia nasci soleant, certe non subit mirari, quare qui supra commemoratae pathologiae favent, nulla nisi in partibus inferioribus pede admittere venesectionem velint, rejecta proflus ista, quae in superioribus & manu instituitur, ex metu, ne salutaris excretio per venas sedis praepediatur: quum tamen ex veterum aequae ac recentiorum & nostra quoque observatione per venesectionem in plethoricis in manu decenter institutam molestissimus ille fluxus per haemorrhoides, qui summa circumspectione in regimine vitae per omne reliquum tempus eger, saluberrime possit praeveneri. Plura mihi obvia recensere possem exempla, ubi in sanguine plenis & vegetis corporibus, in quibus nulla ad hunc fluxum dispositio nec proclivitas apparuit, repudiata sanguinis missione in manu, ex tantum in pede fuit instituta, propter exiguam autem venae parum sanguinis effluxit, graves chronici morbi,

morbi, ut sunt asthma sanguineum cum hydropse anasarca junctum; affectus soporosi, paralytici quoque & podagrici subortu fuerunt, qui per sufficientem sanguinis secta in manu vena detractionem insignites levati & convenientium remediorum ope sanati fuerunt integerrime. Ceterum ingenue etiam hoc loco consistendum est, commune, quod nostris temporibus viget, chronicis affectionibus medendi methodum maxima ex parte praeposteram esse atque perversam, adeo ut inde non convalescant aegri, sed pejus potius habeant & diutius torqueantur. Plurimi in hac male fundata versantur opinione, in rebellibus hisce morbis vi quadam & multum validis medicamentis opus esse ad obstruktionum repagula referenda, humores viscidos & in minimis meatibus subsistentes fortiter resolvendos eosque per excretoria ejciendos; quare non temperatis, lenioribus & sic dictis Galenicis, sed activis, fortioribus, chymico igne excoclis & ex mineralium regno petitis ad averruncandos hos morbos remediis utuntur; cum tamen vera & confirmata satis experientia contrarium plane doceat. Nam si ullo in morbo sanando exquisita victus ratio, moderatum vitae regimen & remedia leniora, temperata dietetica & pargorica usum praestant eximium, id ipsum certe de longis & diuturnis affectionibus valere arbitror. Ego hinc plena testari sice possum, me, qui jam per quinquaginta & sex annorum spatium, annuente Deo, artem exercui & docui, pro multis aliis in vivendis chronicis morbis felicem fuisse, potissimumque operae pretium fecisse per decentem aeris & locorum mutationem, corporis variam exercitationem, per aquam puram & aquarum mineralium tam frigidarum quam thermalium potum, per lactis ejusque seri dulcis & aciduli, pitae, infusorum specierum appropriatarum ex aqua usum, per interna valde temperata corrigentia & evacuantia, item balsamica nervina, per balnea, infusos, pediluvia, fomenta & demum quoque per abstinentiam tenuemque victum; si modo patientia, aegrorumque obedientia & sufficiens ad medendum tempus accesserit. Neque vero dissimulandum est, inter causas, cur multi difficiles morbi ad sanitatem non deducantur, hanc potissimum valere, quod tam mediis quam aegrotantibus plurimum, nisi statim auspiciatum remediorum effectum conspiciant, ad crebram mutationem medicamentorum valde proclives sint. Et revera nihil magis valetudini officit, ac crebrior remediorum variatio & copia. In universum quippe tenendum est, omnis generis morbos, maximeque diuturnos, non multa & varia, sed pauca, selecta, & simplicia magis quam composita, leniora, quam validiora desiderare remedia, sed eorum continuatione opus habere. Nam uti natura in omnibus est simplex & simplices quoque morborum sunt causae; ita quoque in sanando & simplicitate & paucis adparato gaudet. Et uti in magnis rebus expediendis tempore sufficienti opus est, sic pariter id valet in artis operibus. Ultimo loco inter causas aegri curationis nec hoc reticendum puto, quod aegri, praesertim malo hypochondriaco afflicti, peculiari animi adfectu laberent, qui mihi nomine pharmacomaniae vocantur.

venit, quo perpetuo medicamina urgent & omnes, qui nomen gerunt  
medici, in consilium adhibent, eorumque medicamentis utuntur, in-  
de vero efficiunt, ut nunquam valetudinem recuperent. Praefari hæc  
volui brevibus circa curationes morborum, quæ a tonis oriuntur & in  
præfenti libro explicantur, ut in limine quasi B. L. perspiciat, quam  
viam in his prætractandis ingressus fuerim, quamque methodum ætem  
exercentibus commendandam præcipue judicem, nullus dubitans,  
quin, si non præsens ætas, tamen posteritas veritatem & insignem seu-  
dam ex scriptis meis sit petitura, præsertim si a præjudiciorum dura  
servitute liberatos animos lectores evulerint, & usu verum tantum pro-  
fecerint, ut a solida multorum annorum experientia nihil enata præce-  
pta, experiendo intelligere & comprobare valeant.

# CONSPECTUS CAPITUM

QUÆ HOC VOLUMINE CONTINENTUR.

Cap. I. De nervorum resolutionibus.	Capite 1
II. De adfectibus soporosis comate, care, & lethargo.	28
III. De vertigine.	45
IV. De gutta serena.	60
V. De visus imbecillitate.	70
VI. De auditus visui.	81
VII. De aphonia.	94
VIII. De delirio melancholico & manico.	101
IX. De virium lapsu & animi deliquiis.	130
X. De sobita morte & morbis insanabilibus ut polypo oriundis.	145
XI. De adfectione phthisica, sive tabe.	158
XII. De cachexia icterica.	188
XIII. De tachexia & chlorosi.	207
XIV. De hydrope.	216
XV. De flatulencia & adfectione tympanitica.	236
XVI. De cachexia uterina, sive fluore albo.	271
XVII. De gonorrhœa benigna & maligna.	286

# NOI REFORMATORI

Dello Studio di Padova.

**H**Avendo veduto per la fede di Revisione, & Approbazione del P. F. Paolo Tomaso Manuelli Inquisitore, nel Libro intitolato; *Friderici Hoffmanni Medicina Rationalis Systematica Tomi quatuor, quo specialis Morborum etc.* non v'esser cos'alcuna contro la Santa Fede Cattolica, & parimente per Attestato del Segretario Nostro; niente contro Principi, & buoni Costumi, concedemo Licenza a Sebastiano Coleti Stampatore, che possi esser stampato, osservando gl'ordini in materia di Stampe, & presentando le solite copie alle Pubbliche Librarie di Venetia, & di Padova.

Dar. 10. Marzo 1738.

( Gio: Francesco Morosini Cav. Rif.

( Pietro Grimani Cav. Pr. Rif.

*Agostino Gadaldini Segr.*

# C A P U T I.

## D E

# NERVORUM RESOLUTIONIBUS.

## T H E S E S P A T H O L O G I C A E.

### §. I.

Qui mor-  
bi in hoc  
capite  
præter-  
mittuntur.

**D**E morbis ex viscerum, partium-  
que solidarum atonia oriundis  
scripturi, recte ab iis incipere posse vi-  
demur, qui in capite, principe totius  
machinæ humanæ parte, suam ha-  
bent sedem, partiumque in eo sita-  
rum atonia vel debilitate nituntur.  
Quos quidem inter primum jure meri-  
toque locum occupant nervorum re-  
solutiones, quas medica schola apo-  
plectiorum, hemiplecticorum, &  
paralyticorum nomine exprimere so-  
let affectuum. Nec erit alienum,  
hanc morborum, non adeo multum  
inter se discrepantium, easdemque fer-  
me origines agnoscentium trigam, uno  
hoc & primo simul complexi capite.

### §. II.

De mor-  
bis in hoc  
capite  
præter-  
mittuntur.

Omnes hi morbi versantur circa  
sensus motusque nostri corporis, &  
eorum organa, quorum primaria ner-  
vos esse, & inde constructas nervosas  
ac membranaeas partes, nemo est  
medicorum, qui dubitaverit. Nervus  
componitur ex canalibus tenerrimis,  
fluidum tenuissimum vehentibus, &  
a membrana, meningum cerebri pro-  
pagine inclusis. Ambiens hæc mem-  
brana omnis generis vasculis, etiam  
lymphaticis instructa est; unde & in-  
flammati & tumere potest: annotan-  
tibus celeberrimo BOERHAVE *prax.*  
*med. P. V. pag. 11.* & BARTHOLO-  
MÆO de MOOR *Pathol. cerebri*  
*Cap. X. pag. 302.*

Tom. IV. Pars IV.

### §. III.

Quæ causa per nervos sensum mo-  
tumque corpori præstet, multis qui-  
dem eusque agitur controversiis; *vid. p. 1*  
nos vero non aliam, scopo præsertim *vid. p. 1*  
medico magis accommodatam agnosci-  
mus, quam fluidum subtilissimum,  
lymphaticum puriori aereo-ætherea  
elastica substantia imbutum, quod ab  
arterioso sanguine intra cerebri, ce-  
rebelli, medullæque spinalis canali-  
culos secretum, & in tubulos fibril-  
larum nervearum, ex his in nervos,  
& denique omnes totius corporis ner-  
vosas partes traditur. Fluidum hoc  
sufficienti quantitate, & proportio-  
nato impetu in nervos & nervosas  
membranas producit horum tensio-  
nem: qua recte constituta, sensus  
motusque per totum corpus optime vi-  
gent, ipsique nervi naturali tono &  
elateri præditi dicuntur. Robusti au-  
tem vocantur nervi, si particulæ mi-  
nimæ illos constituentes ita coherant,  
ut vi fluidorum naturali, quin & hac  
paullo majori superandæ existant pa-  
res: a qua si ob coherionem laxiorem  
superantur, debilitatis accusamus ner-  
vorum genus.

### §. IV.

Nervus naturaliter tensus fluido  
nunquam non plenus est: hinc in ulti-  
ma sui extremitate vel leviter attra-  
ctus, impressum sibi motum juxta  
hydraulicas leges ad cerebrum & com-  
mune sensorium usque; incredibili ce-  
leritate propagat; haud secus, ac si

A tubu-

tubulum aqua repletum, & in utraque extremitatum vesica munitum videas, qui motum uni extremitati impressum, protinus cum digito alteri extremitati incumbente communicat. Hanc sensuum nomine significamus actionem. Motus voluntarii instrumenta sunt muscoli, ex fibris nerveis seu tendinosis, & carneis, quæ fibrillis nerveis undique sunt intertextæ, compositi; qui hunc in modum suas perficiunt actiones: Fibræ nervosæ & tendinosæ una cum carneis eo usque tendi & lymphæ adimpleri debent, ut transeuntem per musciculum sanguinem paullo remorentur; qui subsistens indat ventrem musculi, & hoc intumescente abbreviatur musculus, ejusque finis una cum adnexa ei parte movenda versus principium trahitur: unde sub actione musculus tactu durior, ac velut renitensprehenditur. Hinc in scopum nostrum colligimus, ad præstandos motus majorem vim, & copiosorem fluidi nervei influxum requiri, quam quidem ad sensus.

*Diffinitio resolutio nervi non quod ejusque diffinitio.*

His præmissis, clarissime patet, quod imminuto fluidi tenuissimi in nervos influxu, horum actio tam ad motus, quam ad sensus præstandos vel prorsus aboleri, vel saltem ex parte impediri debeat: & ex hoc fonte nascuntur morbi, quos titulo resolutionis nervorum complectimur. Per hanc enim intelligimus movendi, vel simul sentiendi impotentiam, ab imminuto fluidi nervei in nervos influxu dependentem. Hujus varii sunt gradus, e quibus primum binos, tanquam generales notabimus: vel enim motus voluntarii, & actiones animales, omnes sensus, ipsiusque rationis usus pereunt, homoque velut fulmine percussus concidit: vel sensuum ac rationis usum existente integro, motus saltem voluntarii ac animales actiones, vel ad summum sensus tactus languescunt, vel prorsus abolentur. Priori in casu morbi resultant apoplectici; posteriori vero paralytici.

§. VI.

Apoplexiæ tres iterum sunt gradus: Apoplexiæ summus & nunquam non lethalis est, si cum sensibus, motibusque animalibus, vitales simul, omnesque totius corporis actiones uno impetu prosternunt; de qua MED. SYST. Tom. IV. P. II. S. I. C. VII. sub titulo hæmorrhagiæ cerebri egimus. Alter gradus tollit sensuum, motuumque voluntariorum ac rationis usum; non autem vitales prosternit actiones, sed plerumque in hemiplegicos transit affectus. Tertius denique, ac levissimus, qui etiam apoplexiæ spasmodicæ nomen meretur, iidem acsecundus se prodit notis: differt tamen ab eo, quod breviori tempore penitus debelletur, & rarius in paralyticos abeat affectus. Et de hoc leviori apoplexiæ gradu hoc potissimum nobis agendum erit loco.

§. VII.

Ea his se prodit notis: antecedunt *Miseria* per satis longum tempus sensuum, vi-  
*apoplexiæ*  
*notia le-*  
*visioris.* sus potissimum ac auditus imbecillitas, vertigo, artuum gravitas, tremor, actionum animalium torpor, & plerumque passionis hypochondriacæ vel hysteriæ. Hæc inter improvise contingit, ut homo omnibus sensibus, rationis usu, ac motibus animalibus privatus prosternatur; exhibeat pedes, artusque inferiores frigidos, cutim aridam, spasmoque contractam, faciem vero & oculos rubentes, sanguine turgidos, & arterias fortiter coarctatasque pulsantes. In tali paroxysmo per aliquot horas constituti, vel vomitibus quibusdam sponte subortis viscidæ multum reddunt salivæ, vel sudores per totum corpus erumpentes experiuntur, tumque ad se redeunt, atque rationis haud secus, ac sensuum motuumque recuperant integritatem. Multi narrant, sub tali paroxysmo contractis ipsis fuisse fauces, deglutendi vim abolitam, pectusque vinctis quasi coarctatum. Repetit ejusmodi insultus, nisi medela feratur, sæpius,

sæpius, tandemque in mortiferam cerebri transit hæmorrhagiam.

## §. VIII.

*Morb-  
rum pa-  
ralysi-  
orum  
diffini-  
tio.*

Contra vero hemiplegici morbi audiunt, si salvo rationis, motuumque vitalium usu, movendi saltem juxta voluntatem potentia, aut cum ea sensus tactus labefactatur. Talem hemiplexiam sive paralyfin dari universalem, quæ totum corpus afficeret, negamus, nisi forsitan sub ipsa apoplexia: nec credimus dari paraplexiam, quæ totum corpus, salvo manente capite, resolveretur; nostræ saltem praxi nunquam se talis obtulit morbus. Omnis potius paralyfis vel alterutrum corporis lateris, idque totum afficit, & movendi, atque simul sentiendi potentia privatur; vel certæ tantum parti inhærescit. Prior hemiplexia dicitur; si quando dimidium capitis ac faciei lateris simul sit resolutum, alias non nisi paralyfis alterutrius lateris audit: posterior vocatur paralyfis particularis, & est vel vera vel spuria. Illa sedem suam plerumque in spinali medulla; ejusque mox superiori, mox media, mox inferiori parte habet, & movendi pariter ac sentiendi aufert potentiam: hæc movendi saltem quadam impotentia se prodit, & humorem per metastasin ad ipsos nervos devolutum, hoscque comprimenter pro causa agnoscit.

## §. IX.

*Morb-  
rum pa-  
ralysi-  
orum.*

Hemiplexia vel prægressum insulturn apoplecticum sequitur; vel absque eo cum refrigeratione lateris passuri & præcedente vertigine incipit, & sensum in motus sensusque definit abolitionem. Sanum lateris sæpenumero spasmodicis ac convulsivis agitatur motationibus; orisque canina non raro conspiciuntur tortura; & progrediente malo mentis quoque functiones, & cum primis memoria labascere incipiunt. In paralyfi particulari, annotante COELIO AURELIANO Lib. II. Cap. I. antecedit partis passuræ gravado, tardus motus cum stupore, pallore, & torpore: pars affecta

laxa est, mollis, flaccida, tactu frigida, & vel atrophica, vel tumore cedematoso imbuta cernitur. Caveas vero, ne motus voluntarii impotentiam, quæ paralyfin comitatur, confundas cum ea, quæ rheumaticis arthriticisque nonnunquam jungitur affectibus: hanc enim parvis affectibus dolore, spasmus & sæpius convulsione stiparam deprehendimus; quæ molestiæ ab affectibus paralyticis valde sunt alienæ.

## §. X.

Paralyfis particularis varias afficit *Species* partes. Nonnunquam artus inferiores *paraly-* una cum imi ventris partibus, inte- *sis par-* gris illis, quæ supra diaphragma sunt, *stomatice.* mox movendi solum potentia, mox sentiendi simul facultate privantur: tumque urinæ & alvus contra voluntatem redduntur, ac tandem tumor cedematosus, lenta febris & mors succedunt. Interdum brachia & manus paralyfin patiuntur, quæ si spuria fuerit, & post colicam e venerit, dicitur parafix ex colica; ex aliis vero causis orta paralyticos. manuum nomen obtinet. Datur paralyfis palpebrarum, ubi hæc nequeunt attolli, & invitus lacrymarum fluxus urget. Linguz resolutio dicitur aphonia, quam suo loco pertractaturi sumus. Si pharynx paralyfi afficitur, omnis aboletur deglutitio; ejus differentiam a spasmu pharyngis videas in MED. SYSTEM. Tom. IV. P. III. S. II. C. V. §. VI. Oesophagus, ventriculus ac intestina in moribundis resolvuntur, tumque assumta, maxime potus cum strepitu, murmuribusque descendunt. Paralyfis sphincteris ani per intestini recti proidentiam ac fecum involuntariam excretionem se prodit; vesicæ urinariæ ex invito urinæ fluxus judicatur; vesicularum seminalium ex perpetua seminis effusione cognoscitur; musculorum membri virilis a denegata concumbendi & membrum erigendi potentia significatur. Cordis dari paralyfin, quam mors repentina absque ullis evidenter causis eveniens innuit, &

vetribus jam Herophilum credidisse refert COELIUS AURELIANUS. L. II. C. I. p. 348. & e recentioribus adfirmat BOERHAVE *Prax. med. P.V. pag. 13.*

## §. XI.

*Causa proxima resolutionis nervorum.* Proximam causam & formatem resolutionum affectionum rationem in plus minus intercepto fluidi nervei in nervos influxu consistere; ex §. IV. & V. quis poterit intelligere. Inde quoque statim adparebit ratio, cur alia vera, alia spuria sit paralytis. Hæc enim facilius fit, quam illa; quoniam sensus abolitio totalem fere fluidi nervei defectum supponit, motus autem impotentia imminutum saltem ejus influxum sequitur. Quæ vero causæ remorari valeant hunc influxum; curatius indagari oportet. Plures medicorum obstructionem nervorum accusarunt; sed eam locum habere non posse, vel ipsa tam tubulorum nerveorum, quam contenti in ipsis liquidi subtilitas docet; id quod fufius demonstravit BARTHOLOMAEUS de MOOR *Path. Cr. C. X. p. 283.* Vera potius causa est vel solutio continui nervorum, uti in vulneribus, aliisque violentis contingit læsionibus; vel compressio aut nervorum ipsorum, aut principii eorundem, a quacunque re ipsis præter naturam incumbente facta. Quum vero unicam hanc omnium nervorum resolutionis statuum causam; ea tamen diversos producere animadvertatur effectus: videndum, in quo diversitatis consistat fundamentum.

## §. XII.

*Adus apoplexiæ & hemiplegiæ.* Hoc nimirum unice in loci, qui fovet mali causam, diversitate, quærendum esse; & ratio suadet, & sectiones anatomicæ his morbis peremptorum testantur. Omnes enim, qui observationes ejusmodi consignarunt medici, ut WILLISIUS, BONETUS, WEPFERUS, probe annotarunt, quod in apoplexia defunctis, vitium nunquam non in cerebro, ejusque ventriculis, nec non in cerebello

ob hæserit. Conf. bini notabiles casus de apoplexia lethali, altera ex hydrope cerebri, altera ex sanguine in illo extravasato, quos BRUNNERUS in A. N. C. an. I. dec. III. obs. 153. & 154. recensuit. Contra vero in hemiplecticis alterutrum medullæ spinalis principium, vel extravasato sero inundatum, vel tumoribus compressum fuisse, iidem perhibent auctores. De feri ibi facta extravasatione, BONETUS *sempulch. L. I. Sect. XV.* observationes recenset; tumorem tunicaeum ibi viderunt WEPFERUS in *austriario hist. XIV.* & BRUNNERUS *l. cit. obs. 154.* Silentio prætermittimus abscessus, vulnera, ulcera &c. quæ medullam spinalem afficiendo hemiplegiam, cerebrum penetrando, apoplexiam producere observantur. Ad hæc si ex anatomia repetamus, nervos vitalibus functionibus destinatos ex cerebello; sensibus tributos ex basi cerebri, & motibus voluntariis sensuique tactus dictos, maximam partem ex medulla spinali propullulare: facile colligere poterimus, in omni apoplexia causam nervos comprimentem, intra cerebrum; in paralyti vero intra medullam spinalem; & speciatim in hemiplexia circa alterutrum medullæ principium consistere.

## §. XIII.

Inter causas vero, quæ compressionem nervorum in cerebro efficiunt, & tenuissimi ac mobilissimi liquidi in eos influxum interceptum, principem fere Ragnatio & substantia sanguinis in valis membranarum cerebri locum tenet; quæ ex valde impedito ejus per venas & sinus venosos libero circuitu & reditu versus cor pronascitur: Nam cum sanguis majori nisu & impetu ad caput fertur, quam ut æquali proportionem in venas recipi possit, ob vasa nimium distenta & expansa subsistit, quod potissimum evenit in plethoricis, hypochondriacis, nephriticis & hysteris ob violentos inferiorum partium spasmos. Nascitur hac ratione interdum levior apoplexiæ species, quam spasmodicam nomi-

*Causa media apoplexiæ violentæ sanguinis.*



nominare consuecimus, eo quod remittentibus spasms & derivata sanguinis & humorum mole versus inferiora liberiore sanguinis circuitu per vasa restituta vis mali mox remittere solet; quod potissimum fit mature lecta vena, & alvo per clysterem aperta. Sub hoc paroxysmo plerumque facies rubet, pulsus adest celer & plenus, motuus & sensuum est abolitio, & sudore interdum corpus totum diffluit.

## §. XIV.

*Causa  
mediata  
apople-  
xia &  
hemiplexia  
serosa.*

Quod si vero hæc stagnatio diutius ob hæserit, & in subjectis sero abundantibus contigerit: secedunt sensim succi tenuiores serosi per poros vasorum præter naturam expansorum, incumbunt nervis, eosque comprimunt. Hoc si fiat in basi cerebri, nascitur apoplexia, ejusque alter gradus juxta §. VI. quæ delabente ad alterutrum medullæ spinalis erus sero post se relinquere solet hemiplexiam. Hæc ex eadem causa, sine prævia gignitur apoplexia, si serum a stagnante cruore secedens protinus ad medullam decumbat spinalem. Et talis hemiplexia vocatur serosa, quæ corripit subjecta potissimum pituitosa, sanguineo phlegmatica; pulsus in ea est debilis, languidus, facies pallida, quædam somnolentia, & sensuum torpor. De ea verissimum est, quod annotantibus COELIO AURELIANO L.II. C.I. aliisque medicorum, præ aliis senibus, maximeque autumnali ac hyemali tempore sit familiaris.

## §. XV.

*Causa  
remota,  
sera sunt  
spasmus  
sanguinis  
motus.*

Causas inter remotiores, quæ pro subjectorum varietate mox sanguineam, mox serosam producere valent hemiplexiam, primum locum tenet sanguinis nimia moles in subjectis activioribus, laxoque & spongioso corporis habitu præditis. Quæ quidem iis inducendis malis eo est opportunior, quæ magis humores commoventur: hi enim ebullientes, expandunt nimium tenerrima cerebri vascula, ac nonnumquam plane extravasantur. Hinc explicatu facillimum est, cur ple-

thorici ex improvviso dictis affectibus corripantur a nimio veneris usu, a largiori vini calidioris potu, a balneis nimis calidis, a fortiori sub cælo fervidiori corporis motu, ab insolata (vid. PROSP. MARTIANUS *Comment. p. 102.*) a gravioribus animi affectibus; & a crapulis, maxime si accesserit refrigeratio: mihi quoque in promptu sunt exempla eorum, qui vino, vel cerevisia bene farti, & subito refrigerati, apoplexia subito perierunt.

## §. XVI.

Deinceps nimia sanguinis moles ad nervorum contribuit resolutionem, si nervi per spasmos abdominis & partium infernarum, quacunque de causa productos, ad superiora, maximeque caput compellitur, & in eo stagnat. Hinc derivanda ratio apoplexiæ spasmodicæ & hemiplexiæ sanguineæ, quæ accidit subjectis hypochondriacis, ac hysteris: qualem notatu perquam dignum casum in CONSULT. MED. Tom. I. Sect. I. casu XIX. reperies. Hinc etiam in praxi medica sæpenu-mero licet observare, mensium & hæmorrhoidum excretionem non rite succedentem ad nervorum resolutiones quamplurimum conferre; id quod patet ex observatione loc. cit. casu XXV. allegata. Eo certius vero paralytici morbi ab excretionum sanguinearum, actu fluentium, subitanea cohibitione excitari possunt: adeo, ut eos accedentibus sub fluxu menstruum, hæmorrhoidum & lochiorum, gravi terrore, vehementi refrigeratione, & incongruo remedium adstringentium, repellentium ac opiatorum usu, sæpius accersi videas.

## §. XVII.

Sic purpureus corporis nostri latex sui stagnatione paralyticus & apoplexiæ, plerumque tamen sanguineas & transitorias; successu vero temporis etiam serosas, easque diuturniores producit. Verum has immediate gignit serosa colluvies, majori, quam par est copia, ad caput congesta, ner-

nervorumque principiis incumbens. Hinc si serosæ excretiones, sudores critici, transpiratio insensibilis, salivæ nimius effluxus, sive qui sponte fit, sive a mercurialibus medicinis provocatur, serosæ emanationes ex auribus, oculis, naribus, ulcusculis inveteratis, fonticulis, sector pedum &c. subito coercentur, exsiccantur & reprimuntur: gravissimas oriri paralyses, experientia compertum habemus. Hanc ob causam infantili etiam ætati, cui alias parcunt, insidiari solent affectiones paralyticæ: qualem observationem de infante bimulo, ex prohibita transpiratione paralytico legas in cit. CONSULT. Tom. I. Sess. I. casu XXVI. Ex eodem fundamento diuturnior in locis frigidis humidisque commoratio & obambulatio ad nervorum resolutionem contribuit; quales notatu dignos casus recenset FORESTUS Lib. 10. obs. 83. & 84. seqq. Huc pertinet ea, quam A. N. C. dec. III. anno VII. & VIII. obs. 203. de septuagenario post evanescentem subito surditatem apoplexia lateris dextri correpto allegant, observatio: quæ non nisi sero, primum surditatis causa, dein per metastasin ad medullam dextri lateris devoluto debetur.

## §. XVIII.

<sup>4) Encephaloma tum. cerebri.</sup> Hæc mala eo graviora machinatur serum ad caput congestum, si fuerit acre, purpureum, scorbuticum, & ab artubus externis, corticeque cutaneo male feriatis artibus, unguentisque repellentibus ac sulphuratis intus revocatum. Exstant hinc quam plurimæ observationes, quod achores, crusta lactea, tinea capitis, scabies, purpura &c. repulsæ pressio post se pede traxerint paralysin. Eodem modo res se habet cum morbis arthritico-podagricis-rheumaticis, quos sero acri ad membranas artuum & juncturarum partes incumbente foveri notum est: hoc enim si opiatīs & adstringentibus medicinis, sopito hinc dolore, intus agatur, vel ex naturali imbecillitate retrocedat: auctor sit

pertinacissimæ nervorum resolutionis. Sic observationem de hemiplexia ex rheumatico arthritico affe. du suborta legas in CONSULT. MED. T. I. casu XXI. Huc inprimis pertinet paralytis sic dicta scorbutica, quæ nunquam non spuria est, & a sero acri scorbutico huc vel illuc circa nervos stagnante, eosque comprimente suos mutuatur natales.

## §. XIX.

Mercuriales porro medicinz ejus <sup>5) Mercurialis inapte adhibita.</sup> sunt indolis, ut in corporibus impuris & debilitatis ad movendam salivationem minus recte usurpatæ, nervorum inducant resolutiones. Mercurius enim in corpore cum particulis salinis ac excrementitiis mixtus, vim obtinet fortiter stimulantem, quæ præsertim in glandularum substantiam nerveo-fibrosam agit, adque hanc majorem humorum salivalem & lymphaticorum affluxum concitat. Horum effluxus per spurationem si quacunque de causa sistatur; facile fit, ut parente nihilo fecius affluxu, illi succi copiosius ad spinalis medullæ principia, ipsosque nervos ruant, ibidemque stagnando ac comprimendo influxum nervei fluidi in nervos remorentur.

## §. XX.

Non minus spasmus membranarum <sup>6) Nervus bi compressus.</sup> cerebrum & medullam spinalem ambientium ansam non raro præbet hemiplecticis & apoplecticis affectibus. Non alia subest ratio, quam quod nervosæ membranæ per tam violentos motus agitata læsæscunt, relaxentur, nec impedire queant, quominus irruentes succi, utut tennes lymphatici, in vasculis membranarum stagnent, & medullarem comprimant substantiam. Hinc docet experientia, post epilepsiam non raro sequi hemiplexiam; & illam, si lethalem sortitur eventum, nunquam non in apoplexiam terminari. Et quoniam est causa, quod ex gravi iracundia paralytici nonnunquam nascantur affectus, nisi quod per illam sortior nervis,

vis, vasisque inferatur strictura; eam humorum producens stagnationem, quæ influxui fluidi nervi interceptando existit opportuna?

## §. XXI.

*Flac-*  
*ciditas*  
*cerebri*  
*& debi-*  
*litas ge-*  
*neris*  
*nervosa*  
Omnes hæc causæ coærtius, eoque facilius vim suam pernitiælem exercent, si præsto jam fuerit cerebri flacciditas, generisque nervosi debilitas.

Si enim laxiores sunt nervosæ partes; minus resistere valent irruptioni humorum, & sic horum stagnationi pariter ac extravasationi mirum quantum favent. Et colligitur quidem hæc debilitas nervorum ex causis antecedentibus: quorum pertinent ætas senilis, temperamentum sanguineum, & inde pendens habitus corporis laxus, mollis & spongiosus; vita sedentaria & otiosa, potus parcior, vel cerevisiæ crassioris ac lupularæ, atque vinorum largior usus, diæta laura, multarumque epularum, somnus nimis pariter ac immodicæ vigilæ, multæ meditationes, & lubricationes, venæ sæpe repetitum exercitium, diurnus mæcor, tristitia, habitatio in locis udis frigidisque, & hyemalis tempestas. Sic enim debilitatis corporibus vel levissima causa, quam vix attenderes, ad paralytes & apoplexias disponere valet; quemadmodum ex observatione in CONSULT. MED. Tom. I. Casu XVIII. recensita patet, ubi quis ex potu aquarum Selteranarum, licet eas rite & corpore bene præparato adhibuerit, nihilo fecius in apoplecticum insultum, & hinc relictam spuriam incidit paralytin.

## §. XXII.

*Æthi-*  
*logia*  
*paraly-*  
*tica, q-*  
*ætu in-*  
*ferioris*  
*extremitatis*  
His de hemiplexia potissimum præmissis; restant quædam de paralytes particularis speciebz dicenda. Ex iis maximam meretur attentionem, quæ inferiores corporis partes, vel crura pedesque solum, vel abdomen quoque & omnes, quæ infra diaphragma sitæ sunt partes simul afficit, salvis, quæ supra sunt, regionibus. Posteriori casu causa hæret in medulla spinali circa priores lumborum vertebrae:

quod binis sectionibus hoc malo demortuorum, A. N. C. Vol. II. obs. 31. & 120. insertis egregie monstratur. Priori medulla spinalis circa primam lumborum vertebrae conqussata, & ultra medium crassitie soluta; in altero a dicta vertebra per totam inferiorem spinam tota flaccida, ac penitus exsucca fuit, adeo ut inter eam, & osseam thecam notabilis intercesserit spatium. Oritur hoc vitium (1) a causis externis violentis, fractura, luxatione, vel vulnere spinæ, medullam simul afficiente; quales bini casus exstant in A. N. C. Cent. X. obs. VIII. & dec. I. anno III. obs. 66. (2) a causis internis, maximeque rheumaticis ac convulsivis dorsi affectibus; ut testatur casus supra ex A. N. C. vol. II. obs. 102. allegatus, lectu dignissimus.

## §. XXIII.

Interdum causa hæret intra os sacrum, tumque morbus ambulandi impotentia, & crurum pedumque resolutione se prodit. Hoc malum nunquam est nativum, & præternaturali medullæ intra os sacrum contentæ nititur constitutione: quales casus ex tumore intra thecam ossis sacri connoto, & tandem exulcerato lethales recensent HIST. MORB. WRATISL. anno 1701. pag. 68. segg. Idem contingit post febres acutas, male solutas, nec non intermittentes, si quis malovictu utatur, animique indulgeat pathematibus: ubi causa est serum vitiosum per metastasin ad medullam ossis sacri devolutum, eam comprimens. Eidem malo obnoxie sunt femina post laboriosum partum, abortum, & retenta Lochia, nec alia subest causa, nisi sanguis per spasmos ad os sacrum copiosus delatus, ibidemque stagnans, & nisi medela feratur, tandem serosam portionem per vasorum porosulos dimittens.

## §. XXIV.

Notabilis porro est brachiorum paralytis; quæ si colicam, anodynis ac opiatiss intertempore cohibitam sequatur, dicitur paretis ex colica. Causa

est serum vitiosum acre per metastasin ad nervosas brachii & potissimum carpi partes delatum; & legere licet binos notabiles casus, unum de tali parestesi post colicam opiatis sopitam sequente in A. N. C. dec. III. anno VII. *append. ad obs. 308.* alterum de parestesi ex colica per vini lithargyrio dulcificati potum producta *ibid. anno IV. obs. 30.* Familiare cumprimis malum est metallurgis, saturninas mineras tractantibus; e quarum inimicis vaporibus in colicam, pertinacissima alvi obstructione stipatam, & ex hac in parestesin incidunt, qui morbus vocatur die Dutten-Rare. Eadem brachiorum paralysis alias quoque agnoscit causas; & interdum a scorbutica humorum diathesi suboritur, sicut casus A. N. C. dec. I. anno III. *obs. 334.* insertus docet. Nonnunquam causa hæret intra vertebra cervicis, & dorsi superiores; ex quibus nervi tendunt ad brachia. Talem ab ictu lapidis in cervicem subortam annotavit FORESTUS *Lib. X. obs. 95.* Eadem supervenit quandoque pectoris hydropi; annotante CAROLO PISONE *tr. de morb. ex serosa coll. Sect. III. C. VII. p. 243.* ubi causa lymphæ intra vascula membranam nervorum perreptantia ob impeditum ad thoracicum ductum iter stagnanti, nervosque comprimendi debetur.

## §. XXV.

*Frequens  
est affectum  
paralyticum.*

Quod prognosin affectuum paralyticorum attinet; scire licet apoplexiam spasmodicam, & hemiplexiam sanguineam curatu quidem faciliores esse; at, nisi præcaveantur, sæpius reverti, & tandem in ipsam cerebrum terminari solere hæmorrhagiam. Reliquæ paralyseos species & serosa hemiplexia non subitam quidem inferunt mortem; verum difficillimam & eo intricatorem reddunt sanationem, quo major sensuum internorum vel externorum concurrens læsio, atque non raro miseros per totam vitam discruciant ægrotantes. Si infantes paralyti corripuntur, eos circa pubertatis ætatem ab illa nonnunquam

vindicari animadvertimus; quod vix unquam contingit infensibus. Hemiplexia lateris sinistri periculiosior est ea, quæ dextrum latus occupat ob arteriam sortam, ejusque ramos in eo latere copiosius dispersos. Si pars adfecta adhuc dolet, sentit, non nimium frigida, nec extenuata est; spes restat reconvalescentiæ, eaque certior, si fornicationis ac puncturarum in ea percipitur sensatio. Paralysis abdominis & artuum inferiorum plerumque lethalis est; & non raro gangrænam resolutarum partium habet comitem. Ceterum omnes paralyticæ affectiones vere ac ætate facilius quam hyeme & autumno curantur.

## §. XXVI.

Febris si sequitur paralytin, eam sanare dicitur: sed intelligendum hoc est magis de artificiali, quam naturali febre, atque de serosa potius, quam sanguinea paralyti. Enim vero naturalis si fuerit febris, eam vel continuam oportet esse, quæ periculo nunquam caret, vel intermittentem, quæ malum haud tollit. Per artificialem autem intelligimus motum cordis & artieriarum auctiorem, arte concitatum, quo vegetius circumactis humoribus stagnantes circa nervos, vel eorum principium succi nonnunquam discutuntur, & velut resorbentur. Talis febris provocatur per medicamina paullo acriora & calidiora, nervina, volatilia, per sortierem corporis, maxime sub solis æstu motum, perque balnea, & cumprimis Lauchstadense & thermarum Carolinarum. Verum hæc in sanguinea, quæ jam febrili motu stipata est, paralyti adplicare neutiquam licet, sed in serosa duntaxat, ubi languet humorum circulatio, locum inveniunt.

## THESES THERAPEUTICÆ.

## §. I.

Indica-  
tiones  
curatio-  
nis.

**P**Aralyticos & apoplecticos curatu-  
ro morbos, binæ potissimum oc-  
currunt indicationes; quarum prior  
est, ut causas, quæ tam proxime,  
quam remotius ad interceptum flui-  
di nervi in nervos influxum contri-  
buerunt, removeat; & altera, ut  
partem affectam, totumque nervorum  
genus ita roboret, quo pristinum ac  
naturalem recuperet tonum. Multum  
vero scire interest, num morbus re-  
cens, an confirmatus sit; propterea  
quod junta hanc differentiam diversa  
insituatur curatio.

## §. II.

Pneuma-  
tis ab-  
re omnia  
est infla-  
tione.

Si mox post primam mali invasio-  
nem accersitur medicos, pulsusque  
celerem cum facie rubicunda depre-  
hendit: non præsentius, nec effica-  
cius ad causam mali, quæ est humo-  
rum in capite stagnatio, removendam  
occurrit subsidium, quam venæsectio.  
Hæc protinus vel in brachio vel in collo  
instituenda, facta paullo ampliori  
incisione, ut largo cruor exeat flumi-  
ne; vel, si plethorica nimium fuerint  
subiecta, in pede præmittenda, ne  
dato in superiori parte exitu humores  
ex inferioribus eo ruant copiosius;  
tumque adhuc vel in brachio vel vena  
jugularibus repetenda. Et opus inter-  
dum est, ut bis, vel amplius hæc san-  
guinis missio, larga satis quantitate  
secretetur.

## §. III.

Causa  
est præ-  
sentis.

Deinceps, humores stagnantes re-  
vellendo, operæ pretium faciunt cly-  
steres paullo acriores & stimulantés,  
qui ex herbis nervinis rutæ, majoran-  
næ, saturejæ, thymi, serpilli, flori-  
bus liliorum convallium, oleo chamæ-  
meli, & adjecto stimuli causa sale  
gemmæ vel ammoniaci, vel etiam  
urina humana confici, & iteratis non-  
nunquam vicibus infundi debent. Non  
minus egregiam laudem merentur pe-  
dituvia ex aqua tepidiori, herbisque  
nervinis, nec non floribus chamomil-

læ, summitatibus millefolii, cineri-  
busque clavellatis parata; quibus pe-  
des profundius immittendi.

## §. IV.

Sæpius, tusa vena, adhuc superunt spasmi  
spasmi partium internarum, & humo-  
rum veluti febrilis ebullitio: quibus  
temperandis conveniunt diaphoretica  
fixa cum præcipitantibus & nitrosis  
combinata, velut sunt pulveres ex an-  
timonio diaphoretico, lapidibus can-  
cerorum, matre perlarum, cinnabari,  
nitro & fuscino confecti, & ex aqua  
liliorum convallium, vel florum tilis  
exhibendi, addi etiam potest syrupus  
acetositate citri. His enim juvatus  
transpiratio, qua non raro insultus  
apoplecticos, & paralyticos solvi de-  
prehendimus. Nec præterea in de-  
mulcendis partium internarum spas-  
mis, ullum remedium genus superat vir-  
tutem liquoris nostri anodyni mineralis,  
cum liquore bezoardico vel Spiritu  
volatili tartari convenienti dosi re-  
mixti, qui cum dictis pulveribus alter-  
nari, bisque quotidie propinari debet.  
Eodem sine abstineret decet ab omni  
cervicis potu; nec nisi decoctis, aut  
aqua pura vel fontana, vel Sclerana,  
cum modico vini aupta uti convenit.

## §. V.

His, tempestive adhibitis, dicta vi-  
tia, si sint recentia & sola adhuc san-  
guinis stagnatione nitantur brevi po-  
terunt depelli. Ubi vero feri jam se-  
cessio facta videtur, ad illud discutien-  
dum ac derivandum omnis dirigi de-  
bet intentio. Atque hoc in casu, si  
ægri soporosi veluti sunt, atque ster-  
tuant, summo cum fructu adhibere so-  
litus sum emeticum in forma dilutiori,  
analeptici junctum; quo excitantur  
motus, & ad sensum rationisque usum  
redeunt ægrotantes. Ex usu mihi est  
sequens formula: Recipe aquæ libo-  
rum convallium viscosæ, florum tilis  
primulæ veris, cinamomi, aceti de-  
stillati ana uncias binas, Spiritus cor-  
nu cervi succinati drachmam unam, an-  
timonii diaphoretici, cinnabaris, lapi-  
dum cancerorum ana drachmam semis,

EL.

tartari emetici grana duo, syrupi corticis aurantiorum drachmas duas. M. F. mixtura, cujus bina circiter cochlearia, quavis altera hora exhibenda.

## §. VI.

*Volatilia* Deinceps ad discutiendum, quod *serum* stagnat serum, illustrem ferunt opem *volatilia* urinosa, naribus adplicita; e quibus primum locum occupat *Spiritus salis ammoniaci cum calce viva paratus*, & oleo majoranæ vel rutæ permixtus. Non minus suam merentur laudem sternutatoria, cumprimis si nervina simul fuerint; quippe quæ non modo motum nervis inferunt, verum etiam materiam ferream per nares educunt. Formula talis esse poterit: Recipe herbæ majoranæ, florum liliorum convallium ana drachmas duas, herbæ mari Syriaci, florum benzoës, caryophyllorum aromaticorum ana drachmam dimidiam castorei pulverisati grana decem. M. D. S. Schnupf-Zobad.

## §. VII.

*Contra-ria & vesicatoria laudantur.* In rebelli affectu, ad derivandum serum stagnans efficacissima sunt cauteria, ut vocant, actualia, nuchæ inter secundam & tertiam, vel hanc & quartam colli vertebra inurenda, quorum virtus sicut a vetustissimis medicorum magni æstimatur, ita recentioribus etiam exemplis confirmata a Clarissimo ERNDELIO in Waravia physice illustrata pag. 185. At quum delicatior nostri seculi genius non permittat, tam terribili, quale videtur, uti remedio; solemus substituire setacea, eaque nuchæ admove-re; vel si nec ea ariserint, vesicantia remedia aut nuchæ aut pedibus imponere. Posterior locus in subjectis sensibiliioribus priori præferendus: eo quod a vesicatorio cervici adposito, convulsivos partis non affectus motus supervenisse, compertum fuit.

## §. VIII.

*Hæc sunt adhibenda.* Si magis inveteratum fuerit malum: præter dicta, convenientia evacuantia in usum sunt vocanda; ut iis hu-

mores a capite sensim revellantur & evacuentur. Et primo quidem purgantia oportet simul esse balsamica; qua laude pilulæ gaudent ex extractis colocynthidis, aloës, hellebori nigri, resinæ Jadani ligni aloës, florum benzoës, salis succini, myrrhæ, balsami Peruviani ana scrupulo uno, mercurii dulcis drachmisemis, camphoræ, salis volatilis cornu cervi ana granis quatuor paratæ, si viginti quatuor ex scrupulo formentur, & quatuordecim pro dosi propinentur. Inter diaphoretica palmam obtinet Spiritus cornu cervi succinatus, cum liquore anodyno minerali adjecta castorei essentia, & decocta lignorum ex ligno S. assafras santalo rad. chinæ parata. Non satis porro laudanda in morbis capitis serolis est virtus diureticorum, ac speciatim succinatorum medicaminum: e quibus essentia succini, cum antimonii tinctura acri principem tueri locum.

## §. IX.

Quid diutius morbis paralyticis de-  
tinentur, simulque generis nervosi  
debilitate laborant: roborantibus me-  
dicinis, præter rectum vivendi ge-  
neus sibi debent prospicere. Et hoc  
nomine spiritus salis ammoniaci uri-  
nosus cum aqua liliorum convallium  
ita mixtus, ut unus spiritus tres aquæ  
partes recipiat, magnam meretur  
commendationem. Parari quoque  
potest Elixir nervinum ex essentia  
gentianæ rubræ, corticis cascarillæ,  
tinctura antimonii acri, liquore anodyno minerali, & macis ac cinna-  
mi oleo; idque ex infuso melissæ,  
quod citri fovet cortices, exhiberi.  
Qui adperitu languente & stomachi  
debilitate vexantur; iis viscerale no-  
strum Elixir, vel Electuarium,  
quod cortex chinæ ac cascarillæ in-  
greditur, magnas feret suppetias.  
Nec, præsertim senibus, con-  
venientius quicquam erit balsamo vi-  
tæ nostro, si ad aliquot guttas ma-  
ne, cum infuso melissæ sumatur.

## §. X.



nalesctionem hirudines cum fructu ano admoventur, quin in A.N.C. vol. III. append. pag. 164. exstat casus, de hemiplexia, adpositis pone aures hirudinibus, admotisque suris pedum vesicatoriis, brevi curata.

## §. II.

Quibus a paralyticis affectibus caput valde imbecillum, & sensus etiam interni præsertim memoria læsi sunt; abstinere debent ab improvido interno tam thymarum, quam acidularum usu. Namque hæc aquæ per minima capitis vascula, nimium relaxata difficillime progrediuntur; & amplam majori seroforum humorum stagnationi præbent occasionem. Neque etiam acidulas cum vino mixtas loco potus ordinarii tum salutare esse deprehendi, quia vapore spirituoso nimis caput repletur. Verum si ætas juvenilis fuerit, & malum a passione hypochondriaca ortum traxerit: præservando recidivas, operæ pretium faciunt thermæ Carolinæ, illæ nempe temperiores quæ a molendino nomen habent; vel etiam acidulæ, sed tepesactæ: sub quarum potu, qui paucior esse debet a frigore, mœnore, multisque mentis laboribus cavendum, nimio non indulgendum somno, corpus sedulo movendum, medicinisque nervinis & balsamicis utendum est. Generatim scire licet, harum aquarum potationem, malo declinante, & melius vergente, longe opportuniorē esse, quam ubi illud in suo fuerit vigore.

## §. III.

Balnea, quæ arte ex formicis & nervinis herbis parantur, eo efficaciora sunt, quo leviores & tenuiores iis conficiendis assumentur aquæ. Quare optima censetur pluvialis, vel hæc deficiente, quæ post copiosas pluvias ex fluvio desumitur. Sed omnibus artificialibus præstant Toeplicenses, quæ levitate pluviales adhuc superant, & insigni virtute discutiente, & diaphoretica affectis partibus tonum, & roburreddunt. Stillicida quoque harum aquarum principio spinalis medullæ

adhibita ad humores stagnantes dissolvendos. insignem non raro opem attulisse experientia docemur.

## §. IV.

Ad affectus paralyticos, eosque potissimum inveteratos non sine fructu commendantur balnea frigida, item leniter adstringentia, & fotus qui ex radice consolidæ majoris cum aqua decocta consueciuntur. Huc spectant quoque fontes medicati martiales, cujus generis sunt Freyenwaldenses in Marchia & nostræ Lauchstadienses, item artificiales quæ ex scoris metallicis parantur. Sed hæc circa eorum usum observatio necessaria est, ut non ea tepide adplicentur, alias nimium commovendo sanguinis & humorum massam, miras anxietates, cephalalgias, & cordis palpitationes efficiunt. Hæc enim febrem artificialem excitando; suppetias morbo ferunt: quippe constringendo exteriores corporis partes convertunt sanguinis & humorum motum magis ad interiora, inque primis ad cor, & quæ illud ambiunt, majora vasa: unde fit celerior ac vehementior cortis ac arteriarum systole, & ideo celerior etiam humorum per vasa minima circuitus. Hinc fieri potest facillime, ut obstructions referantur, visceri succi resolvantur, & stagnationes discutiantur. At cavendum probe, ne hæc balnea adplicentur corporibus sanguine turgidis, aut dyscrasia humorum, partiumque solidarum imbecillitate laborantibus, veluti sunt senilia.

## §. V.

Capitis lotiones insignem in paralyticis affectibus habent utilitatem, utique in assuetis: quibus si quis haud adfuetus fuerit, incipiendum a levioribus ex lixivio minus acri, incoctis herbis nervinis; dein radix asari, & herba rorismarini insuntur sacculo, inque lixivio coquantur; quæ vero remedia non nisi prævia purgatione licet adhibere.

## §. VI.

In scorbutica paralyti, quæ plerumque

Circa  
thermas  
et  
acidulas.

Circa  
balnea  
frigida.

Circa  
balnea  
artificialia.

Circa  
lotiones  
capitis.

Circa  
paralyti  
in scorbutica.



que particularis & spuria existit, externis parum proficiemus remediis. Opus est potius, ut decoctis infusisque diluentibus, tam calide, quam frigide in vicem potus ordinari haustis, acrimoniam humorum temperemus, eandemque specificis antiscorbuticis, & quibus lumbrici terrestres in pulvere vel succo cum sero lactis sumti eminent, infringamus; tandemque fordes e corpore prescribamus; & has quidem crassiores per alvum commodis in hunc finem laxantibus mannatis ac rhabarbarinis; subtiliores autem & in sanguine fluctuantes per cutis spiracula ope pulverum diaphoreticorum. Nisi enim tota repurgetur humorum massa, perfectæ nullus est curatio locus.

## §. VII.

*Circa  
paraly-  
sin pal-  
pebra-  
rum.*

Paralysis palpebrarum oculi pes metastasin aut stagnationem humorum producit, & nisi cito depellatur, in medicabile constituit malum. Observavi in ea efficacissimum balsamum vitæ nostrum, calide mane vespereque palpebris inunctum; nec non oleum cinamomi & caryophyllorum, modo vera fuerint, cum axungia quadam permixtum. Non negligenda etiam est feri vitiosi derivatio ac evacuatio; quæ per laxantia, diuretica, vesicantia, & id genus alia perficitur: unde de tali palpebrarum paralysis post morbillos suborta, & vesicatoriis curata recensetur casus in A. N. C. volum. I. obs. 140.

## §. VIII.

*Circa  
paraly-*

Paresis ex colica poscit remedia, seu vitiosum ex sanguine per transpirationem prescribentia. Externo operæ pretium faciunt pelles recenter matiatorum animalium calide affectis partibus applicatæ; nec non axungia humana recens, si ejus uncie non drachma olei caryophyllorum addatur, eaque pars affecta perfricetur. Hoc etiam in casu non frustranea est applicatio coctarum cucurbitularum: quibus curatam talem paresin referunt A. N. C. des. I. ann. III. obs. 308.

## §. IX.

In paralyticis affectibus usus aeris fereni & temperati valde utilis est: unde COELIUS AURELIANUS. L. II. C. I. p. 349. ægrum in lucido loco poni jubet. Hinc conclave nimis calefactum, nec nimis frigidum, sed temperatum oportet esse. Victus quoque facilis & tenuis esse debet, eo magis, in principio ubi paralysis acutus plerumque morbus est & ventriculi robur nunquam non est languidum. Nec ulla convenit cerevisia, nec ullo modum præsertim in principio, sed quando morbus jam diuturnus factus est & tunc etiam victus plenior esse potest.

## §. X.

Ad lavandas partes paralyticas, si aridæ & atrophicæ fuerint, spiritus facillime ammoniaci neutiquam convenit; sed præstat eo uti, si partes tumore sint affectæ. Hoc in casu consulum quoque est, tumidas partes tenui sacculo includere, qui sequentibus impleri potest speciebus: Recipe sursum & milii ana manipulos quatuor, mista in scutella aut atheno aliquo supra cineres siccentur, caleant, calida includantur sacculo, quo decumbentis ægri pars affecta circumdetur.

## §. XI.

Graviores affectus capitis, ut lethargus, apoplexia, hemiplexia, &c. sunt senili ætati per quam familiæ, & fere immedicabiles. Igitur præservationis causa magna cum cura & sollicitudine ab omnibus iis, quæ systema nervorum debilitant & circuitum sanguinis per caput impeditionem efficiunt, cumprimis a frigore, præsertim ubi corpus ad sudorem dispositum est, a largiori vini spirituosiori potu, mœrore animi, terrore, venæsectione consueta intermissa, neque minus a nimio tabaci usu, vaporosis ablynthiacis, cerevisia crassiore, humido & vappido aere senes abstinere debent. Quod verò hi dicti morbi rarissime in senibus medelam recipiant, hæc mihi vide-

videtur causa: quoniam eorum sanguis humore valde pituitoso & glutinoso laborat; qui ad regressum sanguinis per subtiliores venas cerebri, quas lentore obstruit, & sinus venosus impediendum plurimum confert. Ad ejusmodi vero obstructions valorum, quæ altius in cerebro situm habent referandas, non tam facilis & expedita medendi ratioprehenditur.

## §. XII.

Curatio  
per locum  
dilectum.

Corpora paralyticorum quando pinguedine, & vitiosorum humorum copia abundant, non facile ad sanitatem redeunt, vel vires recipiunt, nisi dicta, & victu exsiccantur, qui in eo consistit, ut ægrotantes a jurulentis, enixis, & humidis abstineant, & ut parco etiam potu utantur, atque non nisi decoctum ex radice chinæ, rasura lantali, citrini, fassasras cum passulis assumant, & portionem generosi vini; carnisbus non nisi assis vescendum, passulisque exacinaris, corpus quoque, ejusque membra quoad fieri potest, motu exercenda.

ENARRATIONES  
MORBORUM.

## OBSERVATIO I.

Multi-  
plicitas  
doloris  
lateris  
sanato.

**V**Ir quadragenarius, temperamenti sanguineo phlegmatici, per multos annos sub vita parum mobili largam quotidie cerevisiæ Martis-burgensis quantitatem ingerere solitus, adperitu sensum destitui, corpusque valde tumidum præ se ferre coepit, Quo in rerum statu molestam veruginem, artuumque gravitatem per satis longum tempus sensit, & tandem circa verum tempus ex improvise in dextri lateris hemiplexiam, cum memoriz sensuumque interiorum debilitate junctam incidit; pulsu existente magno, celeri, facieque tumida ac subitunda. Quamotrem ex vena in brachio tusa non semel, sed aliquoties multum cruoris detrahebatur, pulsu nihilominus in magnitudine & celeri-

tate sua persistente; nuclæ eocurbitulæ cum scarificatione admovebantur, pulsus tamen magnus esse pergebat; alvo infundebantur enemata, ac intus dabatur infusum mannatum, nec non nitrosi pulveres. Inter horum usum pes movendi potentiam sensim recuperabat; ac manus resoluta manebat, quin lenta quædam febris, circa noctem semper exacerbata accedebat; & pulsus nunquam non celer erat. Tum, missa cerevisia, fontem Selteranum vino nuptum, pro potu ordinario adhibebat; pedes quotidie pediluvii tepidioribus, ex aqua, floribus chamæmeli & trislo lio fibrino paratis immittebat; brachium resolutum spiritu vini camphorato perfricari curabat; ac intus liquorem nostrum anodynum, pulveres digestivo salino nitrosos, & pro sudore eliciendo essentiam alexipharmacam usurpabat. Usus præterea est victu parco & exsiccante: & hinc factum est, ut post aliquot menses prorsus convalesceret, sentiendique pariter ac movendi recuperaverit facultatem.

## EPICRISIS.

1.) Notabile est in hoc casu, quod post tam largam, sæpiusque repetitam sanguinis missionem, pulsus nihilo secius permanferit magnus & celer: qualem quandoque in nimis hæmorrhagiis observare licet. Causa illi, affectum ejusmodi pro caussa plenitudinem sanguinis, ejusque vehementem ad caput congestionem agnoscere; & in vehementia ac diuturnitate a spasmodicis partium internarum stricturis, quæ etiam hæmorrhagias comitantur, & pulsus magni durique fiunt auctores, sustentari.

2.) Ego non semel sed sæpius observavi, quando de ante æstā paralyticorum vita interrogare solitus sum, eos plus iusto genio suo indulsisse, præsertim in assumendo potu spirituosos, sive cerevisia inebriante, aut potente vino, nam ejusmodi potus, quando im-

moder-

moderatus assumuntur, frigidos morbos, ut tremorem, convulsionem, paralyfin, apoplexiam, sopores excitalle, non modo experientia confirmatur; sed & a veteribus medicis, jam olim proditum est. Nam ab immoderato calore & densiores, & glutinosiores fiunt humores, qui per minora vasa difficiliorem habent progressum, & circuitum, inde stagnant.

3.) Pediluvia ex herbis nervinis & roborantibus concinnata, præsertim, si morbus est in declinatione, circumspecte & repetitis vicibus, adhibita non carent eximio usu, & fructu; eo quod corpus noctu disponunt ad sudorem, & blando calore ac humore partes inferiores relaxando, majorem affluxum sanguinis & humorum ad caput præpediunt, neque minus humores lentos ac viscidos tenuiores & fluidiores efficiunt.

4.) De insigni victus exsicantis in paralytici humidioris constitutionis virtute in quonam consistat, jam abunde supra in cautelis practicis §. 12. dictum est.

## OBSERVATIO II.

*Paralyfis morbi in collo co factus.* Juvenis viginti annorum, sanguine & succis plenus, cum meretrice aliquando in lecto decumbens, & venero nimis percitus oestro, ob accedentem ex improvviso patrem, tanto percelleretur terrore, ut paullo post toto corpore debilitatus & languidus, neutrum movere potuerit pedum. Mox hi cum reliquis inferioribus artubus magno quatiebantur tremore; sequentique nocte largo corpus distillabat sudore. Expergefactus mane non valebat incedere; sed regio inferior ab umbilico ad extremum usque pedem omni privata erat sensu, adeo ut nec acus intrusæ vis perciperetur, nec sciret ægrotus, cum alvum deponeret, aut urinam redderet. Nihilominus exhibebant resolutæ partes calorem naturalem, nec marcescebant, nec adpetitus, nec pulsus quopiam labora-

bant vitio. His per integrum annum affectus molestiis, varii generis medicamina, thermas, balnea, nervinaque penetrantissima in & externe, sed in cassum, adhibuit; neque enim purgantes medicinae, nisi magna dosi datæ alvum movebant, nec ulla concitabant tormina. Sensim adeo abolebatur sensatio, ut aliquando, quod notabile est, lapides igniti ægri sedentis pedibus suppositi, cutim vehementer adusserint, ipse tamen præter anxietates præcordiorum nihil doloris senserit; donec tandem a fumo ex accensa cute exhalante certior, quid ei acciderit, factus, circumstantes vocaverit in auxilium. Et hanc miseram per biennium protraxit vitam; quo elapso præcordiorum anxietates, a sumtis potissimum epulis adligere, adpetitus dejici, calor lentus corpus depascere & vires prorsus perire cœperunt, ipseque fatis cessit ægrotus.

## E P I C R I S I S.

1.) Terrorem vehementem non modo convulsivas & epilepticas in continenti producere posse motiones; verum etiam nervorum inferre subitanam resolutionem; hæc docet morbi historia. Actio terroris autem in strictura partium nervosarum, & speciatim membranarum cerebrum ac medullam spinalem involventium consistit; quæ in præsentī casu circa lumbarem contigisse videtur regionem, & eo perniciosior esse debuit, quo vehementiori veneris oestro inflammatum tum fuit corpus.

2.) Ad rariores referri meretur hæc inferiorum partium paralyfis; eo, quod cum movendi potentia, sensus quoque omnis deperditus fuit, adeo, ut nec acus vis, nec adustio per ignitos lapides perciperetur, quum tamen vix occurrat paralyfis, in qua non aliqualis superlit sensatio. Et hæc quidē paralyfis non externas solum occupavit partes; verum interna quoque viscera & cum primis intestina; testantibus purgantium

tium inertia, & sæcum urinæque involuntaria emissionem. Dum vero, ex abolitione omnis motus ac sensus, totalem influxus fluidi nervi in nervos ex spinali medulla infra diaphragma prodeuntes cessationem, non sine ratione colligimus: attamen non omnem viscerum abdominis, maximeque intestinis denegamus sensationem, quoniam purgantia majori dosi data alvum moverunt. Quod facile conciliabit, qui perpendet, intestina etiam a cerebri nervis per intercostales ramos, nervosas adipisci propagines; per quas aliquis relictus fuit sensus.

3.) Medela tali in casu locum vix habet: vero enim est simillimum, medullam spinalem ab eoloco, ubi facta est strictura, collabi, flaccidam, exsuccamque reddi; cui præsumptionem præbet casus A. N. C. vol. II. obs. 102. insertus. Quare non mirum, quod lenta demum febris accesserit, finemque vitæ imposuerit. Nam hoc in rerum statu, languescens sensim sensimque humorum circuitu, pravi impurique per abdominis viscera succi generari debuerunt: unde virium defectus, appetitus prostratio, & lenta febris suam traxerunt originem.

## OBSERVATIO III.

*Talibus  
si ob  
male &  
arum  
infarctu  
vom &  
errare  
substitu* Vir triginta annorum, frigida, sicca, & macilentæ constitutionis, metallurgicæ addictus, aliquando in minerarum saturninarum calcinatione, cælo existente turbido & pluvioso occupatus, ingentem vaporum saturninorum copiam inspiratione hausit sub dulcis saporis perceptione. Postridie de intolerabili circa umbilicum dolore conqueustus, pertinacissimam incidit alvi adstrictionem, quæ omnem clysterum infusionem, & laxantium exhibitionem rebellis elusit. Jungebantur vomendi conatus, cardialgicæ præcordiorum anxietates, gelidusque per corpus erumpebat sudor. Quo in rerum statu pugnatum est antipastmodicis, clysteribus oleosis, balneis,

oleoque amygdalarum dulcium, carminativis nupto: unde remittebat dolorum ac reliquorum symptomatum vehementia. Verum enim vero brevi post nova succedebat adstrictio; quippe sinistra manus dolore pressorio, cum movendi impotentia, absque tamen tumore prebendebatur, adeo ut ea nec flecti, nec ad os duci potuerit. Adhibebantur varii generis sudorifera, balnea Laconica, fotus ac linimenta, sed in cassum: alvus simul adeo compressa erat, ut nisi clysteribus admonita, sui non reminisceretur officii. Meo tandem flagitato consilio suasi, ut æger abstineret ab omnium calidorum, acidorumque remedium usu, loco cerevisiæ decocta biberet, laxante ex manna, passulis, oleo amygdalarum, tartaroque tartarifato alvum moliretur, & adfectas partes axungia humana, oleo caryophyllorum acuta, calide perficeret: unde factum est, ut per Dei gratiam restitutus, diu salvus vixerit.

## EPICRISIS.

Morbus quo post inspiratum sub dulcis saporis perceptione, saturni vaporem, noster est infestatus æger, colica convulsiva, & peculiari cognomine saturnina, die Durten Rare, vocari solet. Familiaris ea est metallurgis, Hercyniæ potissimum Sylvæ accolis, & plumbi venas scrutantibus; & debetur fumis saturninis, ore haustis, & sensibilibus intestinorum tunicis, quas graviter vellicant, infixis. Præter tormina vehementissima, & convulsivos sere totius generis nervosi motus molestissimum in hoc morbi genere symptoma est contumax alvi compressio; & ei familiariter jungitur paresis manuum.

2.) Quo liberior istis in locis, quibus dictæ tractantur minere, quoque serenior est aer; eo rarius occurrit recensitus morbus, quoniam virulentæ exhalationes commodè dissipari queant. At si gravis ac pluviosus fuerit aer; com-

comprimit vapores &, quo minus in auras abeant impedit: unde sub ea tempestatis constitutione frequentissimum est malum.

3.) Curatio in Paresi, ut recte monet CRATO consilio 72. 73. non ad principium nervorum, sed ad musculos, ad quos humor vitiosus transmissus, ut ille discutiatur, & membra corroborentur, dirigenda est, non neglectis illis, quæ intestinorum tonum restituunt, & alvum lubricant. Cum ante aliquot annos in juvene gonorrhæa laborante, ab improvido tincturæ antiphtisicæ Grammani, quæ pro basi saccharum Saturni recipit, usu, contumacissimam alvi adstrictionem cum paresi utriusque manus conjunctam observarem; oleum amygdalarum dulcium recens cum jusculo avenaceo, additis aliquot guttulis olei cymini destillati, crebrius usurpavi, non omisis potionibus mannatis, cum eodem oleo permixtis, quæ tamen non ante apertionem alvi per clysterem emollientem, & oleosum assumptæ fuerunt. Alvo liberiori reddita, usurpata quoque sunt sudorifera, ut Sp. c. c. cum Ess. Succini & Sp. nitri d. Adhibeam porro balnea ex semine lini, & herbis emollientibus & balsamo nostro vitæ, nec non essentia Galbani saturata, manus, resolutæ inunctæ, naturalem suum robur receperunt. Et cum a visus austeris, rubicundis, neque minus malitiose per additionem lythargirii adulteratis, idem morbus, eadem symptomata in Germania, & in provinciis ubi vinorum est provenus, admodum sint familiaria; non aliis, quam modo laudatis remediis illum ipsum curatum fuisse a fide dignis medicis, nobis relatum est.

## OBSERVATIO IV.

Formina triginta annorum, exiliioris staturæ, vasis capacioribus prædita & ob nimiam, qua pollet, sanguinis abundantiam, a quatuor jam annis hystericiis pathematibus cum vehem-

menti capitis dolore, ac violentis vomitionibus tanta ferocitate fuit cruciata, ut sæpius, maxime post iram vel terrorem suffocativis ac apoplecticis corripereur invasionibus. Anno elapso, vigesima post puerperium hebdomade, menses more solito, licet ipsa infanti præberet ubera, fluere cœperunt: qui, cum accedente gravi terrore, protinus supprimerentur, paucis post diebus, prævia spasmodica artuum lincinatione, incidit in dextri lateris hemiplexiam, oris rigore stipatam. Hanc transactis aliquot diebus, febris quædam intermittens excipiebat, a meridie singulis diebus invadens, & per tres durans hebdomades: sub qua tandem per dextrum pedem alba, sinistram rubra efflorescebat purpura. Qua per usum quorundam remedium deficcata, redibat quidem aliquis movendi potentia: at loquela adhuc erat impeditor, & magna lateris resoluti, maximeque manus restabat imbecillitas. Confugiebat ergo ad fontem Lauchstadiensem: quem cum per quatuordecim dies in balneo adhiberet, eruperunt adhuc maculæ scorbuticæ, & sanitas majora sensim cepit incrementa. Ego, cum meum expeteret consilium, suasi ut fontem selteranum tribus horis ante balneum ad mensuram unam biberet, ut quatuordecim dies curæ adhuc insisteret; quo factum est ut præsentissimum levamen atque augmentum in partibus imbecillibus roboris experta fuerit.

## EPICRISIS.

1.) Non opportuniora affectibus apoplecticis & paralyticis sunt subiecta, quam plethorica, & simul hysterica: & certissime illos incurrunt, si excretiones sanguinæ, superveniente, dum sistunt, gravi terrore, subito sistantur. Idem in præsentis contigit ægotante, quam valde fuisse plethoricam, vel hæmotypsis iteratis sponte revertens vicibus testatur. Adhuc

B

san-

Hebdomada  
mensis  
semen  
subito  
cubitus  
emipit

Tom. IV. Pars IV.

sanguinem ipsi fuisse impurum & scorbuticum: docent & purpuratæ in uno pede rubræ, in altero albæ, & scorbuticæ efflorescentiæ; quibus ad cutaneum corticem pulsus, levare plerumque solet malum. Quare etiam recte hic morbus paralysis hysterico-scorbutica appellari potest.

2.) In cura hujus ægrotantis mulieris plethoricæ & hystericæ in eo peccatum fuit, quod non tempestive satis per sectionem venæ detractus fuerit sanguis. Ita forsitan statim paralytica affectio vel arceri vel tolli potuisset; Atque in eo consentientem habeo RAYGERUM clarissimum Hungariæ Medicum, qui *obs. X.* scribit; paralyticæ & hemiplexiæ in senibus sæpe unica venæ sectione in brachio tolli potest.

3.) Vix unquam paralyticum affectum, cum primis recentiore vidi, quin febricula quadam intermittenti simili fuerit stipatus. Sed nulli prolix solatio hæc febris est: quamvis enim nulla paralysis sine febre curetur; uti monet etiam Clarissimus BOERHAVE *Pr. Med. P.V. p. 15.* id tamen de artificiali intelligendum esse febre, jam sub Pathologicis ultima thesi adnotavimus.

4.) De balneis Lauchstadiensibus, quæ valde adstrictivæ sunt indolis, notari meretur, quod in paralyticis affectibus vel ab initio, ubi adhuc mobilis, nec nimis impacta est materia, vel sub finem, ubi non nisi languor quidam nervosi generis restat, cum fructu possint adhiberi. In malo confirmato magis resunt aquæ Aquisgranenses, quæ intumescens stagnantem materiam penetrant, & resolvunt.

5.) Lauchstadiensium fontium pro balneo insignissimum usum atque utilitatem ego primus ante triginta annos inveni atque detexi, & peculiarem de iis conscripti dissertationem, & bona fide testari possum, quod convenienti & circumspecta observatione si usurpentur, ad imbecillia corporis membra roboranda, vix suis similes habeant,

adeo ut etiam in eo certis in casibus Tricipitensium balneorum virtutem exsuperent. Horum operatio fit per febrem artificialem. Nam sub ipso balneo valde tepido subtiliores martiales moleculæ subcutaneis fibris & poris se paullo altius insinuando stricturnam cutis efficiunt, & eo ipso humorum cursum ad interiora urgendo sub celeritate & magnitudine pullum & auctior calor & major transpiratio sequitur, cujus beneficio vitiosi morbifici humores ex partibus exterioribus discutiuntur, & impuri salsi ad habitum corporis protruduntur.

## OBSERVATIO V.

Vir annorum viginti novem, temperamenti sanguineo-cholericæ, habitus spongiosi, potui fabarum Caffee nimium addictus, nec venam sibi unquam secari passus, per biennium, quo matrimonium iniri male habere, ac de spasmodicis passionibus, molestæque alvi obstructione conqueri cepit. Quibus consulturus in manus Pharmacopœi incidit, qui datis medicamentis id effecit, ut abdomen tympani instar intumuerit, & forsitan ipsa accesserit tympanitis, nisi medela fuisset lata. Brevi post rus aliquando petiit, moxque ab itinere intravit conclave valde calefactum; cujus impatiens, apertæ fenestræ adsedit, cervicemque aeris frigidioris flatui expulsi; tum vehementi corpus commovit exercitio, & demum sub vespertino ac nebuloso domum reversus cœlo, loquelæ subito amisit facultatem. Quam, sumto calidiori decocto fabarum Caffee recuperavit quidem, noctemque placido transiegit somno; sed expergefactus nec loqui, nec dextri lateris artus movere potuit. Tusa protinus in brachio sinistro vena, adhibitisque nervinis, diaphoreticis, pediluvii ac frictionibus utraque evanescebat molestia sed memorie quædam remanebat imbecillitas. Verum paucis post hebdomadibus vehementi percellabatur terrore & ab-

hinc

hinc protinus aphonia, & dextri lateris paralyfis iterum prehendebatur. Secebatur in sinistro brachio vena, adhibebantur diaphoretica, laxantia pervina in & externa, balsamica & id genus alia; sed malo nullum excedebat levamen. Lingua enim, utut satis commode moveri queat, articulationem non valet edere sermonem; nec brachium ullo modo moveri potest. Consultus ego suasi, ut velicans emplastrum utrique furarum imponeretur; decoctum ex Ligno sassafras, cinamomo & passulis, loco cerevisiæ potaretur; passulæ rhubarbarinæ laxandi scopo per vices sumerentur; pulvis ex lapidibus cancreum, antimonio diaphoretico, succino, nitro, cinnabari, sale absynthii, radice aaronis & cardamomo bis quotidie caperetur, & denique balnea Lauchstadiensia in usum vocarentur.

## EPICRISIS.

1.) Potus Coffe abusus sicut variis morbis januam pandit: ita ad nervorum morbos corpori affricat quandam dispositionem. Fabæ enim hæ Turcicæ principio expansivo & vaporoso pollent; quo humores commovendi, solidasque & nervosas partes relaxandi, possident facultatem. Hinc occurrit quotidie, quod id decoctum paullo saturatius & largius bibentes de orgasmo sanguinis, & tremore manuum conquerantur: quare etiam BOERHAVE *Pr. med. L.V. pag. 12. abusus, inquit, nimis Theæ & Coffe paralyfin induxit, nervis flaccidis redditus nec amplius contineri possibilibus.*

2.) Paralyfis in præsentī casu debetur cohibitz per subitam aeris mutationem transpirationi; unde humores retroacti, circa medullæ dextri potissimum lateris principium, & nervos sermoni dicatos flagrantur. Et in tali casu si non fiat cunctatio admodum noxia, sed mox accersatur medicus, venæ leceetur, congruisque medicamentis regularis humorum circuitus pro-

moveatur, facile superatur morbus, qui his neglectis aut tardius admittis subsidii, chronicus evadit.

3.) Hoc notari debet apoplecticos & paralyticos motus facile resuscitari. Nam, utut sanata videatur paralytis, relinquit tamen aliqualem partium affectuum imbecillitatem, qua præsentē terror, ira, & quicquid vehementes spasmos producendi facultate pollet, quam facile ad eadem loca humorum motum compellit, ut ibi statim concipiant sensum & motum tollendo, ubi tamen sciendum, quod quo frequentius revertantur ejusmodi affectus, eo intricatiorem & difficiliorem admittant curationem, quæ non modo interna sed & externa efficacissima remedia exposcunt, adeo ut sine balneis & linimentis spirituosius diuturnior affectus non leniri multo minus expugnari possit.

## OBSERVATIO VI.

Verbi divini minister, quadraginta <sup>septem</sup> annorum, temperamenti sanguineo phlegmatici, habitus corporis spongiosi, vitæ sedentariæ, & lubricationibus valde deditus, appetitu integro, ac sanitate illibata, sub venæsectione bis quovis anno celebrata gavissus, nec ad animi affectus, nisi nimiam venerem pronus, pernovissimos aliquot annos in valde calefactis, æstivo etiam tempore conclavibus commorari, largisque perpetuo sudoribus maderē suevit. Qui cum per proximum remitterent biennium; de tensivis ac spasmodicis artuum doloribus; sensu quodam frigoris in vertice & cervice percepti; nec non pedibus gelidis, licet attractu calidi essent, cepit conqueri. Sensim magno carminum fastidio capiebatur, cessantibusque demum doloribus, insigni totius corporis languore verabatur, adeo, ut vix incedere potuerit, & inde sibi mortem ominaretur: deinde lenis mentis alienatio, quia continuo loquebatur, aderat. Mittebatur ali-

B. 2. quando

quando e vena in pede incisa cruor satis larga quantitate, & ecce brevi post circa vespere lingua subito resolvebatur, & vera accedebat dextri lateris hemiplexia. Nam artus sensu motuque carebant; dexter oculus videndi, dextra naris olfaciendi & auris dextra audiendi potentia destituebatur; memoria labefactata erat; nec bene masticare & deglutire poterat; corpusque largo & perpetuo per aliquot hebdomades diffusuebat sudore. Frustra usurpatis vesicatoriis, antispasmodicis, & balsamicis, adibat tandem Lauchstadiensis fontes: ad quos ipsum balbutiente lingua, memoria debili, lateris dextri resolutione, & pulsu in dicto latere vix notabili præditum deprehendi. Iussit igitur, ut mane in balneum descenderet, vesperi pediluvius uteretur, atque elixir balsamicum sub epulis, vesperi pulverem antispasmodicum sumeret; externe vero nucham & dorsi spinam linteis calidis, spiritu florum chamomillæ Romanæ imbutis perfricandam coraret. Balnea ingressus, large sudabat, dolores dextri brachii persentiscebatur, & frigoris sensum percipiebat; at lecto impotens, iterum incalescebat. Et continuata sic per mensem curatione melius habebat; movendique pariter ac loquendi potentiam, relicta imbecillitate atque torpore recuperabat. Commendavi ad plenariam restitutionem victum cum abstinentia exsiccantem ejus auspiciatissimum effectum ego in ejusmodi morbis aliquoties vidi.

## EPICRISIS.

Multa hoc casu continentur momenta, in usum practicum accommodatissima. Sistit ille veram hemiplexiam, in qua non modo alterutrius lateris artus movendi sentiendique facultate carere; sed & lingua balbutire, alterque oculorum, narium, & aurium lædi, memoriaque solet labefactari. Porro deglutitio læsa est, ut potuam præsertim assumptionem suffo-

cata sequatur molestia, & ægri assumpta scopus sanum versus flectere debeant latus; testante exemplo CONSULT. MED. Part. I. Caf. XX. pag. 91. allegato. Non minus interna quoque viscera quandam labem contrahunt; unde haud raro observavi hepar in paralyti defunctis insignem retulisse magnitudinem, ut notavi cit. l. casu XXII. pag. 116. Pulsus in affecto latere tam debilis est, ut digitis vix queat percipi, claro testimonio, imminutam esse articularum vim systolicam. Tali ratione differt hemiplexia perfecta a paralyti lateris alterutrius; in hac enim motus voluntarii, vel ad summum simul sensus abolentur; integra manente facie, ejusque partibus illæsis. Hinc patet, in hemiplexia vera causam simul in cerebro hæere, quæ in paralyti non nisi spinalem afficere videtur medullam.

2.) Causa præsentis hemiplexiæ non nisi sudorum consuetorum cessationi debetur; quæ in corpore per vitam otiosam, multas lucubrationes, nimiamque venem debilitato facilius pernitiæ exferere potuit effectum, quam in robustiori. Eam ob causam curatio per balnea Lauchstadiensia felicem utique obtinere debuit finem; cum sic revocatis sudoribus subtracta fuit materia nervos comprimens. Præterea vero solitus sum in ejusmodi casibus Elixir meum viscerales propinare, eo quod ventriculus plerumque simul labefactatus esse solet.

## OBSERVATIO VII.

Illustrissima quædam comes, quin-<sup>Paraly.</sup> quaginta annos emensa, succi ple-<sup>fit ab</sup>thorica & cacochymica, per<sup>immut-</sup> viginti jam annos fluxum hæmor-<sup>ante hy-</sup>rhoidalem, stato tempore promanentem cum levamine passa, nec<sup>morbis</sup> non fonticulum per duodecim annos in brachio gerens, ab itinere aliquando ad familiares sesto, domum redux, male cœpit habere



re, & nihilominus inter lautam di-  
tam corpore pinguescere. Quo in te-  
rum statu hæmorrhoides parcius fluxe-  
runt, & fonticulus serum fundere pror-  
sus desit; unde habuit illustrissima,  
ut de insigni corporis languore conque-  
reretur. Tandem cruor media hye-  
me per venas fedales erumpere conatus,  
parcissime stillavit; postridie alvum  
egerendi stimulum sentiens, & ad lo-  
cum secretiorem tendens, in medio  
conclavi tanto prehendebatur pedum  
torpore, ut protinus in terram concideret,  
& sinistri lateris paralyti, cum  
oris tortura, lingueque balbutie stipa-  
ta corriperebatur. Vena protinus secaba-  
tur, vesicatoria manibus admoveban-  
tur, & omnis generis remedia in &  
externa usurpabantur; sed in cassum.  
Movendi artus sinistri lateris impoten-  
tia manebat eadem; attamen eisdem  
dolor quidam per vices occupabat; ma-  
xilla sinistri lateris motu carebat, &  
in dextro solum masticandi erant cibi;  
atque memoria paululum videbatur  
læsa; cum febrili commotione, omni  
vespera accedente. Alvus insuper ma-  
gis compressa erat, urinaque ferebatur  
difficilius. Consultus suasi, ut vena in  
pede tunderetur; dorsi spina linimen-  
to ex axungia humanæ uncia una, olei  
nucistæ drachmis binis, rorismarini,  
lavendulæ majoranæ & rutæ, singulo-  
rum drachma una confecto inungere-  
tur, probeque fricaretur; pro potu de-  
coctum ex radice scorzonæ, chinæ,  
sarsaparillæ, ligno sassafras, lentisci,  
santalo citrino, passulisque paratum  
adhiberet; ter quavis hebdomade la-  
xantem pulverem ex rhabarbaro, ter-  
ra foliata tartari, nitro, & oleo destil-  
lato macis sumeret, & mane lactis se-  
rum dulce potaret. Adhæc pediluvia  
cum herbis nervinis rorismarini, ma-  
joranæ, salviæ abrotani, floribus cha-  
mæmeli, thymi & herba rutæ com-  
mendavi; utque ea egressa lecto se da-  
ret, paululumque sudaret; ac deni-  
que sub capulis quinque balsami mei vi-  
tæ sumeret guttulas, suasi. Hinc per-  
cepi paralylin maximam partem re-

Tom. IV. Pars IV.

mississe, & per anum lividi seri por-  
tulum cum levamine secessisse.

## EPICRISIS.

Quum excretiones tam naturales  
quam extraordinariæ & consuetæ sup-  
pressæ vel impeditæ præcipuam gra-  
vium & difficilium morborum cau-  
sam constituent, tum quam maxime  
id in paralyticis & aliis capitis & ner-  
vorum affectibus observatur. De quo  
etiam præsens morbi historia testatur.  
Una illius causa est fonticuli excica-  
tio; qua factum est, ut serum copio-  
sius in corpus retrocederet, & tandem  
ad medullæ spinalis crus sinistrum de-  
cumberet. Altera, majoris ponderis,  
debetur imminuto hæmorrhoidum  
fluori; unde sanguis in tam plethori-  
co corpore retentus, & superiora ver-  
sus congestus, serosum demum dimi-  
sit portionem. Cui quidem eventui  
occasionalem causam dedit hyemalis  
tempestas; quæ ob impeditionem sub  
ea transpirationem, mirum quantum  
his producendis favet morbis. Et præ-  
servari hunc insultum paralyticum po-  
tuisse, extra dubium est positum; si  
eo, quo illustrissima comes ex itinere  
reverti, corporeque oberior facta fuit,  
tempore, vena tusa, aut ano admo-  
tæ fuissent hirudines. Quibus omis-  
sis, omnis utique curandi cardo in eo con-  
sistit, ut hæmorrhoidalis revocaretur  
excretio: quam licet obtinere non li-  
cuerit, attamen satis fuit, seri lividi  
magnam per anum effluxisse copiam.  
Quum enim accessit demum sudoris  
per blanda pediluvia provocatio, &  
hinc facta seri virtiosi evacuatio; aspi-  
citur omaino, malo existente recen-  
tiori, venire debuit eventus.

## OBSERVATIO VIII.

Vir septuagenario major, macilen-  
tus, valisque capaciorebus præditus, <sup>Paraly-</sup>  
constitutionis sanguineo melancholi-  
cæ, in juventute ex vita sedentaria, <sup>et lene-</sup>  
multisque lubricationibus contraxerat  
<sup>ris la-  
proge-  
nario;</sup>

B 3 libi



sibi melancholiam hypochondriacam, sed per congrua adminicula, maximeque motum corporis illam debellaverat. Ab hinc sub venæ sectione, bis quotannis repetita, & frequenti corporis exercitio, quo alvum lubricam servari dixit, integram ad senectutem usque conservavit valetudinem. Per novissimum vero biennium omni mane large sudare solitus fuit; & quum pronuper mense Aprili rus petiisset; imminutis hinc sudoribus, de colicis intestinorum doloribus, & alvi conquestus est obstructione. Brevi post prævia corporis lassitudine, dextri lateris paralysis corripiebatur, lingua dextraque maxilla intumescibat, sinistra extenuabatur, os torquebatur, loquela erat impeditior, movendique manum & pedem dextri lateris potentia evanescebat. Vocatus ego mox sanguinem e vena in pede tusa large detrahendum; clysterem adplicandum; vitæque nostrum balsamum inungendum curavi; interne vero liquorem anodynum, cum balsamo vitæ remixtum propinavi. Factum est inde, ut melius haberet, & loquendi, ambulandi, scribendique facultatem, utut languidior recuperaret; sudores etiam largi per noctes rursus erumpabant, & somnus appetitusque sibi constabant: sed alvus non nisi alternis respondebat diebus, & æger in dextro pede perpetuum sentiebat frigus; quo etiam in toto corpore perfunditur, simulac liberiore se tradiderit aeri.

### E P I C R I S I S.

Quanta mala ex suppressione excretionum consuetarum, sive fuerint sanguineæ, sive serosæ, propullulent, vel præsens docet casus. Obvia enim in illo paralysis non nisi sudorum immutato preventui debetur: unde accumulati in corpore, præsertim senili, humores serosi distenderunt vasa medullæ spinalis principium ambientia, & per illorum poros omniino transdasse videntur. Quemadmodum vero

ortum a prohibita transpiratione traxit morbus; ita non alia exstirpari potest ratione, quam per abundantis feri imminutionem, ac ad habitum corporis revocationem. Prius obtinimus venæ sectione, quippe qua una cum sanguine serolus latex subtrahitur: & dum ope liquoris anodynæ stricturæ cutis relaxata fuerunt, rediit etiam consueta sudatio, cumque hac multum vehementiæ morbi substractum est.

2.) Circa paralyticorum sudores adhuc scire licet, quod affecto latere plerumque copiosiores erumpere soleant. Quum enim humorum vegeta circulatio in eo latere valde langueat, sanguisque tarde moveatur: sit inde, ut serolus latex sub lento progressu a sanguine secedat, & per laxatos tubulos largius exhalet. Hinc etiam observamus, in artubus resolutis exanthemata, scabiem, purpuram &c. longe majori copia efflorescere, quam in sanis.

3.) Membra paralysis resoluta ordinario frigida sunt. Quemadmodum enim corporis nostri calor a motu sanguinis vegetiori & rapidiori proficiscitur: ita quo hic magis languet, eo majus percipitur frigus. Quum igitur in partibus paralyticis languidior sit humorum circulatio: facile patet, cur illæ attactu sint frigida, & curque intumescere soleant; quia nimirum irruptioni humorum serosorum, nulla est resistentia.

### OBSERVATIO IX.

Fœmina, viginti duos annos nata, <sup>Paraly</sup> procera, post enixum partum lochiis <sup>is artub</sup> bene perfuncta, absolutoque puerperio <sup>is artub</sup> e lecto surgens conqueri cœpit <sup>inferior</sup> gravi ventris dolore, ad lumbos <sup>is artub</sup> diffuso, & cum motus imbecillitate <sup>is artub</sup> stipato; qui affectus adeo sensim invaluit, ut binis abhinc mensibus non solum non ingredi, sed nec pedibus absque fulcimento insistere posset. Quin imo tanto torpore manus etiam affectæ sunt, ut nec pondus aliquod attollere, nec

nec ipsas facile contrahere vel explicare valuerit, incolumitamen manente sensu. His demum accedebat motus quidam convulsivus, & rigor partium infernarum; nec non sensus constrictionis in abdomine, ad lumbos usque diffusus. Alvum non nisi sollicitatam deiciebat, & rarius difficulterque urinam reddebat, lunareque tributum, stato quidem tempore, sed parcius solvebat, somno ex istente longiori. Adhibitis varii generis medicaminibus, fontem Lauchstadiensem usurpavit, simulque meo suasu Spinam dorsii Spiritu ex floribus chamomillæ Romanæ destillato inungi curavit: unde sensim majorem movendi recuperavit potentiam.

## EPICRISIS.

1.) Causa præsentis mali absque omni dubio hæret in ea medullæ Spinalis parte, quæ intra lumborum & ossis sacri vertebrae continetur: & vero videtur simillimum, utrum a partu non rite fuisse expurgatum; unde restantes fordes per metastasin ad lumbaris regionis medullam decubuerunt, eamque comprimendo impediunt, quo minus fluidum nerveum in partes, quæ ad istam medullæ portionem suos nervos adipiscuntur, sufficienti influere potuerit quantitate.

2.) Quum parcius effluxus fluidi nervei ex inferiori spinæ medulla fuit; ille omnino in aliis partibus largior & copiosior esse debuit. Hinc patet ratio, cur ægotans nostra in partibus integris convulsivos motus, & in abdomine constrictionis sensum fuerit passa. Notabilis hanc in rem est observatio, quam A. N. C. vol. 11. obs. 102. allegant, ubi miles quidam paralyti abdominis & partium inferiorum affectus, infra costas spurias constrictionem percepit, abdomen chordæ instar ambientem: post mortem dissecta Spina, ejus medulla intra primam lumborum vertebra sita, labæ caruit, nisi quod succus turgidior paullo fuerit: ea vero,

quam sequentes incluserunt vertebrae, tota flaccida & exsucca adparuit. Et hinc clarissimus SALTZMANNUS, dictæ observationis auctor rectissime concludit, constrictionem illam provenisse a succo nervoso copiosius quam par est, in nervos & prima lumborum vertebra prodeuntes influente.

3.) In hac partium infernarum paralyti & mictionis & alvi vel involuntarius fluxus vel pertinacissima retentio observari solet. Utrumque vitium a relaxatione vesicæ aut intestinorum provenire; contradictorium videtur, sed non est. Involuntariam harum sordium excretionem debere partium relaxationi, nemo dubitaverit: at quomodo illius suppressio ex relaxatione provenire queat, multis videbitur dubium. Neque vero opus est, ut explicando huic phænomeno diutius immoremur; quippe quod in CONSUL. MED. Tom. II. Sect. IV. casu 138. pag. 552. fufius demonstravimus. Res credit: omnes canales membranacei totius nostri corporis pollent motu constrictionis & dilatatorio; ad excretionem vero justum partium robur requiritur; quo sub paralyti cessante, vel non sunt excretionem, vel contra voluntatem contingunt.

## OBSERVATIO X.

Matrona honesta, sexaginta sex annorum, robusta, his quotannis veniens nam tundendam præbere solita, a teneris ferme integra valetudine est gavisâ, Anno novissimo neglexerat suam venæsectionem & hyemali tempore consionem in templo audiebat: hinc penâ aliquot dies de vertigine, refrigeratione & languore corporis conquesta, levem quoque mentis alienationem passa, ex improvîso omni sensuum ac rationis usum privata, incidit in hemiplexiam, sub qua dextrum capitis latus convellebatur, sinistrum erat resolutum, & ægra jacebat insensibilis. Vocatus multum sanguinis e vena jubeo detrahi, infundendosque:

Ri 4; curo.

curo clystères: sed quum spes vota falleret, præscribo mixturam ex aquæ lilliorum convallium, melissæ, florum tilizæ, cardui benedicti ana uncis tribus, mixturæ simplicis guttis quadraginta, aceti destillati uncia una, lapidum cancerorum drachma una cum dimidia, cinnabaris scrupulo uno, tartari emetici granis duobus, julepique rosarum uncia dimidia parandam. Hujus bina cochlearia postquam binis sumferat horis; remittebat convulsio, sedibat rationis usus, & ægra intra horas viginti quatuor perfectissime convalescebat.

### E P I C R I S I S.

Sicut naturalium excretionum suppressio; ita artificialium neglectus ad varios morbos, ipsamque nervorum resolutionem, præsertim in senili ætate contribuit. Hemiplectici enim insultus, quem matrona hopesta toleravit, non aliam invenire possumus causam, quam stagnationem sanguinis, per neglectam venæsectionem accumulati & per frigus versus caput commoti. Resellitur simul inde vulgi valde noxium præjudicium, quo senibus non debere sanguinem mitti perhibent: non enim ætati tanta noxa ex omisissis sanguinis missionibus acquiritur, quam quidem senili, propterea, quod vis & elater partium solidarum in ea sensim languescere incipiat, nec satis valeat humorum impulsui resistere. Hanc ob causam eo quoque in præseni curatione respeximus, ut primum sanguinis depleretur abundantia per venæsectionem. Et quando ab hac ægri ad sensum & rationis usum nondum redeunt; multo cum fructu exhibere solitus sum descriptam mixturam, quam tartarus emeticus ingreditur, non eo fine ut vomitum excitare consilium fuerit, sed ut torpidæ & languentes partes nervosæ subtilissima stibii acrimonia vellicatæ, ad motum & sensum recipiendum stimulentur. Nam in medicamentis antimoniali-

bus, quæ paulo majori dosi emesin excitant, si refracta dosi a perito medico usurpantur, plane singularis & incomparabilis ad difficiles & chronicas passionis expugnandas virtus deprehenditur, eo quod glandulas & nervosæ partes irritando lympham stagnantem & corruptam discutiunt, & humores crassos viscidos attenuant, & fluidos reddunt.

Ad præcavendam recidivam & systema nervorum corroborandum præter sollicitam corporis & extremarum potissimum partium a frigore & ventis frigidis præcautionem, conservam florum anthos & florum melissæ turicæ item elæosacharum olei macis & olei melissæ veri, interdum quoque aliquot guttulas balsami nostri vitæ in decocto succoladæ vel Coffee veletiam spiritum oleosum salis ammoniaci pro lubitu assumenda commendavi.

### OBSERVATIO XI.

Vir quidam, ecclesiastico præfectus <sup>in salute</sup> muneris, sexaginta annorum, temperamenti sanguinei, habitusque succi <sup>populi</sup> pleni, ad quadragesimum usque annum integra sanitate gavissus; postea <sup>stili in</sup> vero nephriticis affectibus infectus, <sup>corpo</sup> sed ab his ope Amasiani fontis liberatus est. Deinceps ad aulicum promotus officium, ad vitæ genus solito magis lautum, diætamque vinosam pervenit, vinis potissimum rubicundis utens, & valde frigidum adeptus est habitaculum. Sex abhinc annis podagra chiragraque, cum spirandi perpetua difficultate & tussi stipata corripiebatur; quæ mala sæpius repetebant, & tandem erumpente post usurpata antiscorbutica purpura, insigniter remittebant. Ante biennium mense Novembri ex improvise apoplexia leviori infectus, sensuumque & rationis usu privatus concidit; sed rufa vena, adhibitoque Spiritu cornu cervi succinato, tinctura antimonii acri & essentia castorei, ad valetudinem redibat: utique cum & podagra & purpura recedescere.

descerent. Sequenti tempore multa tulla adversa, ideoque perpetuis confectus mœroribus, magis magisque suum debilitavit corpus; quin memoriæ quandam sensit imbecillitatem. Tandem accidit, ut prævio pulsationis circa aures sensu, caput subito dextrorsum convelletur, & æger paullo post sensu, motu, ac rationis usu destitutus, instar apoplectici prostereretur. Ad se rediens, cruoris quidpiam naribus reddidit, adhibitisque venæsectione & fritionibus, rationis integritatem recuperavit; sed tumorem dextri oculi inflammatorium retinuit, qui cum malorum reliquiis tertio demum post die, revertente podagra, penitus evanuit. Quum verò pulsatilis pone aures dolor continuaret, metumque reversuri mali injiceret: præter cœcurbitulas cum & sine scarificatione juxta aures adpositas, quatuor circiter e brachio mittebantur languinis unciz. Nihilominus vires mirum in modum prostratz manebant; unde meum ad averterendam recidivam implorabatur auxilium.

### EPICRISIS CUM CONSILIO.

Primarius, quocum hic æger confistatur, morbus est apoplexia, quam diximus spasmodicam; quæ humorum stagnationi in basicebri suam debet originem: hanc enim vel solus pulsationis circa aures sensus significat. Neque mirum est, ægrum tanto rapi morbo: quum enim natura temperamento pollet sanguineo, ad sanguinis justo majorem generationem aptissimo, & præter consuetudinem in opiparum vinolumque devenit victum; præter modum omnino succi debuerunt accumulari. Quare etiam experientia teste plurimi ex nimia ingluvie & comestationibus, in paralyticos morbos incidunt. Deinde vina rubicunda, quia ut plurimum sunt austera & adstringentia, ad affectus nervorum inque primis paralyticos gignentes multum conferunt, & ob hanc causam etiam Moravia incolis paralytici endemium morbum esse

Jordanus prodidit. Cavere quoque sibi quam maxime debent ab ejusmodi austeris vinis podagrici, præsertim in senili ætate constituti. Nam ex remanente hac critica excretionem gravissima oriri afflictiones necesse est. Accedit habitaculum frigidum; in quo salutaris transpiratio vehementer solet imminui. Hinc factum est, ut fordes in sanguine suborirentur salinæ, acres, tartaræ; quæ corpus ægri ad scorbuticam constitutionem, podagram & purpuram disposuerunt. Quo in rerum statu, junctis insuper mœroribus, meditationibus, vita sedentaria, accrevit nervosi generis debilitas; cujus ratione & purpuræ & podagricæ materiæ vegeta ad corporis superficiem expulsio imminui cepit. Unde abundantes pariter ac impuri succi ad caput fuere compulsi, ibidemque stagnantes, apoplecticum produxerunt insultum; qui, vocato mox medico, missoque protinus sanguine, bis feliciter superatus fuit.

2.) Cum ego vocarer in auxilium; nihil prius tentandum duxi, quam donec vires fuerint refocillatz. Hunc in finem præscripsi potionem analepticam ex aqua melissæ, florum acaciæ, liliorum convallium, tiliz, rosarum ana uncis binis, cinamomi sine vino uncia una, matris perlarum drachma una, Spiritus nitri dulcis guttis triginta, syrupi acetosistatis citri drachmis binis confectam, eamque ad duo vel tria cochlearia sæpius sumendam suasi. Vespere pulverem ex lapidum cancerorum, pulveris Marchionis ana drachmis duabus, succini, nitri drachma dimidia, cinnabaris præparatz granis duodecim, castorei granis sex compositum, & ad drachmæ pondus capiendum ordinavi. Jussula medicata mane forbiliari jussi: alvumque obstructam clysteribus aperendam curavi. Sic collectis viribus, suasi, ut ad corrigendam sanguinis impuritatem propotum ordinario decoctum radice chinæ & cichorii cum pasulis biberet, a cœna abstineret, & victu

victu attenuante ac leniter exsiccante & roborante uteretur. Cæterum non possum non hoc loco referre, me hemiplexiam a nimia ingluvie & desidia in corporibus maxime mollioribus ac spongiosis pinguiusculis enatam dixta emaciantie Dungen-Cur, & lignorum decocto, methodo, quam optime descripsit VALLERIOLA in obs. I. obs. III. p. 23. feliciter curasse. Vitentur carnes bubulæ, porcinae, hædinæ, lactaria, legumina omnia & fructus, somnus meridianus, sed exercitium in rheda est utilissimum.

## OBSERVATIO XII.

*De præform. duæ op. p. 101. in obs. I. obs. III. p. 23.*  
Comes quidam illustrissimus, annorum sexaginta, temperamenti phlegmatico sanguinei, iter aliquando per fluvium Danubium in navi sub aere humido, nebuloso & valde pluvioso per tres continuos dies faciens, incidit ex improviso in dextri lateris hemiplexiam; sub qua manus pedesque dextri lateris immobiles, linguaque gravis & balbutiens evadebat, & æger delirabat. Inepta protinus vena, redibat valetudo, & vir illustrissimus, intra viginti sex horarum spatium perfecte convalescebat. Abhinc dixta & sex rebus non naturalibus optimeungebatur; humidam frigidamque tempestatem, tanquam ipsi noxiam fugiebat, & quotannis semel venam tundendam præbebat. Quo in statu satis equidem sanus vivebat; at, quum per intervalla manuum stuporem, cum dolore & sensu fornicationis, sentiret, metuens recursum, gravioris mali, meum petebat pro eo præcavendo consilium. Ego, quum noscerem, ægrum illustrem multis mentis laboribus fatigari, fluore hæmorrhoidali obnoxium esse, suasi, ut bis quotannis circa æquinoctia venam in pede secandam curaret, motui corporis plus, lucubrationibus minus indulgeret, ab imo præsertim ventre & dorso frigus humidum arceret, & pro potu fontem Selteranum, quarta vini Rhenani parte

remixtum, interposito nonnunquam vini Hungarici haustu, adhiberet. Ex pharmacis tria commendavi, pulverem nempe nervinum ex matris perlarum, pulveris Marchionis, succini præparati ana drachmis binis, cinnabaris scrupulo uno, ambræ gryfex granis duodecim & olei macis cinnamomique ana guttis tribus confectum, inque decem parres divisum, quarum unam alternis diebus ex aqua frigida sumeret. Ad ventriculum roborandum exhibui Elixir viscerale, septuaginta guttis inter epulas capiendum; & vitæ balsamum nostrum, ad inungendas manus & cervicem proposui.

## EPICRISIS.

Illustrissimus de quo sermo est æger vi temperamenti, quo pollet phlegmatico sanguinei, ad languidiorem solidatam partium motum proclivis est; & accedentibus quamplurimis mentis laboribus, ac fatigationibus, insignem utique generis nervosi sibi contraxerat debilitatem. Hinc facillime fieri potuit, ut in diuturniori sub aere pluvioso ac nebuloso, commoratione, cohibita transpiratione, hemiplecticus suboriretur insultus, tempestiva venæsectione brevi debellatus. Ex tali pluviosa tempestate vero paralysis chronica & pituitosa nasci posse, confirmat variis exemplis FORESTUS L. X. obs. 83. segg. ad quas expugnandas commendat assata præcoctis, victum tenuem & exsiccantem, & ut ægri in aere sicco, & cubiculo caryophyllis suffumigato versentur. Laudat quoque clysteres, primo mitiores, tum fortiores; pilulas de hiera simplices & compolitas, nec non cochias. Ad sudorem movendum decoctum bardanæ præscribit, & denique nucham, spinamque oleo, nardino, & collino, philosophorum, sambucino, rutaceo, de euphorbio inungendam suadet. Spectat huc quoque insignis locus apud GALENUM de locis affectis cap. IV. Quidam tempore frigido & pluvioso madid.

*madido pallio collum diutius obvolvitur, unde in manus paralyfin incidit.*

## OBSERVATIO XIII.

*Hemiplexia cum subsequente morte.*

Vir quinquagenarius, temperamentum sanguineum melancholici, victu duriori, & crasso, nec non vini ob parsimoniam spiritu frumenti, floribus papaveris rhizados tincto, cerevisiaque valde tenui & lupulata, & nimio Tabaco usus, atque lubricationibus, anxii curis & iracundia deditus, scepe numero iestero, a crebra ira inducto, satisque pertinaci laboravit. Aliquando factum est, ut mane sanus surgens, & jentaculum assumens, ob frustula placentæ in asperam arteriam delapsa, validissima tussis, cum vehementi pectoris concussionem, vultus tumore ac rubore, & lacrymarum profusione stipata corripereetur. Sedata motuum violentia, robur sinistri lateris labefactum erat, adeo, ut nec artus, nec corpus movere, nec pedibus inniti potuerit. Deportabatur in lectum stragulisque obruebatur; sed malum incresecebat cunctis, & lingua non minus, quam totum latus sinistram resolvebantur penitus. Medicus vocatus sanguinem e brachio dextro detrahendum curavit; sed sine ullo levamine; æger potius gravi sopore obrutus jacebat, sub quo dextrum brachium vehementer agitabat, exasperatus sinistram attollere nequibat palpebram, assueta deglutire via valebat, alvum cite deponebat, & urinam per biduum retentam largiter emittebat. Nec silentio prætermitti debet, sub invasione hemiplexiæ vomitus quosdam multæ pituitosæ ac biliosæ materiæ supervenisse. Visit in tam misero statu per septem dies; quibus elapsis crevit sopor & memoriæ abolitio, & demum, frustra usurpatis variis medicaminibus exspiravit.

## EPICRISIS.

Discimus ex hac morbi historia 1)

quod a validiori pectoris per violentam tussim & concitationem expirationem commotione, sanguis tanto cum impetu ad caput urgeri queat, ut minus respondente ejus per venas regressu facillime in partibus capitis internis stagnare, & serum extravasari possit. Contingit hoc eo facilius in subjectis, quæ crasso, copiosoque sanguine, & alvo segniore possent; atque quibus debilitatum est cerebrum, gentisque nervosum. Quæ omnia in præfenti locum inveniunt ægro quippe qui diæta crassa, & spiritus frumenti, papavere rhizados tincti usu crassos succos, per graves vero meditationes ac ærumnas nervosi generis imbecillitatem, sibi met omnino contraxisse videtur.

2.) Omnium malorum causa in seri stagnatione querenda est; quod sicuti circa spinalis medullæ principium hærens, hemiplexiam parit; ita corticem cerebri inundans soporosum produxit affectum. Et pessimi semper in hemiplexia præfagii est, si lateris sani convulsivæ agitationes accedant, & malum cum vomitibus invadat: tum enim graviore est presumenda partium internarum lætio.

3.) Quæquam tales morbi opem eludant; tamen religiosum medicum non decet, ab eorum curatione manus subtrahere. Cuiusmodi rei in eo vertitur, ut sanguis per venæsectionem imminuatur; clysteres paullo acriores injiciantur; vesicatorium nuchæ admoveatur; Spiritu volatilis naribus offeratur; capitis talo epithema ex aceto rosaceo, tutaceo & Spiritu vini camphorato paratum imponatur; & Spinalis medulla linimentis nervinis inungatur.

4.) Denique monemus, ut omnes senes, plethorici, & qui sunt debilioris cerebri, sibi sedulo caveant ab omnibus rebus, quæ pectus in motum concitare & tussim ciere valent. De paralyticis & hemiplecticis morbis legi possunt CONSULT. MED. Tom. I. Sect. I. casu XLVI. ad XXVII.

CAP.

## CAPUT II.

DE AFFECTIBUS SOPOROSIS.  
COMATE, CARO, ET  
LETHARGO.

## THESES PATHOLOGICÆ.

## §. I.

De so-  
porosis  
affecti-  
bus per  
quam  
confuse  
apud  
Medicos  
est histo-  
ria.

**A**ffines apoplecticis & paralyticis, & cum iis sæpenumero conspicientes sunt morbi soporosi: quorum tam confusa, tamque intricata apud medicorum plerisque reperitur historia, ut cui credant, dubii omnino relinquuntur lectores. Hinc quidam Medici, velut HOLLERIUS & RONDELETIUS multas de ea confusione habuerunt querelas & ne eam committerent HARTMANNUS, RIVERIUS, & PAULUS BARBETTE, de morbis iis generatim potius, quam singulis speciebus agere maluerunt. Verum, quo magis eorum causas, & his innixam curationem variare, ex infra dicendis patebit: eo curatius quoque signorum diversitatem esse attendendam putavi. Et quæ hac in re sedula, ac diuturna me docuit experientia; mihi nuper BARTHOLOMÆI de MOOR *Pathologiam cerebri* perlegenti, ita videbantur comparata, ut cum iis observationibus, quas clarissimus vir *Cap. VII. de affectibus soporosis* memoriz reliquit, exacte conveniant. Sequar igitur ipsius ordinem, etque nomina, quæ huic vel illi somnolentiz speciei imposuit, omnino retinebo.

## §. II.

Soporosis  
soporis  
affectibus  
dispositio  
et  
differe-  
ntia.

Per soporosos affectus intelligo præternaturalem in somnum propensionem, ipsumque ut plurimum soporem inextinguibilem, mox sine mox cum febris stipatam, ab impedito fluidi nervi in medullam cerebri oblongatam, ipsosque sensui motuique tributos ner-

vos sufficienti influxu propullulantem. Plures horum morborum recensentur species quarum præcipuas coma vigil, somnolentum, carus & letargus constituunt. Omnes in eo conveniunt, quod in iis præternaturale circa somnum occurrat vitium: attamen ratione gradus, causarum & curationis omnino differunt, adeo, ut neutiquam sit alienum cujusvis speciei genium præstius rimari.

## §. III.

Coma vigil hæc se prodit notis: *Historia Comate vigilis*  
Aegri conqueruntur de capitis dolore, magis tamen ardente, & velut expansivo, cum sensu ebullitionis intra caput stipato; maxime opere in somnum propendent, illumque anxie anhelant: attamen vel prorsus nequeunt dormire, vel si obdormiscant, mox parum levati expergilantur, ab omni adhuc immunes delirio. Neque enim antecesserunt hunc affectum diu protrahere vigiliz: unde ii, qui post longas vigilias a somno sibi temperare nequeunt (de quibus vulgus dicit: Die sind schlaffrig, und sonnen doch vor Matigkeit nicht schlaffen: non dum comate hoc laborare censendi sunt. Differt etiam coma hoc a pervigilio, quod familiare est acutis febribus: hoc enim nullam ad somnum proclivitatem habet comitem, (unde vulgo dicunt; Et sanno nicht schlaffen, sagt auch nicht daruber: quæ tamen comatosus est molestissima. Malum hoc semper est symptomaticum; siquidem acutis, ardentibus, malignisque febribus, & inflammationi matrisdure sæpe tanquam symptoma jungitur, inque his non raro phrenitidem antecedit. Idem vero symptoma hemiplexiam interdum comitari, nonnullis mihi innouit exemplis, quorum unum in CONSULT. MED. Tom. I. Sect. I. Cas. XX. pag. 91. legere licet.

## §. IV.

Somnolenti comatis hæc fere sunt signa: ægri languentes, a febrili incendio prorsus liberi, nec fere habentes, de quo conquerantur, nisi de al-  
*Historia Comate somnolenti*  
lidua



fidua somnolentia, contra voluntatem semper dormiunt, somnoque scēpius inter edendum cum amicis colloquendum, vel munera obeundum obruunt profuso: per intervalla vigilant, sed brevi post somnolenti rursus obdormiscunt. Hoc malum senes potissimum, qui laeta dicta utuntur, sanguinisque negligunt missiones, corripit, nec parcat juniori ætati, si idoneæ concurrant causæ. Est etiam idiopathicum semper; & in eo a vigili simul se distinguit comate, in quo anhelantes somnum, ejus participes fieri nequeunt; quo comate somnolento affecti, abunde fruuntur. Hujus exemplum existat in CONSULT. MED. T. I. Sect. I. Casu XV.

## §. V.

Carus est sopor profundissimus, ex quo ægroti nec per clamores, nec agitationes, nec si vel eos acu pupugeris excitari possunt; aut quamvis sentire acus stimulum videantur, tamen vel non loquuntur, vel mox in priorem relabuntur soporem. Jacent attonitorum iastar; ac spiratio ferme naturalis, & dormientium similis est. Malum vel idiopathicum est, vel symptomaticum; & sæpius febre stipatum: sed, hoc optime monente BARTHOLOMÆO DE MOOR Cap. VII. pag. 198. tres exhibet species. Prima est, quæ sociatur acutis febribus, circa earum principium, vel incrementum; cui nonnunquam convulsionibus superveniunt ac lingultus, vitæ impoentes finem. Altera est, cum ægri post toleratas vehementiores acutas febres ex insigni infirmitate altos incidunt sopores, inque iis per aliquot dies permanent, excitati ad interrogata respondent, mox vero iterum obdormiscunt, & tandem expersæcti, ad se redeunt, omniumque, quæ sub eo sopore loquuti sunt, inscii convalescunt: cujus mali mentio fit in CONSULT. MED. Tom. I. Sect. I. Cas. XIV. pag. 60. Contingit etiam talis sopor per febres acutas, maxime, exanthematicas. circa dies

criticos; tumque sudore junctus optimum exhibet præsagium. Tertia species cari occurrit in mortis ex febre proximis: per unum enim alterumve ante mortem diem ægri febrili tyrannide cunctis exhausti viribus, sensu motuque destituti, ac alto fopore oppressi jacent, subque exaspitant animam.

## §. VI.

Qui denique *ἐν τῷ λήθει* ab oblivione dicitur, lethargus, est gravis assiduusque sopor, quo ægri perpetuo sine vigiliarum sere intervallis, tantum abest, ut hæc tam longa sint, quam in comate somnolento, obruuntur. Excitati respondent, sed eorum iastar qui ab alto & tranquillo somno præmature suscitantur, dictorum nescit, & oblivisi in pristinum mox relabuntur soporem: quidam matulam possunt, manuque tenent, mingendi tamen memoriam, mox iterum obdormiscunt amittunt, vel oscitantes os claudere obliviscuntur. Sic a comate somnolento patet differentia. Jungitur autem, & quasi Symptoma lethargo supervenit febris, quæ mitior est magisque pulsum semet exeret frequentia, & spiratione rara febrilique. Hinc discrepat a caro, qui sæpius est sebrum vel symptoma, vel consecrarium, & sentiendi quoque impotentiam habet comitem. Differt etiam ab apoplexia, quæ subito invadit, cum omnium & sensuum & motus voluntarii abolitione, ac stertore, citiusque necat, quam lethargus; quippe qui ultra septimum non raro producit diem.

## §. VII.

His morborum sopororum historiis præmissis, addemus sectiones anatomicas, iis denaturum, atque tunc causarum perquisitioni studerimus. Pleraque nobis suppeditat solertissimus BONETUS, qui in anatomis ejus præctica, quam *sepuibretum anatomicum* vocat, Lib. I. per tertiam eamque integram sectionem, soporis affectibus extinctorum anatomis exhibet. Ampla nimis foret recensio

*differtio  
lethargi*

*Sectio  
anatomica  
soporosis  
affectionibus  
anatomicis*

omnium, quæ adducit, exemplorum; sufficiat, summa illorum allegasse capita. Sic invenit in plerisque serum copiosum per cerebri substantiam diffusum, ita tamen, ut pars ejus potissimum exterior, seu cordicalis cum meningibus, aquis fuerit inundata: & simul adnotat, quod in quibusdam interiora, ac penetralia cerebri salvo cortice, extravasato sero repleta viderit, ea vero subiecta per totam vitam soporoso neutiquam laboraverint affectu. Hoc diluvium cerebrinum, quo magis ad medullam cerebri penetravit; eo majorem soporis gradum per vitam fuisse animadvertit. Deinceps invenit quoque in sopore peremptis abscessus, scirrhus, tumores in cerebro: sed hi quoque non aliam quam anteriorem & corticalem ejus regionem obfederunt. Et denique in nonnullis, cerebro existente sicco, & a serosa coluvie libero, deprehendit vasa piaz potissimum meningis cruro crasso admodum sarta disenta, & velut varicosa: cumprimis in lethargicis membranas cerebri inflammatas vidit Johannes Faber Lyncius; teste HARENDEZ *L. IV. cap. 18.*

## §. VIII.

Indolem nostrorum affectuum illustrandi causa, addemus adhuc quasdam observationes huc spectantes. WEPFERUS & PEYERUS canibus per plus minus graviolem cerebri a cranio denudati compressionem, arte soporem conciliare docuerunt: & perquam notabile est exemplum cujusdam mendici Parisiensis, cui casu quodam magna cranii pars deperdita & cerebrum denudatum fuit. Hic ex leviori cerebri compressione oculorum obtenebationem; ex paullo fortiori, aurium tinnitum; ex adhuc graviore vertiginem & soporem passus; & cessante pressione, ab iis iterum liberatus fuit symptomatibus. Conf. BOETII *diff. de epilepsia ex depresso cranio*. Cui quidem observationi majorem affundit lucem, cranii per trepanum a chirurgo fieri solita terebra-

tio; qua, in subiectis ex sanguinis inter cranium & cerebrum facta extravasatione, & hinc pendente cerebri pressione soporosis, educto ope trepani stagnante humore, protinus sensus redire, omnemque soporem discuti per fide dignas compertum habemus observationes. Ex quibus certo concludimus, quod materialis causa affectuum sopororum intra corticalem cerebri substantiam primario & originaliter contineatur.

## §. IX.

Jam ex physiologia (*vid. SYSTEM. Causa MED. Tom. I. L. Sect. III. Cap. VI. §. 3. segg.*) repetimus, somnum naturalem ab influxu fluidi nervei in nervos sensibus, motibusque voluntariis tributos imminuunt, ac languidiori dependere: hunc vero languidiorem influxum partim ipsorum nervorum relaxationi, partim fluidi nervei penuriz, partim tardiori sanguinis per vasa cerebri & membranarum circulo deberi. His cum iis, quæ præcedentibus paragraphis dicta sunt, collatis, sequitur, causam proximam affectuum sopororum esse valde languidum ac imminutum fluidi nervei ex cortice cerebri in hujus medullam & inde in nervos sensui motuique dicatos influxum. Causæ hunc influxum præter naturam impediens tres potissimum esse videntur; nimirum vel nimia fluidi ipsius penuria, vel tubulorum illud vehentium laxitas, vel denique compressio cerebri corticalis, eaque seu per sanguinem tardius per cerebrum & ejus involucria progredientem, aut plane stagnantem, seu aliam peregrinam, dicto cortici incumbentem materiam facta: unde medulla undique cortici adnexa comprimitur simul, & ideo non satis fluidi recipere potest.

## §. X.

Quum vero plures affectuum sopororum sint species; singulam perscrutemur curatim. Vigil coma medius quasi inter pervigilium, & affectus soporosos morbus, ubi somni desiderium inexplabile urget, licet ipse

Causa  
Med.  
Tom. I.  
L. Sect.  
III. Cap.  
VI. §. 3.  
segg.)  
repetimus,  
somnia  
naturalem  
ab influxu  
fluidi nervei  
in nervos  
sensibus,  
motibusque  
voluntariis  
tributos  
imminuunt,  
ac languidiori  
dependere:

Coma  
vigil.  
la  
febr.  
hæc  
an  
thiolo-  
gia.

capi nequeat, est Symptoma vel hemiplexia, vel febrium acutarum, maxime cum duræ meningis inflammatione junctarum, & sæpius antecedit phrenitidem. Causam ipsius mixtam esse debere, qua in uno cerebri loco fluidi nervei influxus languidior, in altero auctior sit, quilibet pervidebit facile. Consideremus ergo, num talis causa in dictis morbis locum habeat. Quod febres acutas attinet, sic concludimus: Si in iis coma vigil ut plurimum antecedit phrenitidem, quæ juxta MED. SYSTEM. *Tom. IV. P. I. Sect. II. C. V. §. I. segg.* ab inflammatione membranarum cerebri suboritur, & nostris in regionibus symptomatice ut plurimum febribus malignis exanthematicis supervenire solet; si etiam cum dolore ardente ac ebulliente complicatum est: vero videtur simillimum coma vigil in iis febribus pro causa mediata agnoscere, membranarum cerebri involvendum incipientem in uno loco inflammationem. Quum vero inflammatio supponit sanguinis auctiorem ad locum quandam congestionem, & plane stagnationem: necesse est, ut inde cerebri corticalis pars quidam comprimatur, & hinc introitus fluidi in medullam immittatur, cum insequente somnolentia effectus. Hoc dum in uno cerebri sit loco; in altero tamen a sanguine per febrilem motum celerius agitato, jugis fluidi nervei perennat secretio; quæ, quo est copiosior, eo magis vigilas inducit, nec præsentem ad somnum proclivitatem in actum deduci sinit. Quicquid igitur in febribus acutis sanguinis organismum adaugere, ejusque copiosorem ad caput progressum adjovare valet: illud remore ad coma vigil inducendum contribuit; veluti sunt remedia spiritiosa, calidiora, alexipharmaca, regimen justo calidius, refrigeratio extremorum in variolis.

## §. XI.

*Comati.* Quæ coma vigil ratione jungi queat  
*vigiliæ* hemiplexia; explicatu facillimum est.

Si enim perpendimus, in eo affectu *in hemi-*  
nervorum principum in uno latere *plena*  
tantum comprimi; & sic influxum *ab illi ad*  
fluidi mobilissimi in unum duntaxat *obito-*  
latus impediri, altero immuni; mox  
quoque intelligemus, quod in uno loco  
& latere pervigiliæ, in altero somnolentia, ex quibus componitur vigil  
coma, latere possit causa: eo quod  
succus nervosus denegata in uno latere  
secretione ad alterum eo copiosior feratur;  
quod inter alia integri lateris convulsivæ  
testantur agitationes. Verum  
cur non omnes hemiplexici sunt comatosi? Legas, quæ §. VII. ex BONETO  
allegavimus, & invenies, solam principii nervorum compressionem  
non secum semper habere soporem, nisi simul corticalis cerebri substantia fuerit vitata.

## §. XII.

Coma somnolentum, frequentior *Comati*  
perfecto, quam lethargus & a febre *somno-*  
semper vacua affectio talem habere de- *stant a-*  
bet causam, quæ transitus fluidi nervei *obito-*  
ex cortice in medullam non in uno *pla-*  
loco, sed per totum impediri potest  
cerebrum. 1.) Talis est nimia relaxatio  
canalium sanguinem per cerebrum  
vehentium, ob quam nec sanguis vegete  
progrederi, nec satis fluidi secerni  
potest: sicut fere fit in semibus plethoricis.  
2.) Sanguinis, præsertim spissi  
ac impuri difficilior per caput circulatio,  
& inde pendens cerebri compressio.  
Hinc plethorici sunt somnolenti,  
hinc scorbutici, & hypochondriaci  
hunc frequenter incurrunt soporem,  
eoque magis, cum per imi ventris spasmos  
thumores eo copiosius compellantur  
ad caput: hinc quoque petenda comatis  
somnolenti ratio, quod, teste RIVERO,  
pueris lumbricis vexatis nonnunquam  
evenit; siquidem hoc in casu per  
abdominis spasmos vitales succi coguntur  
ad superiora. Hinc valde plethorici,  
accidente causa sanguinem nimium  
commovente & expandente, ut ebrietate,  
profundo immergi solent sopori,  
eoque plane necari. 3.) Seri nimia  
per membranas cerebri, ita-  
lud-

ludque ipsum collectio ac plane extravasatio: unde aurium manationum, coryzae, ulcerum improvidae suppressiones, & exsiccationes, ad id morbi genus contribunt; nec rarum est, ischuriam seu plenariam urinae suppressionem presso pede coma sequi somnolentum, quod restituito urinae fluxu, protinus cessat.

## §. XIII.

Cari,  
ejusque  
prima  
/puclet  
attributione  
gla.

Cari prima species, quae in principio, aut vigore febrium acutarum maxime synocharum nonnunquam, nec nisi in valde plethoricis, occurrit, dependet ex nimia sanguinis abundantia & ebullitione, qua cerebri & ejus membranarum vasa adeo expanduntur, ut comprimant mollem cerebri substantiam, & nervosi succi introitum in medullam per totum impediunt caput: unde succus ille per cerebellum in partes, functionibus vitalibus praefectas eo copiosior impellitur, cordisque systolem efficit vehementiorem. Hinc cognitu facillimum est, cuncta exasquantia, ac commoventia remedia in iis febribus adhibita, nec non intermissam venesectionem; remotius narcoticorum, ad conciliandum somnum, inepte exhibitorum abusum proximius ad eam in febribus producendum, multum conferre.

## §. XIV.

Cari  
ejusque  
secunda  
et  
tertia  
/puclet  
attributione  
gla.

Ad cari alteram, quae post superatas fere acutas febres sequitur, speciem plures contribunt causae. Non enim ignorari oportet, per febrile incendium tam fluidas, quam solidas partes mirum in modum alterari: solidae scilicet a naturali vigore & toni deiciuntur, fluidae vi continui attritus resolvuntur, & transeunt in crasin eorumque vitali non nimis amicam. Namque humidior ac generosior succorum vitalium pars, non accedente novo nutrimento, dissipatur, perque varia loca et corpore proscinditur: & hinc resultat fluidi nervi penuria, lymphae ferique vappida, & quasi gelatinosa consistentia, ipsiusque sanguinis coagulum. Concurrentibus igitur 1.) va-

forum debilitate, 2.) nervi succi penuria, 3.) cerebri compressione a sanguine difficilius per illud progrediente facta non fieri potest, quin sopor praeternaturalis, cum sensuum imminutione suboritur. Quod eo fit facilius, si per febrem potentiora pharmaca, solidas partes debilitantia, vel plane narcotica fuerint adhibita. Et si haec fluidorum solidorumque vitia nimis invaluerint, uti fere in tertia cari sit specie: subsistunt tandem coagulati inertesque succi in debilitatis vasibus, extravasantur, & sic vix evitabilem accersunt mortem.

## §. XV.

Lethargi  
gla.  
gla.

Lethargi denique sunt eadem causae, quas comati somnolento tribuimus, nisi quod in eo graviore sint, ac profundius corticalem cerebri substantiam penetraverint, adeo ut non sopor tantum inducatur, sed sensus quoque externi & interni oblanguescant. Cardio rei in eo vertitur, quod in comate perinde ac caro nulla adhuc existat sanguinis vel feri extravasatio, sed haec demum tanquam effectus producat, & in apertis post mortem craniis conspiciatur. Praesto potius in iis soporosis affectuum species est circulus sanguinis per vasa meningum, & cerebri corticalis valde debilitata difficilis, ejusdemque plus minus serosis stagnatio: at Lethargus pro causa agnoscit vel feri tenuioris per arteriarum poros factam secessionem, vel plane extravasationem.

## §. XVI.

Distinguitur vero Lethargus a caro, dum Lethargici excitati respondent, Dissertum vero minus. Est quoque discrimen inter apoplexiam & soporem; nam in illa respiratio est difficilis ac desinit in paralytin, quod non fit in caro. Differt quoque a syncope, in qua pulsus parvus vel admodum obsecutus & languidus ac facies cadaverosa; carotici pulsus magnus & validus est, & color faciei potius floridus. Neque minus differt a praefocatione uterina, quod praefocatae sine omni respiratione sunt,

sunt, & postea intelligunt & recordantur; in caro autem in paroxysmo non intelligunt, nec recordantur; oculos semper clausos habent, & si aperiunt, statim claudunt.

## §. XVII.

*Causa remota. res eff. causam soporiferam.* Quemadmodum ex dictis speciales & proximæ affectuum soporiferorum causæ clarissime perspicuntur: ita generatim sciendum est, quod iis producendis aptissima sint omnia, quæ ad difficiliorem humorum per vasa cerebri & meningum circulationem, eorumque stagnationem conferunt, & vim vasorum membranarumque elasticam labefaciunt. Quo nomine remotissimis causis accenseri merentur corpora cacochymica, cachectica, scorbutica, viribus defraudata, a nimio calore, tristitia, vel diuturno morbo, enormi sanguinis profusione debilitata: abusus potuum inebriantium, Spiritus vini, cerevisiæ valde spirituosæ & lupulæ, frequens crapaula, habitatio in conclavi humido, ubi densus vappidusque aer est, nec non aeris humida ac nebulosa, Zephyri statu prægnans constitutio, hiemalis tempestas, & Tabaci abusus.

## §. XVIII.

*Constitutio causæ remota.* Præterea quam sæpiissime in praxi licet observare, in subjectis sanguineis, sanguineo phlegmaticis, obesi habitus, sanguine plenis ab hæmorrhoidum, mensium, & cuiuscunque hæmorrhagiæ solennis ac criticæ suppressione, coma somnolentum, vel etiam lethargum excitari. Nec rarum est, eisdem affectus a sudorum præsertim matutinorum, atque criticorum cohibitione, nec non serosorum excretionum suppressione, oedematosorum pedum repentina fragilitate subito generari: quid? quod in iis, qui cerebri sunt imbecillioris, a nimia potus vinosi in corpus refrigeratum ingurgitationes, vel a corporis vino fartis & calentis refrigeratione, repente sopor altus cum omnium sensuum stupore producatur, brevi tamen tempore abque periculo transeat.

Tom. IV, Pars IV.

Non minus comatosi lethargique affectus introduci deprehenduntur ab arthricis, podagricis doloris quotannis semel bisve antea redeuntis cessatione: & observavi lethargum in asthmate convulsivo, revocato ad articulos dolore, una cum astmate fuisse debellatum. Huc denique spectat nimius ac intempestivus vaporiferorum usus: unde ab absinthiacis & opiatibus large datis, papaveraceis, fumo sulphuris, vapore carbonum ardentium, intra arcibus spatium incluso, in subjectis imbecillibus, graves & plus minus periculosos produci sopores non raro animadvertimus. Nimius quoque suaveolentium usus nocet. STRABO L. XVI. narrat Sabæos populos incidere in hunc morbum ex odore & fragrantia fructuum & florum in hisce regionibus productorum. Novi exempla, ex continuo suaveolentium usu omnem odoratum ex toto deperditum fuisse, eo quod membranis cerebri & nervis narium atoniam inferre videntur. Ad soporiferorum affectuum causas pertinent etiam violentiæ capiti illatæ, sic GALENUS L. de insens. odor. Cap. VI. numerat inter eas cerebri compressionem factam a Chirurgo, qui perforavit cranium, & membranam cerebrum ambientem; & ego, inquit MERCURIALIS in prælect. Batav. p. 22. quandoque vidi ex importuna perforatione cranii a Chirurgo vulneratum quandam statim factum esse carotieum.

## §. XIX.

Soporiferorum affectuum prognosis non adeo læta, sed pro causalium gravitate plus minus inausita est. Et vigil quidem coma per sæpe phrenitidem ac convulsiones funestas prænunciat, inque malignis febribus non raro in emortualem transit soporem. Sive etiam somnus profundus testante HIPPOCRATE in Coac. interdum in febribus significat firmam crisin & non est malum. Quando dolores caro conjuncti sunt, teste eodem Hippocrate i. e. convulsionem significant. Quo se-

C

noria

niora sunt corpora, & quo magis debilia, impurisque fucis prægnantia, eo majus portendit periculum coma, facileque, monente præsertim *Mercato L.I.C. 12.* in mortiferum terminatur lethargum. Carus quo gravior juncta est febris, & quo pejores ejus notæ, urinæque crudiores, eo periculosior attamen prima secundaque species non raro debellatur, tertia nunquam non lethalem exhibet eventum. Lethargus nunquam periculo caret; is tamen pessimus, quem artuum tremor, & gelidus faciei sudor comitantur.

## CURATIO.

## §. I.

*Indicationes curatio-  
nis.*

**M**Orbos soporosos curaturo, tres generatim incumbunt medendi intentiones, quarum prior est, ut ægrum a sopore excitare annitatur, altera, ut sanguinis & humorum difficilem per caput circuitum, stagnationem, vel extravasationem removere conetur; & tertia, ut robur membranarum vasorumque cerebri deperditum instaurare libe-  
*Prima indicationem  
quomodo  
faciat?*

## §. II.

Soporem discutiendi, ægrotumque excitandi vim ea possident remedia, quæ principio subtili ac penetrante in nervosas partes, eas agitando, vellendo, tremulumque & oscillatorium per universum nervorum systema motum inducendo agant. Huc spectant 1.) potentiora acida, & ex his palmam præ reliquis obtinet Spiritus chrysalorum veneris, qui nihil est, nisi Spiritus aceti concentratissimus, & cum essentia castorei mixtus, admotusque naribus, penetrantissima agilitate cuncta sperat: 2.) Salia volatilia, velut est, spiritus salis ammoniaci urinofus cum calce viva paratus, qui vertici admotus, vel quod consultius est, naribus inditus sternutamentum mover, ac torporem soporemque discutit egregie. 3.) graveo-

lentia, ut galbanum, pennæ perdicum &c. accensa, ut odor gravis nares feriat. 4.) Aqua frigida repente toti capiti infusa, quæ membranas cerebri simul roborando promte somnum excutit. 5.) cataplasmata ex aceto fortiti, ruta, foliis lauri, summitatibus Satureiæ, semine sinapi, castoreo, camphora parata, rasque capiti, fronti ac temporibus admota.

## §. III.

Eorum vim secundant, & simul *Quæ faciat  
vires boni  
mores u  
capitis  
derelicti.* rosam, si peccaverit, e capite colluviem. 1.) sternutatoria, quæ inter primas meretur sal vitrioli albi, si ejus grana decem in dimidia aquæ majoranæ uncia fuerint soluta, & naribus hausta. 2. & vesicatoria e tantharidibus paullo latiora, & pedibus, nec non cervici imponenda; quippe quæ & solidis nervosis partibus motitationem inducunt, & serosos revellunt humores. 3.) cucurbitulæ vel cum vel sine scarificatione nuchæ applicatæ, 4.) frictions validæ partium infernarum, 5.) clysteres acriores. 6.) Nec satis laudari possunt enemata paullo acriora, ventri infusa; quibus sal gemmæ vel commune, vel etiam squillæ radix stimuli loco commodissime additur.

## §. IV.

Excitato horum ope a sopore ægro, *Altera  
est ter-  
tia indi-  
catio.* restat, ut restituatur æqualis humorum per totum corpus circuitus; & subinde corroborentur debilitatæ partes. Favet priori scopo sanguinis missio, in ipso sæpius sopore, si turgeant cruore vasa, instituenda; multoque magis, discusso somno, ad ejus præservationem administranda. Tum quoque si primæ regiones sordibus onustæ, vel spasmis sint obfessæ; blando laxante alvum moliri oportet. Stagnationes humorum discutiendi; simulque partes infirmas corroborandi virtute gaudent nervina, nupta diaphoreticis: ex quibus magnam merentur commendationem essentia ligni aloes, succini, cum spiritu liliorum convallium, salis ammoniaci, &c.

Antimonii tinctura acri remixta; vel sal cornu cervi, cum sale succini, cinnabari antimonii, vel bezoardico minerali in pulveris formam redactum.

## §. V.

*Transfractio  
quæ  
morbo-  
rum  
symptomatum  
genera-  
tum.*

Denique recurrentes soporum insultus præcavere licebit partim victus recta servata ratione, partim causarum eos inducentium remotione. Et quum sanguinearum excretionem suppressio, vel motuum arthritico-podagrico-rum, hæcenus consuetorum silentium, ad id mali generandum, plurimum contribuant: haud ludet operam, qui revocandis istis & fluxionibus & doloribus operam navabit, eorum legitimum conservabit successum. In victu vitanda otium, ebrietas, cibi coctu difficiles & spirituosæ: corpus moveatur sedulo: repletio omnis est vitanda; quemadmodum jejunare aut parce nutriri optimum est; a pifeibus, lacte, caseo prorsus abstinendum, & inter fructus, humidi fugiendi omnes; carnibus magis assis, quam elixis vescendum; panis a lolo, quod intermixtum esse solet, probe purgari debet: senes ac debiles generoso vino, tanquam eorum lacte utantur; somnum non diu nimis protrahant; ab animi affectibus caveant; amicorum consortii intersint frequenter; commodis peregrinationibus delectentur; alviam perinde ac cutaneam curent excretionem; nec sanguinis adfuetas missiones statim repetere obliviscantur temporibus.

## CURA SPECIALIS, ET CAUTELE PRACTICÆ.

## §. I.

*Comate  
vigilia  
in febri-  
bus  
comate.*

Quemadmodum causæ affectuum sopororum, eorumque species valde sunt diversæ: ita etiam illis medendi ratio non una est eademque. Quare quid auxilii per singulas species super sit, videbimus. Coma quidem vigilæ, uti plerumque in

malignis febribus a nimia sanguinis mole, & imminente membranarum cerebri inflammatione suboritur: ita exposcit ea omnino remedia, quæ nec ipsi febri sint præjudicio. Et hoc sine venæsectione, si febris haud ultra tertium quartumque duraverit diem, larga debet institui: ut confirmant GABELCHOVERUS *Lib. I. §. 8.* & FORESTUS *Lib. X. obs. 34.* Missio sanguine alvus, si sit obstructa, clysteribus, minus tamen acrisioribus liquanda: tumque exhibenda remedia, quæ diluendo temperandoque humores, æstum illorum coercent. Quo quidem nomine præter pulvillos absorbentes, leniter nitrosos, cum antimonio diaphoretico & aquis diaphoreticis ac anælepticis in potiunculam redactos, nec non emulsiones leniter papaveraceas; magni usus in malignis sunt acidulata. Et placet sane mihi julepus, quem ex roob ribium tribus uncis, in aquæ fontanæ libris duabus solutis, & cum Spiritu vitrioli ad gratam aciditatem permixtis conficiendum docet LOTICHIUS. Spiritus nitridulcis ob temperantem pariter ac blandam anodynâ vim, usus est egregii. Nec sua laude caret externa, velut cataplasmata cum aceto parata, unguentum alabastrinum, temporibus admotum, animalia viva disiecta, & imposita capiti: non neglecto quieto blandoque regimine.

## §. II.

Vigilæ, quod hemiplecticis familiæ *Cura en-  
re coma, ut diuturnius, ita curatu  
est difficilior. Parum præstabit, qui  
solum symptoma, neglecto principa-  
li morbo adgrediatur: nihil superest,  
nisi ut hemiplexia ea, quam præce-  
dente capite notavimus, ratione me-  
deamur; tum enim sponte sequetur  
soporus naturalis.*

## §. III.

Carus, ejusque prima species, lar- *Carum  
gam, si nondum elapsa fuerit com-  
moda occasio, venæsectionem, ex-  
poscit: cui jungenda dormientis exci-  
tatio per clysteres, squilla acutas,*

C 2 vesica-

vesicatoria; aceti destillati in nares immisionem; tumque intrinsecus per temperantia, diaphoretica fixa, & acidula humorum orgasmus componendus. Altera cari species, quum semper sit critica, nihil fere opis medicæ exigit; sed sibi relicta, sanitatem secum fert. Tertia, etque perniciosissima, vix admittit medelam: attamen tentare juvabit, an æger vesicatoriis queat excitari; tumque diluentibus & analeptis dimicandum.

## §. IV.

*Curatio somnolentia summatim* Coma somnolentum rectissime videtur in serosum & sanguineum. Illud serosas excretiones vel naturales revocari, vel his artificiales substitui jubet. Urinæ suppressio accommodatis prædiis referenda; podagrici motus pedum frictione, vesicatoriis, laxantibus, balneis tepidis invitandi. Juvant hoc loco sternutatoria, educendo per nares serum, nervisque motum inferendo. Ubi pituita viscida oblidet ventriculum; operæ facit pretium vomitus arte concitatus: quo sine pulvis squillæ ad scrupulum dimidium vel unum, aut binæ tartari emetici grana, laxanti potuunculæ, ut diluantur, intermixta, summo cum fructu poterunt exhiberi.

## §. V.

*Curatio somnolentia summatim* Contra vero coma somnolentum, quod a causa calida, i. e. sanguinis per caput difficiliore transitu, vel flagnatione originem trahit, uti ferè sit in hypochondriacis ac scorbuticis, majorem requirit circumspectionem. Quæcunque enim calidiora ac spirituosa sunt remedia, eane pejor ac angue fugiantur: hisque substituantur, clysteres, venæsectio, blanda laxantia, pulveres temperantes, simul nervini, & id genus alia. Et hæc quidem omnia circa lethargum quoque sunt observanda; nisi quod efficaciora sæpius requirat excitantia.

## §. VI.

*Curatio affectus* Quicumque soporosi affectus a san-

guinis vel feri extravasatione intra meninges ac calvariam per externam violentiam indulta pendent: non prius sanari poterunt, quam humoris extravasati per trepanationem eliminatione. Attamen & huic operationi si abundet sanguinis molles, præmittenda venæsectio.

## §. VII.

*Curatio affectus* Sanguinis missionem in soporosis morbis peropportunam esse, facies rubens, oculi cruore turgidi, venæ tumentes, pulsusque arteriarum magni indicant. Qua administrata, si floridior vultus color, pulsusque magnitudo continuet; spes est reconvalescentiæ, sed simul opus erit adhuc semel secare venam; eo, quod non sufficienter facta venæsectio plus minetur detrimenti. Quo spissior præsumitur sanguis; eo amplior venis insigenda incisio, ut nimirum ei solutior pateat exitus.

## §. VIII.

Post detractum cruorem, alvus ducenda vel laxante intus dato vel enemate: neque enim, nisi præmissis hisce evacuationibus, alia remedium generat, ut roborantia, diaphoretica, sternutatoria &c. adhibere licet; quoniam major motus & impetus humorum ad caput per ea concitatur.

## §. IX.

*Curatio affectus* In soporoso omni morbo sedulo cavendum a balneis calidis, vaporosis, & quæ fragranti, olidoque vapore ad somnum contribuant. Multo magis absurdum est, narcotica, sulphurea, opiata, crocata, papaveracea in usum vocare; quorum etiam pertinent theriacalia, quæ veteres his in affectibus præscribere solent; quia his oleum camino additur.

## §. X.

*Curatio affectus* Externa volatilia, naribus attrahi solita non nisi in soporibus a causa frigida, serosa subortis adhibere licet. Hinc ab iis abstinendum in omni sopore, febrem acutam comitante, vel



vel qui a materia erysipelacea, purpuracea, exanthematica &c. ad cerebrum devoluta proficiscitur: ubi potius acida fixa, simul tamen penetrantia, cum fructu inferviunt. Cujus generis sunt oxyrrhodinum, cujus usum AVICENNA & RHASIS jam laudaverunt: cui etiam majorana & ruta possunt addi.

## §. XI.

Cere  
therma-  
ria sum

Quamvis thermarum, multoque magis acidularum potatio in morbis capitis idiopathiis, non omnino sit suadenda: attamen in soporibus, qui hypochondriacos ex suppresso hæmorrhoidum fluxu, vel retroacta podagra cruciant, mirabilem thermarum, quæ in Carolinis juxta molendinum scaturiunt, & ab hoc dicuntur, virtutem, in revocandis podagra & hæmorrhoidibus, & fugando hinc sopore deprehendi, cujus exemplum in CONSULT. MED. Tom. I. Sect. I. casu XV. allegavi.

## §. XII.

Cere  
therma-  
ria sum

Cavendum maxime, ne ab initio hujus morbi ad excitandum a somno sternutatoriis utamur; præsertim in plethoricis: eo quod ex intempestivo hujusmodi remedio, major affluxus ad caput sit, ut inde metus apoplexiæ immincat.

ENARRATIONES  
MORBORUM.

## OBSERVATIO I.

Cere  
therma-  
ria sum  
compli-  
catus.

Vir quinquagenarius, scarificationibus adfectus, ex diuturno mœrore & vigiliis contraxit sibi dolorem capitis gravativum, vertiginem, ventriculique imbecillitatem aliarum; cujus abigendi causa vinum absinthites mane pariter ac subcœna per aliquod tempus liberalius sumsit. Interim accidit, ut verno tempore, quo febres tertianæ grassabantur, postquam gravi exarserat ira, in libero aere, cœlo existente pluvioso iter faceret, domumque redux in duplicem

Tom. IV. Pars IV.

incideret tertianam. Hujus accessiones cum profundo incipiebant sopore, ad duodecim sæpius durante horas; quo discussio calor satis mitis excipiebat, & hunc demum sudor sequebatur. Quam scenam paroxysmi lepties ludebant, & omnes, quæ ad somnum propellendum adhibita erant, medicinas volatiles, purgantes & excitantes spernebant; adeo, ut majora potius sumerent incrementa. Vocatus ego tribus ante paroxysmum horis lenè dedi emeticum, quod aquæ menthæ unciam unam, tartari emetici grana duo, syrupi cinamomi drachmam unam habebat: quo sumto, miram colluviem pituitæ lentæ ac viscidæ nec non bilis valde crassæ, oleaginosæ, & ut dicunt vitellinæ evomuit. Sequens paroxysmus longe fuit mitior, & quod notabile, sopore caruit. Hinc idem remedium, interjectis aliquot diebus repetitum, una cum aliis antifebrilibus & febrim & soporem prorsus fugavit.

## EPICRISIS.

Si soporis, qui febrem nostram comitatus est, nomen indagemus; illam ad cari titulum referendum esse, quivis facile judicabit, qui soporosorum affectuum supra positas historias legerit. Carus autem hic non nisi symptomatice est, & una cum ipsa febre saburram biliosam & pituitosam, primis in regionibus stabantem pro causa agnoscit. Quum enim in febribus intermittentibus, maximeque tertianæ omnes circa primas vias sitæ nervosæ ac membranaceæ partes spasticè constringuntur: non potest fieri, quin succi vitales copiosius ad caput compellantur. Quod quia a prægressis mœrore, vigiliis, & vini absinthiaci ulu in præsentem ægro nimis debilitatum videtur; stagnantes in cortice cerebri humores facile potuerunt soporem concitare; qui resurgente sub paroxysmo caloris a capite per totum corpus sanguine, sponte cessavit.

C 3

Pror.

Prorsus igitur curatur hunc affectum incumbit, ut spasmi primarum viarum causam, quæ est saburra biliofo viscida, removeat; quod ope vomitotii brevissima fieri potuit via.

## OBSERVATIO II.

*Coma somnolentum scorbuticum.* Vir temperamenti sanguinei, habitus spongiosus, in locis degens paludosis, & crasso crudoque utens victu, febre tandem intermittente corripiebatur: qua cessante, totum corpus admodum languebat, crura magno dolore, tantaque lassitudine affiebantur, ut vix incedere potuerit, urinæ absque siti & molestia rufescebant, & arteriarum pulsus erant debiles. Brevis vero post in præternaturalem incidit somnolentiam, qua interdum per totam fere diem alto sopore obrutus jacebat, dein vero per aliquod tempus iterum vigilabat. Opposita huic malo remedia fuerunt succus nasturtii aquatici, cum jusculis crebro sumtus; Spiritus cochleariæ cum spiritu salis ammoniaci mixtus; & per intervalla aqua vitæ emetica, quæ sursum & deorsum copiosam eduxit saburram. Præterea a vino abstinuit, & pro potu ordinario decocto satureiæ, majoranæ & chamædrii cum passulis confecto usus fuit: indeque fugata somnolentia, pristinam recuperavit valetudinem.

## EPICRISIS.

Præsens affectus omni jure nomen comatis somnolenti scorbutici tuetur; quod nimirum ab humoribus viscidis, lentiscentibus, & impuris, per minutissima cerebri vascula difficulter progredientibus, ibidemque stagnantibus suos mutuatur natales. Eidem scorbuticæ succorum diathesi reliqua, quæ soporem antecesserunt, debentur symptomata, nimirum febris intermittens, urinæ rufescens absque siti & calore color, corporis lassitudo, crurum dolor, pulsusque debilitas. Quem-

admodum vero hanc humorem impuritatem diætæ crassa, cruda, & habitatio in udibus palustribusque locis generavit: ita eandem magis adauxit febris intermittens, cujus calore sulphurea & spirituosæ sanguinis portio dissipatur, & lenti vappescentesque remanent succi. Hinc non sine egregio fructu oblata fuerunt ea remedia, quæ sanguini blandam reddunt spiritualescentiam, viscidos humores incidunt, & languidas partes ad motum resuscitant. Et hac quidem laude superbiunt antiscorbutica usu recepta, uti sunt trifolium fibrinum, nasturtium, cochlearia, beccapunga &c. Neque tali in casu alienum est, blandum exhibere emeticum; quippe quo & saburra e primis regionibus evacuetur; & nervosæ partes in motum eriguntur. Externis enim remediis in omnibus, quæ a scorbutica sanguinis diathesi proficiuntur, affectionibus parum proficiunt.

## OBSERVATIO III.

Vir robustus sexaginta annorum, victui crasso aduetus, alvi adstrictioris, per longum tempus morori indulgens, singulis ferme mensibus erysipelaceum in crure sinistro tumorem pati solitus fuit. Tandem hyeme existente sicca idem exanthema, sed paullo languidius erupit, & perpetuo dormiendi junctum est desiderio: clausi semper erant oculi, pulsus magnus, facies rubicunda, & tertio post die pes niger tumidusque adparebat, adeo ut sphaceli periculum immineret. Consultus ergo medicus affecto pedi applicuit epithema, ex floribus sambuci, myrrha, bolo rubro, cerussa, camphora, aceto atque vino confectum; cujus adplicationem cum profundior exciperet somnus, ad hunc discutendum præscripsit sal volatile cornu cervi. Verum auctus inde potius est sopor facie tumida, rubicundaque existente; & quum artuum jastationes accederent, alter medicus exinde mortem

tem pronuntiavit, quæ paullo post est insequuta.

### E P I C R I S I S.

Hippocrates, solertissimus naturæ observator rectissime scribit, quod senes, qui sæpius erysipelate tentantur, eo tandem moriantur. Erysipelas enim rarissime fit sine febrili commotione, & quo magis plethorica vel cacochymica invadit corpora, velut sunt senilia, eo gravioribus quin sæpe funestis stipatum est symptomatibus. Ex his periculosum valde est coma somnolentum, quod sanguinis majori ad caput propter insultum febrilem raptui debetur; & eo majorem incutit metum, si materia erysipelaeica vel ob imbecillitatem naturæ, vel per male feriatas artes retropulsa fuerit.

2.) Erravit itaque medicus, quod in præsentia affectu, qui neutiquam ab humore frigidus, tenaci, sed sanguinis ebullitione & raptu ad caput, testibus pulsu magno, vultusque rubore, artum traxit, calidioribus medicinis, ut est sal volatile, pugnaverit. Hinc enim factum est, ut sanguis magis commotus, & sopor profundior fuerit redditus. Consultius fuisset, cucurbitulis cum scarificatione cervici appositis molem sanguinis imminuisse, & deinceps ad temperandum æstum, materiamque peccantem per transpirationem successive excutiendam, nitrosa cum pauxillo camphoræ & pulveribus bezoardicis exhibuisse, & externe cataplasma ex aceto rosaceo, camphora, Spiritu rosarum & oleo ligni rhodii capiti & temporibus adplicuisse.

### OBSERVATIO IV.

Vir sexaginta sex annorum, macilentus corpore, vasisque sanguine turgidis præditus & venam bis quotannis tundendam præberet solitus, huic per novissimum annum superedit. Aliquando fortiori percussus terrore, de extremorum frigore, anxia præcordio-

tum compressione, spirandique difficultate conqueri cœpit, facie existente tumida & rubicunda. Paulo post capitis gravativus dolor, vertigo, & mira ad somnum propensio cum oblivione accedebat: quæ debellaturus symptomata, iter suscipiebat; sed exinde tam profundum sibi contrahebat soporem, ut eo per quatuor dies sepultus, nec oculos aperire, nec pedibus insistere potuerit. Excitatus tandem, ingentem virium prostrationem, artuum languorem, & perpetuam dormiendi proclivitatem persequentebat; rite quidem respirabat, at pulsus depressus, alvum adstrictus, urina fluxum parciorem, appetitus prostrationem, & memorie omniumque sensuum languorem patiebatur. Quo in rerum statu ego consultus mox largam sanguinis quantitatem ex pede detrahendam, & clysterem ex antispasmodicis ac nervinis paratum, multoque sale acutum crebro injiciendum curavi: circa somni tempus usum pediluviorum commendavi; naribus adplicandum præbui sal volatile salis ammoniaci, oleo rutæ majoranæque nuptum; insusum ex herba majoranæ, satureia, floribus anthos, radice sarsaparillæ loco Theæ potari, & cum eo sal volatile oleosum Sylvii cum tinctura antimoniæ acri propinari jussi. Unde factum, ut cum pristina in gratiam rediret valetudine.

### E P I C R I S I S.

Præfens, de quo sermo est, sopor ad lethargi classem pertinet; qui nunquam non cum oblivione sensuumque torpore stipatus existit. Is suam originem sero per vasa sanguinea ab humoribus stagnantibus distenta & relaxata secedenti debet; & pro remotiori causa sanguinis justo majorem ad caput agnoscat raptum. Cui quidem vitio in præsentia casu remotiorem occasionem præbuit intermissa, quæ consuevit fuit, venæsectio: qua humores præter modum accumulari, &

C. 4. in.

Leib-  
er  
per  
quid  
rem  
rem

in corpore senili partes nervosas debilitare debuerunt. Accedens terror effecit, ut contractis inferioribus & externis partibus succi actus ruerent ad caput, ibidemque stagnando, recensita producerent symptomata.

2.) Motus corporis sicuti ad robandas solidas partes, & æqualem sanguinis circulum juvenum permultum contribuit: ita in morbis ex humorum abundantia productis, antequam minuat nimia moles, & excretionum libertas restituatur, magis commovendo magnam parit noxam. Unde etiam inconsultum fuit, quod noster ægrotans ante præviā venæsectionem & alvi liquationem iter susceperit.

## OBSERVATIO V.

*Carus periclitatus est reverti.*  
Matrona trium ultra sexaginta annorum, variis curis & ærumnis per aliquot annos agitata, nullisque post mensium cessationem nec naturalibus nec artificialibus adjuvta hæmorrhagiis, hyemali aliquando tempore, prævia vertigine spasmodico convulsivis prehendebatur motionibus. Hæ enim primum in abdomine vehementissimis torminibus, & alvi urinæque retentione semet exerebant; deinceps ad pedes excurrerant, qui tactu gelidissimi magno tremore agitabantur; tum manus exercebant, & denique caput occupabant, illudque ab uno versus alterum torquebant latus. Expiciebant demum omnium tam interiorum, quam exteriorum sensuum abolitio, & sopor profundus; quo cum per triduum, spiratione liberiori existente, sepulta fuisset; accedebat febris pulsusque celer, sub qua aliquando experscebatur, & deliria loquebatur. Septimo die largus erumpebat sudor, quo & febris solvebatur, & sopor discutiebatur, appetitusque cum perfecta redibat valetudine. Et abhinc per novissimum triennium idem ille, jam recensitus paroxysmus, iisdem symptomatibus stipatus bis quo-

tannis circa singulum solstitium recurrebat, febreque semper ac insequente sudore solvebatur. Reliquo tempore optime valet ægrotans, nec ullis hucusque remediis a descripto malo vindicari potuit.

## EPICRISIS.

Sisit præsens morbus peculiarem cari speciem. Describitur nempe carus, quod sit somnus profundissimus, in quo respiratio libera est, & ægri nulla arte excitari possunt. Differt igitur a lethargo, in quo spiratio est difficilis, & ægri quidem excitantur; sed oblivisi sunt: differt etiam a comate somnolento, ubi non perpetuo dormiunt ægri, sed actiones suas peragunt, & sub iis ipsis obdormiscunt. Et si dicendum, quod res est; carus videtur infimus apoplexiæ esse gradus; siquidem omnium & sensuum & motuum sub eo cessat usus. Causarum etiam in his tribus affectibus hæc mihi videtur differentia, quod coma somnolentum a sanguinis stagnatione in cortice cerebri; carus ab ejus profundiori, medullam simul & sensuum organa penetrante stagnatione, & facta sub hac seri tenuioris secessione; lethargus vero ab actuali seri per vasa relaxata, aut plane rupta & dilacerata extravasatione suos mutantur natales.

2.) In præsentī casu notabilis est peculiaris naturæ vigor. Quum enim ægrotans tam provecctam attigit ætatem & nullas sanguinis habuit excretiones, quarum tamen cessato in senilietate & sequiori sexu est nocentissima; quum etiam diuturnis mororibus confectum præ se tulit corpus: non fuisset mirum, si gravi subito periisset apoplexia. Hinc mirandus est naturæ vigor; quo excitata febris, discussit stagnantem materiam, eamque per sudorem excussit: id quod critico veluti motu deinceps est factum.

## OBSER.

## OBSERVATIO VI.

*Carus post cry-*  
*fauces*  
*humor*  
*rhoides*  
*aqua fel-*  
*gida en-*  
*ratia.*  
Fœmina sexaginta & tres annos emensa, robustæ ac firmæ constitutionis, post cessantem per ætatis rationem menstruorum fluxum, sanguinem et venis sedalibus stato tempore reddere suevit, & sub hac excretionem sana vixit. Quum vero hæmorrhoides aliquando fluere desinerent; prævia vertigine incidit in altum soporem, in quo absque ullis sensus vel motus vestigiis, pulsu existente celeri & forti, per tres immota decubuit dies, nec ulla arte excitari potuit. Tusa in pede vena infusique frustra clysteribus, arripiebatur consilium, ut aqua frigida liberiori quantitate ori instillaretur: quo factum est, ut elapso trium dierum spatio non modo diarrhœa accederet, sed & hæmorrhoidum fluor recurreret, & ægrotans sopore discusso, prorsus ad se rediret, omnium rerum ignara, ad hoc usque tempus sana vivens.

## E P I C R I S I S.

Causam sopororum sæpius ac paralyticorum affectuum sæpius quidem nimia humorum præbet moles, sed nec hæc tanta machinari potest mala, nisi solidarum & nervosarum partium accesserit imbecillitas. Hoc ex fonte in præsentī casu egregius aquæ frigidæ effectus potest explicari. Postquam enim per venæsectionem moles humorum imminuta, & per clysteres eorum raptus a superioribus derivatus fuit: curationi colophonem addidit aquæ frigidæ potus. Hujus ea est vis & indoles ut ventriculo & intestinis robur addat: quo recuperato, hæmorrhoides rursus cœperunt fluere, & sic depleta sanguinis abundantia pristina rediit valetudo.

2.) Id non semel sed sæpius a nobis observatum fuit, quod graves illi cerebrī affectus soporosi & semi apoplectici & paralytici post tertium diem

ceu dimidium septenarii motu quodam critico vel in melius vel in pejus mutati fuerint; & quod peculiare naturæ robur & vigor in vincendis difficillimis hisce morbis plus quam remedium efficaciam valuerit; ut etiam verissimum illud GALENI l. X. method. haberi possit: validas vires omnia sustinere, imbecillas a minimis ladi.

## OBSERVATIO VII.

Vir generosus, annorum quinquaginta sex temperamenti sanguineo *Carus post ma-*  
*is tran-*  
*stam*  
*feh-tem*  
*erythip-*  
*lottam.*  
cholericī, habitus spongiosi, venæsectioni adsuetus, & intemperantiæ tam vinosæ, quam ciborum nimis indulgens aliquando vino ferme fartus tradit se itineri, & sub eo horrore & tanta virium prostratione corripitur, ut domum attingere non posset, sed in pago manere cogeretur. Lectum petens, profundo & gravi per noctem fruitor somno, & mane expergestus insignem cruris tumorem cum macula ex brunno rubicundaprehendit. Vocatus medicus erysipelas adesse pronunciat, & mittit purgantes pilulas, quæ oscles movebant alvum. Sed sequebantur graviora symptomata, & æger subito omni sensu ac loquendi potentia destituebatur: unde suspicatus apoplexiam medicus dabat mixturam ex aqua apoplectica, confectione alkermes, oleo cinamomi & caryophyllorum paratam. Pulsus, qui jam cum aucto calore celer aderat, magis augebatur; & æger soporem incidebat profundum, cum insigni calore, & omnium sensuum abolitione stipatum, inque eo per octo dies jacebat, & a medico, & ab aliis pro deplorato utique habitus. Tandem accessit alter medicus, querit primum: an aperta sit alvus? respondit, illam per octo jam dies mox a datis pilulis pertinacissime clausam fuisse. Injiciendum ergo protinus clysterem curat emollientem, & hoc votis haud respondente, alterum paullo acriorem jubet infun-

infundi. Neque hinc mota alvo ægrum in lecto hinc inde volvi & agitari præcipit: quo facto mox secedebant faeces copiosissimæ, grave olentes, & cum his globuli tam duri, ut vix contundi potuerint. Elapsis abhinc binis horis ad se redibat æger actorem incius, & de dolore occipitis, corporisque debilitate querulus. Quare elixiria stomachica cum sale volatili oleoso combinata, & externe spiritus vini camphoratus, ad nucham inungendus, fuerunt ordinata, & æger convaluit.

### E P I C R I S I S.

1.) Quemadmodum vitæ genus inordinatum, multæque crapulæ, debilitando cerebrum & nervosum genus, remotius ad præsentem soporosis contriherunt affectum: ita eundem proxime induxit male tractata febris erysipelacea. Hæc sese exseruit horrore, cum in squata virium prostratione, & tumore erysipelaceo stipato; & debetur corporis, vino facti itinere refrigerationi. Datum ad eam expugnandam purgans, vero non potuit non esse perniciosissimum: a purgantibus enim & vomitoriis retroactum sæpius vidi erysipelas. Nam agunt purgantia vi stimulant, quæ & intestina, & externas corporis partes ad spasmus proritant, quo repellitur acris & caustica, quæ sub erysipelatis specie excussa fuerat, materia.

2.) Peccavit deinceps medicus, quod iusto calidius dederit remedium, quo humores in maiorem æstum ac ebullitionem sunt acti: & facillimum inde fuisset, ut phrenitis & gangræna supervenissent, eo magis, cum ob alvum a dato purgante, pertinaciter strictam, omnis humorum motus ad caput converfus videtur.

3.) Hinc alter rectissime egit medicus, quod repetita clysterum infusione duras faeces emolliverit, imique ventris stricturas consopiverit: unde restituto per corpus, sanguinis æquali circulo, sopor discussus fuit. Inde di-

scant practici juniores, ut in omnibus morbis alvi rationem ante omnia habeant.

### OBSERVATIO VIII.

Vir quinquagenarius, obesus plethorico sanguineus, & cacochymicus <sup>sopor</sup> corripitur aliquando erysipelate cum <sup>profundus cum</sup> horrore & febricula stipato. Tertia die pedi tumido epithema ex symphyto <sup>restituta</sup> cum aceto decocto adplicat quidam empyricus; unde mox in profundum <sup>ita de-</sup> soporem delabitur æger, ex quo vix poterat suscitari. Vocatus hinc medicus protinus jubet venæsectionem institui, clysteres infundi & interne propinat pulveres nitrosos camphoratos. Unde discusso sopore ad se rediit ægrotus; sed cum antea fuerit vir ingenii vivacissimi & incomparabilis memorie, retinuit jam omnium mentis functionum notabilem imminutionem, tantamque memorie debilitatem, ut præteritarum plane ignarus esset rerum. Quo in statu, frustra usurpatis omnis generis adminiculis, per aliquot annos & ad vitæ usque finem permansit; hæc ceterum & appetitu frueretur integro, & optime nutriretur.

### E P I C R I S I S.

Sensus internos, memoriam, ingenium, phantasiam, in homine vivo ope nervorum haud secus ac externos administrari, vel exinde patet, quod relaxato cerebro & nervis, aut a serosa colluvie inundato, prorsus hæc cessant actiones. Et idem in nostro casu contigisse post discussum soporem, probabile videtur: scilicet relictæ sunt laxitas & imbecillitas eorum, qui memorie & ingenio servant nervorum.

2.) Quemadmodum camphoratorum remedium, & in pulvere, & cum spiritu vini solutorum, exterius usus in tumoribus erysipelaceis repellentem & nocivam exserit efficaciam: ita eadem, in repulso jam erysipelate, intus cum nitrosis, post præmissam <sup>venæ.</sup>

venæsectionem & alvi liquationem exhibita, egregia pollent vi, materiam erysipelaceam e corporis penetralibus removendi, & ad cutaneum vultus corticem, cum magno sanitatis com- modo, propellendi.

## OBSERVATIO IX.

Coma  
fomno-  
sentum  
tib. col-  
cum a  
retro-  
posita  
podag-  
rica.

Verbi divini minister, quinquage- nario major, obesi valde corporis ha- bitus & temperamenti sanguinei, in- dulsit in juventutis præsertim annis crebris comotationibus, maximeque vinis calidioribus. Hinc podagricis pedum doloribus diu fuit ex cruciatus; quibus ope cujusdam emplastri prorsus fugatis, retinuit tumorem circa pe- dum talculos, in quo per vices macu- læ rubræ efflorescebant, squamatis abscedentes. Præterea septem abhinc annis incidit in perpetuam ad somnum proclivitatem, & hanc ad hoc usque tempus retinuit. Obdormiscit sæpius nocte dieque, somnoque tam profun- do obruitur, ut vix queat excitari; sub quo facies fit rubicunda & iorame- scit; attamen memoriæ iudicii que observatur imminutio. Conqueritur sæpius de dolore gravativo in lumbis, calculum mentiente, & interdum præ- cordia adeo angustante, ut vix spiri- tum ducere queat. Multis ad depellen- da hæc vitia usus est præsidii, nimi- rum crebris phlebotomiis, quibus in- tra spatium sex hebdomatum ultra duodecim sanguinis libræ fuerunt de- tractæ. Usurpavit decocta lignorum cum mercurio dulci, decocta vipera- rum, cinnabarina, volatilia, cepha- lica, millepèdes &c. a quibus invo- luntarium urinæ sibi met contraxit fluxum. Optimum in potu aquarum Schwalbacensium invenit solatium; quas quamdiu portabat, tam diu a so- pore liber erat.

## EPICRISIS CUM CONSILIO.

1.) Omnes, qui soporosis ex inter- na causa affectibus vexantur, ejusmo-

di solent esse homines, qui crebris in- dufferunt crapulis, vinisque calidiori- bus aut cerevisiis lupulatis. Hisce enim sibi met contrahunt ad omnes, qui ex cerebri atonia propullulant morbos, dispositionem, quæ in eo consistit, quod vasculosæ, nervosæ ac membra- naceæ partes nimis distendantur & la- befactentur.

2.) Causa præsentis mali quærenda est in podagræ re:ropulsione; ex qua in debilitatis ejusmodi subjectis inno- mera provenisse vidi datmo. Et hinc petenda ratio, cur tali in casu omnia frustra adhibeantur remedia, nisi po- dagrica materia discussa, aut ad pe- dum revocata fuerit articulos. Venæ- sectiones in plethoricis subjectis cum fructu quidem instituuntur: at ejus immoderatam in casu præsentis usum merito taxamus, eique majorem mali pertinaciam omnino tribuimus. In cu- ratione hujus chronici mali vitanda sunt omnia, quæ sanguinem commo- vent remedia, sudorifera, volatilia sic dicta cephalica, nervina aliaque; & ad roborandum caput inserviunt po- tius epithemata ex aceto vini rutaceo, cum aliquot guttulis olei lavendulæ & rosmarini necnon camphora parata, & fronti temporibusque cum linteis adplicita. Præterea magnum fructum observavi ab usu pediluviorum non modo ad revocandam podagram sed & ad divertendos humores a capite, quod tamen a vaporibus est defendendum. Potus aquæ frigida etiam in paroxys- mo nunquam tere non proficius; ma- gis tamen ubi febris subest: utpote frig- gis motum sanguinis expansivum co- ercet & nimium relaxatis fibris tonum & elaterem naturalem restituit.

## OBSERVATIO X.

Vir dives generosus annorum su- pra quinquaginta, temperamentis san- guineo phlegmatici, obesi corporis habitus, in juventute multum semper pituitæ ex naribus excrevit, gulæ, pituitæ ex naribus excrevit, gulæ, vici- <sup>Leithar- go are. moneto materia arthri- tis.</sup> gen-  
osio, vino & veneri plurimum indul- gens

gens per aliquot annos tempore autumnali & vernali cum febricula catharrali dolores mox in manibus mox in pedibus expertus est. Sed postquam æstate nimium fructibus horaeis refrigerantibus, fragis, ribibus, lacte eburato, & Pyramontanis quoque aquis usus fuit, sequenti autumno, a consuetis ejusmodi doloribus artuum plane fuit immunis. Præter modum vero de languore virium, membrorum lassitudine, dolore capitis gravativo, spirandi difficultate & continua in somnum propensione conqueri cepit. Postea accessu venti frigidioris borealis simul & semel sopor ita invaluit, ut ægerime excitari, nec ad interrogata respondere potuerit. Pulsus erat magnus, mollis & frequens, alvus obstructa; urina secebat tenuis & cruda, mentis quoque levior aderat alienatio. Ego vocatus in consilium reperi ægrotantem in conclavi humidiori & demissiori jacentem in lecto. Quare mox eum in locum superiorem transportandum jussi: Proinde spiritus crystallorum veneris cum oleo rutæ destillato roboratus applicabatur naribus. Clyster aliquoties injectus fuit, qui constabat ex decocto majoranæ, satureiæ, sale ammoniaco, adjectis sex granis tartari emetici solutis, qui ingentem semper pituitæ viscidæ cum lordibus eduxit copiam. Cecurbitulæ cum scarificatione primo dorso, deinde scapulis, postea occipiti applicatæ fuerunt. Interne per vices oblatus spiritus salis ammoiaci urinæ cum essentia castorei saturata mixtus; vehiculum fuit aqua fontana frigida, quam etiam sumisit pro potu. Vesicatoria pedibus applicata nullas excitabant velicas; in nucha vero, tanquam parte sensibilibus eas omnino producebant. Remissior quidem fuit morbus inde redditus; circa septimum vero diem purpura in superioribus partibus adparuit cum largo sudore succellive universum corpus occupante. Ita sensim sensimque morbi vi depulsa & vires & functiones animales redierunt. Ad arcendam re-

eidivam abstinentiam cum exercitio corporis, victum quoque attenuantem & exsiccantem, & infusum herbæ satureiæ, majoranæ, & florum arnicæ, ac cardamomi lingnlo mane forbillandum plurimum commendavi. Tandem altero anno thermis Carolinis me suafore uso, rediit dolor podagricus, ex quo optime convaluit.

### E P I C R I S I S.

In hac morbi historia multa obveniunt notatu digna. Morbus hic, qui nomen lethargi recte sortitur, in homine obeso, humidioris constitutionis, ab inordinata diæta, otio & abusu fructuum refrigerantium, per quem materia arthritica intus remansit, & spasmos in inferioribus partibus produxit, qui humores serolosos ad caput propulerunt, natus fuit, ad cujus genesis multum quoque habitatio & dormitio in loco decliviori & humidiori contulit. Quod uti nunquam non insalubre, ita quam maxime ad morbos capitis & ærvorum, qui ex atonia veniunt disponit. Ita HILDANUS *cent. IV. obs. XL* ex fumo fornacis non ita pridem constructæ lethargum & mortem annotavit. Atque nos sæpius capitis morbos cum defluxionibus, cum auditus difficultate, vertigine, somnolentia, in foemina quæ lavatione linteaminum operam dant, item quando circa fornaces hyeme linteamina exsiccantur, observavimus. Quare etiam balnea & pedum lotiones si caput imbecillum est, vel ad soporem aut paralytin dispositum, non conveniunt. Denique non sine fructu emetica in clysteribus etiam dari possunt, & longe securioris sunt effectus quam aciora purgantia, cujus generis sunt colocynthiaca, ad humores a capite revelendos. Tandem neque hoc loco prætereundum, quod crisis in affectus etiam soporosos, præsertim si cum febre conjuncti sunt, incidat.



## CAPUT III.

## DE VERTIGINE.

## THESES PATHOLOGICÆ.

## §. I.

*Definitio vera signata.* **H**Aud ultimum inter cerebri morbos locum tuetur vertigo; maxime frequentissimum, quod omnes capitis affectiones nunquam fere non & antecedit, & comitatur. Ea est sensatio circumgyrationis & lapsus, vel cum vel sine corporis prostratione in terram conjuncta, a compressione nervorum optico- & intra calvariam adhuc absconditorum, & hinc pendente vitioso fluidi nervi in tunicam retinam influxu originem trahens.

## §. II.

*Definitio vera signata.* Ex improvviso nimirum fit, ut ægrotantes omnia objecta, sequæ ipsos circumrotari libimet videantur, atque sub idea imminenti lapsus titubent, pedibusque vacillent; tum vero oculi obfuscurentur, quin ipsi prorsus nonnunquam istar apoplecticorum concidant. Junguntur sæpenumero capitis torpor, dolor, gravitas, aurium suffusus & tinnitus, oculorum mador, visio vitiosa & vel duplicata, vel dimidiata, faciei rubor, somnolentia; tumque si vel levis inclinatio capitis in terram, vel corporis circumgyratio accesserit, protinus oritur vertigo. Occupat subjecta potissimum sanguinea, edacia, senilia, viribus defraudata, hypochondriaca, hysterica, nephritica, & quæ alvi sunt durioris, imique ventris eruciantur spasmi. Interdum ea primarium constituit morbum: non raro tamen graviorum capitis affectuum, velut est apoplexia, paralysis, soporosi morbi, epilepsia &c. prænuncia, cumque ipsis complicata deprehenditur.

## §. III.

*Gradus.* Dini vero sunt, ut anoteur, tres altissimum vertiginis gradus, quorum levissimus, omnique periculi ex parte dicitur, quæ, quasi turris, quoniam adfectu in orbem agitur, & omnia secum in gyrum rotari tant, & que tamen concidunt, ne caligine oculorum experiantur. Huius obnoxii ut, qui navi vehuntur, quæ se in orbem rotant, qui Tabaci fumum creius sugunt, aut crapulis frequenter indulgent. Alter gradus vocatur Scotomia seu vertigo tenebrosa, in qua præter dictam rotationis ideam, & idem vacillationem, oculi caligine confunduntur. Antecedit ea vomitum, eosque, quæ ab inferioribus ad superiora adspirant, spasmodicos affectus; & expiratur. Es svid mir grund gelb fudenen Augen. Summus, gravissimus gradus appellatur veritas caduca, & revera est species levior apoplexiæ, vel etiam epilepsiæ. Antecedit enim spasmi partium inferarum, fornicationis sensum exhibens; tum laborit idea gravissimi in precipitia lapsus, & non solum objecta circumrotari videntur, oculique cægant, ærum ægri etiam, nisi contingant subito in terram prostrernuer, qui scæpius omni sensuum, motuum, locutæ ac rationis usu destituti, mortuorum instar jacent; quales notat dignos casus reperies in CONSULT. MED. Tom. I. S. I. cas. IX. & X. & in A. N. C. dec. 11. anno VIII. obs. 41.

## §. IV.

*Definitio vera signata.* Omnis vertigo merito distinguitur in idiopathicam & sympathicam. Prior causam in ipso cerebro habet, & agnoscit, & longe gravior est posteriori. Complicatur cur ea alii capitis affectus, & raro est periodica. Posterior fit vitio ventriculi, acida & acris saburra prægnans, & se prodit per conjunctam molestem, vomendi proclivitatem, rursusam molestiam, ventriculique gravitatem. Plerumque est periodica, & jejuno existente stomacho.

stomacho gravissime urget, summa-  
tem et paullo cibi protinus con-  
scit

## §. V.

Perstis-  
tis se-  
des.

Idem vertiginis determinati ob-  
servamus eam circa visionis disti-  
um organon hærere. In ipso idem  
culo, quatenus intra orbita conti-  
netur, nullum nec extrinsecus cerni-  
tur, nec post mortem reperitur vitium,  
nunc non sine ratione colligit, illud  
in nervo quærentum esse oportet. Jam  
vero in demortuis, qui per eam satis  
gravi laborarunt vertigine, prehendi-  
mus vel plerum choroidum, vel  
tertium cerebri ventriculum præter  
naturam fuisse constitutum. Sic enim  
SCULTETUS in *anatomichir. obs.* 19.  
plexum choroidum videtur rubicundissi-  
mum; MONETUS *Sulchr. L. I. S.*  
*XI. obs.* 8. iam in vivis vertiginosis,  
quam hominibus inquit sanguinem  
concretum, vel tumorem vesicularem,  
tertium cerebri ventriculum occupan-  
tem, & ROLFINGIUS in *diff.*  
*anat. L. I. C. 13.* admat, se in verti-  
ginosis avibus post mortem vesiculas  
aqueo humore plenas, & intra tertium  
cerebri ventriculum contentas, plus  
simplici vice, in homine semel obser-  
vasse. Nihil autem vitii ipsa in optico  
nervo deprehensum est; in quo tamen  
sedem mali cortex residere. Quod id  
ergo fiat pater, mox explicabimus.

## §. VI.

Strabismus  
oculorum  
oculorum

Cerebrum difsecanti, & ad plexum  
choroidum, qui est congeries pluri-  
morum arterioforum, quam ve-  
nosorum vasculorum, pervenienti,  
hoc subdatis sese sistant bina strata seu  
thalami nervorum optico-  
rum, & vulvam sitorum, & per  
quandam fissuram, sub qua tertius ce-  
rebri ventriculus prodit, ab invicem  
distinctorum. Ab horum superiori  
parte oriuntur bini nervi, qui dicun-  
tur optici, qui non nisi pia meninge  
investiti, & dictis thalamos ab utro-  
que latere compleri, antrosum pro-  
grediuntur, & ante infundibulum ar-  
tissime conjunguntur; mox iterum

secedentes tendunt ad oculi orbitam;  
tum eos ab utroque & externo latere  
transversim attingit carotis intera ar-  
teria; ac denique perforant foramen  
eorum transitui in posteriori orbitæ  
parte destinatum, cumque matre du-  
ra, instas vaginæ cincti, per oculos  
distribuantur, & horum varias consti-  
tuunt partes. Si oculo recte constitu-  
to, nervus opticus vitio caret, & le-  
gitimus in illum fluidi nervei sit infu-  
sus, visio exercetur integra. Sublato  
penitus istius fluidi influxu, nascitur  
cæcitas; eodem vero quocunque mo-  
do tantum imminuto, varia visionis  
vitia emergunt. Imminuitur influxus  
per dicti nervi compressionem; com-  
primi potest nervus a partibus vicinis  
præter naturam constitutis; partes vi-  
cinæ sunt plexus choroidæus, arteria  
carotis, ventriculus cerebri tertius.  
Ergo ab harum partium præternatura-  
li constitutione nervus opticus, licet  
in sua substantia integer, comprimi  
& ideo vertigo etiam suboriri potest.

## §. VII.

Scimus ergo, imminutionem fluidi  
nervi in nervos influxum producere  
varias visionis læsiones, velut visio-  
nem duplicatam, dimidiatam, ob-  
scuram & circumgyrationis sensum;  
sed quomodo idæ in mente excitentur,  
& quantum influentis fluidi ad  
singulam producendam requiratur;  
determinatu & difficilissimum & inuti-  
le est. Sufficit, si ex hætenus dictis  
cognoverimus, vertiginis formalem  
rationem in fluidi tenuissimi influxu in  
nervos opticos per eorum compressio-  
nem imminuto consistere. At unde  
pedum vacillatio? Sensum circumgy-  
rationis comitatur idea casus; hæc in-  
volvit metum; metus idem sequitur  
pedum titubatio, quæ confuso fluidi  
nervei in musculos situm erectum effi-  
cientibus influxu absolvitur; Ergo sen-  
sum circumgyrationis sequitur pedum  
titubatio. Hæc docet experientia; sed  
unde fiat, quod certi corporis motus  
sequantur certam in anima ideam, no-  
bis adhuc obscurum est.

## §. VIII.

## §. VIII.

Devolvitur ergo ad causas, compressionem nervorum opticorum producentes. Sinit se primum ebrietas, quæ plerumque vertiginosam perturbationem, pedumque vacillationem habet comitem. Vinum scilicet ebrietatem, & hinc pendentem vertiginem duplici ratione cassatur: nam fovet 1.) principium subtile, vaporosum, quod majori copia ad cerebrum delatum, purissimam nervorum lympham inquinat, & ad sensus motusque rite præstandos inertem reddit. 2.) Principium spirituosum, unde sanguis expanditur, & arteriæ carotides, vasque discenta thalamos nervorum opticorum, ipsosque nervos comprimit: sicut id de vino MED. SYSTEM. Tom. II. Part. III. C. IV. §. VIII. & de cerevisia §. XII. susus explicavi. At hæc vertigo transitoria est, & dissoluto principio vaporoso, sopitaque sanguinis ebullitione transit. Quare nec de hac, nec de ea, quæ per vectiorem in navi, aut corporis rotationem inducitur, tanquam non morbosa nobis nullus est sermo.

## §. IX.

Ex causis potius morbosam vertiginem inducentibus, principalis est sanguinis nimia in arteriis carotidibus, & vasis plexum choroideum constituentibus, stagnatio. Hinc vertiginem patiuntur valde plethorici, cum primis si consuetæ excretiones per narium hæmorrhagias, hæmorrhoides, vel menses in sæminis sublitterunt, aut imprudenter suppressæ fuerunt. Non minus hoc malum inturunt, qui consuetas venæsectiones, aut scarificationes neglexerunt. Eo magis huic morbo obnoxii sunt plethorici, si simul hypochondriaci, hysterici, nephritici, spasmodicique imi ventris passionibus vexantur, quibus sanguis majori impetu ad caput fertur. Et novj quidem juvenes hypochondriacos, sanguinique missiones nunquam passos, qui vertigine uno impetu & ictu invadente rapti, perque aliquot horas de-

tent secuto autem vomitu statim liberi fuerunt.

## §. X.

Eadem vim obtinet serum, in debita erectione cohibitum, ac intra crebra sanguinea vasa accumulatum. Quamvis videmus cachecticos sæpius virginem pati; eademque chronica acertinatissima addigi, quibus serosæ sanationes per aures, oculos & nar fuerunt cohibitæ. Hinc de vertigi: diuturna ex coryza suppressa in CONSULT. MED. Sect. I. Caf. VIII. de eadem per restitutum seri e naribus fluxum soluta ibid. Sect. IV. Caf. CLIV. pag. 662. & de ea cum fluxu auris hæumatico alternante Sect. IV. Caf. CXXXIV. pag. 535. exempla leguntur. Inde etiam vernali ac autumnali tempore, quo repentini tempestatis mutationes contingunt, frequentes observamus vertigines. Has porro prognerant narcotica, inque primis lolium illud frumentaceum, quod ab effectu vocatur temulentum, sub pane au pulte comestum: quales casus A. N. Cæc. II. anno VIII. obs. 173. & dec. III. anno II. obs. 127. allegant. Nec silentio prætermittendæ sunt violentiæ extrinsecus capiti illatæ, quippe quibus humorum stagnatio & extravasatio facillime inducitur: unde satis gravis ac diuturna fuit illa vertigo, cujus in CONSULT. MED. Sect. I. Caf. XL/III. mentio fit, & quæ a vehementi in caput lapsu originem traxit.

## §. XI.

Sympathicæ vertiginis causa residet in primis viis, maximeque ventriculo, & non nisi hujus vehementiori debetur spasmus. Namque dum primæ regiones valide constringuntur, cogunt vitales succos ad superiora, qui ibidem copiosius collecti, & intra plexus potissimum choroidei vascula stagnantes, vertiginem pariunt. Hinc frequens vertigo est iis, qui primas officinas saburra acri biliola onustas habent; qui consuetas intermiserunt purgationes; qui leguminibus, & qui statum movent, cibis.

cibus largius vefcuntur, qui vides intra canalem inteftinorum aluntur, vehementi vomitu torquentur. Et hæc quidem vertigo, jejuno ex inteftinulo, maxime urget; & pterea quod tum acriores fint fordes, tum ab adfumtis alimentis, & fic æmonia per fubeuntis cibi admixtionem temperata, ftatim remittere et affectus.

## §. XII.

*Causa  
accidens  
natales  
vertiginis.*

Quum videmus in multis aiffa leviſſima vertiginem produci, tam in aliis ne gravior quidem excitat: ſupponenda in illis eſt major debri & nervorum ad fovendas vertiginis cauſas diſpoſitio. Et hanc cum URALTO in *A.N.C. dec. II. ann. VII. pag. 26.* in generis nervoſi, vaſculoſi & membranofi debilitate collocatam arbitramur: qua fit, ut irruentiori non ſufficiens ſit vaſorum reſiſtentia, unde facilius ille ſtagnare poteſt. Hinc omnia, quæ caput debilitat, aditum huic affectui parant, veſt ſunt ætas ſenilis, vigilie diuturnæ, frequens crapula, venus nimia & mæmoria, animi diuturnus moror, vita ſedentaria, & id genus alia. Hinc etiam leves cauſæ eundem prolocant; ut ſunt capitis in terram inclinato, terror, frigus, crapula, balnorum improvidus uſus. Sic vertiginem a frigore ſemper recrudefcentem adnotant *A.N.C. dec. anno. VIII. obſ. 5.* eandemque a terrore in hypochondraco ſubortam recensui in CONSULT. MED. *ſeſt. I. caſ. XXXII. pag. 175.*

## §. XIII.

*Pregnoſti  
ſignis.*

Vertigo, quæ a vitio ventriculi ſuboritur, levis eſt, & repurgato ceſſat ventriculo: quæ vero ex imi ventris ſpaſmo, conjuncta nervoſi generis debilitate, natales ſæpe mutatur, altioris eſt indaginis magisque diuturnum portendit morbum. Semper gravior eſt idiopathica, quæ a ſanguinis aut ſeri ſtagnatione in cerebro proficiſcitur; & metu inſequitur guttæ ſeræ, paralyſeos, apoplexiæ, aut ſoporofi affectus terret, maxime in ſe-

nibus. Qui jam paſſus eſt inſultum apoplecticum, & corripitur rursus vertigine, habet cur a recidiva apoplexiæ ſibi metuat. Graviſſima vertigo eſt caduca, quippe quæ cauſam profundius cerebrum penetrantem ſovet, & revera nihil, niſi apoplexiæ levioris eſt ſpecies.

## CURATIO.

## §. I.

UT promptum & expeditum huic malo adferatur auxilium; binas potiſſimum indicationes reſpicere oportet medentem, ut nimirum ſanguinis & humorum in capite ſtagnationem diſcutiat, eorumque raptum ad inferiora derivet; & demceps ut ſyſtema partium nervolarum a tono ſuo dejectarum corroboret. Quum vero variz ſint cauſæ, quæ majorem ſanguinis, quam par eſt, ad caput compellunt quantitatem, harum in curatione habeatur ratio, necelle eſt.

## §. II.

In recenti malo, corpore exiſtente valde plethorico, facie rubicunda arteriſque fortiter pulſantibus, nihil eſt præſtantius ſanguinis miſſione. Quam ob rem, ut ad remotiores partes ſanguis retrahatur, in pede ſecanda vena, multumque ſanguinis mittendum. Deinceps ſi menſium vel hæmorrhoidum irregularis ſit ſuccellus, opus eſt, ut per commodam medendi rationem hæc revocentur excretiones. Hæmorrhoidariis hiruſinum ad anum applicatio præſentaneam non raro tulit opem; ſicut confirmat obſervatio CONSULT. MED. *ſeſt. I. caſ. VIII. pag. 23.* inſerta. Quando narium hæmorrhagia vel ſuppreſſa, vel ſponte ceſſans malum induxit: præſtans auxilium ſerunt ſcarificationes cervicis & dorſi, præſtantius autem & certius eandem, more Aegyptiorum naribus admotæ.

## §. III.

Miſſo ſanguine ſæpius totum depellitur

*Indica-  
tiones  
curatio-  
nis.*

*Good  
ſanguis  
necesse  
miſſionem*

*Remo-  
dio / an*

gulaem  
a capite  
derivat  
clau

litur malum, quod si cedere recuset, insistendum est remediis sanguinem a capite derivantibus. Eminent ex iis præsentemque virtutem exerunt clysteres, iteratis injiciendi vicibus; vel etiam laxantia, quæ blanda & simul roborantia esse debent; quo nomine superbiunt pilulæ balsamicæ vel ad nostram vel Beati STAHLII mentem concinnandæ; aut laxans ex manna, rhabbaro, & cremore tartari confectum, addito oleo de cedro. Utilissima porro sunt pediluvia crebro adhibenda; quæ tamen tepida tantum oportet esse; quoniam calidiora sanguinem commovent, & recursum mali provocant.

## §. IV.

Curatio  
vertig.  
alis sym  
pathicæ

Ubi cruditates acidæ, biliosæ, acres, ventriculum obsidentes, malum produxere: opus sæpenumero est, ut blando emetico evacuetur ea saburra; quo sine in robustioribus tartarus emeticus, in sensibilibus radix Ipecacuanhæ operæ faciunt pretium. Si præ iis magis arrideant purgantia, ea paulo validiora esse præstat; & eo scopo pilulæ balsamicæ extracto hellebori nigri permiscere. Quando acidum ventriculo insidet, præmittendi & subjungendi sunt pulveres absorbentes ac digestivi, cum oleo nucis combinati; vel etiam martialia cum pilulis balsamicis alternanda.

## §. V.

Curatio  
vertig.  
alis hy  
pochondriacæ

Diuturnioris perinde ac difficilioris sanationis est vertigo, quæ hypochondriacis passionibus, cum generis nervosi debilitate complicatis sociatur. Lenioribus in ea pugnandum est medicinis, quæ discutiant flatum in abdomine subsistente, acrimoniam ventriculi obtundant, sordes per alvum blande evacuent, ac spasmosimi ventris demulceant. Hoc nomine præstantissima utilitatis deprehendi pulverem, ex pulvere Marchionis drachmis duabus, cornu cervi philosophice præparati, nitri depurati, cinnabaris præparatæ, lumbricorum terrestrium ana drachma dimidia, & olei macis gut-

Tom. IV. Part IV.

tulis tribus confectum, atque bis quotidie cum aqua analeptica exhibendum. Conjungenda laxantia, pediluvia, ordinatæ venesectiones, ac resta vivendi ratio.

## §. VI.

Sic subtracta mali causa, studendum ut roboretur nervosorum partium Systema. Ad quem obtinendum finem amplam laudem meretur nostrum vitæ balsamum, quod & externe vertici infundi, & naribus admoveri, & interne in elæosachari forma propinari cum fructu potest. Adjuvat etiam ægros spiritus salis ammoniaci inter cibos acceptus. In chronica vertigine ex vitio hypochondriorum soleo roborandi sine circa quadras lunæ per aliquot dies sequens exhibere electuarium: Recipe visci querni, corticis chinæ ana unciam dimidiam, pulveris florum chamæmili, lumbricorum terrestrium ana drachmas duas, succini præparati, extracti cardui benedicti ana drachmam unam, caryophyllorum, cinnabaris nativæ præparatæ ana scrupulos duos, syrapi berberum uncias binas. M.F. electuarium, cujus drachma pro una dosi exhibeatur.

## §. VII.

Omnis autem curatio erit irrita, nisi adjuvetur resto rerum non naturalium usu. Quare cibos oportet esse faciles, quibus concoquendis sufficiat digestionis officina; removeantur acrida, salsa, acida, leguminosa, & quæ flatos pariunt. Qui debilem ventriculum fovent; iis, prodest jejunio tempore cortices citri vel aurantium masticare. Nec quidpiam est, quod magis vertiginosos lædere valet, quam potus vinosi, spirituosissimi ac cerevisiarii; quorum in locum vel decocta, vel solum Selteranum modico vini nuptum substituere juvat. Motus corporis sit cautiissimus; ac placidissimus; ne ex vehementiori commotione novus exciterur paroxysmus. Aer seligatur temperatus ac serenus; omne

D frigus,

frigus, maxime partium infernarum fugiatur; & ab iracundia, terrore, moerore, quantum possibile, caveatur. Hæc qui rite observaverit, quique sanguinis molem debito tempore imminui & excretionum naturalium libertatem conservari curaverit, habebit modum, quo ab ulteriori & vertiginis, & aliorum cerebri morborum invasione semet vindicare potest.

## CAUTELE PRACTICÆ.

## §. I.

Quid sit,  
ducat in  
vertiginem  
non in  
spasmo  
ventriculi  
causa.

**Q**Uando ex spasmo ventriculi vertigo, ut sæpe fit, oritur; utilissimus est pulvis Marchionum, cum pauca cinnabari, extracto castorei, & nitro mixtus, & in aqua lilio-rum convallium datus. Insignis etiam est efficaciz pulvis ex cubebis, nucista, & lapidibus cancrorum paratus: neque minus desideratissimam in tali casu opem ferunt pilulæ Wildegansii.

## §. II.

Cura  
vertiginis  
in choroidei  
agnatione  
locum.

Fit nonnunquam, ut ex diuturniori sanguinis intra vasa plexus choroidei stagnatione, serum secedat, & vel in tertium cerebri ventriculum, vel alium locum, unde nervos opticos potest comprimere, extravasetur. Quo in casu utilissimum est, bregma ferro candenti inurere; aut nuchæ admove-re vesicatoria. In tali etiam vertigine, quam a causa frigida subortam dixeret veteres, si molliori haud cedit medicinz, cura per inediam, conjunctis fonticulis & cinnabarinis remediis locum habet.

## §. III.

Alia  
causa  
remedia.

Quemadmodum in vertigine idiopathica internus acidularum, thermarumque usus neutiquam proficius existit; tantum abest, ut inde flasis humorum in capite augeatur: ita eadem ab hypochondriorum vitio progenerata, præmissa convenienti medicina, optimum a bene ordinato thermarum vel acidularum tepescatarum usu reci-

pit auxilium: testante observatione CONSULT. MED. Sess. I. Cas. X. inserta.

## §. IV.

Gravidæ sæpe numero vertigine <sup>De verti-</sup> affliguntur; quæ non modo plethoræ <sup>signis</sup> qua pollent, verum etiam alvi adstri- <sup>Gravidarum</sup> ctioni & flatuum retentioni, ipsis fami- liari debetur. Tali casu omne cura- tionis absolvitur negotium, si admi- nistrata venæsectione, status subdu- cantur & alvus aperiatur vel infuso clystere, vel laxante passulato, man- nato ac rhabarbarino. Vidi etiam sub- bito ortam vertiginem in iis, qui per aliquot dies suppressam habuerunt al- vum: ubi infuso clystere, datoque intus oleo amygdalarum dulcium, omne protinus cessavit malum.

## §. V.

Balsama roborantia, spirituosæ, <sup>Caustica</sup> nervina, confortantia magis in hoc <sup>circa</sup> affectu proficiua sunt senibus, & infir- <sup>sum re-</sup> mis corporibus; subjectis vero junio- <sup>rem</sup> ribus, floridioribus & plethoricis mi- nus conveniunt, nisi antea vena tusa; ac alvus evacuata fuerit. Tum etiam conveniunt infusa calida ex herbis ce- phalicis, radice valerianæ, & cube- bis parata; nec non cucupha a Wepse- ro inventa, quam LENTILIUS in *Miscell. P. I. p. 74. & P. II. p. 314.* de- scribit. Vitanda vero cuncta sunt; quæ nervos debilitant, ut sunt omnia vaporosa, narcotica, moschata & camphorata.

## §. VI.

Sæpissime fit, ut cum vertigine <sup>Remedia</sup> complicantur affectus nephritici; quo- <sup>in ver-</sup> in casu bina notissimum remedia effi- <sup>signis</sup> caciissima & velut specifica deprehendi- <sup>specifi-</sup> ca. Unum est succus ex dauco hortensi re- cens expressus, cui, mane ea quam octo cochlearia capiunt quantitate as- sumpto, infusum theiforme ex veroni- ca, melissa, betonica, radice liqui- ritæ & semine sceniculi superbiben- dum dedi: alterum est pulvis ex lapi- dum cancrorum, radicis pimpinellæ nigræ, & iridis florentinæ æquali pon- dere oompositus, & ad drachmam di- midiam

midiam bis quavis hebdomade vespere sumtus. Ex quorum remediorum usu per aliquot hebdomades protracto magnam vidi efficaciam.

## ENARRATIONES MORBORUM.

### OBSERVATIO I.

*Vertigo  
levi-  
sima*

**V** Ir quadraginta annorum meditationibus nimium indulgens, & animi mœrore, curisque per longum tempus agitatus, tandem de insigni capitis gravitate & levi vertigine conquirebatur; quæ in eo consillebat, quod mane potissimum & jejuno existente stomacho cuncta objecta videbantur nigra, & ipse pedibus vacillabat, ut sine lapsu metu vix ingredi potuerit. Ingravescabant hæc vitia, si tempestas ingruerat aquilonia; & præterea sæpius pituita viscida acida, interdum aqua limpida cum levi animi deliquio mane per os eructabatur; alio existente strictiori: Implorato nostro auxilio ordinavimus pilulas nostras balsamicas, alternis diebus circa lecti introitum sumendas, & temperata quotidie pediluvia. Mane & hora pomeridiana quinta dedimus pulverem nostrum bezoardicum; & sub epulis essentiam corticum aurantiorum; cum balsamo vitæ remixtam. Eodem balsamo inungi tempora cum vertice, eundemque naribus admovevi, & quandoque loco pulveris bezoardici ad decem guttulas cum infuso betonicæ, melissæ, falviæ & veronicæ intus exhiberi jussimus. Extrinsecus ad reprimendum humorum ad caput raptum capiti non sine fructu adplicuimus epithema ex camphora in spiritu rosarum soluta, aceto rutaceo, rosaceoque confectum; & mane panem butyro illitum, ut comederet, suasimus. Inde obtinuimus, ut perfectam æger recuperaret sanitatem.

## EPICRISIS.

Est hæc vertigo sympathica stomachalis. quæ a cruditatibus acidis, ventriculique vellicantibus origines trahit. Fovet enim ventriculus insignem cum capite consensum vi paris nervorum vagi, per quod spasmi ac stricturæ simul ad superiora propagantur. Præterea præcordiorum stricturæ id fecum trahunt incommodi, ut humores ad caput compellant, qui vel in carotidibus arteriis, vel plexu choroideo accumulati, stagnantes, nervosque opticos comprimentes, vertiginem inducunt. Quocirca igitur est materia in ventriculo hospitans; eo gravior & spasmus & vertigo est: qualis matutino præsertim tempore, ubi jejunus est stomachus, observatur. Quare crebra etiam compertum habemus experientia, nunquam vertiginosus utile esse, ut jejuni permaneant; sed magno ipsis esse levamini, si mane parum cibi, & vel solius panis butyro illiti assumant. Curatio eo dirigi debuit, ut sordes exprimis viis removerentur, & ventriculus una cum nervoso genere corroboraretur: qui scopi propositis. medicamentis optime potuerunt obtineri. Nec enim opus fuit, in præsentem per diuturnos mœrores ac meditationes valde debilitato, venam secare; id quod in vertigine idiopathica nunquam intermitteri debet.

### OBSERVATIO II.

Vir annorum sexaginta sex, temperamenti sanguineo cholericis, corporis oberioris, matre nephritide ac vertigine caduca defuncta natus, in illius juvenute sua sanus vixit, nisi quod arthriticis quandoque & nephriticis motus fuerit perpeffus. Postquam vero per octo novissimos annos vitam magis otiosam sub diætâ lauta vinosaque egit; sensit primum motus hæmorrhoidales, dein sub potu thermarum Carolinarum mixtum cruentum;

D 2 &

& denique gravem nephritidis paroxysmum, alvi obstructione, vomendique conatibus stipatum, sed ope emulsionum & nitroforum semper superatum, aliquoties toleravit. Successit demum vertigo cum artuum imbecillitate, quæ licet usu venæsectionum & laxantium mitigari primum videretur; paullo tamen post ex improvviso vehementior cum vomitibus & sensuum abolitione recrudescebat. Sopitis per pulveres antispasmodicos vomitibus, vertigo eadem adhuc per quatuordecim inhaerebat dies, leni febriacula stipata, sub qua æger non incedere valebar, & pedes mirum in modum vacillabant. Anno abhinc elapso ad roborandos pedes descendit in balnea calidiora cum herbis radicibusque nervinis parata; sed brevi post in plenariam memoriæ abolitionem, cum linguæ paralyti & summa extremorum debilitate conjunctam incidit. A quibus sensim liberatus incommodis, tantum tamen pedum retinuit imbecillitatem, ut vix incedere possit. Ab eo tempore nephritici motus plane siluerunt, & magis magisque pinguescit corpus: sed vertigo per intervalla revertitur, & cum sternutatione non modo invadit, verum etiam finitur. Consultus ego fuasi, ut pro ratione plethoræ bis quotannis vena in brachio secaretur; loco cerevisiæ decoctum ex radice chinæ, sarsaparillæ, Santalo citrino, rasura ligni aloes, passulis ac cinamomo adhiberetur, sumto desuper pauxillo vini: victum commendavi efficacem, abstinentiam a pinguibus, carnibus coctis, & iusculis; nec non pediluvia ex herbis nervinis, sale communi, cineribusque clavellatis parata, & post horum usum juncturas & os sacrum unguento martiato, cum oleo orismarini, thymi & majoranæ mixto inungendas fuasi.

## EPICRISIS.

1.) Præsens vertigo debetur congestioni humorum ad caput, a spasmodicis hypochondriorum hæmorrhoidalibus & nephriticis productæ: unde etiam ejus singulos paroxysmos vomitus sunt comitati. Pedum vero insignis vacillatio, non a sola vertigine derivanda; quippe qualis non nisi sub ipso vertiginis paroxysmo semet exserere solet: sed originem omnino trahit ab atonia membrarum, quæ medullam spinalem, inferiori spinæ parti inclusam cingunt, & hinc ad pedes prodeuntium nervorum; quæ per motus nephriticos fuit relicta.

2.) Quemadmodum plethoricis & sanguineo choleris calidiora & spirituosiora omnia, nimiam sanguinis ebullitionem concitando, sunt nocentissima; ita præsertim insensa iis deprehenduntur, si jam capitis quoddam morbo laborarint. Hinc enim factum est, quod noster ægotans ex balnearum calidiorum usu (quæ alias tepida nil nocent) apoplecticum ferme insultum contraxerit, qui linguæ paralyti, memoriæque debilitate se prodidit. Discimus ergo, & balnea & pediluvia in capitis affectibus usurpata semper esse debere tepida.

3.) Annexa erat huic observationi quaestio: num thermæ Carolinæ ex usu ægroti essent? Dissuasi autem earum usum. Aeger enim non solum sympathica vertigine laborare censendus est; sed omnino idiopathica, a primarum viarum spasmodicis, & excitata, & exacerbata. Causa hujus jam in dispositione hereditaria est quaerenda; qua cerebrum & nervi insigni debilitate affecti videntur. Quo in casu omnes & thermæ & acidulæ sunt fugiendæ; quoniam per debilitata valcula non rite progrediuntur, sed stagnantes majora pariunt damna.



## OBSERVATIO III.

*Vertigo*  
*sedata*  
*hypochondriacis*  
*diutius.* Litteratus quidam quadraginta sex annorum, spongioso habitu, vasis hexilioribus, multisque succis præditus, vitæque nimium deditus sedentariæ, per sedecim jam annos magno animi torpore, angore, mœrore, angustia præcordiorum, languore artuum, cephalalgia, borborygmis, & spasticis flatulentisque commotionibus valde discruciatu fuit. Hæc autem inter symptomata maximam ipsi crucem figebat vertigo tenebrosa & caduca, sub cujus accessione, nisi contineatur, omnino concidebat, omniumque sensationum usu carebat. Post capitis ad terram inclinationem malum protinus invadebat; & interdum punctula seu scintillulæ se oculis præsentabant. Nares erant ut plurimum sicciores, & si post sternutationem vel natura vel arte provocatam pituitam plorabant, malo ferebant levamen. Alvus valde segniss non nisi alternis diebus scybala durissima reddebatur; sed somnus cum adpetitu rite sibi constabat. Variorum medicorum consilia contra hæc mala expetiit sibi ægrotans; sed a nullo sensit auxilium. Quidam haud incelebris, causam in ventriculo hæere ratus, emeticum ex tartaro emetico propinavit, idque cum non moveret vomitum, quater adhuc eadem die iteravit, nullo tamen effectu, nisi quod alvus inde duceretur. Inter alia prædida usus etiam est thermis Carolinis, & tribus quidem vicibus, cum levamine tantum brevi. Non minus hæmorrhoidum, quarum tamen nulla adsunt molimina, provocaturus fluorem, hirudines ano curavit admoventes; venam bis in pede quotannis præbet secandam; & novissime serm lactis curæ loco potavit. Præterea diætam servat Aristissimam; cavet sibi a multis mentis laboribus; magis indulget corporis exercitio; loco cerevisiæ pro potu aqua leviori, vino nupta utitur. Sed quum ex his omnibus nullum

levamen, nedum plenariam medelam reportaret; meum flagitavit consilium.

EPICRISIS CUM  
CONSILIO.

1.) Vertigo præsens rectissime vocatur hypochondriaca, eo quod suos natales a malo hypochondriaco mutuatur. Hæc autem vertiginis species, si inveteravit, longe pertinacior, curatuque longe difficilior est, quam omnes reliquæ, utut idiopathicæ: quoniam omnes totius corporis nervosæ ac vasculosæ partes simul a tono suo sunt dejectæ, omnes totius corporis functiones simul languent, & ipsa mens anxiosa, meticulosa & inconstans est; unde etiam diuturniorem non perferunt medicationem, sed mox hunc, mox illud adeunt medicum, & mox hoc mox illud adperunt medicamen.

2.) Eo autem graviore est in nostro ægrotante morbus quum jam omnibus, quæ bis in affectibus adhiberi solent, usus fuerit remediis, & novissime tale vitæ genus selegit, quale ad curandos ejusmodi morbos admodum necessarium est: neque tamen minus valetudinem nondum recuperavit. Præterea ad majorem hujus mali pertinaciam multum contribuit 1.) perversa medicatio, qua vomitorium uno die quinquies, idque pessimo consilio fuit adhibitum; 2.) alvi contumacia, nec ullis remediis cedens segnitie; quippe quæ spasmodicam imi ventris strictionem, una cum majori humorum ad caput raptu sustentat.

3.) Quamobrem angustia profecto curationis spes superest; quæ non alia ratione institui poterit, quam ut ægrotus exactissimæ victus observationi insistat; pediluvii tepidioribus, blandis laxantibus, & nervinis utatur; & demum molares Carolinarum thermas sub debito adhibeat regimine.

## OBSERVATIO IV.

*Vertigo cum catarrha*  
Vir juvenis, maritus, temperamenti sanguineo-choleric, sub regulari narium hæmorrhagia sanus semper vixit: ea vero ineunte ætate cessante, capitis dolores per totam ætatem perpetuo adligentes sensit. Hos Decembri mense remittentes excipiebat gravis vertigo cum tendente & lancinante musculorum temporalium dolore, somnoque turbulento stipata. Jungebantur oculorum obnubilationes, & ante illos punctula perpetuo obversabantur. Alvus insuper adstrictior erat; & flatulentia, utur cibi non nisi molles sumerentur, abdomen cum spirandi difficultate distendebant. Ipse ceterum æger corporis exercitio haud multum studebat, nec unquam sanguinem sibi curaverat detrahendum. Ego itaque consultus suavi, ut ter quotannis ex pede mitteretur sanguis; vesperi adhiberentur pediluvia; post venesectionem emplastrum vesicans exemplastri de melliloto uncia una, cantharidum drachma una, & balsami Peruviani drachma dimidia nuchæ applicaretur, & per quatuor gestaretur hebdomades. Commendavi etiam Elixir meum viscerale ad octoginta guttas sub epulis sumendum; laxans rhabarbarinum bis quavis hebdomade capiendum; & cum recta vivendi ratione loco potus aquam vino permixtam ordinavi.

## E P I C R I S I S.

1.) Vertigo, quam præsens ætate adhuc junior patitur æger, duplici nititur causa: quarum unam suppressæ & intermissæ sanguinis excretiones; alteram flatulenta & spasmodica hypochondriorum pathemata exhibent. Priorem quod attinet, duplex ea iterum est; siquidem non solum narium hæmorrhagia per ætatis rationem cessans; verum etiam venesectionis, quæ succedere debuisse, intermissio accusari merentur. Alteram, quæ mali hypo-

chondriaci initia significat, testantur alvus adstrictior, borborygmi & flatulentia intestinorum, spiratio difficilis, & digestio vitiata.

2.) Isdem causis debetur catarracta incipiens sive spuria, quam ægrotus patitur, quamque significant scintillulae ac punctula oculis obversantia. Id vitii genus ex hypochondriaca passione generari novum non est: quum enim ob male constitutum ventriculum chylus generetur crassus & impurus; qualis etiam sit sanguis; & hic majori copia ob inferiorum partium spasmos ad caput compellatur, in oculis stagnet, & dimittat particulas crassiores: hæ in aequum delapsæ humorem efficiunt eam sensationem, qua punctula oculis obversari percipitur. Quo ex vitio successu temporis ipsa emergit catarracta.

## OBSERVATIO V.

*Vertigo ex debilitate causata*  
Matrona generosa, sexaginta annorum, temperamenti sanguineo melancholici, a teneris pro potu plerumque vino, & cibis crudis, coëctaque difficilius uti solita, permultos variolique morbos toleravit, sed feliciter semper superavit. Post menstruum cessationem hæmorrhoides eruperunt, & per multos annos magno cum sanitatis emolumento fluxerunt. Quarum florum ante triennium sponte silet; nihil tamen incommodi ad sanitatem inde pullulavit, eo quod venesectionibus ac scarificationibus moles sanguinis semper imminuta fuit. At elapso anno quum paucis post institutam circa autumnale æquinoctium venesectionem diebus, ostrearum iusto majorem comedit quantitatem: accidit, ut gravi vertigine, præcordiorum anxietate, nausea, & vomendi conatu corripere; quæ cuncta symptomata, reddita per vomitum multa pituita protinus conquieverunt. Sed interjectis aliquot mensibus longe vehementior redibat vertigo, extremorum frigore, pectoris oppressione, pulsu-

pulsuque magno & pleno stipata; quæ ope clysterum alvum solventium, frictionum, & antispasmodicorum paulo mitigata; venæ autem incisione prorsus sublata fuit. Neque tamen minus nausea adfligebat adhuc cum intercurrente levi vertigine; quæ dato blando emetico ita debellabatur, ut ægra per aliquod tempus sana videretur. Sed brevis erat valetudo: siquidem circa vernale æquinoctium recrudescbat utique vertigo, cum dorsi & ossis sacri gravissimis doloribus; & per aliquot hebdomades ægram lecto affigebant, donec prorumpentes hæmorrhoides felicem toti scænz imponerent finem. Circa solstitium autem vehementer terror omne revocavit malum, quod abhinc, suppressis plane hæmorrhoidibus, inque cassum adhibitis intus Egranis, externe Lauchstadiensibus aquis, nullis expugnari potuit medicinis, quin per intervalla rediret. Ego demum consultus pro potu decocta cum vino, laxantia rhabarbarina & Elixir nostrum viscereale commendavi; ad firmandum nervorum robur pulverem ex lapidibus, cancrorum, pulvere Marchionis, nitro depurato, succino præparato, cardamomo, & cinnabari nativa præscripti; & venæsectionem, quater quotannis repetendam ordinavi. In ipso vertiginis paroxysmo suasi, ut ano clyster infunderetur, tum pedes immittantur pediluvio, & interne aliquot balsami vitæ cum quindecim liquoris anodynii guttis remixtæ exhibeantur.

## E P I C R I S I S.

Fœminas, quibus post mensem cessationem hæmorrhoidalis fluor statim tempore contingit, eandem ab eo utilitates circa sanitatem sentire, quas ex legitimo menstruum fluxu percipiunt, quotidiana docet experientia. Quod si vero utraque excretio ob quæcunque causas cessat; rectissime sibi consulunt, qui earum vicem artificialibus sanguinis suppleant missionibus.

Quemadmodum vero hæc sub debito regimine administrata, incomparabilem inferunt sanitati usum: ita neglecto regimine, multorum auctores sunt malorum. Et id in præsentī contigit etiam casu: immoderatus enim ostrearum usus mox a venæsectione, ansam præbuit cunctis, quæ sequuntur affectionibus. Nam post venæsectionem per aliquot dies ab omnibus coctu difficilioribus cibis abstinendum est; quia ventriculus iusto debilior, iisque digerendis impar existit.

2.) Discimus etiam ex præsentī casu, quantas & in producendis, & revocandis morbis vires possideat vehementer terror. Aegrotans nostra, si post adhibitam medelam, rectæ vivendi rationi studuisset; procul dubio ab omnibus libera permanisset symptomatibus. Sed terror omnia rursus exacerbavit; quippe qui constringendo corporis habitum, ad interiora & superiora repellit vitales succos, qui accumulati in partibus nondum firmatis, pristinas ludunt scenas.

## OBSERVATIO VI.

Vir generosus, quinquaginta sex annorum, temperamenti sanguineo cholerici, vitæ sedentariæ addictus, a prima infantia ad viceßimum circiter primum ætatis annum, variis efflorescentiis scorbuticis, asthmaticis, affectibus & largis: narium hæmorrhagiis laboravit. Aetate adolescente arthritici artuum & dorsi motus accesserunt; sed venæsectione circa quodvis æquinoctium abhinc administrari solita mitigati, in fluxum tandem hæmorrhoidalem desierunt; quo per multos annos singulis ferme mensibus cruoris, utut parca quantitas, cum singulari sanitatis allevamento effluxit. Antetriennum parcius promanavit cruor, & per novissimum annum fluere prorsus desit: quo tempore sanus quidem vixit, nisi quod per intervalla efflorescentiæ purpuraceæ, cum doloribus artuum, tensivis, flatulentis, cordis,

D 4 palpi-

palpitationibus, & nocturnis pollutionibus corpus occupaverint, hancque præsertim scenam Decembris & Aprilis mense luserint. Novissime accesserunt vertiginosæ molestiæ, quæ cum cordis palpitatione, inflatione abdominis flatulenta, & crebris ructibus, post prandium æque ac cœnam gravius adfligebant; sed adhibitis congruis medicinis evanuerunt. Quum autem eorum recursum, quin apoplexiam timeret; meum flagitavit consilium. Quare suasi, ut sub convenienti diætâ, & acidorum, spirituosorum ac vinosorum evitacione, nec non debita venæsectionum continuacione, adhiberet pediluvia; sub epulis caperet Elisir nostrum viscerale, pro potu uteretur decocto ex hordeo, radice cichorei, semineque fœniculi; & quandoque pilulas balsamicas cum pulvere præcipitante fumeret.

### EPICRISIS.

1.) Innumeris exemplis & observationibus confirmari potest, quod qui in juventute largis narium hæmorrhagiis obnoxii fuerunt, his progrediente ætate cessantibus, arthriticis ac hæmorrhoidalibus afficiantur pathematibus. Quibus omnino medelam ferre licet, si vel hæmorrhoidum regularis fluxus provocari potest; vel convenientes insituantur venæsectiones. Unde etiam noster ægrotans sanus vixit, quam diu fluxerunt hæmorrhoides.

2.) Quod si vero hæc supprimatur excretio; quam vel sola vita otiosa, crassos reddendo humores, & excretionibus ineptos suppressere valet: stagnât succi in imo ventre, maximeque ventriculo & intestinis; quæ debilitantur exinde, & officio digestionis rite perficiendo minus sunt idonea. Hinc gi-gnuntur cruditates in primis viis: quæ ventriculi & conterminarum partium spasmodicas excitando stricturas, vertiginis in nostro casu causæ fuerunt.

### OBSERVATIO VII.

Vir sexaginta sex annorum, robustæ & sanæ constitutionis, aliquando circa vespertinum tempus vehementi exardescens iracundia, sanus quidem lectum petit; at mane surgens, tanta prehendebatur vertigine, ut iterum in lectum prosterneretur. Eidem etiam per aliquot menses affixus fuit; donec exhibita remedia id quidem efficerent, ut muniis domesticis fungi, & obambulare potuerit; nihilominus vertigo pertinax continuat, ægrotumque per vices subito in terram prostermit. Cui cum medelam quæreret; suasi venæsectionem bis quotannis celebrandam; dedi infusum theiforme ex melissa, citricque corticibus; & pulverem, qui cornu cervi philosophice præparatum, pulverem Marchionis, lapides canerorum, succinum præparatum, nitrum & cinnabarin habebat. Unde factum, ut conjuncto balsami vitæ externo usu haberet egrégie.

### EPICRISIS.

Senes, quamvis illibata sanitate, magnoque corporis & animi vigore fruuntur, accidit tamen sæpius, ut gravi animi perturbatione, subito terrore, vel insolenti ira in ingentem virium defectum, quin etiam in affectus vehementer caput infestantes incidunt; idque eo magis, si sanguine abundant, vel critica hujus evacuationis cessant & consueta venæ sectio intermittitur. Quo in casu opus omnino est, ut sanguis mittatur & vehementes nervosorum partium commotiones blandis sedativis sopiantur, abstinendo ab omnibus iis calidis nervinis, quæ sanguinem valde commoveant. Est alias liquor noster balsamicus, qui balsami vitæ nomine venit, in affectibus senum, capitis præsertim, & arcendis & sanandis efficacissimum & crebriori usu comprobatur remedium. Cavendum tamen ab eo est summo pere, ubi

valio-

Vertigo  
pertinax  
ab ira.

valorum est plenitudo & dispositio ad motus hæmorrhagicos & congestorios.

## OBSERVATIO VIII.

*Vertigo  
caduce  
in fan-  
gine  
copio  
prima-  
rumque  
colorum  
vitiis.*

Vir Reverendissimus quinquaginta annorum, temperamenti cholericis sanguinei, obesus & procerus, in juventute narium hæmorrhagiam subilibrata sanitate expertus, nec ullis unquam morbis, nisi bis tertia, novissime ictero discussa, fatigatus, ob insignem sanguinis & humorum copiam per viginti jam annos venam medianam quotannis tundendam præbere suevit. Neque vero minus per quindecim annos hæmorrhoides bis vel ter quovis anno absque ullis incommodis, nec sine egregia valetudine fluxerunt; quæ vero quatuor abhinc vel quinque annis febriles commotiones nunquam non habuerunt præcursores. Sed per novissimum triennium mutata sunt rerum facies; siquidem per crebra intervalla vertiginosus accessit insultus, quem semper comitatur sunt hæmorrhoides cæcæ, adeo ut eo tempore non nisi bis fluentes fuerint. Hinc vertigo magis magisque increbuit, caducæ speciem omnino referens: etenim ex improviso cuncta videntur in gyrum rotari, pedes vacillant, sieubant, ægerque lapsus evitaturus, desidere tenetur; tum vero magnam capitis imbecillitatem sentit, maxime in cervice, ut caput erectum tenere nequeat, sed pectori illud adplicare teneatur: præterea refrigerant expalescuntque facies, manus atque pedes, & non raro ipsi sensus cum ratione turbantur; quæ demum cæcæ hæmorrhoides, mox iterum evanescentes excipiunt. Præterea auditus difficultas cum tinnitu auris sinistra infestat, æger appetitu truitur integro, alvoque gaudet aperta; sed crebri vexant ructus, & insignis muci quantitas laborioso nonnunquam redditur secretu. Contra quæ mala cum plura pharmaca, nec non hirudines frustra fuerint adhibita: ego confusus suavi, ut servatis recte vi-

endi regulis, venam bis terve secandam quot annis daret; crebris uteretur pediluvii; quavis hebdomade alvum pilulis meis balsamicis laxandam curaret; sub epulis Elixir meum viscerale, oleo macis & cinamomi nuptum caperet, & vesperi nonnunquam pulverem ex antimonio diaphoretico, succino præparato, lapidibus cancerum, nitro, arcano duplicato, & cinnabari usurparet.

## E P I C R I S I S.

Hæmorrhoides insignem cum ventriculo & intestinis habere nexum, crebra docet experientia. Iis enim impediæ fluentibus, vim concoctricem ac peristalticam dictarum partium admodum debilitari, passionemque sic generari hypochondriacam; & vicissim labefactato intestinorum tono hæmorrhoides produci symptomáticas; quam plurimis didici exemplis. Idem in præsentia casu contigisse, inque primis ex hæmorrhoidum imminuto fluore primas vias vitium contraxisse; vel crebri ructus mucique secretus testantur. Quem vero fugit, ventriculo male habente, omnino generari vertiginem.

2.) Sed huius in hoc casu ratio adhuc ab ipsius sanguinis copia, & ad caput facta congectione accersenda videtur. Scilicet dum fluxerunt hæmorrhoides; natis in abdomine spasms, humores copiosius ad caput rapti, distenderunt vasa, compresserunt nervos, turbarunt sufficientem liquidi tenuissimi in eos induxum, & sic produxerunt vertiginem, nervosarum capitum partium debilitatem. Spasms inferiorum partium sub paroxysmo significant frigus extremarum partium; quibus remittentibus, cæcæ adparuerunt hæmorrhoides.

3.) Febriles commotiones, quæ hæmorrhoidum antecesserunt fluxum, significant, sanguinem jam crassorem & ad excretionem minus aptum fuisse. Observamus enim, spasmodicos ac febriles motus omnem

fere antecedere hæmorrhagiam, eoque vehementiores, quo hæc succedit difficilior.

## OBSERVATIO IX.

*Vertigo a frigore pedum & immoderatiore ut potest.*

Serenissimus ætatis annorum quadraginta, a patre genitus podagrico per omnem fere vitam nunquam ægrotavit, nunc vero per quinquennium gravis vertigo subinde adeo cum invadit, ut vacillantibus pedibus eum prosterнат: ut plurimum periodice, circa octavam matutinam & vesperti circa quintam incidit, mox levior, mox gravior: accessionem tinnitus & auditus difficultas cum oculorum stupore & obnubilatione antecedit, facie existente rubicunda & venis turgida. Ubi paululum affectus remittit, protinus pectoris cum anhelosa spiratione oppressio & dolor ac spasmus femorum, nonnunquam etiam vomitio vel conatus ad vomendum, neque minus dolor in reddenda urina adlunt. Solvitur malum ingenti materie tartareæ per urinam secessione. Pedes subinde frigidius præsertim circa malleolos nunc per quatuor hebdomadam spatium tumet cum dolore tensivo, torpore & debilitate, inprimis post pediluvia & tum levius malum exsistit. Sanguinis vacuationes criticæ per omnem ætatem visæ sunt nunquam, at vero circa æquinoctialia tempora sine incommodo sanguis secreatu fuit rejectus, qui postea per annum ter incisa vena evanuit. Consultus ego suasi venam singulis anni quadrantibus in pede secandam & ut abstineret a cerevisia valde lupulata, venire, vini potu, cui paulo largius indulgit, aquam pro potu sumat, ac pedes probe a frigore defendat eosque mane, ut pessime consuevit, non nudet, pediluvia vero frequentius adhibeat & ad vim ventriculi concoctricem confirmandam in prandio temperatum balsamicum meum sic dictum viscerale ad 60. guttas affumat. Suasi quoque ut instante vere fontem Egranum cum debito regimine

interposito pilularum balsamicarum usu biberet.

## EPICRISIS.

Hoc capitis frequentissimum vitium, ut sæpius observatum a me est, a liberaliori vini potu, extremorum frigore, sanguineæ evacuationis sive per naturam sive per artem defectu in sanguine plenis subinde oboritur & laborantem sæpe diu trahit, immo, nisi commodis auxiliis succurratur, in apoplexiam & mortem præcipitat. Ubi ex hisce causis nascitur malum, ego levissimis, facillimis & promptis modo enumeratis remediis dieteticis plus præstiti, quam generosis pharmacis. Sed opus est, ut ejusmodi vitio & vivendi ratione diutius ægrotantes urantur.

## OBSERVATIO X.

Illusterrimus Comes annorum sexaginta trium in juventute semper robustus & bene valens, temperamenti sanguinea cholerei, corpus venationibus probe semper exercuit: ante viginti annos Silesiæ in continuam & acutam febrem ex abusu vini Hungarici incidit, quæ naturæ vires ac robur corporis adeo infirmavit & destruxit, ut vix intra tres menses functiones tam vitales quam naturales in ordinem redigi potuerint. Ab eo tempore imbecillitatem capitis cum vertigine per intervalla expertus est, quæ succedente tempore ingravescentes ante quadriennium tam vehemens facta est, ut in terram Illustrissimum Virum præcipitaverit. Ex licet crebriores hujus affectus accessiones per repetitas venæsectiones, leniter purgantia & alia commoda remedia fuerint præpeditæ, attramen adhuc ex vitio digestionis subfuitis tempestatis mutationibus ineiunt. Quod pessimum vero est, comitatur hoc vitium ingens audiendi difficultas & visus obnubilatio. Vires præterea constant, somnus placidus,

*Vertigo cum anxia diffinita diffinita & acutiora obnubilatio chronica.*

& major quam decet & laboris exercitationisque necessitas exigit, ciborum est appetentia. Infantes vero cibos ac pingues, quorum usum frequenter sorda excipit, minus bene ferre potest. Pro potu sumit aquam & singulis diebus duas vini Mosellani bibit mensuras, facies est florida, rubicunda. Per sex fere annos verno tempore fonte Egrano usus singulis fere annis quater, quique, imo sex V.S. admisit.

### EPICRISIS CUM CONSILIO.

Infirmiorem, quæ magnos & diuturnos morbos sequitur, aliis gravibus morbis, qui inde prodeunt, obnoxiam esse, & hæc historia & multæ aliæ nobis cognitæ manifesto satis confirmant. In ejusmodi diuturnis vitiis ego vix aliis quam dieteticis remediis ulum esse animadverti. Interdixi itaque ex hoc fundamento liberaliorem vini usum, motum vero & exercitationem corporis ad sudorem usque pervectionem aut equitationem, neque minus abstinentiam a cibis, præsertim mucilaginosos, flatulentis, pinguibus ac victum parvum & extenuantem imperavi, utpote cum ex sanguinis & succorum abundantia plerumque ad imbecillius caput congestio proficiscitur. Ex quia ventriculi imbecillitas id vitii valde fovere & augere solet, semper omnino medicum, ea quæ concoctionem juvant, proponere oportet; quo nomine Elixir meum viscerale, idem quod in notis in Poterium præscriptum est, principem sibi vindicat locum. Postremo, hanc ceu perpetuam, & quæ meretur notari, observationem subnectere hoc loco volui, idque maxime in gratiam juniorum medicorum: in capitis affectibus, ut in vertigine, auditus difficultate, ubi a sanguinis abundantia ortum traxerint, communia illa adversus ejusmodi morbos commendata cephalica, nervina balsamica, ad quæ etiam pertinent balsama apoplectica, & balsamum nostrum sic dictum vitale, nec

externe nec interne, nisi cum maxima prudentia exhibenda esse, eo quod majorem motum & orgasmum in humoribus excitando & consequenter stagnationem efficiendo pessimos effectus producant.

### OBSERVATIO XI.

Litteratus triginta trium annorum, <sup>Vertigo</sup> temperamenti languineo-cholERICI, <sup>caduca</sup> animi sensibilioris, crebris mox lucubrationibus & meditationibus, mox comportionibus, mox animi pathematibus indulgens, nocte aliquando in frigido conclavi scribendo transacta, mane facturus iter ex improvviso gravi corripitur vertigine, quasi cadauca: quippe ultra horæ spatium instar attoniti jacebat, oculisque celeriter invitum movebat, tum facies intumescebat, & paroxysmus sensum, relicto corporis languore, remittebat. Abhinc quavis circiter hebdomade redibat; & novissime sic se habebat: Prævia insigni iracundia, cum mensæ pransurus addidere vellet, frigus pedum, tanquam regularem mali prænuncium, sensit; hinc dissipaturus affectum discurrere per conclave nititur; sed vertigine opinione citius accedente præpeditus, pedes aquæ tepidæ immergit, & ex aqua frigida triginta liquoris anodynî guttas sumit. Unde factum, ut paroxysmus, qui alias per aliquot horas in hærebat, non solum protinus cessaret, verum etiam mitior esset, & non nisi levi lassitudine semet exleret. Verum cum nihilominus per intervalla posthæc reverteretur accessio: meum ad eam penitus abigendam implorabat consilium. Quamobrem suavi primum, ut venæsectionem, quam antea singulo tantum biennio admiserat, bis quotannis administrandam curaret; deinceps corporis exercitio, & tranquillitati mentis probe studeret; pediluvii tepidis frequenter uteretur; pro potu ordinario adhiberet fontem Selteranum; quavis hebdomade pilulas balsamicas

micas cum pulvere præcipitante usurparet; & mane denique ex infuso theiformi guttas quadraginta mixturæ, quæ habebat liquoris anodynî, tincturæ antimonii acris ana unciam dimidiam, balsami vitæ drachmam unam, sumeret.

### EPICRISIS.

Hæc vertigo rectissime vocari potest spasmodica; eo quod a spasmis ac stricturis partium infernarum, succos vitales ad caput compellentibus in singulo paroxysmo originem traxerit: id quod frigus pedum, quemvis paroxysmum antecedens testatur. Et tali incasu utique consultum est, pedes mox sub accessionis initio tepidæ aquæ immittere: nec sine fructu adsumtus sub ipso paroxysmo est liquor noster anodynus; siquidem hæc remedium genera, spasmodum partium externarum relaxando, omnino avertere paroxysmum potuerunt.

2.) Causa occasionalis, quæ hanc vertiginem introduxit, frigus quidem est; sed recte dicitur occasionalis, quoniam in corporibus, quæ non iam aliqualem dispositionem sœvent, tam gravia non semper excitat mala. Noster autem ægrotans cum partim per crebras animi commotiones, partim etiam multas lubricationes, & fluidorum crassitiem & solidorum debilitatem sibi contraxisse videtur: ex facili accedente frigore in vertiginem potuit incidere.

3.) Quod sub paroxysmo vertiginoso oculi moti ac velut convulsi fuerint, id cum vertiginis essentia facile conciliari potest. Nam vertigo dependet a quasi paralytica nervi optici relaxatione; & motus oculi a pari nervorum tertio; seu oculorum motorio: qui omnino convelli potest, altero nervo existente paralytico.

## CAPUT IV.

### DE GUTTA SERENA.

#### THESES PATHOLOGICÆ.

##### §. I.

**G**Rave malum est cœcitas, quam Græci ἀπὸ πύρρον, Latini guttam serenam; quasi gutta quædam obturrasset nervum opticum dixerunt, & pth. nos per visionem ab influxu fluidi nervi in nervum opticum prorsus intercepto, oculis illæsi existentibus, sublatam describimus. Sub ea, si exterius oculum inspicias, sanus & integer apparet oculus neque in tunica ipsius, neque in humoribus labe conspicua est ulla, tantum quod pupilla naturali amplior, nigrior, nimiumque dilatata compareat, & ad radiorum luminosorum illapsum rigida spectetur & immobilis: nihilominus visio vel prorsus est abolita, vel saltem facultas restat tenebras a luce discernendi.

##### §. II.

Distinguit ergo semet hic morbus 1) Distinctio a vertigine, in qua circumgyrationis sensus, & pedum adest vacillatio, fluidi vero nervi influxus nec prorsus est, nec interceptus, sed saltem imminutus, nec etiam perpetuo talis. Differt etiam 2) a cataracta; nam in hac crystallinus humor opacus cernitur, & pupilla ad lucis splendorem coarctatur, in tenebrosos autem locis dilatatur: contra in gutta serena per pupillam pellucidus adparet humor crystallinus, & pupilla, sive sit in lucido, sive obscuro loco, nec contrahitur, nec magis dilatatur, sed permanet immobilis.

##### §. III.

Neque vero eadem semper ratione se noster habet morbus: mox enim subito & repente invadit, ut plerumque fit, si ex violentis & externis oritur causis, ut post casum ab alto &

gra-



gravem capitis percussionem. Vid. HILDANUS *Cent. 5. Obs. 8. it. AMATUS LUSITANUS. Cent. 5. Obs. 64.* mox successive visio perditur, quod in senibus potissimum hemiplexia vel paralyti affectis, aliisque languidis contingit corporibus: mox associantur capitis dolores, vertigo, somnolentia, tinnitus & susurrus aurium &c. mox vero vacat his symptomatibus, solaque cœcitate adhigit. Datur quoque gutta serena periodica, quæ subito invadens, & per aliquot horas vel dies durans, sponte cessat, sed sæpe revertitur, ut fere sit in hypochondriacis, hystericis & parturientibus. Dividitur etiam in perfectam & imperfectam; in illa ulla nec visio, nec ullum luminis vestigium superest; in hac lumen adhuc a tenebris discerni potest, & videtur ad hanc quoque pertinere dimidiatus visus, cujus peculiarem speciem describit CHR. SIGISM. WOLFFIUS *diff. de amaurosi imperfecta 1709.* Trajecti habita; ubi quis non nisi truncum inferiorem cum pedibus in homine potuit videre.

## §. IV.

Quum in gutta serena oculus externe ab omni vitio liber conspiciatur; gutta se. haud sine ratione colligimus, causam mali non in ipso oculo, sed nervo potius optico esse querendam. Et hoc idem evidenter demonstrat incisio eorum, qui per vitam luminis usu caruerunt: hæc enim docet, nervos opticos fuisse nimium extenuatos, marcidos ac duplo minores, Vid. BONETUS *Sepulch. L. I. Sect. XVII. Obs. 3. & 4.* vel sero aut sanguine per cerebrum extravasato circumfusus & compressos, sicut adnotavit WEPFERUS *de apopl. hist. IV.* aut tumore duriore obfessos, qualem circa eorundem originem vidit BONETUS *l. c. obs. 1.* PAWIUS *obs. anat. 2.* conspexit vesicam aqueo humore plenam, distis nervis circa eorum conjunctionem insidentem, PLATERUS tumorem globosum prope nervos visorios in gutta serena laborante post mortem deprehendit, &

BONETUS *l. cit. obs. 5.* observavit arteriam carotidem, eo quo orbitam ingreditur loco, sanguine turgidissimam.

## §. V.

Multi quippe & tantum non omnes, Gutta serena arbitrio. accusarunt nervi optici obstructionem a lymphâ crassiuscula, qua tubuli hoc in nervo occludantur, ut liquidi nervi ad retinam affluxus, vel sufflaminetur, vel intercludatur plane. Verum nondum ab Anatomicis evictum est, nervis inesse canaliculos & tubulos, per quos liquidum recto vehatur tramite. Neque etiam per cerebri & oblongatam medullam crassior & coherens lymphâ, sed longe tenuissimum & ad cohesionem minime aptum liquidum fertur. Hinc in nervos obstructionem cadere neutiquam videtur credibile, multo minus in opticis nervis obstructio a materia ex cerebro adjecta commodum invenit locum. Cunctis his in casibus nervorum opticorum ea debet fieri compressio, quæ omnem fluidi nervi in eos influxum tollere, adeoque paralyin illorum vallet inducere: unde sequitur, causam guttæ serenæ proximam esse nervorum opticorum paralyin. Jam ex anatomica oculi structura notum perspicuumque habemus, nervum opticum, simulac ossicam oculi orbitam & hanc investiens intus periosium penetravit, atque exterius, quod a dura matre recepit, involucri ad constituendam scleroticam deposuit, altero involucri, præ meningis propagine, uveam, processus ciliares, & pupillam efformare, medullari vero substantia tunica mollem & pulposam, quæ retina audit, constituere. Notissimum porro est, retinam picturas objectorum visibilibus recipere, illas ad sensorium commune per nervum opticum propagare, tumque visionis ideam in mente excitare. Ad sentienda vero externa objecta opus esse nervosarum partium tensione, quæ in legitimo fluidi nervosi influxu consistit, capite jam primo de nervorum resolutionibus fuso demonstravimus.

Quum

Seftia  
anato-  
mica  
gutta se.  
rena pe-  
riosa-  
tam.

Quum autem in gutta serena adest paralyticus nervi optici & per consequens tunicae retinae, uveae ac processus ciliarium: sequitur, has partes nec tensas esse, nec recipere posse radios luminosos, sed pupillam ampliatam & ob relaxatos processus ciliares dilatam adparere. Nec aliud in oculo cernitur vitium; sed & motus humorum, & musculorum eos moventium optime se habet: propterea quod & vasa sanguinea vehementia & musculi non aboptico, sed aliis nervis, qui non sunt affecti, suas recipiunt propagationes.

## §. VI.

*Gutta serena tam paralytica quam spuria sedet.*

Causa igitur, quae comprimendo nervos opticos, horum paralyticam inducit, haeret vel circa illorum principium, seu thalamos, vel circa eodem oculorum orbitam ingredientem. Sed haerere etiam potest intra ipsum nervum opticum, & quidem in vasculis sanguineis, quae in ejus medullis latent; & quorum praesentiam non modo recentissimi anatomicorum, verum jam WEPFERUS *L. de Cicut. aquatica* pag. 127. demonstrarunt. Haec vasa, quae carotidis propaggines sunt, ut & alii carotidis rami, orbitam ambientes, si cruore inibi stagnante infarciuntur, premunt distenduntque medullares nervorum canaliculos, simulque lymphae per vasa nervos cingentia reditu impediunt. Haec videtur causa guttae serena periodicae; quae discussa sanguinis stagnatione statim cessat. Porro etiam verisimile videtur, in spuria amaurosi nonnunquam serum intra tunicas oculi, maximeque scleroticam secedens, opticumque comprimens nervum esse accusandum: ubi perennante a tergo fluidi nervi affluxu, ejus quaedam ingreditur portio, quae tantum relinquit visionis, quantum ad discernendam a tenebris lucem requiritur.

## §. VII.

*Subiecta & etate praesens gutta serena causa.*

Quamvis morbus noster omni sexui & aetati sit infestus, si causae externae violentiae, quae gravem capitis percussione, cerebri concussione, & hu-

morum circa nervos opticos stagnationem provocant, accesserint: attamen si ex internis enascatur causis, familiaris potissimum est subiectis valde plethoricis, pituitosis, cachecticis, senilibus, & quae caput nervosumque genus a praecedentibus animi affectibus, diuturno mœrore, anxia cura, nimis vigiliis, ac capitis laboribus, intemperativis studiis, lectione minutarum literarum ad lucis splendorem, frequenti ebrietate, diuturno frigore, & hereditaria dispositione imbecillum sibi contraxerunt. Et in eo quidem convenit cum reliquis cerebri affectibus, quod ut plurimum cerebri atonia nitatur.

## §. VIII.

Si mediatas spectemus causas; illae vel ad repletionem vel inanitionem commode referri possunt. Ad repletionis classem pertinet gutta serena, quae a sola sanguinis, plus minus crassius in vasculis cerebri, nervo optico continetur stagnatione proficitur; & non solum transitoria nonnunquam ac periodica existit; verum etiam, si recens fuerit, medellae locum relinquit. Talis evenit 1.) summe plethoricis, a vehementiori corporis motu, balnearum nimis calidorum usu, fortiori iracundia &c. qualem casum in CONSULT. MED. *Secl. I. cas. XLII.* relatum legas. 2.) parturientibus, vel in ipso partu, quae debetur vehementissimis imi ventris striculis, humores ad caput summo cum impetu propellentibus, & a BARTISCH in *Ophthalmod. p. 6. C. 2. der schwarze Meibers-Staar* vocatur; vel post partum, si fuerit laboriosus, & cum primis lochiorum accesserit defectus; qualem adnotavit, & venesectione brevi curavit MAURICEAU *Cent. V. obs. 368.* Notandum quoque, quod hemicrania, quae interdum excipit puerperium, saepius in coecitatem terminetur. 3.) Fœminis, ex defectu mensium, maloque hysterico laborantibus; qualem casum recensui in CONSULT. MED. *Secl. I. cas. XLIV.*

Memi-

Meminit quoque PECHLINUS L.I. *obs.* 42. gutta serena, quæ cum cephalalgia singulis mensibus, deficiente uteri purgatione, adfligebat. 4.) Hypochondriacis, hysteris, & qui gravioribus imi ventris torquentur spasmodis, quibus scilicet humores ad caput coguntur: unde notabilis est observatio, quam A.N.C. *dec.* III. *anno* 3. *obs.* 81. recensent de gutta serena, vehementem colicam cum alvi obstructione stipatam excipiente, & hac per clysteres curata, protinus cessante.

§. IX.

Quemadmodum vero gutta serena, quæ a sola sanguinis stagnatione ortum trahit, est transitoria: ita e contrario hæc si diutius ob hæserit, & subiecta pituitosa, cacochymica occupaverit, dimittendo ferosam, quæ ad nervos incumbit, portionem, diuturniorem & sæpius immedicabilem producit morbum. Novum igitur non est, a purpura, scabie, ulceribus, achoribus (vid. A. BEROL. *Dec.* II. *Vol.* VI. *pag.* 28.) intra corpus remeantibus id vitii oberiri: vel infantes imbecilliores, & qui humoribus abundant, eodem infestari; præsertim ubi non bene prodierunt morbilli, vel intestina lumbricis obducentur. Idem fit post morbos acutos, febres malignas, variolas, phrenitidem; humore videlicet per metastasim ad nervos opticos decumbente. Nonnunquam plethorici vel cacochymici ex fortiori vel purgatione vel vomitione cæcitatem sibi contrahunt; sicuti de vomitoriis observavit GULDENKLEE L. I. *epist.* 20. *pag.* 498. Cumprimis vero mercurialia inepte, & in corporibus impuris adhibita, lymphæ pertinacem stagnationem luserendo, ad hoc malum contribuunt.

§. X.

Hæ causæ ad repletionis spectant titulum; sup inanitionis autem voce complector nimias ac immoderatas succorum vitalium profusiones, quas nonnunquam guttam excipere serenam, experientia testatur. Præsertim

id contingit post effrenas hæmorrhagias; & speciatim abortam cæcitatem observant post vomitum cruentum largiorem A. N. C. *vol.* II. *obs.* 52. post nimiam venæsectionem in gravida ibid. *obs.* 45. post detractum largiter e vena frontis sanguinem BONETUS *Scd.* XVIII. *obs.* 2. *app.* Dum enim humor vitalis exhauritur, collabuntur vasa cerebrum perreptantia, secretio fluidi nervi imminuitur fit, & inde vertigo, gutta serena, animi deliquia, aliaque propullulant incommoda. Præsertim vero notari meretur insignis consensus, qui hoc in casu oculos & partes genitales intercedit; siquidem observamus, ex immodica & intempestiva venere sæpius oriri cæcitatem, quam ego multoties adnotavi & CONS. MED. *Scd.* III. *obs.* CIV. *p.* 427. recensui. Fluidum scilicet lymphaticum seminale cum eo, quod in cerebro secernitur, & per nervos distribuitur, ejusdem ferme indolis est & essentia: quare quo copiosior illius est excretio, eo parcius hujus secretio, unde partium nervosarum atonia, visus imbecillitas, & ipsa sequi solet cæcitas.

§. XI.

Gravissimum & pertinacissimum gutta serena est malum; & in primis si perfecta, si inveterata fuerit, sique senes & elanguida subiecta occupaverit, nullum medelæ relinquit locum, tantum abest, ut graviores tandem apoplectici & paralytici superveniant affectus. Contra malum recens, quod imperfectum est, & in oculorum duntaxat tunicis hærentem agnoscit causam, præsertim in junioribus & robustis subiectis, interdum sanatur. Non minus curationi cedit ea, quæ periodica est, & a sola sanguinis stagnatione dependet: quæ vero paralytica, aliisque capitis morbis jungitur, periculum portendit vix superabile.

## THESES THERAPEUTICÆ.

## §. I.

*Jodica-  
tiones  
sarcoti-  
cæ.*

**C**Urandi guttam serenam ratio admodum est difficilis; quippe remedium vis remotas has, ac in osseæ cranii theca absconditas partes minus subire valet. Neque tamen minus incumbit medico, ut quid valeant humeri, experiatur, curationemque procausarum ratione accommodatam instituat. Hæc verò binis absolvitur indicationibus, quarum prima discussionem humoris stagnantis, & nervos comprimentis; altera affectarum partium roborationem respicit.

## §. II.

*Quomodo  
primò  
indica-  
tiones  
sarcoti-  
cæ sunt  
in gutta  
serena  
sarcoti-  
cæ  
mole-  
stias.*

Ad primum, qui difficillimus est, obtinendum scopum, generosiora, & quæ vocant heroica, in usum vocare juvat remedia. Quodsi igitur serosus humor in cerebro effusus stagnaverit, sicut fieri solet in subjectis pituitosis, cachecticis, cacochymicis, item post remeantia exanthemata, & si affectus recens fuerit: magnum profecto præsidium est in cauterio actuali, syncipiti vel nuchæ inusulo; cui etiam substitui potest setaceum. Duplici hæc remedia operantur ratione, dum videlicet partim excitando dolorem, tremulam quandam & vibratoriam motionem tenuissimis cerebri fibrillis inferunt, partim affluxum humorum, qui plerumque vulnus inhiectum sequitur, proritando, succos stagnantes a cerebro & affecta parte avocant. Et si quid sperandum auxilii; id sane a tali remedio in hoc affectu longe certius, quam a vesicatoriis, vel fonticulis obtinetur.

## §. III.

*In gutta  
serena a  
sanguine  
nisi hæc  
gustatio  
ad.*

Contra, si a sanguinis stagnatione ortum sit malum, uti fit in plethoricis, florida & rubicunda facie, pulsuum magno præditis, & excretionibus sanguinearum retentione laborantibus: cavendum a tali remedio, & a sanguinis potius missione inchoanda medela.

Utilis hoc sine est venæsectio in pede; sed longe utilior incisio venarum frontis aut arteriarum temporalium. Et hoc quidem præsidium ipsa docuisse videtur natura; siquidem exemplis confirmatum habemus, cæcos ex vulnere fronti inflisito, & hinc sequuta larga hæmorrhagia visum recuperasse. Neque alienum est, hirudines temporibus admovere; aut, in defectu fluxus hæmorrhoidalis, easdem ano applicare; aut si suppressa fuerit narium hæmorrhagia, has infruso stylo pertundere; ut cita & efficax fiat sanguinis ventilatio.

## §. IV.

Deinceps ut in omni oculorum valedudine, ita quoque serena gutta maxime juvat, alvum esse fusiozem, quo stagnans in capite humor ad inferiora ducatur. Eo sine adhibenda remedia non decet esse drastica purgantia; sed blanda laxantia roborantibus nupta, qua laude pollent pilulæ balsamico cephalicæ, quarum capite de paralyti exemplum proposuimus. In usum quoque trahi possunt pilulæ nostræ balsamicæ, cum mercurio dulci & extracto panchymagogo Crollii combinatæ: nec contemnendi clysteres, paulo efficaciores; quorum virtus illustris est, si imi ventris stricturæ concurrant.

## §. V.

Quando malum valde est inveteratum, & a lymphæ pertinaci in vasis nervos opticos ingentibus stagnatione sustentatur: præmissis iis, quæ proposuimus, unica spes in validioribus discutientibus, iisque potissimum internis est sita. Quo nomine bina præsertim remedia reliquis palmam præripiunt; quorum unum est sulphur antimonii pro nostra methodo correctum; alterum cinnabaris. Confici ex his potest sequens pulvillus: Recipe cinnabaris nativæ præparatæ, lapidum cancrorum, succini præparati ana drachmas duas, salis volatilis succini, cornu cervi ana grana decem. M. F. pulvis. div. in 12. partes, quarum singulæ

*Lenam  
tum in  
gutta se-  
rena  
us:*

*Curatio  
gutta se-  
rena in  
vetera-  
ta.*

gole tria vel quatuor sulphuris antimonii grana addi possunt. Exhibetur pulvillus talis quavis vespere; hauritur sequenti mane infusum, quod ex herba melissæ, semine sceniculi & radice valerianæ conficitur. Interponi etiam debent laxantia; jungi victus tenuis & exsiccans, & subjungi balsamica. Et si his cedere recuset morbus; confugiendum ad lenem salivationem, cujus ope nonnullos a cœcitate gravi sanatos novi.

§. VI.

Roborantia & discutientia nervina, balsamica. Ex iis illustrem etiam enervantia.

Distis hisce & interponenda & subjungenda sunt externa discutientia, balsamica. Ex iis illustrem etiam enervantia. discutienti facultatem possident sternutatoria; & cumprimis sal volatile ammoniaci siccam, & cum oleo salviz, majoranz, balsamoque Peruviano maritatum, naribusque attractum, vel longe adhuc efficacius extractum ligni Quajaci resinosum, quod ab evaporatione decocti ex hoc ligno remanet & a me inventum est. Cujus unum vel duo grana naribus suscepta vehementer cum sternutamento pituitam ex intimis capitis eliciunt. Imponi etiam oculis potest sacculus ex radice valerianæ, semine sceniculi & floribus rosarum paratus, & aqua sclopetaria, quam l'eau d'arquebuse vocant, irroratus; aut iidem vapor ex recensito §. superiori infuso admitti. Omnium vero vim longissime superat balsamum vitæ nostrum, partim temporibus inunctum, partim aliquot guttulis saccharo exceptum & deglutitum: cujus usu me cœcitatem inter initia non semel discussisse memini.

CAUTELE PRATICÆ.

§. I.

Cautela circa cauteria, setacea & sternutatoria.

**P**riusquam cauteria vel setacea adhibeantur; opus est, ut corpus tam a sanguinis & humorum nimia mole, quam ab eorum impuritate, & primæ viæ ab omni saburra liberentur. Quo scopo præmittendæ sunt sangu-

Tom. IV. Pars IV.

nis missiones, blanda laxantia, & medicamina sanguinem diluentia & depurantia. Eadem esse debet cautio in usu sternutatoriorum, ne scilicet, antequam corpus & caput iusta purgatione levatum sit, adhibeantur; quoniam alias humorum vehementiorum ad caput affluxum causantur. Verum eadem, corpore rite preparato, inter morbi initia desideratissimam ferunt opem.

§. II.

Ex roborantibus discutiente simul virtute præditis balsamum vitæ meum excellenti contra guttam serenam pollet efficacia; cumprimis si ea decubitu serosi humoris ad nervos opticos in subjectis pituitosis ac phlegmaticis originem traxerit; quo in casu novi balsamum illud inter initia capiti frontique cum linteis admotum omnino suffulisse cœcitatem. Eo autem cautius utendum in corporibus sanguine plenis, ubi sanguinis copia & congestio malum induxit; tum enim temperantia potius atque tam molem humorum imminuentia, quam ejus orgasmum componentia sunt proficua.

§. III.

Externorum quod attinet usum; *Circa* nemo non videt, eum in vera & inveterata amaurosi prorsus esse frustraneum; quoniam vi sua ad affectum locum haud pertingunt. Quando autem vitium non in ipso nervo optico, sed potius in oculo, ejusque humoribus vel aliis partibus residet; tum non de nihilo sunt topica; e quibus eminent vel focus ex decocto radice valerianæ, cubebarum, feminisque sceniculi cum aqua & vino parati, per infundibulum oculis admissi; vel epithemata hac ratione conficienda: Recipe radicem angelicæ, imperatoricæ, valerianæ ana uncias binas, herbæ chæresolii, arnicæ, florum sambuci, lavendulæ, rosarum ana pugillos tres, seminis sceniculi, anethi ana drachmam unam cum dimidia. C. C. f. species, E deco-

decoquantur in æquali portione aquæ rosarum & sclopetariz, l'eau d'arquebuse distillæ.

## §. IV.

Cura  
curam  
per  
int  
diam.

Evellendæ, quæ contumax est, cecitati perquam opportuna nonnunquam est curatio, quæ per incediam instituitur. Conducit ea potissimum in corporibus impuris, cacochymicis, sanguineque & succis abundantibus, & requirit prægressam clementem quidem, sed satis efficacem alvi subductionem. Ipsa hæc curatio consistit in eo, ut ægri non nisi modico panis cocti, carnisque assatæ cum passulis vescantur; vinum omnemque cerevisiam fugiant, & decoctum ex sarsaparilla, glyzirrhitza, passulis, semineque feniculi bibant: cui pro corporis ratione per tres & ultra hebdomades insistendum.

## §. V.

Quæ puellis, infantibusque post variolas, morbillos, alioque exanthematicos morbos remanet gutta serena; multam sanationis spem relinquit. Accedentibus enim pubertatis annis menstruumque fluxu aut sponte disparet, aut mirum in modum emendatur; tumque opus est, congruis adminiculis menstruum adjuvare fluxum; qua de re notabile exemplum allegavi SYST. Tom. IV. P. I. Cap. VIII. p. 192.

ENARRATIONES  
MORBORUM.

## OBSERVATIO I.

Gutta  
serena  
incipit.

**V**Ir triginta annorum, sex circiter abhinc annis corpus fortiori labore & exercitio vehementer commotum, subitanè exposuit refrigerationi. Unde dolorem quandam gravitum capitis, & accedente oculi dextri contusione, magnam in ipso visus imbecillitatem, nullo externe adparente vitio, sensit. Variis igitur usus est remediis, vesicatoriis, fonticulis, collyriis atque purgantibus; sed sine ullo effectu. Ante biennium accede-

bat scabies, & posthæc ad sinistram quoque oculum transibat vitium; dum non modo visio valde imbecillis esset, verum etiam scintillule maculæque dicto obversarentur oculo, eideque omnia duplicata adparerent objecta. Præterea aurium gravi tinnitu, stomachi magna debilitate, ructuosis ac flatulentis molestiis, alvi obstructione, doloribusque artuum tractoris vexabatur; vultus lividum præ se ferebat colorem; & vitæ genus sedentarium, multis ingenii laboribus ac scriptationibus implicatum continuare non desinebat.

EPICRISIS CUM  
CONSILIO.

Hic affectus vocari meretur gutta serena incipiens ac incompleta, & sedem habet in nervo optico & cerebro: unde extrinsecus nullum adparet vitium. Natales suos a cacochymica sanguinis & seri impuritate mutuatur: quippe frequens docet experientia, scorbuticos, cacochymicos atque cachecticos oculorum vitia ab interna causa facile incurrere, inque iis malum ab uno ad alterum transire oculum. Cacochymica humorum diathesis in præsentî ægro testantur scabies, prava digestio, flatulentia, artuum dolor, & tinnitus aurium: atque eam cum vitæ genus sedentarium, tum corporis calefacti refrigeratio induxerunt. Hæc etiam visiois imbecillitati prima occasio data est; siquidem inde repressi humores copiosius ad cerebri partem anteriorem decubuerunt, & accedente oculi dextri contusione, ad ejus nervos inde debilitatos pertinaciter secesserunt. Fuisset facilius hanc affectionem adhuc recentem convenienti debellasse medicina; at ea jam inveterata difficilior omnino est negotium. Neque tamen abjiciendum ideo opinor animum, sed eo respiciendum, ut succi reddantur temperati & benigni; ac deinceps partes nervosæ, quæ sunt debilitatæ, corroborentur. Primæ  
intenc.

intentioni faciunt satis lignorum decocta, tinctura antimoniales, pulveres absorbentes & diaphoretici, purgantia ex gummatibus confecta, & vivendi recta ratio. Posteriori scopum explent emplastra ex oleis cephalicis, aromaticis, balsamis liquidis, & gummatibus resinosis, fronti & temporibus adplicata, nec non spiritus vini fortiter camphoratus, & cum essentia balsami Peruviani mixtus, & denique balsamum nostrum vitæ. Quæ per satis longum tempus continuata si votis nondum responderint, nec succi vitales satis edulcorati fuerint: haud alienum erit, blandam movere salivationem, quæ cum cinnabarinis vel æthiopicis minerali perficitur commodissime, quandocunque hic, prius probe perpuratis primis viis per pilulas cephalicas aut aliud. conveniens purgans, ad decem grana cum drachma dimidia sacchari & olei Melissæ Turcicæ guttis duabus per tres & ultra septimanas manere exhibetur & porni decoctum rad. Chinæ cum passulis & cinamomo datur, subijuncta simul diæta & proba vivendi ratione. Novi hac methodo, ob gravem capitis contusionem feliciter restitutos qui in periculo cæcitatæ versabantur; non tamen omisissis externis.

## OBSERVATIO II.

Gutta.  
serena.  
propriam  
temperamentum  
habent.

Puella septem annorum, debilioris naturæ & tenerimæ corporis constitutionis, faciei lividæ & cachecticæ, flavescente sæpius colore tinctæ, incidebat aliquando in febriculam, dorsi capitique dolore, & si corpus erigebat, vertigine stipatam. Tertio ab invasione die, tota cutis punctulis asperis & rubicundis referta cernebatur; quorum ulterior efflorescentia remediis temperantibus, leniterque expellentibus, & temperato regimine adjuvabatur. Neque tamen minus hæ maculæ mox cum sensu horripilationis evanescebant, mox cum magno cotis ardore rursus prorumpentes. Conque-  
rabatur insuper de magno capitis &

oculorum, præsertim circa septimum diem, exacerbato dolore; & quum postea ab hoc convalesceret affectu, subito omni privata visu, nihil prorsus videre valuit. In oculis externe nihil videbatur vitii; nisi quod pupilla paulo amplior & magis dilatata compareret.

## EPICRISIS.

Affectus, qui post se traxit guttam serenam, est purpura; infantibus præsertim, cachecticis, qui ob ventriculi imbecillitatem & bilis inertiam, ingentem feri impuri contrahunt copiam, admodum familiaris. Purpura enim ex sero impuro acri in glandulosis ductulis stagnante, quod febrili commotione ad habitum corporis protruditur, originem trahit: cujus feri copia si iusto major, & natura imbecillis est, seu, quod idem est, si corpus debitis motibus, illud expellendi destitutum fuerit; fit inde, ut partibus etiam solidis a succis vitiosis hinc inde stagnantibus; easque vellicantibus labe affricetur. Quare observamus, tusses diuturnas, phthises, febres lentas, diarrhoeas, capitis dolores, hemicranias &c. illum affectum non modo comitari, sed eundem quoque supervenire. Ex quo facile colligitur, delapsam in nostro casu ad caput, & præsertim nervos opticos serum guttam induxisse serenam. Cujus curatio in eo potissimum consistit, ut corpus a colluvie serosorum ac purpure infectorum succorum liberetur, eorumque moles a capite derivetur. Quo scopo præter interna sanguinem mundificantia, decocta diluentia, diaphoretica & laxantia, mira virtus in velicatoriis reposita est, dummodo tempestive adhibeantur: quæ revocando ad cutaneum corticem serum acre, illud capiti subtrahunt. Præterea, eo est annitendum, ut per balsamica ac temperata stomachica, ventriculo robur ac virtus digestiva restituatur; & sic generosus chylus, laudabilisque succi generentur.

## OBSERVATIO III.

*Gutta  
serena  
in sup-  
pura-  
ta, su-  
doribus  
& mala*

Puella novem annorum, catharralibus defluxionibus, achoribus, tumoribusque glandularum colli per totam vexata vitam, naribus aliquando præter morem fœcis existentibus, corripitur vertigine, & doloribus dorsiac hypochondriorum tantis, ut accedente vomitu & cephalalgia, lectum petere cogeretur. Post aliquot dies melius paullisper habens, liberò se rursus exponit aeri, qui tum erat gelidissimus: sed redux, gravi vertigine, tumore vultus, febricula & purpura, mox iterum retrocedente afficitur. Haud multo post, gravi mentis commotione agitata, incidit in affectum epilepticum; sub quo dentes valide commordebant, oculi rigebant hiantes, sensus omnes erant aboliti, & pulsus ferebatur vehemens & inæqualis. Elapsa hora ab hoc paroxysmo ad se rediens, prorsus cæca erat, & inter vehementes capitis dolores, multum biliosæ faburræ vomitu reddebant. Insulo clysmate, atque datis remediis antispasmodicis, præcipitantibus, ac diæpoicis remittebant & vomitus & dolores capitis: sed cæcitas eadem persistebat per quatuor dies, quorum singulo supra citatus paroxysmus epilepticus revertebatur. Quum urgerent insuper continuæ vigilæ, & dolores vehementer recrudescentes, dabantur vesperi aliquot grana pilularum de cynoglossa: unde nox quietior sequuta; & quum altero mane ex insulo theiformi olei Cajaputi tantillum fumeret, largo per totum corpus perfundebatur sudore, & cum hoc subito recuperabat visum. Sed elapsa hora, & redeunte cephalalgia, cæcitas plenaria recurrebat; & altero demum die, remittentibus cunctis doloribus & spasmis, iterum redibat, cum tam felici successu, ut ægra post sedecim dies inter continuos sudores, & visionem & sanitatem perfectam recuperaret.

## EPICRISIS.

Quanta serum acre, quod sub exanthematibus purpuraceis ad corporis peripheriam protruditur, intra corpus retentum, machinari valeat mala: præfens quoque testatur morbi historia. Sæpius fit, ut illud per aliquod tempus in corpore delitescens quiescat, & non nisi accedente quadam occasionali causa, suam exercere incipiat tyrannidem. Talis causa in nostro casu duplex fuit, nimirum refrigeratio, & mentis commotio: qua utraque gravis spasmi nervoso generi inductus, & hoc cutaneum corticem afficiente, humores noxii majori copia ad interiora, & caput potissimum compulsi fuerunt.

2.) Meretur itaque, quæ hic occurrit cæcitas vocari spasmodica; eo quod a spasmo externarum & infernarum partium, humores sursum commoti strictura fortiori & cerebri membranas, unde epilepsia nata, non minus ac oculorum: membranas nerveas adfecerint. Hinc factum est, ut, postquam larga accesserat sudatio, inde serum acre evacuatum, spasmi relaxati & ideo cuncta mala depulsa fuerint.

## OBSERVATIO IV.

Infans trimulus, cum vix anni quadrantem attigisset, variolis erat correptus; quæ non legitimam supurationem passæ, nec rite efflorescentes, tertio post die rursus evanuerunt. Abhinc vacillante sanitate sæpius adfixerunt catharrales molestiæ; & ante annum tempus abdominis quædam accessit durities. Contra hanc præter alia medicamina datum fuit vomitorium, idque intra unam hebdomadam bis repetitum: unde spontanei vomitus, & alvi fluxus exceperunt, perque decem inhæserunt dies.

Tum

*Gutta  
serena  
in sub-  
stanti-  
bus vari-  
olis.*



Tum conqueſcentibus his excretionibus, abdomen quoque detumuit; ſed virium ſummus languor ſucceſſit, & non obſtante cum appetitu, tum ſomno integro diu continuavit. Noſſiſſime plenaria viſus abolitio, oculis illaſis exiſtentibus, ſupervenit; corpus, licet ſatis muſculoſum, adeo tamen debile ac languidum eſt, ut ſi ex lecto attollatur, artus quaſi collabi videantur; ſiniſtrum brachium frequens tremor occupat; caput eſt tumidum, & loquelæ ſumma difficultas. Alvus ſatis libera, & adpetitus integer eſt; ſed nares perpetuo ſiccæ, & crebri urgent ſudores.

### EPICRISIS CUM CONSILIO.

Adfectionum, quæ in præſenti caſu variolaſ ſubſiſtentes exceperunt, cauſa eſt plethora ſeroſa; ſive ſeri atque lymphæ ſpiſſæ ac impuræ magna per totum corpus abundantia; quæ plerique infantum familiaris eſſe ſolet. Hinc catharrales aurium, narium, oculorum, capitis &c. deſuxiones in nulla ætate magis frequentes deprehendimus, quam infantili & puerili. In noſtro quidem ægrotante variolarum ſubſiſtentia primam conſequentibus malis dedit occaſionem: excrementitii enim humores, qui per hoc exanthematis genus alias excerni ſolent, puſtulis ob nativam forte generis nervoſi debilitatem non rite extruſis intra corpus retenti, inquinaverunt ſeroſum & lymphaticum laticem. Unde originem traxerunt catharrales affectus, abdominis durities, & facta materiæ ſeroſæ ad cerebrum & medullam ſpinalem meſtaſi, variarum partium reſolutiones paralyticæ, ut oculorum, linguæ nervorumque ad brachia & pedes tendentium.

2.) Curatio tanti mali ſolis ſermè internis perficienda eſt remediis, & quidem talibus, quæ viſciditatem lymphæ reſolvendi, ejuſque nimiam molem conſumendi facultate pollent.

Tom. IV. Pars IV.

Conſultum igitur duco, ut ſequenti procedatur ratione: Purgato per pulverem Cornachini corpore, omni mane ſumatur pulvis ex cinnabaris optime præparatæ granis quinque, lapidum cancerorum granis octo, & mercurii dulcis grano dimidio conſectus; quo per ſex dies uſurpato, interponatur iterum laxans; tumque per ſex rursus dies ſumto pulvere, repetatur laxans. Sub hac cura propotu inferviat decoctum, quod ex radicis ſarſaparillæ unciiſ tribus, corticis ligni ſaſſafræ drachmiſ tribus, ſalis tartari drachma dimidia, cum duodecim aquæ puræ libris in vaſe clauſo coctiſ paratur; idque etiam loco potus Theæ calidum bibatur: non minus victus ſit attenuans, ut non niſi carnes aſſatæ, & panis ſimilagineus modica tamen quantitate adhibeantur. Deinceps per octo circiter dies corpus omni mane immittatur balneo, quod ex aqua ſimplici, furfuribus triticeis, & cineribus clavellatiſ conſicitur; & poſt illud nucha, & os ſacrum linimento nervino inungatur. Interne continetur dicti uſus decocti, & ſub epuliſ ad firmandum ſtomachum propinetur Elixirium ex eſſentiæ pimpinellæ albæ, gentianæ rubræ ana uncia dimidia, ſpiritus nitri dulciſ drachmiſ duabus, & olei maciſ, de Cedro ac cinnamomi ana guttiſ ſex conſectum: externe vero naribus admoveatur ſal volatile ſaliſ ammoniaci ſiccum, cum oleo majoranæ vero imprægnatum. Ex qua curatione non dubito, quin auſpicatus ſit conſequuturus eventus.

### OBSERVATIO V.

Duodecim annorum puer, antea aliquot jam annos catharris, coryzæ, tuſſi, obnoxioſ, ingruente tempeſtate valde humida & aquilonia corripitur iterum catharrali febre; quam nono die acerbis capitiſ & oculorum dolor excipiebat, & tandem plenaria ſequebatur cæcitas. In oculiſ niſil adparebat

E 3 viti,

Gutta  
serena  
spontanea

vitiis, nisi quod pupilla adhuc se contrahebat, & puer lucem a tenebris distinguere poterat: ceterum vero & adpetere bene & egere bene rite. Postquam igitur per integrum semestrem, frustra usurpatis varii generis medicamentis, hoc affectu laboravit, & nostræ curæ traditus fuit; nihil adhibuimus, quam pilulas nostras balsamicas, quavis semel hebdomade adsumendas, & externe linteum balsamo vitæ nostro madidum bis de die fronti & temporibus applicari curavimus: unde, favente divina gratia factum est, ut intra paucas hebdomades omnem recuperaverit visum.

### EPICRISIS.

Præfens serena gutta videtur tantum esse spuria, quæ a defluxione ferri, partes nervosæ visui dicatas obli-  
dente proficiscitur. Nervus enim opticus, quatenus intra cerebrum continetur, in tali casu ab omni fere liber est læsione; & adducit adhuc fluidum tenuissimum ad partes oculi nervosæ: quæ tamen a serosa colluvie hinc inde compressæ, ad recipiendos solis omnes radios, & efformandam perfectam visionem haud idoneæ sunt. Et hinc observamus frequenter, quod infantes ac pueri nimium pituitosi & catarrhalibus affectibus divexati, ejusmodi imminutiones & visus & auditus patiantur. Quo in casu solemus quidem remediis anticatarrhalibus uti; sed cum hæc in præfenti puero sufficienter fuerint usurpata, nihil restitit, quam ut roborante ac nervino remedio, quale est nostrum vitæ balsamum flagnantes succi discuterentur, & infirmæ roborarentur partes.

## CAPUT V.

### DE VISUS IMBECILLITATE EX LIPPITUDINE ET SUFFUSIONE.

#### THESES PATHOLOGICÆ.

##### §. I.

**I**nter morbos oculorum, qui ex nervosarum partium atonia nascuntur, præcipuos, lippitudo, quam Græci *μωωπη* vocant, primas tenere videtur. Est hæc salsa & acris laticis cum pruritu, dolore & rubore ex oculis fluxio, cum hebetudine eorum juncta.

##### §. II.

Levius hoc malum existit, si in oculi bulbo nullum quidem comparatur vitium, palpebræ tamen tument & rubent, fluxio lentescit inque lemas densatur, quibus palpebræ subinde noctu conglutinantur & si hoc ipsum diutius durat.

##### §. III.

Differt hic affectus a fugillatione, in qua oculi album, quandoque totum, per omnem sui ambitum, quandoque etiam ultra hunc & iridis circumlumen, rubrum apparet & omnia quæ adspiciuntur rubra videntur. Fit plerumque a causa externa, ut contusione, & a stagnatione in minimis vasculis sanguinis, epiphora vero a lymphæ stagnantis effusione. Differt quoque ab inflammatione oculorum, sive ophthalmia, in qua major dolor & ardor & ingens ad lucis accessum exacerbatio cum febricula & metu suppurationis observatur; nec minus distat in eo, quod epiphora diutius duret, ophthalmia celerius dissipetur.

##### §. IV.

Solenne hoc malum est infantibus & pueris, si caput auræ frigidæ exponunt, vel catarrhis, vel capitis tinea laborant,   
runt,

runt, præpostere ea sanata. Invadit dein maxime eos, qui tumoribus glandularum in collo, vel circa aures afficiuntur, neque prius discedit, quam sublato tumore & reddito liberiori lymphæ per glandulas transitu. Frequens etiam lippitudinis genesis post variolas & morbillos, quod in his ob æstum & ebullitionem succi temperatam diathesin exeunt & impuram, viscidam ac falsam contrahunt, quæ nisi morbo superato per convenientia depurantia corrigatur, non modo lippitudinem sed & alios diu durantes morbos post se trahit.

## §. V.

*Ad tempus quibus lippitudo vadit.* Datur præterea lippitudo, quæ epidemice infestat & infuetas ac inordinatas temporum anni constitutiones sequitur, maxime vernali & autumnali tempore, & atmospheræ, exhalationibus subtilis acrimoniæ refertæ vitio debetur, quo tempore etiam ex eodem fonte prodeuntes morbi, ut rheumatismi, gravedines, impetigines ac vitiliginis, pustulæque in cute ulcerosæ regnare solent. Cirea solstitium æstivum ego quoque sæpius idem malum ortum observavi.

## §. VI.

*Sedes.* Ipsa sedes mali potissimum est in glandulis, quarum varix sunt in ocululo. Maxima harum lacrimalis dicta *anatomia ex dem.* in orbita supra angulum minorem collocata est, & manifestum primum faciente STENONE, ex sex septemve ductulis, inter palpebrarum membranas decurrentibus & non longe a ciliis totidem distinctis oculis hiantibus, serum lacrimale falsum fundit, quod a punctis lacrimalibus absorbetur & per peculiarem ductum ad nares fertur. Dein in cantho oculi majori plures acini glandulosi consistunt, qui glandulis sebaceis accensentur & serum lentescens plorant. Sub palpebris etiam delitescunt glandulæ, ab inventore Meibomianæ vocatæ, & a MORGAGNI in sebacearum numerum relatæ, quæ juxta dorsum palpebræ elegantiori ordine positæ, ad limbum hujus oscu-

lis hiant, e quibus stillare videtur illa, quæ in oculorum morbis palpebras conglutinat materia.

## §. VII.

Jam, quandocunque excretoria hæc glandularum, ex nervis & fibrosis tunicis conflata organa, a sero subtili acri, vel etiam ab acribus effluviis arroduntur, nervæ glandularum membranulæ crispantur & spasmodice contrahuntur, ut sanguinis per arteriolas advecti refluxus, ob venas contractas, minus libere fieri possit, sed tubuli glandulosi asecedente sub mora hac ferro, plus justo ampliuntur, & hac ratione ingens fiat feri falsi lacrimalis effusio.

## §. VIII.

Ruborem & dolorem jungi, acrimoniæ humoris effluentis tribuendum, cui sæpe tanta salis acris copia, instar ammoniaci, præsertim in scorbuticis inest, ut ex drachma una feri in lippitudine effusi, grana duo salis muriatici acerrimi, leni tantum evaporatione, obtinuerim, quod tamen ratione odoris & saporis multum differt a sale illo, quod post urinæ exhalationem restat, luculento indicio, peculiarem plane & mechanicam esse glandularum & oculi tubulorum excretoriorum structuram, ut serum falsum sine contagio sulphuris fœtidi, ut in urina & sudore sit, admittat.

## §. IX.

Quasdam notas, ex quibus quid eveniturum sit colligere possumus, quam optime tradidit CELSUS *Libr. VI. cap. VI. Si simul & lacrima & tumor & crassa pituita cæperint, si caputita lacrima missa est, neque lacrima calida est, pituita vero alba & mollis, tumor non durus, longe valetudinis ætas non est. At si lacrima multa & calida, pituita tantum, tumor modicus, idque in uno oculo est; longum id sed sine periculo, futurum est. Idque lippitudinis genus minime cum dolore est; sed vix ante vigesimum diem tollitur, nonnunquam per duos menses durat, quandoque brevius fini-*

*tur. Tumor magnus si sine dolore est, & siccus, sine ullo periculo est: si siccus quidem, sed cum dolore est, fere exulecerat; & nonnunquam ex eo casu fit, ut palpebra cum oculo glutinetur. Eiusdem exulcerationis timor in palpebris pupillæ est; ubi, super magnum dolorem, lacrima salsa calidaque eunt; aut etiam si, tumore jam finito, diu lacrima cum pituita profluit. Pejor etiamnum est, ubi pituita pallida aut livida est, lacrima calida aut multa profluit, caput calet, a temporibus ad oculos dolor pervenit, nocturna vigilia urget. Est etiam genus arida lippitudinis, quod ὀφθαλμία Græci appellant. Sub hoc neque tumens, neque fluens oculi, sed rubens tantum & cum dolore quodam fere levi ac prurigine graves sunt, & palpebra extra duritiem ullam noctu prægavi pituita in hærescunt, quantoque minor generi huic impetus, tanto finis minus expeditior est.*

## §. X.

*Ad eas, quæ visum lædunt, affectionum species, referri quoque debet suffusio, quæ vulgo pro cataracta incipiente vel spuria habetur. Hac qui laborant de simulacris vagarum rerum, de nigris punctis, muscis oculis observantibus, vel, quod pejor est, de nebula, de araneorum telis, de tenebriori rete, quibus oculi tecti sunt, conqueruntur.*

## §. XI.

*Fit hoc vitium, ubi aqueus pellucidus humor ab admixtis corpusculis & moleculis opacis, propter nimis dilatata vasculorum adducentium oscula, pelluciditatem ex parte amittit atque varix & obscuræ, præsertim in chartis & parietibus candidis visui imagines sistuntur, adeo ut quo major sit hujus humoris opacitas, eo major obfectorum obscuratio.*

## §. XII.

*Ut horum vitiorum ratio & natura eo liquidius appareat, repetendum ex physiologicis est, tres in oculo humores numerari, aqueum, vitreum &*

*crystallinum. Aqueus dicitur, qui utramque oculi cameram, tam anteriorem, quæ inter corneam & uveam, quam posteriorem inter uveam & lentem crystallinam, replet, quantitate est exiguus, sed admodum fluidus: hic subiecto blando igne sine spuma leniter exhalat, relictis valde exiguis & pellucidis moleculis salis. Vitreus aqueo densior est, posteriorem oculi partem retinæ ubique contiguus occupat: hic mole longe major priori cochleari argenteo inditus, supposita candelæ flamma, protinus in aquam limpidam liquatur & totus sine ebullitione in halitus solvitur, relicta identidem massa spissa, exigua valde, salis saporis. Prunis ardentibus injectus hic humor non ut aliæ ex animantibus partes fœtidum exhalat odorem. Crystallinus reliquis solidior, eodem modo tractatus in liquamen non convertitur & igni injectus flammam concipit & graveolentem spargit odorem. Deinde vitreus & aqueus nec a rectificatissimo vini spiritu neque a spiritu vitrioli mutatur aut coagulatur; crystallinus vero inde turbidus fit & pelluciditatem amittit.*

## §. XIII.

*Ex his euriosis a me institutis experimentis clare apparet, vitreum & aqueum parum inter se ratione indolis & mixtionis differre; crystallinum autem, qui exsiccat in meras lamellas discindi potest, ex partibus longe solidioribus & salino quoque sulphureis esse constatum; aliam quoque esse originem humoris aquei & vitrei, quam crystallini. Ille enim ex tenuissimis arteriolarum & vasculorum lymphaticorum oculis in uvea & choroidea tunica gignitur, vitreus vero ex tenerrima lymphâ, quam vehunt vascula arachnoidea, venit ac nutritur: Crystallinus in ipso utero producitur, suum augmentum & conservationem a vasculis in tenuissima arachnoidea & propria membranula existentibus & tenuissimam lympham plorantibus nasciscitur. Neque dubium videtur, quin purif-*

*Cois-  
flatio  
expres-  
sionem.*

*Orbitæ  
anatomica  
experi-  
mentis  
probatur.*

purissima, quæ nutrit oculos eorumque humores, lymphæ circulari motu per adducentia & abducentia vasa feratur.

§. XIV.

*Ratio* Hisce cognitis liquet, originem suffu-  
*impul-* fusionis in lymphæ ocularis vitio posi-  
*tar, quo-* tam esse: Nam quum hic humor valde  
*modo* diaphanus, purissimæ & homogene-  
*humores* næ naturæ esse debeat, adeo ut cum  
*poten-* liquido tenuissimo, quod nervi ve-  
*tes suffu-* hunt, pene similem naturam habere  
*suffusio-* videatur, qualis non modo nutriendis  
*nis* oculorum humoribus, sed & eorum  
*sanis* membranis roborandis intersiat, sit  
omnino, ut, quando ipse per morbo-  
sam diathesin, crassus, impurus ab  
heterogeneis & opacis terrestribus par-  
ticularis redditus per oscula vasorum ad-  
modum dilatata & diducta ad interiora  
oculi transfertur, humores turbidis  
evadant & naturalem pelluciditatem  
suam amittant.

§. XV.

*Subiecta* Ex hisce jam facile colligere licet,  
quare omnes illi, qui ob lymphæ spi-  
rituosæ subtilis in sanguine defectum,  
imbecillarum virum sunt, ut senes,  
vel diuturno morbo afflicti, aut qui  
nimium sanguinis profuderunt, vel  
diuturna mœstitia, anxiiis curis, assidu-  
is vigiliis macerantur, vel etiam in  
tempestiva & nimia venere usi sunt,  
tanti prompte & facile in suffusionem &  
visus hebetudinem atque caliginem in-  
cidant. Neque minus hypochondriacos  
vitæ addictos sedentariæ, qui pi-  
gra alvo atque ventriculi inflatione la-  
borant, item cachecticos, quorum  
corpus multis impuris fucis abundat,  
maxime, quando purgantibus, sudori-  
feris aut balnei calidi improvide admis-  
si vehementia humores in motum acti  
ad caput pelluntur, hisce vitiiis subje-  
ctus fuisse non semel sed frequentius  
observavimus. Atque etiam, si ple-  
niora nimium urget, in iis, qui con-  
suetas sanguinis per scarificationem,  
per sectionem venæ neglexerunt, vel  
qui solennes & criticas salutares per  
uterum, per anum fluxiones, non  
amplius, aut deficientes experiuntur,

eiusmodi oculorum, de quibus nunc  
agimus, vitia, crebrius observantur:  
nam ex nimia sanguinis & humorum  
abundantia protinus eorum spissitudo  
atque impuritas suboriri incipit, qua-  
tenus, ob tardiorum progressum, nec  
satis fluidi redduntur, neque ab hetero-  
geneis & excrementitiis partibus depu-  
rantur.

§. XVI.

Memoratu præterea dignum est, hanc  
visus imminuti speciem, quæ *habet*  
omnia per nebulam cernuntur, statas  
suas habere periodos, ita ut pluries ob-  
servare licuerit, certis tantum tempo-  
ribus illam infestasse, postea vero  
sponte remississe atque ex toto commo-  
dis remediis fuisse sublata. *periodos*  
TIMÆUS a GULDENKLEE *Lib. I. cap. XXVII.*  
casum communicat matronæ, gravi  
febre semitertiana laborantis, quæ in-  
gravescente paroxysmo de oculorum  
caligine & obversantibus ante oculos  
corpusculis conquerebatur, remitten-  
te vero febre cessasse hæc omnia, &  
illa ipsa retrocedente, tanquam sym-  
ptoma iterum accessisse memorat. Nos  
recordamur quoque, maculas & alia  
quæ visui obijciuntur, crescente luna  
incrementum, decresciente vero de-  
crementum cepisse, & mense Martio  
potissimum hoc malum infestasse. Ex  
quibus signis simul dignoscitur disse-  
rentia, qua suffusio maxime sese di-  
stinguit a cataracta vera. Hæc enim  
non tam facile ratione temporis aut  
magnitudinis variat, sed pertinacius  
insistit, & sit præcipue, quando irre-  
gulares opacæ atomi congregiuntur &  
tunicam quasi solidam constituunt; aut  
ut rectius quidem cum recentioribus  
existimatur, si tunica crystalloides pri-  
mum densa sit & opaca, postea vero  
totum corpus crystallinum multis la-  
mellis per naturam suam instructum,  
aridum, exsuccum & opacum evadit.

§. XVII.

Oculorum vitia id habent cum mor-  
bis nervorum commune, ut, quo diu-  
tius inhzrescant, eo difficiliorem san-  
nationem recipiant & levissimis ex  
causis revertantur, interdum quoque  
*Prognosis*  
*fit.*

in-graviorem morbum transmutentur, idque non sine ratione : nam solidorum textura, structura & robur longo tempore ita invertitur & destruitur, ut tardo admodum modo ac gradu curatio contingat. Atque hoc est, quod vulgo consuetudinem & habitum habere dicitur.

### CURATIO CUM CAUTELIS.

#### §. I.

*Interna remedia  
externis  
anteponenda,  
adjuvata  
dieta.*

**R**ESTA lippitudinem sanandi ratio, utriusque potissimum in edulcoratione feri falsi ejusdemque derivatione ab oculo ad alia loca & in glandularum nimis remissarum robore restituendo, consistet. Nos quidem pro certo affirmamus, incipiens malum solo potu copioso infusi Theiformis, ex herba Veronicæ & semine scæniculi, ad aliquot libras, cum regimine diaphoretico per aliquot dies sumti, brevi & expedita curatione fuisse expugnatum. Econtrario, certum pariter, illud difficulter admodum sanationem recipere, si a diathesi humorum scorbutica invalescente fuerit enatum, nec cedere, nisi accedat prudenter instituta cura lactis, vel vaccini, cum aqua Selterana nupti, vel etiam feri lactis dulcis nostra methodo parati, nec non fontis medicati mineralis & martialis, interpositis idoneis laxantibus & diaphoretico-temperantibus pulveribus. Frustra enim omnis medicatio per alia remediorum genera, præsertim externa, tentatur, nisi interna hæc prius fuerint usurpata. Opus tamen etiam est, ut exacta victus & vitæ ratio accedat, vitando salia, acida & acria, nec non frigus, & abstinendo a vino & spirituosius, immo cerevisiæ potu, & sumto ordinarii potus loco decocto ex rasura cornu cervi, radice scorzonæræ & semine scæniculi, usurpatis simul crebrius vesperi ante decubitus pediluvii ex aqua dulci.

#### §. II.

Externa, ut in aliis oculorum passionibus, sic & in hoc vitio circumspicienda adhibenda. Hæc inter tamen non sine fructu frequentius usus sum unguento, ex butyro insulso, saccharo Saturni & vitriolo albo debita proportionem composito, quod ad magnitudinem piscis cantho oculi majori inditum, efficaciter, si prius internis rite fuerit prospectum, huic malo medetur, discutiente simulque roborante qua gaudet virtute. Serio itaque monendi sunt ii, qui perperam omnino & ophthalmiam & epiphoram nimis refrigerantibus, adstringentibus vel acerbis collyriis & unguentis excipere solent; quibus rebus, præsertim ubi rubor & dolor oculum tenet, vix quidquam datur perniciosius. His enim oculi talem, corrugationem, suffusionem, nec non epiphoram chronicam, rubentem, siccam & asperam fuisse indoctam, quin palpebrarum exulcerationem concitaram experientia abunde satis docet. Si etiam sicca plane epiphora existit, abstinendum ab externis exsiccantibus, multo magis acerbis, & oculus potius cataplasmate ex mica panis tritici, lacte & croco tepide fovendus est.

#### §. III.

Quibus setaceis, fonticulis & vesicatoriis tribuendum, in pertinacibus ejusmodi oculorum vitiis mitigandis loquuntur observationes Medicorum, & encomia de iis passim. Nos tamen molestis his & incertæ efficaciz auxiliis medentes melius posse superledere censemus, si tantummodo ex inventionem mea vesicatorium ex uncia una Emplastri de melioro & pulveris cantharidum drachma una paratum, grossi magnitudine, nuchæ applicent, idque quotidie recens imponendo, ex eadem leniter cutem & apertam per aliquot menses jubeant. Tum enim mira feri impuri effluit copia, & non tantum hi, sed alii etiam capitis morbi, exinde levantur egregie.

#### §. IV.

§. IV.

*Suffusio-  
nis san-  
guinis per  
v. s. &  
lentius  
evacuanda  
est.* In suffusione sic dicta spuria curanda, quum ipsa ab impuris ac crassioribus in oculorum humores, propter autem sanguinis & humorum versus superiora impetum, delatis moleculis proveniat, multum omnino auxilii situm est in venæ sectione vel cucurbitulis nuchæ applicatis, hac tamen observata cautela, ut, si fluxus hæmorrhoidalis aut mensium irregularis vel suppressus huic malo causam præbet, sanguis in pede mittatur, vel prius in superioribus & dein in inferioribus locis vena tundatur; ceterum vero semper sanguinem in loco propinquiori de trahere & re erit. Post hæc haud minoris usus sunt leniter ex rhabarbato & foliis sennæ evacuantia, aut nostra vel alia methodo confectæ pilulæ balsamicæ. Nobis in memoria sunt exempla, ubi ejusmodi visus obscuraciones per intervalla remittentes & redeuntes cum adpectu humorum in oculo turbidorum divina adjuvante gratia feliciter expugnâvimus. Quodli enim humorum incurfus ac impetus a capite & oculis ad alia loca divertitur & humores crassi, impuri per convenientia remedia educuntur, sit omnino, ut per abducentia vascula, quæ HOVIUS nervoso-lymphatica vocat, impuri succi absorbeantur & per adducentia puri advehantur, atque hac ratione pristina humoribus claritas reddatur.

§. V.

*Per an-  
teptia.* At vero ut supra dictum est, ingenti virium jacturæ, vel defectui laudabilis lymphæ ad humores oculorum nutriendos necessariæ, origo plerumque hujus mali debetur. In ejusmodi vero casu analeptica & conveniens vietus ratio, fugiendo omnia quæ prava & spissa ingignunt succos, plus valent & præstant, quam ingens collyriorum vel aliorum medicamentorum apparatus.

ENARRATIONES  
MORBORUM.

OBSERVATIO I.

*Visus  
immensus  
est per  
lippitiam  
diagnos-  
tam per  
calycule  
& supra-  
cili af-  
fectibus  
complicata.* Ir quidam septuagenarius, robustus & nunquam non sanæ constitutionis, media hyeme dum mane lecto surgit, de insolita virium prostratione conqueritur; quam sensuum abolitio, ambulandi impotentia, & continuus mox expositus sopor. Vocatus medicus impositis brachio vesicatoriis, & ordinatis externis spiritibus ac linimentis effecit quidem, ut discusso sopore æger haberet melius, præsertim, quum subinde vena in pede tunderetur, & fonticulus brachio infingeretur. Verum enim vero, graves adhuc morbi supersunt reliquæ, quarum hæc potissimæ observantur: Visus tam imbecillis est, ut litteras cognoscere nequeat; oculi perpetuas fundunt lacrymas, & dexter imprimis noctu adeo conglutinat, ut mane vix aperiri queat. Præterea dextrum brachium spuria paralyti resolutum; siquidem manu nec arripere, nec tenere quid valet.

EPICRISIS CUM  
CONSILIO.

Nullæ equidem manifestæ hoc in casu occurrere videntur causæ, quæ recensita mala generare potuissent: at qui ad ætatem ægrotantis, & tempus, quo ægrotare cœpit, respexerit, illius morbi sufficientem inveniet rationem. Senes enim licet ilibata gaudeant sanitate, per naturæ tamen necessitatem corpus debile tandem nanciscuntur, indeque notabilem ad morbos acquirunt proclivitatem. Cui cum accedat aeris frigida & hyemalis constitutio, quæ morbis paralyticis ac soporosis præ aliis favet; ex facili potest fieri, ut ejusmodi affectibus præter spem & opinionem corripiantur. Quo magis autem his in subjectis causæ morborum sunt

sunt intrinsecæ ac velut naturales: eo difficilior est curatio. Validiora enim & generosa cuncta exulare oportet remedia; & non nisi ea conducunt, quæ roborante ac nervina virtute debilitatis succurrunt partibus. In præsentī ergo casu præter blanda laxantia, & Elixir nervinum, præscripti balsamum vitæ meum, idque & externo, nucham & tempora inungendi, & interno usui, mane aliquot guttas ex infuso melissæ capiendi, commendavi; atque hoc præstantissimo remedio per mensem & ultra usurpato, adfectus hic evanuit & vires egregias senex recipere cœpit.

## OBSERVATIO II.

Visus  
obnubi-  
ditio p-  
etudica.

Serenissimus princeps, annorum sexaginta, robusti & bene valentis corporis, per viginti & ultra annos, mente Jumī, singulis fere annis, gravi & acri oculorum fluxione cum rubore, dolore & visus obnubilatione ad sex interdum septimanas moleste perseverante torquebatur. Postea sponte cessavit malum. Ad avertendam hanc molestissimam passionem claros & peritos consuluit medicos, qui multiplici medicatione usi sunt, quæ in sanguinis detractione per venæ sectionem in brachio, in fronte, per hirudinum applicationem circa aures, & scarificationem in nucha & dorso consistebat. Apposita quoque sunt vesicatoria & setacea nuchæ, sed omnia irritō plane effectu. Nam appropinquante solstitio æstivo protinus malum celerissime oculos occupabat. Narravit mihi serenissimus hunc casum, eodemque malo denuo affectus consilium a me petiit. Quæsi vi ex eo, an nunquam ulus fuerit pediluvius; id quod vero factum esse negabat, præsertim quum non perspicere possit, quomodo læsis oculis succurrere valeant. Ego vero in multis & permagnis oculorum vitiis mirabilem me adnotasse eorum effectum affirmavi, & ut eorum usum admitteret maximopere suasi. Annuebat com-

plio, & postquam modum præparandi & applicandi illum qui ab ejus servitio erat, edocui, bis de die mane & ante cubitum illis usus, intra trium dierum intervallum tam præsens & efficacax levamen expertus est, ut oculis claritas, mox evanescentibus dictis incommodis, restituta fuerit. Quem auspaticissimum effectum mihi nunciavit lætissimus.

## EPICRISIS.

Ad illustrationem hujus casus adhuc pertinet, Personam hancce Serenissimam mane a multis retro annis nudis pedibus, nec tecto satis abdomine per aliquot horas sub dio ambulasse; idque maxime æstivo tempore. Ex quo jam facile rationem adparere existimo, quare hic affectus quam maxime circa tempus solstitiale afflixit, sub quo ingens æstus auctiori intestina agitatione humoribus particulas salino sulphureas acres ingignit, quarum exitus per infimas & extremas partes frigore præclusus ejusmodi metastasin ab exterioribus restrictis ad caput & oculos, jam ad receptivitatem promptè dispositos, producit. Cum vero pediluvia opportune adhibita insignem transpirationem, quin etiam interdum sudorem movendi vi polleant, ex eo jam utilissimus eorum effectus patet luculentissime. Cordatum itaque meum fuit consilium, ut in posterum Sereniss. a prava illa consuetudine se retraheret & matutinum frigus æstivo tempore quam sollicitè caveret. Quo effectum est, ut sequenti anno ab hoc malo plane liber evaderet.

## OBSERVATIO III.

Puer annorum decem, succi plenus, præcocis ingenii, sub primis statim ætatis annis varia in capite exanthemata patiebatur; siquidem & crusta lactea & postea tineæ capitis illud occupabant diuque affigebant. Sequēbatur dein tam acerba cum dolore ex oculis

*Epiphora summa, et glaucoma, in collo sustenta.*



oculis fluxio eorumque noctu conglutinationo, ut lucem adipicere propter doloris augmentum non valuerit, quare in loco tenebricoso semper se continere tenebatur. Tanta erat huius affectus contumacia, ut nullis a celeberrimis etiam Medicis præscriptis internis & externis remediis eederet, bonæ indolis puerum per integrum annum & ultra affligens. Quum parentes optimi etiam meam requirerent opem, curatori instituto examine, glandulas colli tumentes deprehendi & crebris ventris torminibus cum alvo adstrictiori puerum tentari ipsumque abineunte ætate dulcibus delectatum audivi. Hæc cognitis, quæ sequuntur remedia præscripsi. Primo ad alvum laxiorem reddendam rhabarbarinas passulas bis in hebdomade ante prandium sumendas suasi. Loco cerevisiæ decoctum radieis chinæ & altheæ, cichorei, glycyrrhizæ ex aqua bibendum præcepi, interposito pulverum absorbentium cum pauxillo cinnabaris usu. Ad discutiendos glandularum tumores emplastrum manus Dei, quod describitur in pharmacopea Domini Charitas, cum unguento dialtheæ permixtum applicatum fuit. Ultimum denique & præstantissimum remedium præbuit temperatum nostrum emplastrum vesicatorium, quod nuchæ applicatum, sine ullo dolore vitiosum serum in magna copia eliciendo, intra mensis spatium tam exoptatum præstitit effectum, ut ex toto hic pertimæ affectus, oculis claris redditus, superatus fuerit.

### EPICRISIS.

Retulit mihi pater, Vir litteratus, temperamenti pure sanguinei, sese in pueritia iisdem capitis vitis & oculorum passionibus diu fuisse obnoxium, quæ, frustra omni curatione adhibita, superveniente demum narium hæmorrhagia cessassent. Ex succorum in infantibus & pueris abundantia, præsertim si nimium voraces sunt & fructibus

vescuntur multifariis, ejusmodi capitis & oculorum vitia progigni, experientia satis confirmat. Sed frustra omnis generis remedia, inprimis externa adhibentur, nisi temperantia in victu tenni, potusque præcipue dilutus & alvi laxitas accedat, qua tumores glandularum in collo, qui sovent & sustinent ob vitium stagnantis lymphæ oculorum passiones, commode resolvuntur. Ex omnibus vero optime proficiunt, quæ vitiosam lympham a parte affecta ad alia loca derivant & evehunt. Quem in finem usi sumus emplastro nostro vesicatorio frequentissime & felicissime. Interim, sine ullis externis immediate oculis applicatis, quæ, nisi cautissime adhibeantur, nocent, feroces oculorum adfectus sanari posse, hac curandi methodo edocemur.

### OBSERVATIO IV.

Serenissimus Princeps annum agens <sup>Lippitudo per malum vitæ repleta, plenam vitam vitiosam, seu prius præstitam notam.</sup> quinquagesimum, sanguineo-cholericæ constitutionis, naturæ alias bene valentis & robustæ, immoderatori vini, potui & cerevisiæ valde saturatæ ac spirituosiori per omnem vitam adfuetus, multis jam annis circa æquinoctia fluxum cum euphoria hæmorrhoidalem expertus est. Evenit aliquando, ut per frigoris vehementiam subito hic fluxus subliteret. Sequebantur mox cum ventris dorsique doloribus & hemicrania & cardialgiæ, quibus acris ad oculos fluxio superveniebat. Per venæsectionem in pede remittebant quidem hæc mala, sed remansit dolorifica cum rubore in oculis fluxio, quum Serenissimus pocula in seram usque noctem protrahere & mane sub tempestate aeris humida & frigida venationibus indulgere, quam immutato vitæ regimine consuevit oculos a frigore defendere mallet. Hinc vero prohi dolor factum est, ut, malo subinde aucto, oculi naturalem suam constitutionem, colorem, figuram, magnitudinemque & claritatem iades magis magisque amiserint, insequen-

sequente postea plenaria visus, privatione. Cui removendæ a celeberrimis. undique Medicis & artificibus remedia, sed frustra, hætenus sunt requisita.

### E P I C R I S I S.

Graves & chronicas, omnis generis passiones solis medicamentis sine convenienti vitæ victusque ratione sanari non posse, abunde non experientia solum confirmat, sed & constans. antiquissimorum Medicorum, inque primis Galeni, adfessio fuit. Si quis enim a quibus originem morbus traxit, ea sugere recusat, quo modo valere is possit equidem non video. Quam vero non laudabilis, principum maxime, ea sit consuetudo, ut præcepta dietetica vel rarius, vel prorsus non admittant, sed medicamentis jucunde tractari velint; non mirum est, sæpius morbos eorum, facilioris alias & promptioris sanationis, sanari non posse. In tali, qualis noster est, longo & difficili admodum affectu levibus dieteticis: quam pharmaceuticis remediis uti solitus sum: Jubeo, ut a vino, cerevisia crassiori, a carnibus, ovibus, plantis, acerbis, salis & acidis ægrotautes abstergeant; e contrario vero aquam frigidam, quin etiam calidum herbæ appropriatæ infusum ex aqua, magna in copia pro potu sumant & alvum inprimis laxiorem lenissimis laxantibus fervent.

### OBSERVATIO V.

*visus.*  
*habere.*  
*de.*  
*hipp.*  
*diu.*  
*ab.*  
*inc.*  
*græc.*  
*sp. oris.*  
Vir generosus, quinquaginta & aliquot annorum, temperamenti sanguineo phlegmatici, vitæ aulicæ jam per plures annos innutritus, inordinatum habebat vitæ genus: siquidem crebro excessum committebat in potu vini dulcis fructibusque horum nimium delectabatur; in venatione quondam autumnali caput ventis fortiter spirantibus inopportune exposuit. Postero die de capitis dolore pressorio conque-

rebatur, quem fluxio in oculis acris adpectu lucis semper increfcens cum rubore & dolore sequebatur. Quod malum, neglecta victus ratione, idoneisque mediis contemtis, in dies majora cepit incrementa, & quia simul rei veneræ deditus erat, nec a vini potu liberaliori abstinebat, tam grave factum est, ut in utroque oculo pene visum amiserit. Multos ideo consuluit Medicos & variis, quæ hinc inde commendabantur, collyriis sed inani plane effectu utebatur. Ranam per medium discissam interiori oculi parti superimponebat, quod crebro usu ab aliis comprobatum ipsique commendatum nihil proficiebat. Per annum & dimidium hoc molesto affectus malo petiit a me quoque opem. Ego prospexi primo loco dieteticis remediis & ne potui assumeret cerevisiam vel vinum, sed aquam frigidam, suavi. Deinde pediluvium valde temperatis frequentius ex meo consilio usus est paulo longiori in iis mora. Tum interdictis omnibus externis simplex tantum & vulgare ut in usum vocet, remedium commendavi, ut videlicet saliva sua jejunos, antequam furgat & postea quoque oculos illinat frequentius. Quibus simplicibus cum diu usus fuerit, accidit, ut, discussa prorsus vitata materia, visus clarus cum naturali oculorum constitutione restitueretur.

### E P I C R I S I S.

Sicuti nullæ fere partes corporis tam variis vitis morbilque subiectæ sunt quam ipsi oculi; ita etiam vis ullæ partes ab improvida externorum, quæ collyria vocantur, applicatione gravius patiuntur damnum quam illi ipsi; siquidem inde graviter exacerbantur & in deterius plane mutantur. Cautissime itaque quod in ejusmodi affectibus, externis, alias maximopere laudatis, utantur Medici, tanquam monitum summe necessarium experientia sat edoctus scribo. In presenti morbo mirabilem sane saliva ægri jejuna.

juna oculis inuncta præstitit effectum, quod remedium vulgo etiam non ignotum. Nam subtili suo sale alcalino volatili, quo refertus est penetrans hic humor insignem discutiendi spissescences humores facultatem habet, hinc non sine insigni fructu in phlegmenibus atque tuberculis cutim descendantibus adhibetur. Ex quibus apparere cuilibet potest, gravia oculorum vitia simplicibus & promtis remediis subinde rectius removeri posse, quam compositis & arte pharmaceutica vel chymica laboriose compositis. De utilitate aquæ frigidae in hisce morbis egregie commentatur CELSUS *Lib. I. cap. V.* *Neque vero his solis, quos capitis imbecillitas torquet, usus aqua frigida prodest; sed iis etiam, quos assidua lippitudines, gravedines, destillationes, consillaque male habent. His autem non caput tantum quotidie persundendum; sed os quoque multa frigida aqua fovendum est; præcipueque omnibus, quibus hoc utile auxilium est, eo utendum est, ubi gravius calum Austri reddiderunt.*

## OBSERVATIO VI.

*visus caligo mela hypochr. dilute*  
Vir Generosus, quia jam sexagesimum attingit annum, officio admotus principis, quod multum curæ, sollicitudinis ac laboris in mente, neque minus ingentem per varia itinera fatigationem cum multa actorum lectione ad multam noctem producta requirebat, jam ab aliquot annis pathematibus hypochondriacis, frequentibus cardialgiis cum vertigine, hemicrania, alviq; stipatione junctis obnoxius, fonte foterio Pyramontense cum insigni fructu, aliquoties usus est. Nunc ante annum & ultra de visus hebetudine & dolore interni oculi pressorio neque minus de molesta circa præcordia sensatione, vulgo Ubelseit, circa vespere maxime, conqueretur. Variabant hic secundæ adversæque res. Mox enim hoc vitium evanuit, mox recruduit; sed ante anni

dimidium indies increvit, adeo ut nulla fere ejusdem fuerit remissio, dolore simul tum caput perpetuo affligente, qui tamen post somnum ex parte siluit. Præterea molestus circa præcordia sensus cum virium defectione & dolore artuum tensivo genua & pedes præsertim torquente frequenter quum virum generosum afficiebat, a me petiit consilium. Ego fontem Egranum cum convenienti vitæ victusque regimine per III. hebdomades bibendum & singulis diebus circa decubitus pedes ad genua usque in balneum tepidum immergendos suasi. In prandio Elixirio Viscerale temperate balsamico Vir Generosus usus loco cerevisiæ aquam Selteranam potui sumit. Dein emplastrum nostrum temperatum vesicatorium sine incommodo per mensem & ultra vutchie impositum maguam seri impuricopiam extraxit. Quæ cura tantæ fuit efficaciz ut oculis bene habentibus & legere & scribere optime potuerit haud de ullo amplius incommodo conqueffus. Verum scena non multo post fuit mutata. Nam ex improvviso quodam casu, qui ejus animam ingenti percolit mœrore, protinus cuncta priora mala, ingens scilicet oculorum caligo cum dolore premente, dolor cardialgicus & artuum tensivus cum magna virium jactura revertebantur, quibus cum etiam usque eo conflictatur & consilia sibi expetit,

## E P I C R I S I S.

Sicut complures capitis affectiones, ut vertigo, aurium tinnitus & difficultas, cephalalgia, hemicrania, ubi suas servant periodos, ex vitio stomachi & primarum viarum sæpius originem suam trahunt; ita & oculorum statim temporibus recurrentes morbos, obnubilaciones, caligines, visus hebetudines, fluxiones, ex colluvie humorum in hypochondriacis provenire non modo præsens casus docet, sed & crebriori observatum habemus experientia. Genesis horum affectuum ita proce-

procedit : A colluvie vitioforum humorum in tunicis ventriculi nervosis spasticæ sunt stricturæ , per quas , quum liber sanguinis per venas compressas transitus intercipitur , major ejusdem redditur adpulsus ad caput ejusque partes , ubi in vasis minimis stagnans ejusmodi molestias producit . Neque vero oculi ab ejusmodi fortiori appulsu & congestione sunt immunes , quum tunicæ eorum omnes tenuissimis vasculis lymphaticis & sanguiferis sunt repletæ , in quibus facile humorum circuitus potest turbari . Ex quo fundamento nunc ex facilitam faultæ acidularum aliorumque remedium operationis reddenda erit ratio . Ex hoc igitur casu id maxime discere possunt artis nostræ tyrones , quanta vis & vehementia insit animi perturbationibus , adeo ut etiam morbos jam quiescentes ; imo sublato , sine ullis aliis causis accedentibus repente revocare possint . Denique cautionem quoque exinde depromere possunt , qui per fontium salutarium virtutem convaluerunt , ut præter meliorem vivendi rationem , tranquillam quoque & ab affectibus immunem , mentem quantum licet , custodiant .

## OBSERVATIO VII.

*visus* Vir annorum quadraginta duorum ,  
*immin-* robustæ ac plethoricæ corporis consti-  
*dit oculi* tutionis , a primis jam annis lauto vi-  
*en suff-*ctu & largiori vini potu , nunquam au-  
*stus .* tem venæsectione usus , nullum per omnem vitam graviorem morbum , nisi crebras in juvenute sanguinis e naribus fluxiones expertus est , quæ deinceps haud redierunt prius , quam superiori anno magno cum impetu . Haud ita pridem longo itinere per concitatorem equitationem confecto , ad convivium invitatus & binis diebus vino Hungarico obrutus breviter post truculentis vexatur doloribus colicis gravi diarrhoea stipatis , inter quam strías quasdam deposuit cruentas , quas pro intempestivis hæmorrhoidum ex-

cretionibus habere nulli dubitamus : Præterea venationibus nimium deditus Vir generosus die æque ac nocte ut totum corpus , ita oculos maxime aeris exposuit injuriis ; hinc subito ante tres abhinc anni quadrantes hebetudinem visus sensit oculi dextri , qua aciem ejusdem ita debilitatam conquerebatur , ut omnia quasi per nebulam videret , nec ab homine hominem , licet minori distantia remotum , rite posset distinguere , altero ceterum oculo illaeso existente .

## E P I C R I S I S .

Sanguinis nimie abundantie & tenacitati primam hujus mali originem deberi , nemo non videt . Omissa enim tam per naturales vias quam per artem sanguinis detractio , facile ejusdem ab infernis partibus ad superiores fieri potuit metastasis ; præsertim quum , collectis in primis viis per inordinatam dietam cruditatibus , ventriculi vires debilitatæ & humores spissiores cum flatibus generati sunt . Sanguis itaque versus caput adpulsus & circa oculum præcipue dextrum congestus ob tardiorum ibi per minima valcula progressum stagnavit ; unde denegato tenuissimi succi nutritii ulteriori affluxu humores oculi crassi turbidique reddituri videndi claritatem imminutam produxerunt , In instituenda igitur cura eo respeximus , ut debita ventriculo vis & chylæ subtilitas restitueretur , ut sanguinis mole per ejus missionem & tenuem viam imminuta excretionibus ejusdem naturalibus via aperiretur & denique , ut caput , inque primis oculis a congestionibus liberatus corroboraretur . Id quod potissimum convenienti stomachicorum & tonicorum usu , subjunctis simul pediluvii , quæ miram habent a superioribus ad inferiores partes derivandi facultatem , efficere studuimus . Præter ea hac observatione adhuc prorsus confirmamur , vitiorum morborumque , qui oculos invadunt , causam nimis sæpe in primis viis atque imo

imo ventre repositam esse & radicatam, atque ideo in curatione ad eam aptis prædiis tollendam respici omnino deberi. Neque id profecto satis junioribus mædendum inculcari posse existimo, in gravioribus morbis causam non tam in humorum dyscrasia atque intemperie, quam in motuum vitio & aberratione, qua humores & sanguis locum suum naturalem mutare coguntur, querendam & inveniendam esse.

## CAPUT VI.

## DE AUDITUS VITIIS EX ATONIA.

## THESES PATHOLOGICÆ.

## §. I.

Defectio  
pelo affe-  
ctum  
auditus

**A**uditus vitia, quæ ex atonia partium nervosarum & membranacearum aures constituentium plerumque proficiuntur, ad tres potissimum redigi possunt classes. Prior est, quando sonitus tinnientes, susurrantes, murmurantes, campanarum strepitum æmulantes, alique innumeri, qui tamen nullam extra corpus habent causam, audiuntur; tumque malum tinnitus & susurrus aurium adpellatur. Alter *diversus* seu *Asperitas*, auditus gravitas, quando soni extra nos excitati perceptio ipsius magnitudine minor est; & tertia denique surditas, seu perfecta auditionis abolitio.

## §. II.

Idem  
dis-  
ferentia

Cuncta hæc vitia, si spectes originem, eodem ferme nituntur fundamento, gradu tamen diverso, & sunt vel transitoria, quæ sanis sæpius, uti quidem videntur, accidunt hominibus; vel perpetua, nunquam non morborum quidpiam secum habentia. Hæc vero jure dicuntur vel idiopathica, quæ ex læsione partium aurem constituentium, & intra ossæam cra-

Tom. IV. Pars IV.

nii thecam reconditarum primario suboriuntur; vel sympathica, quæ ex aliarum partium, ut ventriculi vitio natales suos mutantur, aliisque morbis accedunt. Illa ut plurimum instant continuo; hæc per intervallaredeunt; suntque non raro vertigine, dolore capitis, oculorum hebetudine, ventriculi imbecillitate, ructuosis, flatulentis, aliisque symptomatibus stipata.

## §. III.

Quorum causas & formalem rationem si velimus perquirere, opuserit, quædam nostro scopo inservientia ex auri structura, indeque explicanda; auditionis ratione præmittere. Neque enim copiosi in tradenda auri fabrica erimus; sed duntaxat notabimus, 1.) internas ejus partes, cavitates, mæandros, fornice, circulos, gyros, miro artificio fabricatos, investiri periosio, quod est membrana tenuissima, vasculis arteriosis quam plurimis, tenuem humiditatem perpetuo plorantibus, plena; 2.) hanc membranam esse propaginem & expansionem portionis molliis nervi acustici, ex protuberantia medullæ oblongatæ transversali egredientis, & per foramen auditorium internum, petroso ossi insculptum internam aurem ingredientis, eademque ratione ac retina in oculo visus, hanc auditus verum organon constituere; quippe in ea soni colliguntur, per nervi continuationem ad commune sensorium pro distincta perceptione transferendi. 3.) Ejusdem nervi, qui septimum exhibet par, duram, ut vocant, portionem cum ramo quinti pariter ac octavi seu vagi paris communicare, & chordam illam, quæ membranæ tympani subtenfa est, efficere: 4.) arteriolas in aure distributas nervos ramulos in suo itinere comitari; 5.) tubam Eustachianam, primum ossæam, deinceps cartilagineam, & denique membranaceam hiari in palatum, & non solum cum externo aere, qui ore & naribus hauritur, communicare, F verum

verum etiam tenuem humiditatem, quæ in aure interna ex continua perspiratione colligitur, in oris cavitatem, ne auditum turbet, evacuare.

## §. IV.

Quibus  
modis  
auditus  
lædatur  
genera-  
tim.

Quod si ergo membranae nervæ in aure reperiundæ iusto tensionis, a debito nervi fluidi influxu pendentis gradu gaudeant; sanguinis per arteriolas circuitus sit regularis; ductus Eustachianus pariter ac reliqui rite constituti ac aperti sint, & reliquæ partes aures constituentes bene conformatae: tum auditus, qui est perceptio soni, seu motus aeris elastici per corpus sonorum producti tremuli ac undulatorii, sine ullo peragatur vitio. Hinc autem e contrario adparebit, auditum generatim vitari, si vel partes ac cavitates auris internæ præternaturaliter sint constitutæ, male conformatae, obstructæ, ulceratae; vel inprimis tuba Eustachiana clausa ac obturata; vel humorum per vasa cunctis inordinatus; vel denique membranae nervæ nimis relaxatae, aut ultra gradum naturalem tensæ.

## §. V.

Spres-  
sim a  
mala et  
stiratio-  
ne per-  
sim.

Sic auditus difficultas, & ipsa demum surditas datur nativa, ex mala organi auditorii conformatione originem trahens, & omnem respuens curationem. Idem vitium pariunt externæ capitis & aurium percussiones, contusiones, ac violentiæ; unde colaphos ita insigi posse notum est, ut tinnitus aurium inde exoriat, dæsi enim die Obren davon gellen: ex bombardarum forti explosione auditionem imminui, permultis comprobatur exemplis; & eos, qui diu inter tormenta bellica versati fuerunt, die Artilleristen, ætate profectioni plerumque fieri surdos docet experientia. Non minus audiendi facultas vitatur, a meatus auditorii, tympani, ossiculorum auditus &c. arrosione, & exulceratione; nec non peregrinis aures il-lapsis, & tum aeris ingressum impedi-entibus, quam ipsas membranas cum dolore afficientibus, ut insectis, pis-  
spe-

&c. atque muci illius subpinguis ac fla-vi, qui glandulis tubulique minimè in meatu auditorio fecernitur, & ce-ruminis nominæ venit, induratione. Nec denique silentio prætermittenda ea auditus vitia, quæ ex tuba Eusta-chiana, quacunque de causa obstructa natales mutantur; hinc enim aeris reciprocus per os & aures auditus & re-ditus impeditur, atque tenuioris in aure secretæ humiditatis excretioni obex ponitur, unde & tinnitus & ob-auditio propullulant. Sæpius id fit sub salivatione, si caput præsertim aures frigida boreali, quæ reprimat viscidos succos, exponitur: qualem casum post caput mercurio inunctum recenset TIMÆUS a GULDENKLEE L. 2. ep. 29.

## §. VI.

Variis quoque modis auditus læditur. a spasmo, nimia siccitate, rigiditate, & interdum velut occalescentia ner-vearum & membranacearum partium, quæ organon auditionis constituunt; quo in casu auris interna & meatus au-ditorius plane siccus, omnique humo-re etiam pinguiori destitutus visitur. Quanquam enim talis nimia membra-narum acusticarum tensio illum sæpius affectum producat, quo acutiores soni non sine molestia & dolore audiri pos-sunt: attamen exinde quoque gravi-tas auditus cum susurru tinnituque non raro proficiscitur. Hoc vitium post phreneticos, maniacosque morbos crebro remanet; nec non a vehementi ca-pitis, sudore madidi, perfrigeratione, nimis diuque protractis vigiliis, diuturna capitis ad radios solares expositi-one, omnibusque causis, quæ corpus exsiccant, & succos tenues, rosidos, lymphaticos consumunt, suam trahere observatur originem.

## §. VII.

De his autem affectibus nobis non est sermo; sed de iis tantum agere con-sistimus, qui a nimia nervorum & membranarum acusticarum relaxatio-ne vel plenaria atonia oriuntur. Quo-rum licet tres superius adduxerimus  
spe-



deriaci, & flatulentis morbis laborantes; in quibus sæpius citra omnem expectationem evenit, & brevi iterum evanescit, quod experientes dicunt: Es ist mir auf einmahl mas vor die Ohren gefallen, daß ich fast nichts horen l'an. Hinc etiam observare licet, ejusmodi vitia solis sæpenumero stomachicis, carminativis, & accuratori diætâ prorsus debellari.

## §. X.

*Auditus vitio ex decubitu serosorum humorum ad aures.* Imminuitur porro, vel plane aboletur auditus, a decubitu serosorum humorum, vel ad principia nervorum acusticorum, vel ad internas auris cavitates. Prius fit in affectibus soporosis, apoplecticis, hemiplecticis, paralyticis, & iis omnibus, qui a colluvie serosa, cerebrum inundante originem trahunt: quin interdum difficultatem auditus & surditatem post lethargum & insultum apoplecticum sequuntur observavi. Posterius contingit 1.) si excretionis feri mucidi consuetæ per nares, ut in coryza, simul & semel cohibentur, vel sponte cessant; ubi serum illud ad aures decumbit, & membranas acusticas relaxat, præsertim in senilibus ac debilitatis corporibus. 2.) critico quasi motu in febribus continuis, exanthematicis, maxime catarrhalibus malignis seu petechizantibus, Hungaricis, & quæ caput cum ejus dolore ac delirio afficiunt. In his surdaster ejusmodi status extra dies potissimum criticos evenit, boniq; ut plurimum ominis esse solet: sed prospiciendum, ut talis obauditio inter initia convenienti medicina debellatur, ne radicata vires medicas eludat.

## §. XI.

*Causa remota, seu obauditi-  
onis.* Lento denique pede auditus gravitatem incurrit, qui per vitæ genus inordinatum ut totius nervosi systematis, ita speciatim membranarum acusticarum debilitatem humorumque simul impuritatem sibi contraxerunt. Hipec iis vitiis obnoxios potissimum deprehendimus senes, cacochymicos, scorbuticos, qui veneri nimis indulserunt, potibus inebriantibus abusi fuerunt, aut diuturna tristitia ac mœrore vires

corporis consumserunt. Non minus laxitatem membranarum auris, & insequentem obauditionem patiuntur, qui in tempestate humida, nebulosa, vappida diu versantur, aut in locis palustribus, vel conclavi udo commorantur, nec non, qui per longum tempus defluxionibus catarrhalibus capitis & glandularum circa fauces sitarum laborarunt: tensionem enim nervearum membranarum nimia humiditate insinignitæ minui, multis constat experimentis.

## §. XII.

*Quæstio. Per exacerbatum viti-  
um.* Notatu præterea dignum, & aurium tinnitum, & auditus difficultatem pro diversitate causarum diversa ratione ac tempore exacerbari. Qui dictis vitiis a sanguinis congestione ad caput sunt obnoxii; eorum exacerbationem circa æquinoctialia tempora, vere scilicet & autumno experiuntur; quoniam eo tempore humores magis commoveri, & congestiones augeri solent. Qui autem ex ventriculi, primarumque regionum vitio auditum gravem patiuntur; male habent post sumtos coctus difficiiores ac flatulentos cibos; eo quod status, quo copiosiores generentur, eo magis humorum ad caput raptum efficiant. Qui denique ex serosi humoris decubitu, laxitateque nervorum surdastri sunt, mali sui insigne augmentum percipiunt cœlo existente nebuloso, gravi, pluvioso; quod videlicet talis tempestas laxitatem membranarum acusticarum magis augeat; quæ vicissim iis est solatio, qui ex nimia aurium siccitate inciderunt auditus difficultatem.

## §. XIII.

*Pregna-* Omnes auditus lationes curatur sunt difficiles; nisi enim inter prima initia corrigantur, inveteratæ raro medellam admittunt, quæ eo fit intricatior, quo profundius causæ intra ossæam auditus thecam, aut ipsum plane cerebrum sunt absconditæ. Qui in plethoricis, atque debilitatis corporibus capitis dolorem gravativum atque vertiginem sequitur tinnitus, aut auditus difficultas; sæpius infaustum apoplectici insult-



infusus exhibet praesagium; quando vero in phrenitide, Hungaricaque febre, non sequente narium fluxu, contingit, delirium portendit: surditati vero succedens delirium, juxta HIPPOCRATEM malum. At postea si status in petechizante febre circa dies criticos, urina existente cocta, eveniens, bene omnino jubet sperare.

## CURATIO.

### §. I.

**Q**uemadmodum vix ullus morbus curatur, nisi ejus causa removeatur, & emendandi artificium in eo potissimum consistit, ut justa causa cognoscatur: sic idem in aurium adfectibus est summopere necessarium. Neque vero in his causarum modo diversitas, sed etiam temporis, per quod durarunt, diuturnitas respicienda; quoniam aliam recentia, aliam inveterata auditionis vitia requirunt curationem. At cum nobis de iis potissimum sermo est, quae ex flacciditate & laxitate nervorum membranarumque & facto ad eas humorum decubitu suboriuntur: eorum curationem tribus recte complectemur momentis, quae in eo consistunt, ut 1.) impetus ruentium ad caput humorum deriveatur, 2.) stagnantes in aure succi discutiantur, & obstructions referantur, ac denique, ut 3.) influxus fluidi nervi sufficiens restituitur, adeoque robur membranarum instauretur.

### §. II.

**Q**uoniam ad effectum curationis  
Prima indicationi satisfaciunt 1.) venesectiones, quae sanguinem imminuendo, aequalem ejus per corporis ambitum circulum promovere, raptumque a capite derivant. 2.) Alvum laxantia, statumque excretionem juvantia; qualia, si malum in corporibus sanguine plenissimis, & spasmodis imi ventris obnoxii recens ortum fuerit, leniora mannata, rhabarbarina, vel clysteres esse debent. Ubi vero inveteravit affectus in subjectis se-

Tom. IV. Part IV.

rosi ac pituitosis; efficaciora ex usu sunt laxantia, ut infusa vinosa, quae per epicastrum operantur, & pilulae cephalicae, quarum exempla supra Cap. I. pag. 18. allegavimus. 3.) Pedilavia tepidiora ex aqua fluviali, surfuribus triticeis, cineribus clavellatis; quippe quae humores efficaciter a capite revocant, & in ambitum corporis exteriorem ac inferiorem invitant. 4.) Vesicatoria suris pedum admota, quae in subjectis pituitosis, ubi serosa colluvies malum induxit, egregie sunt utilitatis.

### §. III.

**Q**uoniam ad effectum curationis  
Alteram indicationem explent, quae vim serum viscidum ut in toto corpore, ita praesertim in capitis recessibus discutendi, resolvendi ac evacuandi possident. Ex internis praeter laxantia huc spectant 1.) diaphoretica, pro subjectorum & causarum ratione seligenda. Sanguinei enim, plethorici, & qui ex orgasmo sanguinis vitia auditus patiuntur, possunt diaphoretica fixa, absorbentibus & nitrosis nupta; nec non infusa theiformia intra lectum cum blando regimine potanda: sic enim solo potu Caffee tinnitum discussum novi. Phlegmatici & defluxionibus catarrhalibus obnoxii ex spiritibus bezoardicis, cum essentis catarrhalibus obnoxii ex spiritibus bezoardicis, cum essentis catarrhalibus ac resolutivis junctis solamen percipiunt, ut sunt spiritus bezoardicus Bussii, liquor cornu cervi succinatus, essentia succini, pimpinellae silbæ &c. 2.) diuretica, quorum in morbis capitis serosis excellentissima est efficacia; ex iis reliquis palmam eripit tinctura antimonii acris, quae cum essentia succini, & liquore cornu cervi succinato combinari potest. Scorbuticis vero, atque cachecticis interna resolutiva, attenuantia, & sic dicta antiscorbutica, quorum princeps est serum lactis, fructum pollicontur amplissimum.

### §. IV.

**Q**uod externa huic scopo intervenientia attinet; ex iis, si congestio sanguinea, & stasis inflammatoria malum sustineat, principem locum teneant sacculi

F 3 discu.



## §. II.

*Chon*  
*menas*  
*Chonem* Sanguinis miliones in tinnitu aurium, gravitateque auditus, quæ a nimia sanguinis copia, ejusque congectione ad caput originem traxit, commodissimum habet locum; maxime si suppressio vel imminutus fluxus mensium ac hæmorrhoidum antecesserit: quo in casu venæsectio in pedibus instituta fructum pollicetur amplissimum. At si narium hæmorrhagiæ cohibitis tinnitus causam præbeant, eas, si opportuna fuerit ætas, stylo nariibus intruso revocare multum juvabit: earum vero emanatio, per ætatis rationem facta, refarcienda venæsectionibus circa singula æquinoctia in pede instituendis; siquidem harum omissio malum, licet jam sit debellatum, revocare valet.

## §. III.

*Quomo*  
*da, tro*  
*stunda*  
*stunda*  
*no co*  
*norba*  
*lis* Quæ catarrhalibus defluxionibus stipata sunt, auditus vitia, efficaciora laxantia, infusaque vinosa, nec non mercurialia postulant, & præterea vitæ tenuis exsiccans omnem fere pharmacorum vim superabit: nec contemnendam eo in casu efficaciam suffragia ex temperatis gummatibus præstabunt. Sæpe etiam fit, ut achores, tinea capitis, scabies, aliæque efflorescentiæ præmature consolidatæ & exsiccatæ auditus relinquant gravitatem: quo in casu præter laxantia, & pulveres diaphoreticos cum floribus sulphuris permiscendos, vesicatoria atque fonticuli, derivando materiam exanthematicam operæ pretium faciunt. Si serosæ per nares excretionis cohibitis auditus difficultatem excitaverint; non est alienum, sal volatile ammoniaci siccum, oleo majoranæ imprægnatum crebro nariibus admovere.

## §. IV.

*adu hy*  
*guboa*  
*de lacte*  
*ac fer*  
*hustis* Ubi auditus vitia sunt periodica, & hypochondriorum malum constitutionem pro causa agnoscunt; annitendum est, ut ventriculus a sordibus repurgetur, atque suum recuperet tonum; sicut præcedente Tomo Cap. de malo hypochondriaco docuimus: &

observavi sæpius, molestissimum aurium tinnitum in hypochondriacis sæpius eventientem, unica absorptentis dosi fuisse curatum. Qui scorbuticam humorum diathesin, & vasorum minorum obstructions patiuntur; bene sibi consulunt, si aquis mineralibus cum debito regimine utantur.

## §. V.

*ca flos*  
*itate*  
*infusio*  
*naum* Quæ auditus gravitas ex nimia siccitate membranarum nata fuit; poscit balnea emollientia, infusa decoctaque lubricantia & humectantia, atque juvat tum omnino oleum amygdalarum dulcium, auri adfectu immittere aut pinguedinem anguillæ tepidam instillare. Præterea nocent vere olea auri improvide infusa. Exterius profunt fomenta emollientia & paregorica, quorum optimum præbet panis ex furno recenter exemptus, cui balsamum vitæ adspargitur. Ubi vero cerumen aurium coagulatum, & quod sæpius fit, instar gypsi est induratum; abstinentur a nimio humectantium & oleosorum, quæ vulgo solent commendari, usu. Optimum potius est consilium, si lac, vel quod melius, ejus cremor tepide ope syphonis infundatur auri, vel vapor ex pane calido, ex furno extracto, & discisso eidem immittatur: hic enim blando vapore penetrat & emollit viscidam tenacemque materiam.

## §. VI.

*ab ob*  
*obstructio*  
*ne du*  
*bus En*  
*stibus* Quando tuba Eustachiana inrerius obstructa tinnitui, surditatque causam præbet; præter interna succos viscidos colligantia, & evacuantia, commendantur masticatoria, ut radix angelicæ, imperatoricæ, pyrethri, mastix, zinziber &c. quorum vis proxime pertingit ad affectum locum. Laudantur hoc etiam sine sternutatoria, quippe quæ motum constrictorium excitando sæpe expellunt in hærentem materiam; & eadem in hoc casu opem tulisse, testis est TULPIUS. *Lib. I. Obs. 35.*

## §. VII.

*atris*  
*plecto*  
*no pro*  
*bilita* Cum a nimio sanguinis ac humorum motu

motu ad caput & auditus organa nimiaque humiditate propter perspirationem sufficientem cohibitam ibi collecta & secedente plerumque auditus difficultates suboriantur, maxime omnium curandum est, ut caput in continua & moderata perspiratione conservetur & ab iis omnibus, quæ eam sufflamant, probe defendatur: cuius generis sunt balneum, conclave, in quo æger dormit, vappidum & decive, capitis post sudorem refrigeratio, maximeque omnium ejus lotio.

## ENARRATIONES MORBORUM.

### OBSERVATIO I.

*Tinnitus  
aurium  
a ple-  
thora.*

**I**llustrissima in vigore ætatis constituta forma valde obesa, per multos jam annos in matrimonio vixit prole destituta & quoad animi corporisque functiones bene semper valuit, nisi quod ante aliquot abhinc annos confestim vertigine cum gravi aurium tinnitu juncto correpta per intervalla fuerit. Contra hæc mala suavis medicorum variorum remediis & præcipue aquis Schwalbacensibus usa est, hisque posterioribus tam felici successu, ut vim mali fractam paulo sentiens, recidivæ metum omnem abjiceret. At vero, paucis abhinc mensibus non modo vertigo in caducam transiit, verum etiam tinnitus cum graviore auditus læsione denovo invasit, quibus simul everfio complicatur ventriculi cum refectione multæ pituitæ, quæ modo gravior, modo levior sæpius recurrit. A medicamentis balsamicis & calidioribus pejor, melius vero a diluentibus & sanguinis orgasmum sedantibus Illustris habere solet. Ceterum sat bene ipsi uterina succedit purgatio & ad minuendam propter lautum vitæ genus plethoram ter singulis annis sanguinem vena secta detrahendum curat. In tali rerum statu mihi demum in consilium vocata questio fuit proposita: An ab aquarum Spadanarum interna & externa Aquis-

granensium thermarum usu exoptatum sperare liceat auxilium?

## EPICRISIS CUM RESPONSO.

Clarissime ex hac morbi historia elucere arbitror, a sola temperati & boni sanguinis nimia in corpore bene valente & plethorico disfluentia vertiginem cum auditus labe posse suboriri. Sanguinis quidem detractionem ter per annum Illustrissima femina admisit; sed quum nimio sanguine turgida sine prole vixit lautiorique dicta usa est, plus superflui sanguinis generavit, quam per V. Snem & mensium fluxum, satis fortasse parcum ac moderatum, fuit consumtum. Quæ cum mecum perpenderem, præter ternas V. Snes consuetas, alternatim quoque scarificationes eodem numero instituendas & loco potus ordinarii Selteranam vel communem aquam cum quarta vini parte remixtam bibendam suasi. Præterea a cœna vitæque dedidit, quibus dedita erat, abstinere jussi; & quæ salutare antea fuerunt, Schwalbacenses acidulas iterum potandas, quam experimentum cum fontibus Spadanis denuo faciendum consultius duxi. Balneum vero thermarum Aquigranensium, quæ ob minerale sulphur, quo abundat, nimis calidæ sunt, quum in morbis capitis, præsertim qui a plethora sunt, nunquam salutare deprehenderim, reprobavi.

### OBSERVATIO II.

Vir ætatis quadragesimum secundum, temperamento præditus cholericus - sanguineus, jam inde a teneris juventutis annis a nimia lucubrationibus tinnitu aurium leviori eum continua aurium nariumque siccitate laboravit. Aliquot nunc effluerunt anni, quum tanta hinc affectus incrementa sumsit, ut in altera aures horologii pulsus, in altera tintinabuli sonitus perpetuo percipiatur, qui omnem prope

*Tinnitus  
aurium  
a hypo-  
sthesia  
re & hy-  
peræsthesia  
morbi-  
dus.*

prope somnum adimendo vires mirum debilitat. Quod peculiare symptoma longe majori urget vehementia, si quando iracundia, aut vehemens corporis commotio, aut sanguinis quidam a vini generosi potu ebullitio præcessit. Præterea nec capitis dolor, nec vertigo follicitat, nisi quod autumnali nonnunquam tempore sub humida aeris temperie dolores cervicis tensivi invadant, auditusque tum temporis simul aliqua fiat obfusio. Cruentæ sedes rarius expertus æger per aliquot jam annos hæmorrhoidibus cæcis affligitur, qui urunt & tument cum magno pruritu: quibus in ordinem redigendis bina per annum V. Sne ad unciam dimidiam utitur, qua sanguis colore & consistentia bonus detrahitur. Cæna hucusque semper major fuit prandio, alvique officium rite semper constitit. Consultus ego præter V. Snes confusæ scarificationes quoque alternis mensibus triduo ante & post novilunium suscipiendas, crebrumque pediluviorum usum cum hirudinum ad venas hæmorrhoidum tumentes adpositione sumi: tum vero, ut ab animi affectibus probe sibi æger temperet, a cæna abstineat optimeque corpus contra aeris, præsertim autumnalis injuriam defendat & potui ordinario vinum cum tribus aquæ paribus dilutum bibat, consului. Aurium vitio specialius succurrendum duxi essentia moschi cum spiritu rosarum, liliorum convallium & storum chamomillæ R. parata, quam bombaci insillaram auri sæpius indere jussi. Quibus probe observatis se brevi noster egregie levatum vidit.

## E P I C R I S I S.

Quando cholericæ & hæmorrhoidariæ auditus vitio obnoxii sunt, scarificationes V. Sne longe efficaciores deprehendi. Insuper notabile in hac morbi historia est, quod in juventute animi lucubrationibus vitæque sedentaria & exorta inde ventriculi imbecil-

litate malum originem suam repetat, nec perfecte curetur sed per plures annos, maxime si diætæ accedat vitium, affligat. Docemur denique, aurium vitia, præsertim tinnitum gravem & pertinaciorem a sanguinis magis & humorum vitio eorumque motu ad caput & præsertim auditus organa vitioso, quam a partium auditum constituentium læsione ortum trahere, quod tum maxime fit, si malum per tempus remittit, postea revertitur.

## OBSERVATIO III.

Femina viginti annos nata, machi <sup>stomach</sup> lentioris corporis habitus vitæque <sup>stomach</sup> sedentariæ admodum addictæ alvi adeo <sup>stomach</sup> constrictæ est, ut vix sexto die rite deponat, cui vitio simul appetitus magna jungitur prostratio, hæud fallax digestionis lætæ testis, ob quam fit, ut si forte in cibis adsumendis paululum excedit, nauseosam circa præcordia molestiam statim persentiat, quam copiosi ructus sequuntur. Jam per tres integros menses gravi hæmicrania cum vehementi aurium, inprimis sinistri lateris laborat tinnitu, qui ex somno expectatæ ingentes erant molestias & ab humida frigidaque aeris intemperie nunquam non intenditur. Accesserunt insuper aliquot abhinc hebdomadibus dolores in nucha tensivi, qui in brachiis, maximeque sinistro, ad digitos usque protensè misere nostram excruciant. Pedes, qui plerumque frigidi sunt, summa tenet latitudo, neque, quod maximum est, recto modo & ordine procedit menstrua purgatio; quæ cum vitio capitis auriumque exacerbato ut plurimum orta per quatuordecim dies durat, copiosa demum mucii albi excretionem subsequente.

E P I C R I S I S C U M  
C O N S I L I O.

Recte omnino ea, quæ a grota nostra laborat, affectu dici potest & hæmicrania capitis, cujus proximam causam in-

stagna.

stagnatione & decubitu feri circa membranas capitis & eas maxime, quæ aurem internam, præsertim sinistralateris investiant, reponendam esse ducimus. Occasionem huic malo præbuit ingens ob excessivam mensuram purgationem motuum vitalium imbecillitas, qua humores hinc inde in partibus nervosis & musculosis stagnantes dolores tensivos & gravativos cum insigni lassitudine inducunt; in intestinis vero status & spasmodicæ stricturæ seu pathemata, hypochondriaca, fuscitant. Nam instat, regulæ practicæ probe tenendum esse reor; ab inopia & defectu boni ac temperati sanguinis pariter atque a nimia ejus abundantia. & capitis & intestinorum morbos, qui mali hypochondriaci consuetæ nomine veniunt, excitari. In hoc casu primo omnium symptomati urgentiori, atroci videlicet capitis dolori succurrendum duxi, eo quod ea dolorum ac spasmodorum indoles ac potentia est, ut universam tam functionum naturalium quam motuum vitalium œconomiam non modo turbet & pervertat, verum etiam genuinam convenientium remedium in sanando efficaciam impediatur. Præscripsi itaque linimentum nervinum ex quatuor liquoris nostri anodynî & una balsami vitalis parte compositum cum linteo duplicato fronti & temporibus bis de die applicandum, ut prope quod discutiente roboranteque & anodyna virtute sua mitigandis capitis doloribus mirifice opitulatur. Deinceps usum elixirii nostri sic dicti visceralis temperati, quod omnibus anhypochondriacis palmam præripit, inter prandium ad roborandam ventriculi & intestinorum viam digesticem, interposito, nonnunquam laxante rhabarbarino, ordinatoque pro potu ordinario decocto radicis chinæ cum portione cinnamomi & corticem aurantiorum recentium, commendavimus. Quorum remedium frequenti usu negotium mensium in ordinem redactum, vitiisque primarum viarum sublatiis conveniens omni-

bus solidis partibus robor conciliatum per Dei gratiam effecimus.

## OBSERVATIO IV.

Vir generosus, Consiliarius Aulicus, quadragesimum annum nondum ingressus, constitutionis, ut ex pleno corporis habitu floridaque facie apparebat, sanguineo-phlegmaticæ, ob majorem paulo ciborum appetentiam a dimidio anni pinguior factus ab eodem tempore obtusum & graviorem animadvertit auditum, quem aere præsertim pluvioso ita ingravescere conquerebatur, ut vix ullam vocem distincte satis percipere valeret. Multis quidem sed frustraneo effectu usus adminiculis, me tandem ad aulam Principis sui vocatum consuluit. Tum ego hancce auditus labem sine medicamentis me curaturum promittens curam per inediæ hoc modo influendam suasi. Primo omnium, purgato probe corpore & sanguine per V. Snem evacuato, ab omnibus jusculis, pinguibus, ovis, piscibus carneque cœta abstinere jussi, & nihil quotidie carnis præter eam, quam libra dimidia ponderat, portionem affatæ cum viginti aliquot passulis exacinatæ & prunis coctis admisi. Dein, loco panis panem bis coctum & pro potu consueto Decoctum Chiaz, graminis & tar-saparillæ bibendum commendavi, quo itidem singulis diebus mane ad aliquot patellas calide hausto corpus ad blandum in lecto sudorem componere deberet. Ut tandem vinipotus sit modicus, motus instauratur frequentior, & vigiliis potius quam somno. Vir generosus indulget, consului. Ego quidem ex aula abiens vix ipsum huic severæ medicationis legi obtemperatum credebam; at ille nihilotiescens parcam victus rationem tam curate observavit, ut mihi a Principe in consilium rursus adscito mirum plane videretur, obestatem ad ultimæ dimidium imminutam pristinasque auditus integritatem exinde redditam fuisse;

Te; quod gratissimo animi adfectu nunciabat mihi latissimus.

## E P I C R I S I S.

Abstinentiæ & inedia tanta vis inest medicinalis, ut non modo in vitiis stomachi omnibus fere, in quibus eam CELSUS *Lib. IV. p. 217.* commendat, colluviem crudorum humorum absumendo, calorem & tonum deficientem restituat, verum etiam copiam ferri evacuando solidorum tonum intendat, totumque sanguinis circulum cum excretionibus promoveat; ac adeo iis adfectibus, qui ex nimia seri abundantia proveniunt, occurrat insignissime. Recte hinc HIPPOCRATES, *Señ. VII. Aph. 59.* corporibus præhumida carne præditis famem commendat; namque sua hæc efficit sensum atque equaliter. Et idem quoque *Lib. Epidem. VII.* æque ac Celsus in morbis capitis gravioribus exercitium corporis & abstinentiam a carnibus, præsertim pinguibus & vino plurimum collondat. Ut & ego plena fide testari possim, me in cachexia, ictero, exulcerationibus scorbuticis & variis cutis vitiis, neque minus in affectibus soporosis & paralyticis sola per inediam cura, quæ tantum sit carne pauciori assata sine inflantibus, sine pinguibus, & glutinosis, mirificum effectum vidisse productum. Quoniam itaque hæc auditus labe sola humiditate in auditu partibus stagnante originem suam duxisse mihi visa fuit, sola quoque abstinentia, quæ humidum nimium absumit, sublatam eam futuram bono omine judicavi.

## OBSERVATIO V.

*Græci ob auditu infirmo ju. nist.*  
Matrona sexaginta & aliquot annorum, vegetæ alias constitutionis, & ob insignem vim ventriculi concoctricem, qualiacunque æque bene digerens esculem; alio nonnunquam sciore, tempestatque pluviosa existente, gravativum capitis cum audi-

tus difficultate per sentit dolorem, qui a sumtis cibis leniter subducentibus, ut dulcibus & castis, vel etiam pilulis nostris polychrestis aut ab aliquot Balsami nostri vitæ guttulis cum bombace auri inditis feliciter cessat. Aliquot abhinc mensibus in sinistra aure audiendi facultatem penitus amisit, quæ imminuta tamen in dextra remansit. Suali hinc ut per intervalla rhabbarbari drachmam unam cum uncia una Caffee in aqua leniter coctam solutamque biberet, & frustulum allii alternatim cum essentia quadam acustica, quæ essentiam Colocyntidis & Molchi habebat, bombaci ad aliquot guttulas infusa lætæ auri applicaret. Quorum remedium usu laudabilem percepit effectum.

## E P I C R I S I S.

Quemadmodum, teste Hippocrate *aph. 24. Señ. III.* pueri juvenelque ob nimiam aurium humiditatem; ita senes ob harum siccitatem secundum ejusdem gravissimi Auctoris placita *aph. 31. señ. 111.* auditus vitiis valde obnoxii sunt. Nunquam tamen non, annotante pariter Hippocrate, *Señ. IV. Aph. 28.* salutaris observatur alvus in aurium vitiis liquida, dum exinde motus sanguinis a capite ad infernas partes egregie derivatur. Sed uti omnes sensus tam interni quam externi sensus; ita visus quoque & auditus admodum debilitantur; & cum nervi membræque sensoriorum in iis rigidiores non satis rore imbuti sint subtilissimo nervo; auditus pariter organon ad motum aeris tremulum percipiendum minus existit idoneum. Quæ cum ita sint, externa spirituosæ remedia, quæ spiritus reficiunt & subtili acrimonia sua stimulante vigorem & motum nervosis tunicis addunt, nunquam desitura bono effectû deprehendi. Ideo quoque ab allii frustulo auribus immisso, quod plebejæ & domesticum experimentum est, singularem sapientis fructum animadverti. Quando vero paralyticam

cam adfectionem auris unius aut utriusque comitatur vel sequitur audiendi gravitas, aliquot falis volatilis purificati grana cum pauxillo castorei mixta auribusque indita, tonum & robur relaxatis partibus conciliando, eximie opitulantur.

## OBSERVATIO VI.

*Auritus*  
*in suo*  
*vizio*  
*primæ*  
*regionis.* Vir quidam sexaginta annorum, complexionis melancholico-cholericæ, jam a decem abhinc annis audiendi quadam difficultate ab angina maxime, quæcum sæpius fuit conflictatus, laboravit. Ad abigendum igitur hocce malum suavis Medici cujusdam Balsamo Schariano per aliquod tempus frequenter usus plenariam auditus in dextra aure abolitionem animadvertit. Cumque simul hæmorrhoides, quæ rite antea fluxerunt, penitus silerent, accidit, ut sinistram pariter aurem, post lenem corporis motum aut sub inclinato paululum capitis situ vehemens suffusus sibilusque afficeret, quem ex ventriculo cibis repleto ortum ducere judicans ita sermone exprimebat: Et fühle recht, mie es ihm non unten hinauf als ein Mind hinein fahe. Quæ cum ita sint, ne audiendi facultate in altera aure æque privatus plane surdus evadat, vehementer metuit.

## E P I C R I S I S.

Quemadmodum reliqua capitis & nervorum vitia ex pravis maxime humoribus oriuntur in prima regione flagrantibus, dum molesta partium nervosarum vellicatione spasmos concitant, quibus alienus cum sanguine minus puro humor ad caput delatus ibi stagnat motumque & sensum pro diversitate locorum ac nervorum varium cum obauditione tinnitus ex primæ regionis vitio suos mutuari natales recte statuitur. Quod vero si incidit, nihil ducimus consultius, quam ut Medicus ad corruptos in primis viis humores & abhinc prodeuntes perverfos sanguinis

ac humorum motus mentem probe advertat. Crassissimus enim error est eorum, qui neglecta in capitis affectibus prima regione ad caput tantummodo respiciunt varique nervina, cephalica & nimis calida remedia adhibere solent, quibus tantum abest ut nervorum systema roboretur, ut potius humores stagnantes mirum exacerbentur, adeoque haud mirum videri possit, quare balsamum illud Augustanum in auditu difficili plus detrimenti attulerit, quam emolumenti. Memini me molestum aurium tinnitum crebrius infestantem in hypochondriaco, qui alvi erat adstrictioris, paulo majori dosi lapidum cancerorum cum aqua frigida sumtorum presentaneo auxilio mitigasse; quod pariter in senibus, in quorum ventriculo ingesta facile coalescunt, a me observatum est. Ceterum, presenti huic ægroto consilium dedi, ut una cum pulvere nostro præcipitante quatuordecim numero pilulas balsamicas alternis diebus fumeret.

## OBSERVATIO VII.

Vixit ante triginta circiter annos *Centu.* lebris in Academia nostra Professor, *max. ob-* vir provectioris ætatis, macilentus, *audito* qui cum per sedecim & ultra annos audiendi sensu in dextra aure privatus *facilest* idem malum sinistræ accidere auri de- *purgan-* *te cura-* prehenderet, meum imploravit auxilium. Quare ego singulis ægritudinis momentis probe perpenis a purgatione per pilulas cephalicas initium curationis suscipiendum statuens hancce præscripti formulam: Recipe Extract. panchymag. Crollii, Mercur. dulc. Cinnabar. aloes depurat. singulorum drachmam dimidiam, salis succini, trochiscor. Alhandal, resin. giallappana gran. XII. M. F. cum Balf. Peruv. ex scrupulo uno N. XIV. pilulæ, quas bis per hebdomadem mane adsumat. Ipse vero profundis meditationibus implicitus minime attendit præscriptum in capsula pilulis utendi modum, sed eas brevi intervallo obambulando deglu-



deglutit omnes . Binis circiter horis elapsis truculentis imi ventris cruciatibus, nec non nauseosa circa præcordia sensatione, crebrisque lithymiis correptus confestim me vocari iussit . Accessi igitur, & interrogatis tam subitanæ mutationis causis ægrum mox lecto tradendum variisque externis analepticis reficiendum curavi : tum vero, ut copiosolactæ & multis pinguibus utatur, suavis fui . Quibus effectum per Dei gratiam est, ut soluta alvi constipatione quater alvum, licet inter acerbissima ventris tormina deponeret . Proxime abhinc capitis dextrum laus vehementissimi occupabant dolores spastici, qui circa aurem maxime dextram tanta sæviebant atrocitas, ut somnum omnino adimerent . Sed percepto dein horrendo, instar bombardæ explosæ, in hac dolente aure fragore remiserunt, & qui antea absuit audiendi sensus perfecte rediit . Posthæc in sinistra pariter aure priori plane similis ludebatur scena, nec dissimili effectus ; siquidem hac ratione pristina auditus incolumitati noster ex voto redditus superstes adhuc & integer plus minus sex transiegit annos .

### EPICRISIS.

Notatu perquam dignus & plane mirabilis est purgantis acrioris in enormiori dosi ad surditatem sanandam effectus, quo docemur, ad magnos, eosque contumaces & inveteratos morbos tollendos non levioribus sed magnis & efficacissimis opus esse remediis . Procul dubio hæc surditas in nervo auditorio a tenaci humore obstructo oborta a potenti medicamento vehementem nervosis partibus motum, qui impactum humorem vecte quasi expulit, inducente simul & semel remota fuit, quod ex sonu fragoris interno cognoscere licet . Ne autem tanta purgantis acrimonia propter spasmos in intestinis excitatos languido & senili corpori majus inferret damnum, humectantia & pingua propinanda esse

consului, eo inductus ratiocinio : si virulentam arsenici acrimoniam hæc ipsa remedia in copia assumpta delinire & innoxiam reddere possint, multo magis ad acrimoniam purgantium demulcendam, ne noxam inducant, idonea esse .

### OBSERVATIO VIII.

Non adeo multo abhinc tempore mi-  
lit ad me Serenissimus Princeps insi-  
gnem militiæ præfectum, virum vigore  
& ætate florentem, ut ipsi auditum, <sup>Auditus</sup>  
quo penitus destitutus erat, restitue-  
rem . Cum in acerbi huius mali causam <sup>abolitio</sup>  
atque originem inquirerem ex salva-  
tionis mercurialis cura illud ortum du-  
xisse ab eo intellexi, quod ob insigne  
tædium & molestiam non totam istam  
sustinere voluerit, sed corpus nimis  
cito frigido liberiorique aeri commise-  
rit, a quo tempore caput gravari &  
auditus sensus turbari cepisset, ita  
prorsus, ut per duos nunc menses au-  
diendi facultate omnino careat . Perspecta  
sic mali causa curationem ita in-  
struendam duxi, ut humor vitiosus inter-  
rioribus ac sensibilibus auris partibus  
firmiter impactus accommodata medi-  
cina removeatur . Quo fine omnium  
maxime exquisitè corpus purgandum  
decevi medicamento, cui non infirma-  
vis sit, prævum subsistentem humorem  
a supremis & infimis locis proliciendi  
& foras eliminandi . Id quod hacce for-  
mula præstare solemus : Rec : Gummi  
ammon. depurat. Extr. rhabarb. alces  
rosat. mercur. dulc. cinnab. singulorum  
drachmam dimidiam, trochisc. Alhan-  
salis succini, croci, castorei ana gr.  
XII. M. F. l. a. cum Bals. Peruv. Pilu-  
læ ex scrupulo uno No. XX. quas pro  
dosi ter alternis diebus exhibuimus .  
Pro potu decoctum ex lignis tempera-  
rioribus paratum, vino interdicto &  
parciori victu præscripto, una cum  
pediluvii quovis die mane & vespert  
tepidè adhibendis commendavimus .  
Præterea externe gossypium balsa-  
mo nostro madidum vitæ auribus  
inden-

indendum nuchæque vesicatorium, quod in usu habemus, blandum atque benignum imponendum suavisimum, subjuncto simul ad mucum e naribus eliciendum pulvere quodam nostræ præparationis, sternutatorio. Quorum remedium energia id Dei auxilio effectum est, ut malo in dies magis magisque decrefcente longe meliorem audiendi facultatem noster adquisiverit & cum aliis sermones miscere potuerit, quantumvis malum non ex toto fuerit sublatum.

### EPICRISIS.

Quam efficax & præstabilis ad magnos ac præsertim ex contagio venereo ortos morbos eradicandos, cura est per salivationem perite & circumspicte tractata, tam nociva, imo pessima est, si ab imperito quodam homine, vel insuper habito convenienti regimine, suscipitur. Tantum enim abest, ut levamen adferat, ut malum potius exacerbet & pejora sæpius difficilisque sananda accersat symptomata, quod longa experientia edoctus plena fide testari possum. Ego a decenti regimine, quod ad sanitatem recuperandam sub hac cura summe necessarium est, neglecto, cum caput nimis cito frigori exposuerunt ægri, jam terna vice in artis exercitio plenariam observavi surditatem, eamque, quod non inter initia statim prospectum malo fuit, immedicabilem. Quod vero tam difficilis ex hac causa natæ surditatis sit curatio, hæc mihi subesse videtur ratio: Sub mercuriali cura a partibus extremis & infimis ad caput, maximeque ad glandulosas ac nerveas ipsius membranas seri vitiosi copia magno cum impatu adpellitur, quas, uti in palato, naribus & gingivis videmus, nimium relaxat; hinc nihil dubii est, quin etiam ad nerveas illas tunicas, quæ interiora auditus ossa & concamerationes cingunt, humor vitiosus delatus hæreat, qui dein a frigore inspissatus & impactus ex locis

ejusmodi magis abditis difficillime demovetur. Balsamum nostrum spirituosum, sicut ad omnia nervorum vitia a nimia laxitate orta; ita quoque ad auditum, si ex eadem causa perierit, restituendum, remedium multo pulcherrimum est & efficacissimum, quod humorem discutiendo egregium partibus robur addit. Si rursus mihi ejusmodi obtingeret casus, suaderem salivationem, sed meliori vitæ ordine & regimine denuo instituendam. Id quod vero ut inter initia statim fiat, necesse est.

Plures de auditus vitii casus legantur in Consult. ac Respons. Medicinali. Tom. I. Sect. I. Casu XXXIX. XL. & XLI.

### CAPUT VII.

#### DE APHONIA.

#### THESES PATHOLOGICÆ.

##### §. I.

**V**Oce loquelæ vulgo intelligimus *Diffinitio* productionem vocum articulata, *ita loqui* *& lo-* *quela* *..* tarum, animi conceptus cum aliis communicantem. Vox autem non articulata dicitur sonus, & est aeris expirati, atque per asperam arteriam, laryngem, hujusque rimam, quæ glottis audit, vi quadam expulsi, ad cava oris & faucium varie figurata facta illisio & repercussio. Quanquam igitur loquela a sono differat; tamen illa sine hoc fieri nequit, tantum abest, ut vitiatas, quæ edendo sono tributa sunt, organis, velus speciatim aspera arteria, ejusque caput, larynx dictum, cum annexis cartilaginibus, musculis, & nervis, nec non foris palati sunt, produci possit; & hinc deperdita sonum efformandi facultate, loquendi simul potentia perest, necesse est. Hinc jam ex antiquis **GALLENUS** *L. de præcog. post. h. c. 6.* multis *cvis*

evicit experimentis, quod nervorum recurrentium, qui ex pari vago & nervo accessorio efformantur, & ad laryngem, nec non docente novissime WINDSLOVIO *Anat. P. III. §. 112.* ad linguam tendunt, uno abscisso animal semivocale, utroque vero resecto, placet mutum omnique & sonum edendi & loquendi potentia destitutum reddatur.

## §. II.

Hoc vitium, ubi sonus cum loquela perit, quod in hystericis frequenter fit suffocationibus, vocatur a medicis *aphonia*. Nos autem, aphoniæ nunc nomen strictius summo, per eam intelligimus, loquendi sive voces articulatas producendi impotentiam, a solo linguae vitio pendens: ubi soni quidem produci possunt, sed lingua vocem articulatam extricare nequit, oppressisque potius conatibus conticescit. Huic valde affinis est linguae hæsitantia, quam balbutiem, das Stammeln, & ea laborantes Psellos vocamus: ubi voces quidem articulatae præferuntur, sed non satis distincte exprimuntur; quoniam lingua ad ideas tanta celeritate, quanta in mente excitantur, enunciantas, impar & quasi nimium gravis videtur.

## §. III.

Quum linguae potissimum vitium in aphonia accusamus, inque ea morbi sedem collocamus: operæ pretium erit, illius structuram, quantum nostræ tractationi faveat, paulo rimari. Est vero lingua musculus, omnium ferè mobilissimus; qui ob fibras varie figuratas, longitudinales, transversas, perpendicularares, acuminatas, angulosas &c. nec non musculos mylohyo- & genioglossos, æque ac illos, qui ossi hyoideo sunt tributi, in omnem plagam celerrime moveri potest. Dicti hi musculi vim suam movendi nanciscuntur a ramo tertio, qui audit maxillaris inferior, paris quinti nervorum, quod totum ferè motorium est; quemadmodum par nonum ad gustum efformandum destinatum esse

videtur. Hac volubili & in omnem partem mobili lingua, si soni ope laryngis formati in certas litteras modificantur, oritur loquela. Quo vero difficilior linguae motus est; eo difficilior fit loquela: & illo cessante, cessat loquendi potentia, licet soni satis clare produci queant.

## §. IV.

Quum motus alicujus partis ita minuitur vel tollitur per imminutum aut interceptum fluidi nervi in nervos influxum; nervi vero linguae motui destinati a pari potissimum quinto proficiuntur: facile patet, sedem aphoniæ in dicto nervorum pari quaerendam, ejusque causam proximam in plus minus imminuto fluidi nervi in illum nervum influxu collocandam esse. Et in hac confirmamur sententia, si consulamus anatomicas eorum sectiones, qui in vita fuerunt aphoni: sic testatur BONETUS in *sepulch. anat. L. 1. Sect. 22. obs. 7.* se in viro ex melancholia in furorem abeunte, & aphono ad mortem usque manente, cerebrum siccissimum, nervorumque origines siccissimas solitque graciliores, lingua illæsa, reperisse; & *obs. 20.* casum allegat ex RIVERO, de balbutiente mortuo, in cujus cerebro circa nervos linguales cystis reperta fuit, foramen habens, & continuum serum plorans.

## §. V.

Quicquid igitur influxum fluidi nervi in nervos motui linguae destinatos remorari valet; id ad aphoniam contribuit. Præcipua hinc consideratio debetur linguae paralyti, quæ vel antecedit, vel sequitur affectus hemiplegicos & apoplecticos. Talis nonnumquam occurrit in senibus, corporibusque valde languidis ac debilitatis; & si sola est, prælagit plerumque hemi-vel apoplecticum affectum, si vero hunc hunc excipit, cum torpore ipsius memorie ac ingenii complicatur, & prioris morbi recursus minatur. Lingua tali in casu ordinario est tumida, flaccida, semistupida, minimeque mobilis, gustus

gustus imminutus, & in hemiplexia in altero tantum latere vitata.

## §. VI.

Levioris prælagii est aphonía, quæ ex seroforum humorum stagnatione, vel plane secessione, nervos quinti paris ad linguam tendentes comprimente proficiscitur; neque tamen minus gravis est, curationis satis rebellis. Hæc fit post excretionem ac exanthemata serosa, intus acta, sovente cum primis tempestate humida ac pluviosa. Sic observationes de aphonía post sudores cohibitos in A.N.C. Vol. III. obs. 82. post catharrum non rite tractatum in FORESTO L. XIV. obs. 32. & A.N.C. Vol. II. obs. 67. post variolas relicta *ibid.* Vol. I. obs. 112. relatæ legimus. Ejusmodi secessio feri ad nervos linguales per externam quoque violentiam, isum vel casum produci potest: unde aphoniam ex casu ab alto subortam describit POTERIUS Cent. II. Cap. II.

## §. VII.

Oritur aphonía porro ex nimia sanguinis ad fauces, & linguam congestionem; quæ vero imminuta humorum mole protinus cessare solet. Sic de tali affectu per insequutam narium hæmorrhagiam sanato casum videas in A.N.C. Vol. III. obs. 113. Idem malum sequitur etiam inopportuna venarum raminarum sectionem, si in valde plethoricis, non præmissa in pede venæsectione instituitur: unde quoque graves faucium inflammationes excitari, frequens docet experientia. Cum primis vero ex hac causa subortam aphoniam novi in foeminis, menstruorum vitio laborantibus, ac hysterica passione divexatis: concurrentibus nimirum imi venteris spasmis, qui humores virales ad superiora cogunt; unde virgines circa pubertatis annos constitutæ, meniumque eruptionem primum experientes hoc non raro incurrunt vitium. Coniunctum illud hoc in casu esse solet, cum tumore ac rubore faciei & oculorum, valorem turgescencia, artieriarum vehementi pullatione, & deglutiendi difficultate.

## §. VIII.

Notabilis denique & satis frequens est aphonía, quæ vermicibus intra ventriculi & intestinorum canalem hospitantibus debetur. Talis subito invadit, & exturbatis vermicibus protinus remittit. Cognoscitur ex imi ventris torminibus vel prægressis, vel adhuc junctis; aliisque symptomatibus, vermium præsentiam significantibus: & originem trahit a spasmoticis partium imi ventris nervosorum contractionibus, quibus vitales succi valido impetu ad fauces & linguam compelluntur, ibidemque stagnantes nervos motui linguæ dicatos comprimunt. Ipse tales casus sæpenumero vidi, & feliciter curavi; nec aliorum auctorum desunt testimonia: vid. A.N.C. dec. III. anno. III. obs. 147. Vol. II. obs. 62. & ibidem obs. 160. exstat casus, de aphonía periodica, quæ toties invasit, quoties tormina a vermicibus fuerunt producta, hisque sopitis statim iterum cessavit.

## §. IX.

Dantur adhuc aliæ causæ, quæ in causa dispositis ad aphoniam plurimum contribuent. Tales sunt abusus potum spirituosorum, & frequens crapula, unde aphonix ex ebrietate ortæ jam HIPPOCRATES 5. aph. 5. meminit. Porro huc spectat gravis terror, & refrigeratio partium præsertim inferiorum: quæ momenta eo magis perniciousalem vim exerunt, si tempore, quo naturales fluunt hæmorrhagiæ, incidunt. Nec silentio prætermittenda tempestas pluviosa, & commoratio in locis humidis, maxime in subiectis pituitosis ac catharralibus. Prognosis aphonix pro ejus causis varia est: quæ enim ex vermium vitio, vel in passione hysterica, aut mensium difficili eruptione accidit, curata facilis est; quæ vero linguæ paralylin pro causa agnoscitur, omnem fere respuit sanationem; aut sanata facile redit affectumque cerebri graviolem prælagit.

CURA.

CURATIO CUM CAUTELIS  
PRACTICIS.

## §. I.

*Indica-  
tiones  
curatio-  
nis.* **A** Phoniam curaturus eo respicere debet, ut primum causas influxum fluidi nervi in nervos linguales, hos comprimendo remorantes removeat, & deinceps robur earum partium confirmandum curet. Quemadmodum vero illarum causarum multum inter se differunt: ita variam quoque medendirationem exigi, quilibet perspiciet; facileque colligetur, eam aphoniam, quæ causarum intra ipsius cranii thecam reconditæ debetur, sanationem admittere non nisi difficillimam.

## §. II.

*Cura  
aphonia  
ex illa  
gæ pa-  
ralysi  
phonia.* Quæ igitur ex vera linguæ paralyfi suboritur aphonia; poscit seri ad nervos & cerebrum decumbentis discussione & evacuationem. Repetenda hoc loco ea sunt, quæ capite de Paralyfi docuimus; & opus adgrediendum venæsectione, clysteribus paulo acrioribus, diureticis, sternutatoriis &c. speciatim in usum vocanda & ipsi extrinsecus linguæ sunt applicanda nervina & balsamica, quo nomine commendari solet aquæ spirituosæ liliorum convallium, primulæ veris, spiritus rorismarini, serpilli, formicæ, essentia ambre, balsami Peruviani, oleum cinnamomi, caryophyllorum, & nostrum vitæ balsamum, paucis guttis saccharo excipiendum, & sub lingua detinendum. Interne etiam dictum vitæ balsamum cum tribus spiritus salis ammoniaci vinosi, & duabus tincturæ antimonii acris partibus combinatum, bis vel ter quotidie ad XXX. guttas summo cum fructu exhibebitur: nec erit alienum, blanda nuchæ adplicare vesicatoria.

## §. III.

*Aphonia  
cathar-  
rallis en-  
ratis.* Si sudorem suppressiones, aut excretionum catharrallium cohibitiones ad malum contribuerunt: nihil superat diaphoreticorum & diureticorum

rite usurpatorum efficaciam; restituta enim diaphoresi, mox redire deprehenditur loquendi facultas. Laudem hinc merentur quam maximam insula theiformia, cum blando regimine potanda; spiritus cornu cervi succinatus, tinctura antimonii acris, essentia succini, maxime si cum essentia balsami Peruviani, aut balsamo vitæ nostræ permisceantur.

## §. IV.

Fit nonnunquam, ut sub ipsa mercuriali salivatione aphonia accedat; *Aphonia  
ex salivatione  
humoribus  
excessu  
humoribus  
excessu  
humoribus  
excessu* quando scilicet serosi ac salivales humores nimia quantitate ad fauces & a linguam redundant. Quo in casu dirigenda est curatio, ut humores isti a capite deriverent & evacuentur. *Phlegma  
excessu  
humoribus  
excessu* Præstant hoc decocta diaphoretica, calide bibenda; & laxantia, maximeque pilulæ cephalicæ, acriori stimulo imbutæ, non neglecto convenienti regimine.

## §. V.

In aphonia, quæ post insultus hemiplegici & apoplectici remanet, satiusque per-*Emplo-  
stium ad  
aphonia* tinax est, insignem usum emplastro-*aphonia* rum, quæ ex terebinthina, seu pice, & gummatibus Carannæ, masticis &c. parantur, & nuchæ adplicantur, observavi: reliqua enim, utut generosa remedia, hoc in casu, spem omnino fallunt.

## §. VI.

Si malum a nimia sanguinis versus caput congestione proficiscitur; omne-*Aphonia  
ex sangui-  
nibus  
curatio* fere curationis punctum conventienti sanguinis subtractione absolvitur. Hanc oportet esse largam, & pro circumstantiarum ratione vel per venæsectiones, in pedibus, brachio, & nonnunquam sub lingua instituendas, vel scarificationem ac cucurbitas administrare decet. Jungenda his pediluvia, quæ humores ad inferiora derivent; nec non interna antispasmodica nitroscæque, eoquod his in casibus infernarum partium spasmi plerumque sint complicati. Hinc operæ pretium faciant pulveres temperantes cum nitro cinnabarique mixti, aut

G liquor

liquor noster anodynus, cum essentia castorei maritatus.

## §. VII.

*Caute-  
circa  
generosam  
affectionem  
nervorum  
splenis-  
sa.*

Quamvis venæsectio remedium sit generosæ & magnæ ad hunc affectum æstus efficacis: attamen cavendum, ne ea promiscue utamur. In senibus enim, languidis, viribus exhaustis ac magis pituitosis subjectis plus adfert detrimenti, & præservandi apoplexiam sine julto liberalius adhibita, hanc potius provocat. Locum potius habet, ubi pulsus celer est & magnus, facies rubicunda, sanguineque turgida: quo tamen casu stricturæ infernarum parium clysteribus, frictionibus, ac pediluvii prius sunt demulcendæ. Ante tulam venam in plethoricis cavendum etiam est a medicinis calidioribus, spirituosis ac nervinis, earumque tam interno, quam externo usu; quoniam humores magis commovent; eorumque raptum ad fauces augent.

## §. VIII.

*Externa  
remedia  
anodyna  
anodyna  
anodyna.*

Si spasticæ constrictiones faucium & linguæ aphoniam prodixerunt; uti sit in hysteris & hypochondriacis paroxysmis, in quibus deglutienti est difficultas: plus juvant externa paregorica, quam interna remedia. Commendantur nimirum eo sine frustulum castorei, vel nucistæ, vel theriacæ, vel salviæ sub lingua detentum, aut balsami vitæ cum liquore anodyno mixti paucæ guttæ linguæ instillandæ. Præterea operæ pretium faciunt clysteres carminativi, totus & incessus emollientes ac pediluvia.

## §. IX.

*Aphonia  
anodyna  
anodyna  
anodyna.*

Quæ denique vitio vermium intra canalem intestinorum stabulantium sit aphonia: facile curatur anthelminticis, ac iis remediis, quæ stricturas intestinorum demulcent. His enim quiescentibus, redit loquendi facultas; sed nondum sublata causa, quam vermes præbent, sæpius iterum aboletur. Quare sub quiete spasmodorum opera est danda, ut ingrati hospites convenientibus & corpore proscribantur adminiculis.

ENARRATIONES  
MORBORUM.

## OBSERVATIO I.

**V**irgo spongiosioris habitus, floridæ faciei, sanguinis & succo-plena, & octodecim annos nata, aliquando cum mensium patiebatur profluvium in itinere constituta, nimirum semet exposuit frigori. Domum redux dolore capitis gravativo, turgidis ac rubicundis in facie existentibus vasis, corripiebatur; noctem transiebat inquietam, & mane omni loquendi potentia se destitutam sentiebat. Hæc per quatuor durabant dies; quibus nec cibum nec potum adpetebat, somno fruebatur turbulento; mens tamen & omnes sensus sibi constabant, ac extremæ quoque partes calore persusæ erant. Medicus, cum alium strictiorem deprehenderet, clysterem protinus infundi; deinde ex vena in pede tusa tres cruoris circiter uncias detrahi iussit: sed aphonia magis invalescebat. Ego vocatus, & pulsus adhuc celerem atque magnum animadvertens, venam rursus incidendam, septemque sanguinis uncias adhuc mittendas curavi: & postea, pulsu satis valido existente, essentiam castorei, cum spiritu salis ammoniaci & liquore anodyno minerali remixtam, triginta ejus guttas quavis quarta hora ex aqua liliiorum convallium fumendo, ordinavi. Brevi post per totum corpus erumpebat sudor, facies detumescibat, somnus erat tranquillior, & continuata per nycthemeron medicina, loquendi facultas omnino redibat.

## OBSERVATIO II.

Priorem casum illustrat alius, qui sic se habet: Puella novem annorum macilenta, ex refrigeratione corporis maximeque pedum noctu facta, mane in loquendi difficultatem cum lingua tumore incidit. Præscripta protinus exter-

externa pariter ac interna cephalica & nervina nihil utique ferebant opis. Hinc vocatus ego, cum adhuc frigidos deprehenderem pedes, eos fricari & pediluvio ex aqua simplici, fursibusque triticeis bis quotidie imponi jubebam: quibus spem fallentibus, suadebam, ut binæ cucurbitulæ cum scarificatione brachiis admoventur. Quo facto post aliquot horas magnum sensit levamen; & adhibito subinde capitiluvio, quod ex vino cum herba thymi, saturejæ, serpilli & majoranæ confectum erat, perfectam recuperavit sanitatem.

### EPICRISIS UTRIVSQUE CASUS.

In hoc utroque casu debetur aphonia congestioni sanguinis ad caput; quæ per partium inferiorum refrigerationem fuit provocata, & quidem majori cum periculo in priori casu, ubi simul cohibita sunt menstrua. Adplicata in hisce casibus morab initio specifica cephalica, volatilia & nervina plus nocent, quam profunt, siquidem stagnantem sanguinem magis commovent, & calefaciunt. Iis potius opus est remediis, quæ derivant a capite congestionem, & infernarum partium stricturas demulcent: quorum primaria sunt pediluvia & sanguinis missiones. Pediluvia non ordinare soleo, si pedes existunt frigidi: nisi per frictiones hi paululum caluerint. Sanguinis missiones in sceminis, menstrua & horum retentionem passis per venæsectionem in pede; in tenerioribus autem, quæ lunare nondum persolverunt tributum, per cucurbitulas cum scarificatione brachiis admodas, quæ etiam in pueris & infantibus locum habent, summo cum fructu sæpius institui. Sed notari meretur, sanguinis detractionem sufficentem esse debere, quoniam, si parcior fuerit, plus intendit detrimenti: unde eam in priori casu repetendam putavi. Si pulsuum vehementia adhuc continuat, subjun-

genda antispasmodica; & denique blanda nervina.

### OBSERVATIO III.

Requisivit haud ita pridem vir egre-<sup>Aphonia</sup>gius & de nostra arte optime meritus<sup>vermi-</sup> meum supra singularem adfectum consilium, quem in conspectum dare operæ pretium erit: Hæc loco natus puer, qui vegeta semper usus valetudine nunc undecimum complevit annum, nec levissimiquidem loquelæ vitii per totam vitam suam meminit, ex improvviso loquendi destituit potentia, adeo ut præter verbum Mama, quod sub magno nisu voceque submissa, profert, nihil omnino articulata voce pronunciare queat. Accedunt insuper molestiæ hinc inde tensiones spasticæ, quæ totum cervicis & dorso tractum in consensum rapiendo insignem his partibus torporem movendique & flexendi impotentiam inducunt. Medicus tam acerbi mali causam in verminosam rejiciens progeniem varia contra vermes alias efficacissima eaque laxantia, roborantia, antispasmodica & præcipitantia adhibuit remedia tantumque profecit, ut dejectis quindecim lumbricis, ciborum adpetentia cum virium aliquo augmento redierit, somnus tranquillior & alvus quotidie lubrica sit; at veio grave istud sermone impedimentum sine ulla in melius conversione per quinque nunc hebdomadas pertinacius insistit. Ego igitur primo omnium vermium colluviei melius educendæ consulendum arbitratus sequentes ob egregiam vermiumque contrariam indolem suam mihi frequentes pilulas præscripsi, quarum septem bis in septimana, maximeque circa lunæ mutationes propinare jussi, interjectis pulveribus ex salis amari gr. XV. nitri purif. Corall. ana gr. vi. compositis. Formulæ autem pilularum hæc fuit: Rec. Alæ foetid. myrrh. elect. extr. ranacet. rhubarb. alces. rolat. mercur. dulc. ana drachmam unam, extr. croci gr. vi. M. F. l. a.

eum eff, castorei Pilulæ ex scrupulo No XX. Denique, ut externe quoque suppetias feramus, partes a spasmis nimium debilitatas roborando, per intervalla collo & cervici imponendum suavisimum epithema, quod ex aquæ Anhaltin. spirituosæ uncis quatuor, bals. nostri vitæ uncia dimidia & bals. Peruv. drachmis duabus confectum erat. Quorum remedium usu per aliquod tempus protracto loquela indies melior redire cepit.

### E P I C R I S I S.

Varia & terribilia subinde sunt, quæ a verminosa progenie in nervosarum partium systemate concitantur symptomata, quorum quidem causam ego non tam in ratione tunicarum intestinalium nervearum, quam potius in exhalationibus acerbis causticis, quæ ex vermium corpore & excrementis exspirant, quibusque omnis generis infecta scatent, reponendam esse statuo. Innumera fere sunt, quæ adversus peregrinos hosce & virulentos corporis hospites habentur & venditantur remedia; sed ego præter mercurium dulcem cum purgante, ut resina giapp. vel diagryd. sulphurato mixtum nec præfentiora inveni nec securiora, quam asam foetidam, tanacetum, alium, semen fantonici, camphoram & denique lupulum, quæ odore potius animaculis hisce adverso quam alia quadam substantia suam exerunt operationem.

### OBSERVATIO IV.

*Totally  
the  
case  
was  
fatal.*  
Octo annorum puer annuo abhinc tempore corripiebatur variolis, quæ cum rarissime adparerent & post eruptionem protinus subsisterent, accidit, ut variis exinde morbis fieret obnoxius, maximeque crebris defluxionibus sollicitaretur serosis, quæ tussim, raucedinem & coryzam subinde inducere solebant. Hæc quidem sym-

ptomata congruis medicamentis sæpius fuerunt mitigata; at vero, quum proxime abhinc magna abdominis cum duritie quadam jungebatur intumescencia, bis medicus intra breve spatium medicinam exhibuit vomitoriam, sed infausto plane effectu; siquidem coactas hæc vomitiones non adeo multo post excipiebant vomitus spontanei, qui cum gravi diarrhæa stipati per octo decemve dies misere nostrum ægrum divexabant. His dein compositis, cum subitanea visus obscuracione tanta linguæ accedebat immobilitas sermonisque difficultas, ut ne verbum quidem puer, licet anxie nitens, proferre posset. Præter hæc insignis caput tumor omnesque artus vehementer occupabat tremor & lassitudo, quæ adeo ingravescerebat, ut viribus magis magisque dejectis tandem animam placide exspiraret.

### E P I C R I S I S.

Nullus fere morbus est, qui tam dira tamque varia & per multos annos durantia in infantibus post se relinquit symptomata, quam ipsa variolosa febris, si aut variolarum eruptio & suppuratio non recte procedit, aut exantlato morbo sanguinis & humorum massa per remedia sanguinem depurantia aptamque victus rationem, in convenientem temperiem & eucrasiam non redigitur. Hinc certe in praxi medica occurrit frequentissime, post variolas & morbillos a læsis pulmonibus pectoris morbos, ab affectis visceribus abdominis tumores & indurationes cum alvi fluxibus; & a tumore glandularum melsaricarum scirrhuso atrophiam reliquarum partium concitari. Nihil autem est absurdius & periculosius, quam citra ullam indicationem medicinam exhibere emeticam, qua pro dolor! in nostro ægroto non modo alvi fluxus fuit proritus, sed etiam impurum serum ob graviores spasmos ad cerebrum cum im-



impetu propulsum primo nervi optici, dein quoque sublingualium paralyfin effecit, quibus mors tandem supervenit. Ideo vero maxime hanc observationem allegare placuit, ut probe constet, quantam medicamenta imprudenter adhibita adferant noxam, & quam frequenter medici, quod dicere pudet, morborum imo mortis causa existant.

## OBSERVATIO V.

*Aphonia ex infultu apoplestico.* Vir octogenarius, habitu corporis succiore præditus, ter minimum in anno, ut februario, junio & octobri mense sanguinem e vena tusa emittere solitus, vitam ab omni morbo egit immunem, viribusque & animi & corporis probe semper valuit. Hac vero æstate, cum regiones nostræ a feruidissimo solis æstu præter consuetudinem incallescere, suavis alius medici consuetum illud evacuationis genus neglexit. Sed subito inde insultu correptus apoplestico, arteriis valde pulsantibus, oculis rubentibus totoque corpore æstuante omnem sensum una cum loquendi potentia amisit. Sub tali rerum statu ego consultus primo omnium venam in brachio aperiendam, ventrique clysteres emollientes injiciendos & balsamum vitæ nostrum, non post habitis aliis remediis, ori naribusque admovendum suasi. Quibus Dei auxilio id effecimus, ut mitigata morbi & symptomatum atrocitas mente æger ad se redierit, præter quod hæsitantia linguæ diutius permanerit; quam tamen frequentioris cum vino, cui aliquot ballami nostri guttulæ instillatæ erant, collutione felici eventu superavimus.

## EPICRISIS.

Quam efficax atque egregium in plurimis senum morbis & avertendis & abigendis remedium sit V. Stio, vel sola hæc observatio evincere potest. Neque deficit ratio: in ætate enim

Tom. IV. Pars IV.

provehentioribus, maxime si firmo adhuc stomacho & integra appetentia gaudent, ob exercitationis defectum corporisque inertiam non tam facile, ut in juvenibus, superabundantis sanguinis consumitur copia: & si natura ab hoc onere minus se liberat, necesse utique est, ut arte subtrahatur; quod venæ incisione perficitur commodissime. Perperam igitur & male fundata inductus ratione sanguinem inter dies caniculares evacuare prohibuit medicus, quod tamen eo magis fuisset necessarium, cum ea tempestate sanguis nimis ob auctum expansionis & orgasmum gradum facile hinc inde in partibus nobilioribus subsistere & graves admodum inducere valet ægritudines. Nec dubitandum, quin in nostro casu a simili cruoris in capitis venis stagnatione levior ille apoplexiæ insultus cum sermonis difficultate originem duxerit; quo fine ego in curatione adoranda primo omnium venam in brachio tundendam cum præsentaneo ægri levamine commendavi. Dein vero clysteres emollientes ventri infundere & ad effraniem sanguinis motum compescendum aliquot per intervalla pulveris nitrosi doses porrigere iussi, subjuncto simul infuso theiformi, ex herba melissæ, beton. cardui bened. floribus salviz & anthos composito, quod cum paucis olei macis guttulis fæcharo infusus bibere æger debuit. Ceterum hac morbi historia confirmamur, nulli fere morbo quam apoplexiæ aphoniæ sociari frequentius, adeo, ut etiam aliquod tempus post non raro remaneat & facillime generetur, si a stagnante intra caput sanguine serum secedens poros cerebri penetrat & radices nervorum relaxando sensum motumque earum partium, ad quas nervi excurrunt, hebetat ac labefactat.

## CAPUT VIII.

## DE DELIRIO MELANCHOLICO ET MANIACO.

## THESES PATHOLOGICÆ.

## §. I.

*Melan-  
cholia  
et ma-  
nia gra-  
de transi-  
t.* **H**Aud paucos fore arbitror, qui mirabuntur, me affectus, qui natura & symptomatibus plane dissimiles videntur, in uno capite pertransandos fuisse & ad unam retulisse speciem. Attentiori vero usu & observatione discimus, utrumque morbum ex una eademque origine & causa contingente, videlicet nimio sanguinis ad imbecille cerebrum appulsu, suboriri & nisi gradu ac invasionis tempore variare, adeo ut melancholia pro morbo primatio, mania vero pro ejus exacerbatione & effectu accidentali habeatur rectissime. Id quod etiam quam optime Medicorum agnoverunt veteres. Hinc TRALLIANUS *Lib. 1. cap. 16.* nihil aliud esse maniam prodidit, quam melancholiam ad majorem gradum redactam, ut propter tam arctam connexionem facillime ex uno morbo in alterum fiat transitus. ARETÆUS *Lib. 3. cap. 5.* melancholiam maniae initium & originem esse, illamque incremento magis quam alia causa in furorem prolabi perhibet. Quam conspirationem etiam quotidiana & attentior confirmat observatio, cum melancholici, præsertim si morbus inveteratus fuerit, perfacile in maniam incidunt, qua cessante melancholia rursus sese prodit, licet postea per certas periodos furor revertatur. Neque admodum diversa est ipsa medendi ratio: quicunque enim consilio & arte causam melancholiz propiorem vel levare vel tollere recte didicit medicus, ad maniam quoque vel avertendam vel sanandam admodum existit idoneus.

## §. II.

Ante vero quam meditatio nostra in *signa  
melan-  
cholia* interiorum horum affectuum naturam, genesis & differentiam descendat, placet omnino, quibus phænomenis, symptomatibus ac notis tam melancholia quam mania sese prodit & dignoscatur, ex veterum, maxime Græcorum monumentis proponere, eo quod hisce regionibus variz deliriorum species admodum olim fuerunt familiares. Nullus vero rectius & accuratius horum morborum descripsit historiam, ipso ARETÆO, qui *Libr. 3.* inter notas melancholicorum has ponit: quod tristes, abjecti torpentique sint absque ratione, ingenti pavore trepidant, male sint animati, vigilent, solitudinem ament, in iram proni atque mutabiles sint, de minimis quibusque rationem querentes, nihil largientes, sed non ita multo post simplices & prodigi. Addit deinde, alvum plerumque aridum esse, jam nihil dejicere, jam vero sicca, rotunda atque humore bilioso circumfusa; urinam paucam reddi, acrem & biliosam, multum flatuosi spiritus in præcordiis esse, ructus putridos, graveolentes ex ore ferri, nonnunquam & humidum quoddam acre cum bile rejici, faciem impalescere, arteriarum motus parvos esse, pigros atque invalidos, & ægros in sumendo cibo esse avidissimos.

## §. III.

Signa, quæ maniam indicant, idem *signa  
mania* gravissimus Auctor ira describit: Ad iram excitati maniaci furore penitus insaniunt, quidam magnum spatium decurrunt, nonnulli vociferantur; alii ab hominum conspectu in solitudinem fugiunt & secum tantummodo versantur; alii sua membra dilacerant. In summo ægritudinis impetu variis secundum quietem visis perturbantur, immoderate venerem concupiscunt & palam sine ullo aut pudore aut timore concumbunt. Cum vero inclinatus est morbus, stupidi, quieti, mæstique sunt; in notitiam quoque morbi veniunt.

nientes sua calamitate miseriaque tristantur. Et hæc sunt, quæ morbum aut præsentem aut desinientem comitantur symptomata; paucis nunc, quæ in artis exercitio diligentius annotavimus signa maniam antecedentia nos suppeditebimus. Inter hæc vero præcipua sunt oculi rubentes sanguineque suffusi, palpebrarum inconstans vibratio, mutati a solito mores, superbia vultu, voce & gestibus se prodens, stridor dentium, odium erga hunc vel illum singulare, fomnus parvus, cephalalgia vehemens cum auditus excellentia auriumque tinnitu & sonitu musico: quo referri etiam meretur insigne illud, quod inerescente morbo pollent maniaci, membrorum robur frigidissime tolerantia incredibilis, nec non in feminis collectio sanguinis in mammis.

## §. IV.

*Differt.* Verum enim vero, cum hæc manie signa valde etiam communia sint delirio acuto, quod phrenitidis nomine venit, indicandum omnino est, in quo utriusque discrimen statuendum sit. Si quando igitur in acuta febre delirium est, vel in ejus vigore sequitur & levata febre mens redit, phrenitis appellari solitum est. Neque id genus morbi aliud desiderat remedium, quam quod curandæ febri idoneum est. Quod si autem furor longius recipit spatium nullamque febrem junctam habet & ex statu melancholico emergit, maniam dicere affectum in scholis medicis usque eo receperunt. Neque silentio prætermittere oportet, dari adhuc insaniam seu desipientiam, quæ nec melancholiz, nec manie aut phrenitidis nomine recte exprimitur, ejus generis est, quæ in homine etiam sano ab assumpto narcotico, ut solano furioso seu ejus baccis, lolio temulento, hyoscyamo & ejus semine, statuta, ut pluribus constat exemplis, excitatur; quæ tamen accommodata medicina adhibita brevi remittit penitusque tollitur.

## §. V.

Ut vero proprios & proprias horum singulorum affectuum continentes causas, ad quas tollendas unice vera medendi dirigi debet methodus, eo accuratius dignoscamus, e re omnino erit operæque pretium, ut, quæ in sectione eorum, qui his deliriis perierunt, inventa fuerunt, proferamus. Notatum vero digna est observatio, quæ in M.N.C. p.234. Dec.11. Ann.6. de mania dissecto legitur his verbis: multas in cerebri basi ad instar retis complicatas vasorum carotidum & vertebralium ramificationes observavimus: post exemtum cerebrum in pelvi relicta feri cruentati propemodum sex unciz fluitabant: elevata deinde digitis in basi cerebri medulla oblongata & detectis ventriculis a latere sitis in conspectum venit plexus choroidæ prægrandis, ab utroque latere totam anteriorem ventriculorum superficiem perreptans & ex multis insignibus valis sanguiferis constans: ubique hic plexus vesiculis lividis pifformibus repletus fuit, quæ lanceola apertæ serum gelatinosum fundebant. Sic quoque *Henricus ab HEER*, *Obs.* 3. pag. 45. de maniaci anatome hæc refert: inventum fuit cerebrum siccissimum, durum & in summa parte digitis friabile, flavedine citri æmula undique ad altitudinem digiti tinctum; observatum circa ventriculos mollius & humidius, nervorum origines comparuerunt sicæ.

## §. VI.

Singularis quoque debetur animadversio anatomiz phrenitici, quæ in M.N.C. Dec.11. Ann.14. obs.162. habetur, ubi vesicula fellis bile picis liquida instar repleta inventa fuit & sinus falciformis massam polypiformem continebat: pia mater multis valis turgida accurate a cerebro separari poterat, tunica longe erat crassior & amplioribus instructa valis. Similis mihi obtulit observatio ante triginta & ultra annos in studio nobili extreme melancholico, qui delirio in statu va-

*Scito delirio morbo-ram*

*Const-  
nuta  
fuit ante  
bifloria.*

riolarum accedente moriebatur. In sectione musculi totius corporis valde densi, compacti & robusti nulla pinguedine obducti, (nam panniculo adiposo fere carebant,) conspiciebantur; vesicula felleis tota repleta erat bile crassa & instar picis nigerrima, quem atrum colorem etiam nunc in scribiis meis adservata exhibet: pancreas magnum, crassum & durum se silebat. Vasa duræ & piæ matris sanguine crasso turgida & in hac varicosa apparebant, & sinu saliciformi concretio sanguinis atrii in polyposam substantiam concreti extrahebatur atque ventriculis cerebri livescens serum innatabat.

## §. VII.

Quibus recte & diligenter perspectis sedem & interiore horum deliriorum causam jam clarius exponere atque ex his suppositis singulorum non nominalem sed realem exhibere definitionem, in proclivi est. Melancholia igitur est firmiter cum mente alienata phantasia, certis objectis valide inhærens, cum diuturno animi angore, inquietudine, metu & tristitia sine ulla causa manifestata, a valde difficili sanguinis copiosius in cerebro congesti ac stagnantis per vasa ejus progressu obor-  
 - manifestata. Mania vero est violenta insania cum temeritate & ingenti membrorum robore conjuncta, a vehementiori sanguinis crassi, copiosi & melancholici per cerebri vasa cum magno æstu transfusione proveniens. Phrenitis denique est insania cum febre, a phre-  
 - nitis, ita sanguinis inflammatoria in vasis cerebri orta.

## §. VIII.

Sedem igitur omnis delirii in cerebro esse, clarissime intelligitur, quam etiam ipse HIPPOCRATES libro de morbo sacro probe agnovit, hæc parte, inquit, sapiamus & intelligimus & videmus & audimus, & turpia & honesta cognoscimus, & hæc ipsa etiam insaniamus. Nam cerebrum omnino est pars illa corporis nobilissima, in qua plane occulto & inexplorabili

modo divina sapientia eminens & valde sublime mentis sive spiritus immortalis, neque minus ingenij, phantasia & memoriæ sensuumque exteriorum recondere voluit domicilium. Quamvis vero istius principij intelligentis & sensitivi natura & essentia, ex qua ejus effectus ac facultates profluunt, plane sit abstrusa & menti humanæ incognita, id tamen per accuratam & attentam observationem didicerunt medici, quod pro diversa sanguinis natura, conditione & motu per cerebri vasa eminentes illæ facultates animæ tam rationalis quam sensitivæ mirifice variant, immutentur & pervertantur, adeoque morum, inclinationum & desideriorum differentia ex hoc fundamento explicari debeat. Id quod jam olim in dissertatione de temperamento fundamento morum & morborum suis deduxi.

## §. IX.

Quod itaque ad causas deliriorum proximas attinet & continentes, veteres, quibus sanguinis circuitus ignoratus fuit, varias & plane alienas in medium prodixerunt. Ita horum alii atram bilem exundantem ejusque raptum ad caput, nec non nimiam cerebri siccitatem; alii ex recentioribus spirituum animalium in melancholia naturam siccam & aquæ stygiæ æmulam, in furore vero inflammabilem & sulphuream accularunt indolem. Sed nostro jam tempore non modo corporis sed & animi morborum causas longe rectius ex sanguinis conditione explicare novimus, a qua sententia nec vetustissimum Auctorem HIPPOCRATEM alienum fuisse ex libro de flat: intelligi potest, ubi scite dixit: sanguis multum confert ad prudentiam, ut ut hæc permixtetur & opiniones peregrina mentem occupent animumque perecllant, si is conturbatus & perturbatus fuerit, & eodem loco sanguis si in constanti habitu consistit, consistit etiam prudentia, eo vero permixtato, hæc simul concidit.

## §. X.

## §. X.

*Anima  
functiones  
in  
hominis  
unde de  
pendit.*

Et certe constanti observatione & experientia habemus comprobatum, omnes illas, quæ animæ adscribuntur functiones, ad quas sanæ rationis, ingenii & phantasie vires una cum inclinationibus referimus, secundum naturam & ordinem se habere, si sanguis iusta temperie & quantitate gaudens ad cerebrum delatus per ejus vasa placido, libero & æquabili fertur itinere, adeo ut hac ratione sensus etiam externi, nisi virium in ipso organo sit, recto ordine succedant; has omnes vero nobilissimas functiones & immutari & perverti, imminui vel penitus deficere, quando videlicet sanguis & humores a naturali temperie & quantitate destituentes ad cerebrum deVecti non æquabili & moderato, sed valde difficili, tardo & impedito, aut nimis celeri & vehementi motu progrediuntur.

## §. XI.

*Causa  
Melancholici  
aberramus  
in præ  
stima.*

Quæ cum ita sint, a vero nos haud aberrabimus, si causam melancholici affectus continentem in sanguinis crassioris nimio ad imbecille & dæcescens cerebrum appulso, stagnatione & difficillimo progressu; furoris vero originem & fundamentum in sanguinis crassioris & melancholici vehementiori & impetuoso per cerebri vascula & fibrillas motu collocamus. Cujus assertionis veritatem ex infra dicendis, ubi convenientem causarum antecedentium & remotarum nexum monstrabimus, rectius dijudicare licebit.

## §. XII.

*Quæ  
causa  
demon  
stratur.*

Quum vero jam supra satis clare & ad oculum per anatomem delirii dysfunctionum demonstratum dedimus, in variis corporibus dissectis non modo sanguinis motum per caput immutatum & plane perturbatum fuisse, dum vasa nimio sanguine infarcta & varicosa se præbuerunt, ut propter stagnationem serum extra valvorum alveos effusum in basi cerebri sat magna copia repertum sit; verum etiam cerebri corticem & medullam sua texture

laxam maleque affectam apparuisse; nemo sane dubitare amplius poterit, & horum affectuum & mortis causam in hoc ipso præternaturali statu ponendam esse.

## §. XIII.

His itaque constitutis, sequitur jam *Causa* ut dispiciamus, quænam ex reliquis *mediatæ* causarum generibus ad anomalum *causæ* illud & plane perversum sanguinis per capitis & cerebri vasa cursum *causæ* symbo- *causæ* lum suum conferant. Inter has *causæ* primum locum peculiaris cerebri debilitas, quæ recte dici meretur mediata causa deliriorum, obtinet, utpote si- ne hac præcedente non tam facile adeo grave motus sanguinis vitium in hac parte exoriri potest. Et hæc quoque præcipua fuit ratio, quare varias has deliriorum species in hoc Tomo IV. nostræ medicinæ systematicæ, ubi de morbis atoniæ agitur, pertractandas constituerim. Ad illam vero ingignendam præcipue referendi sunt graves animi affectus, præsertim diuturnus moeror, tristitia, metus, animique augor ac terror, quorum magna est, sicut ad omnium partium, ita etiam cerebri robur debilitandum & vim valvorum systolicam imminuendam potentia. Ad quam classem etiam acriter mentis labores atque inopportuna studiorum causa diutius protractæ lucubrationes pertinent, quibus ob dissipatos spiritus sic dictos animales, flammam, quæ in cerebro & medulla oblongata sunt, vis motrix & sensitiva mirum infringitur. Et inde quoque intelligi potest quare litterati & quinimum meditationibus indulgent, plus quam plebei mentis alienationibus sint obnoxii.

## §. XIV.

Deinde ex causis, quæ ad gravissimam disponunt deliria viresque animi *Amor* ac corporis destruendo & valvorum *animæ*, membranarum ac flammam cerebri tonum debilitando plurimum valent, multum sibi vendicat vesanus amor, de quo observationes legi possunt apud FOREST. lib. 10. obs. 29. & 30. BAR.

**BARTHOLINUM** *Cent. II. hist. 69.* it. apud **VALERIOIAM** *Lib. II. obs. 7.* Maximam tamen noxam infert amor in feminis viri potentibus sed nondum nuptis, qui a genitalis liquoris, sub otiosa maxime & laeta vita liberalius in glandulis vaginalibus secreti longiori mora & corruptione provenit, quod testantur observationes, quales exstant apud **PLATERUM** *Lib. I. prax. cap. 3. Gregor.* **HORST.** *T. II. op. Lib. 2. Obs. 68.* & **EPHEM.** *Obs. 126. Dec. II. Ann. 10.* Cum enim lege commercii, quod animæ cum corpore ejusque fluidis & solidorum motu intercedit, ex copiosis congesto & stagnantes in organis spermaticis semine imagines & ideæ venereæ in phantasia excitantur, sit omnino, ut phantasia firmissime hæc ideis inherente usus rationis sæpius minuat & invertatur. Neque plane de nihilo est statuere, spirituosum seminale liquidum mora corruptum per vasa lymphatica redire ad sanguinem & quasi ex consymbolismo fluidum illud, quod in sanguine, cerebro & nervis motibus & sensibus præest, contaminare, ut hac ratione ingens virium oriatur defectio.

## §. XV.

Porro observationes testantur medicæ, a nimia feminis tam voluntaria, quam involuntaria profusione morbum melancholicum tum maniaci profluxisse originem. Ita **Henricus ab HEER** *obs. 60.* exemplum sexagenarii producit, qui a nimia feminis sub diebus canicularibus profusione melancholicus redditus est, & **FORESTUS** *in Obs. Lib. 10. obs. 25.* juvenem quandam melancholicum mediæ ætate juveniculam uxorem ducentem & ex effreni veneris usu in furorem coactum fuisse refert. Nam nihil notius est, quam quod semen delibatissima & agilißima sanguinis pars sit eandemque fere indolem cum fluido nervorum habeat; unde etiam fieri observamus, ut a immo-  
nimia feminis profusa

tentur, imo etiam alii, qui ex cerebri vitio nascuntur, morbi progignuntur.

## §. XVI.

Multum quoque nosse refert, deliria quæ diutius protrahuntur, certis familiaribus admodum esse solennia, adeoque ad morbos hæreditarios, qui a parentibus ad liberos transferuntur, justissime referri. Quorum morborum, ut ego quidem arbitror, vix alia subest causa, quam quod morbida & invalida partium solidarum & motricium natura ac textura per nativitatem propagetur, maxime si generationis tempore his affectibus parentes correpti fuerint.

## §. XVII.

Nihil vero tam celeriter & inopinato, etiam sine ulla alia causa præcedente, sanum ceteroquin hominem in dementia præcipitare potest, quam narcoticum sive stupefactivum, inscienter adsumtum. Hincres per experientiam satis nota est, quod a semine datæ, hyoscyami, a baccis belladonæ &c. brevi tempore perfecta amentia induci possit. Si quis vero paulo curiosior fuerit in nocentissima horum energia inquirenda, consulat observationes de his paulo diligentius conscriptas, quales reperiet in **M. N. C. Dec. III. Ann. III. obs. 70.** **WILLISIO** *de animabus. Cap. 12. p. 2.* **MATTHIOL.** *in Diof. p. 756. 988.* **LOBELLO** *in nevris stirpium adversarii.* **ROBELLO** *Cent. IV. obs. 45.* **HELMONTIO** *lib. demens idea.* Neque exercitationibus medicis ignotum est, eas medicinas, quæ opum habent, in delirio improvide datas illud magis intendere & contumacius reddere, tantum abest, ut component, aut levamen afferant. Cujus plane peculiaris effectus rationem invenire non adeo obscurum est, si consideramus, hæc ipsa remedia sulphure quodam abundare valde vaporelo, naturæ adverso atque graveolente, quod calore resolutum in corpore in exhalationes explicatur, quæ minimis cerebri & nervorum poris profundius  
nervosa & spirita

in li-

insinuatæ fluidi ibi purissimi vim motricem & fibrillarum nervearum glaterem labefcunt, adeo ut omnium sensuum & motuum notabilis fiat defectio atque inversio.

## §. XVIII.

*prægressi morbi.* Ad destruendum cerebri vasorum & flaminum naturalem tonum ac tensionem multum quoque prægressi morbi, præsertim acutæ febres faciunt. Hinc quid observatio frequentius est, quam quod post febres ardentes, præsertim diutius protractas, post febrem sic dictam Hungaricam, synocham putridam, cholicam seu caustum, interdum quoque post variolosam, phrenitides & ex hisce demum chronicas deliriorum species proficisci. Cujus effectus ratio ex facili inde potest repeti, quod sub tanto febrili æstu, qui plerumque cum assidua vigilia conjunctus est, nervum fluidum, quod tam sensibus quam motibus perficiendis speciatim dicatum est, dissipetur. Læditur quoque exinde non parum ipsius cerebri fibrosa textura & structura, ut deinde nec secretio liquidi animalis rite perfici possit.

## §. XIX.

*Ebrietas.* Ultimo loco, ad cerebri imbecillitatem & fluidi nervi vitiatam indolem immodicus spirituosorum potulentorum abusus & inde profecta ebrietas multum momenti adfert, quare etiam non minus eleganter quam vere ebrietas a SENECA epist. 83. dicitur insanis, vinolentiam, inquit, crudelitatis sequitur, violatur enim exasperaturque exinde sanitas mentis.

## §. XX.

*a) Sanguis.* Ordine jam accedimus ad eas causas inquirendas, quibus sanguinis motus ex partibus interioribus impetuosius ad caput urgetur, inter quas nihil omnino, quod tam subito melancholiam in maniam convertere, aut silentem resuscitare paroxysmum valeret, reperimus, quam vehementem iram, qua majorem in maniacis causam vix ullam esse jam olim GALENUS lib. 6. aph. 23. reputavit, præsertim si vana

superbie opinio & fastus, odium & vindictæ cupiditas jungantur. Equidem melancholici natura ad iram concipiendam difficiles sunt; quia tamen ubi semel data occasione accensis sunt, tam effrato furiantur impetu, ut nisi ægrius componi possint. Nocet vero ideo maxime melancholicis ira, quia sanguis eorum crassior atque compactior in vehementissimum adactus motum subtilem teneramque cerebri texturam graviter lædit, nec tam facile sili cursu suo potest.

## §. XXI.

Hunc censum quoque subit frigus *externus* externo corpori, maximeque inferioribus ejus partibus improvide admisum. Cui quantum debeatur in affectibus nostris suscitandis testari videatur ipsi melancholicorum paroxysmi & exacerbatæ invasiones, quas nunquam fere non horripilatione & frigoris sensu in externis partibus prægresso suboriri conspiciamus. Nec adeo difficile erit, ex accuratiori horum penitiatione sævissimorum symptomatum, quorum luxurians in melancholicis progenies est, rationalem suggerere ætiologiam: Quod si enim sub tali horrore frigorisque sensatione extremus corporis habitus spasmo quasi constringitur, sanguis propter angustiora spatia minoresque vias majori ad interiora vi & impetu fertur, abhinc vero in vasis majoribus, maximeque pulmonibus, corde & cerebro subsistens pro horum locorum varietate varias creat molestias. Ita circa præcordia anxietates oppressivas, suspiciosos anhelitus, cordis tremorem ac palpitationem, in capite vertiginem & gravitatem, oculorum ferociam, longas vigilias varique & uni rei infixa infert phantasmata.

## §. XXII.

Neque minus referri huc merentur excretionum sanguinearum tam naturalium quam artificialium in utroque sexu imminutiones aut suppressiones, quare ab omissa in plethoricis, quæ antea consuevit fuit, venæ sectione pariter

pariter ac ab irregulari hæmorrhoidum vel mensium successu, vel his imprudenter cohibitis, aut narium hæmorrhagia improvide sedata melancholiam originem repetiisse certa experientia fide constat. Nec dissimili ratione res sese habet, si quando post exantlatos partus labores parior succedit vel plane supprimitur lochiorum fluxus, vel etiam si circa pubertatis annos menses difficiliter erumpunt. Exinde enim sæpius & melancholiam & maniam subortam confirmant observationes, quarum innumeræ a probatissimis auctoribus proditæ leguntur. Ita HIPPOCRATES, diutina edoctus experientia *lib. de superfluitat. Tom. I. cap. 24.* scribit: ordinaria sanguinis evacuatio intercepra furere facit. FORESTUS *lib. 10. obs. 23. & 24.* item BINNINGERUS *Cent. I. obs. 37.* a mensibus suppressis maniam ortam adnotarunt & Zacutus LUSITANUS *Lib. I. prax. admirand. obs. 37. & 57.* post hæmorrhoidum suppressionem melancholiam & maniam secutam retulit. Siquidem a sanguine stagnante & copiosius circa intestina congesto horum tunicæ nervæ compressæ ad spasticos stimulantur motus, quorum vi sanguis congestus per metastasin ad superiora, maximeque ad caput transprimitur. De quo inverso sanguinis redundantis motu elegans apud HIPPOCRATEM *lib. de virgin. morb.* extat locus, qui dignus est ut hic transcribatur: *Virgines nobiles & maturæ viro delitium, ut demones quosdam videre se putent; magis patiuntur, una cum mensium descensu, antea non valde hinc afflicte. Postea enim sanguis in uterum confluit velut effluxurus: cum igitur osculum exitus non fuerit apertum, sanguis autem amplius influxerit propter cibos & corporis augmentum, tum sanguis non habens effluxum præ multitudine refilit ad cor & ad septum transversum. Cum igitur hæc repleta fuerint, cor satium fit, deinde ex satietate torpedio, postea ex torpedine delirium apprehendit.*

## §. XXIII.

Ex quibus jam dictis & adductis facile reddi poterit ratio, quare & mali hysterici & hypochondriaci melancholia frequentissimum sit symptoma. Res enim in theoria medica pervulgata & satis perspecta est, ex atonia viscerum & impeditiori sanguinis crassioris ac copiosioris per hæc transitu spasmos & status in abdomine progigni, a quibus tanquam ex fonte omnia illa, quæ hypochondriacis & hystericis obveniunt pathemata profluunt & derivari possunt.

## §. XXIV.

Hæc expolitè respiciendum erit ad ea, quæ ad sanguinis crassioris genesis & stagnationem in partibus multum conferre valent, inter quæ primo locum otium & vitam laboris expertem ponendam esse arbitramur, quæ tam ad ingignendum morbum hypochondriaco-hystericum, quam ad subsequens inde delirium plurimum omnino valet. Sicut enim conveniens corporis exercitatio egregium solidis corporis robur addit, humoresque fluxiliores reddit & vegetiores eorum circuitum promovet; ita ex huius defectu vires corporis cum omnibus suis functionibus labefactari, salutares & naturæ solennes excretiones imminui, humores subsistere ac mora crassiores ac lentiores fieri quotidiana observationeprehendimus. Quæ omnia longe graviora sunt, si jungitur solitudo & homines ab omni conversatione remoti vivunt in se quasi conversi; tum enim variæ menti inanes & minus jucundæ imagines saltæque ideæ, cum quibus ægre colluctandum est, sistuntur.

## §. XXV.

Neque ex causis remotioribus scutenda & potentia excludenda sunt. Quodsi enim ob excessivam aciditatem in ventriculo progeniem homines voraces sunt, nimium adpetunt, aut crassioris texturæ cibos, induratos minisque solubiles & statulentos adsumunt, nec tamen sufficienti potu utuntur, crassiores inde compactionesque humores, qui



qui materiam & pabulum nostris præbent affectibus, ingenerantur; a quibus in sanguinem adductis stamina & fibræ carnes rigidiores, duriores & ad motum exercendum minus promptæ sunt & idoneæ.

## §. XXVI.

Illud præterea ex meis observationibus ad naturam melancholicorum & maniacorum explicandam adjiciendum putavi, quod illorum sanguis cum venâ emissus calidior & acris observetur, qualem etiam ETTMULLERUS in colleg. Praef. p. 993. invenit & LINDANUS adnotavit, dein quod tardius & parcius serum deponat atque in lance pondratus gravior sit, lentius evaporet & plus crassi magmatis, quam serum sanorum relinquit. Facies alvi quod attrinet, hæc plerumque parciore ac duriores, coloris ex rufo obseurioris, quandoque etiam grysei, urinæ vero, quæ sub accessione minuantur, tenuiores ac leviores observantur.

## §. XXVII.

Quod attinet subjecta hisce mentis affectibus præ aliis obnoxia, notari meretur, homines non modo tardos, stupidos & obliviosos, sed sæpius quoque valde ingeniosos, poetas, philosophos, & qui profundioribus mathematicis & algebræ studiis nimium delectantur, melancholico affectu corripitur. Contra vero per experientiam liquidum est, eos, qui temperamenti melancholico-cholerici habituque corporis macilentio præditi sunt, strictiores ac teniores fibras cum celeriori arteriarum pulsu obtinent, nec non qui prompto in iram animo quotidiana fere domesticorum altercatione, præsertim inter cibum, facile fortiterque commoveantur, in furem promores existere. Neque tamen prorsus excludendi sunt natura languidi, debiles animoque timidi & humidiori ac laxiori carne instructi, quod vel exinde clarius apparere arbitror, quum virgines & mulieres, maxime si menstrua aut in puerperio lochialis excretionis

vicio laborant, morbis cum mentis alienatione junctis valde videamus expositas. Nec denique sanguineos, ut perite monet HIPPOCRATES lib. 2. epid. 6. Sect. 3. & GALENUS lib. 3. de locis affectis cap. 6. a melancholico & hypochondriaco malo immunes esse, item attentam confirmatur experientia.

## §. XXVIII.

At vero, quum ad speciale <sup>Troquo.</sup> mentis morborum indolem ac <sup>Quæ si deli-</sup> genus rite dignoscendum & abhinc <sup>ti a cor-</sup> judicium de ipsorum eventur & curatione recte formandum multum omnino faciat, valde diversas, quæ se offerunt, circumstantias probe cognitæ perspectasque habere; considerandum maxime omnium erit, num morbus a causa magis morali sive animæ, quam physica sive corporis vicio suam repetat originem atque fomentum. Nihil enim in artis exercitio occurrit frequentius, quam ut primam morbi causam scrutantibus nobis referatur, celerimas & subitaneas animi commotiones, iram, terrorem, diuturnum mororem & angorem, vel etiam vesanum amorem occasionem malo & primam originem subministrasse. Quibus si cerebri & internorum sensuum a parentibus accepta imbecillitas, vel notabile in dieta vitium, ut ebrietas, multa corporis refrigeratio, aut immodicus veneris usus accesserint, non novum certe & insolitum est, homines ceteroquin sanos & vegetos, nullo manifesto morbi chronici indicio apparente, in ejusmodi mentis morbos illabi, illapso difficulter admodum, & nisi lento gradu ex iis emergere. Quod enim si incidit, morbum magis idiopathicum & essentialem esse adeoque ipsum mentis domicilium inligoi labe affici pro certo habendum est.

## §. XXIX.

## §. XXIX.

*Sympt. matri- en male hypoch- d. vel hysterice affl.* Verum melior convalescentiæ spes apparet, si delirium melancholicum est symptomaticum & affectionem in viris hypochondriacum, in feminis hysterice comitatur, quod cognoscere licet, ubi spasmi, flatibus, borborygmis & ructibus prima infestatur regio, diaphragmatis cum anxietate sit compressio, alvi adest durities & molestæ hypochondriorum cum renifu distensiones urgent; quibus haud raro lancinantes capitis dolores, vertigines, aurium suffusus cum multis vigiliis jungi solent. Eadem facilioris sanationis spes est, si ex intermittente febre perperam curata, aut suppresso mensium, lochiorum vel hæmorrhoidum fluxu, aut suppresso mensium, lochiorum vel hæmorrhoidum fluxu, aut etiam a fumo narcotico insania sua sortitur incunabula; hæc enim, convenienti medicina adhibita & excretionibus illis naturalibus iterum revocatis, egregie mitigatur aut prorsus depellitur.

## §. XXX.

*Differ- sta & prognos- sic ratio- ne gra- dum* Præterea, sicut omnes cerebri ac spirituum morbi suos habent gradus vel remissiores vel intensiores suasque servant periodos, quibus per interval- la redeunt; ita pariter in singulis amen- tiæ speciebus hoc animadvertere licet. Quando igitur leviores sunt accessio- nes & incipientes, non adeo difficile in curando est negotium; quo diutius vero in hærent & altiores egerunt radi- ces, eo esse pertinaciores & curatu diffi- ciliores, imo, si parum habent remissionis, prope insanabiles, certissi- mum est. Temporis enim diuturnitate ipsa mentis & liquidi nervei sedes, ce- rebri structura terturque sua ita in- vertitur, ut nisi summo artificio repa- retur. Quo vero tam rara delirantibus contingat curatio hanc subesse puto ra- tionem, quod maniaci Medicos ple- rumque respiciunt & ipsa medicamenta vano veneni metu averfantur, melan- cholici autem, & præsertim hypo- chondriaci medicamentis nimium in-

dulgendo nova quotidie a Medicis, quos sæpissime mutant, adsumunt adeoque in pejus res suas ipsi conver- tunt. Pessimum porro, quod auctio- rem & desperatum manix gradum indi- cat, signum est, quando maniaci post profundiores somnum jugiter deli- rant, nec validiorum remedium, ut purgantium & emeticorum, nec inten- sioris frigoris vim sentiunt. Et si tandem plenaria virium ex somni defe- ctu & longo jejunio sit satiscientia, vel, si epileptici, convulsivi aut sopo- rosi affectus superveniunt, mortem ante portas esse censendum est.

## §. XXXI.

Deinde non ignorata perito Medico *Pregno- sit diff- ill rest- divo- ste* erit hæc peculiaris mentis morborum indoles & ab aliis differentia, quod longo interdum spatio plane sileant & intermittant, ita prorsus, ut homines perfecte sanimentiq; compotes interea habeantur; certis vero temporum periodis, maxime circa solstitia & æquinoctia, sub quibus exorti fuerunt, revertantur. Quodsi vero talis morbi genius est, nequitiam de salute despe- randum est, si modo Medicus malum radicitus extirpare satagat & ipse æger observanda probe observet. Audiamus de hoc acutissimum ARETÆI judi- cium, quod lib. 3. his verbis expres- sum legitur: furor & intermitit & di- ligenti curatione radicitus evellitur, sed intermissio non sincera est, quando per se furor desinit, cum non congruen- ter aut medela, aut temporis anni ele- mentia curatur. Nonnullor namque qui penitus solati morbo videbantur, aut veris tempus, aut error in viclu, aut ira casu aliquo proritata denuo ad furo- rem revocavit.

## §. XXXII.

Singularem deinde meretur ani- *Moniaci rana ob- mo- bis imp- tantur* madversionem, quod natura apud maniacos interdum optime suas tum naturales tum vitales observer func- tiones, ut ideo nonnisi raro alio corripiantur morbo, ut plurimæ ad mor- bos disponentes externæ causæ non de- ficiant. Inde quoque delirantes non facile

facile epidemice grassantibus morbis sunt obnoxii. Neque desunt exempla eorum, qui sub gravibus his mentis affectibus ad septuaginta & plures annos vitam produxerunt.

## §. XXXIII.

*Solutio  
delirio-  
rum.*

Fit nonnunquam, ut solius nature bene valentis beneficio sine ulla remedium ac medicorum ope dictorum mentis morborum, per criticas sanguinis sive per nares sive uterum, sive anum excretiones, salutaris fiat solutio; quæ eo certior evenit, si ab illarum suppressione originem malum duxerit, rectissime id observante HIPPOCRATE, qui *Secl. 6. aph. 21.* hæmorrhoides & varices insaniam solvere, perite prodidit. Nec mihi ignota sunt exempla, ubi nonnulli gravi melancholia hypochondriaci in juventute affecti proveciore ætate hæmorrhoidum fluxu accedente immunes manserunt. Ex quo etiam fit, ut alvi fluxus & dysenteria hisce morbis sæpe finem faciant, verissimo teste HIPPOCRATE *Secl. 7. aph. 3.* Quod ego pariter mea ipsius experientia confirmare possum, quum pronuper in juvene ex terrore in stuporem mentis delapso maiorem subortam in diarrhœam feliciter terminatam viderim. Præter hæc digna est, quæ probe teneatur, observatio ab eodem HIPPOCRATE *Secl. 5. aph. 65.* proposita: quibus tumores in ulceribus apparent, non insaniunt; his autem repente dissipatis insania fiunt. Cujus insignem fidem faciunt aliarum historiarum, quæ scabie & pustulis in cutis subortis melancholiam decrevisse memorant. Ita puellam maniacam per ulceram in crure orta curatam refert FORESTUS *lib. 10. obs. 24.* sicut e contrario ab ocluso ulcere melancholiam cepisse auctor est Amatus LUSITANUS *Cent. 2. obs. 47.*

## CURATIO.

## §. I.

Quod ad rectam & securam mendendi methodum attinet, hæc sicut unice causis morborum tum avertendis tum removendis debet esse subnixæ, quum ex causis cognitis indicationes curatoriæ & accommodata desumi debeant remedia: ita vix alia via in percurandis mentis affectibus procedendum esse censemus. Jam vero satis evidenter in superioribus demonstratum dedimus, causam delirii tam timidi, quam furibundi proximatam & continentem in impetnoso sanguinis & humorum ad imbecille caput motu eorumque vel difficiliiori, vel nimis accelerato per vasa cerebri transitu, quem pressio pede varii turbatæ phantasie effectus sublequantur, ponendam esse; quare curationis scopi, qui tum ad præcavendos tum amolendos hos morbos faciunt, præcipui habendi sunt, ut. 1.) sanguis in cerebro nimia copia congestus abhinc ad inferiora derivetur æquabilisque ac liber ejus per caput & universum corpus progressus procuretur 2.) ut causæ materiales & occasionales, quæ naturalem sanguinis temperiem pervertunt ejusque metastasin seu palyndromen efficiunt, removeantur & consueta, naturales & salutare excretiones in ordinem redigantur, 3.) ut cerebri vasis ac membranis vis naturalis lyssalatica, quæ nimis dejecta est, restituitur.

## §. II.

Ante vero quam intentionem hanc feliciter & cum laude exsequamur, monendum esse duco, antiquissimos artis nostræ antifites, maximeque Græcos in affectibus hisce tam recte dignoscendis quam persanandis nostri temporis Medicis longe esse præferendos, eo quod non modo ex tanta deliriorum in suis regionibus ubertate & frequentia majorem sibi experientiam adqui-

*Indica-  
tiones  
curato-  
rum.*

*Peterum  
rap-  
ma-  
delirio-  
rum co-  
guitio  
& curatio.*

adquirere, sed ipsorum quoque remedium vires ac virtutes melius explorare poterint. Id quod vel solus suo confirmat exemplo HIPPOCRATES. Hic enim primum *lib. de insania* veram deliriorum causam ita delineat: *postquam, inquit, cerebrum repente calefactum fuit, sanguine in venis effervescente, insomnia vident horrenda & facies flamme scit, oculi rubescunt & mens aliquid mali operari cogitat. Cum autem sanguis rursus ad venas dispersus fuerit, quiescit.* Quibus perite dictis dein præstantissima subnectit præidia, dum in eodem *lib. V.* *Snem, a quoque potum, & veratri potionem &c. plurimum commendat.* Nec ab hac simplicissima medendi methodo discedunt reliqui veteres medicinarum scriptores. Quodsi enim monumenta ipsorum curatus evolvendo delirios medendi rationem inquirimus, simplicissimis certe remediis, ut sunt venarum sectio, balnea ex aqua dulci parata, aquæ puræ & mineralium fontium potus, lac & ejus serum, evacuationes tum leniores, tum pro circumstantiarum ratione validiores, ad ferale istos affectus debellandos summo cum fructu eos frequentissime usos fuisse deprehendimus.

## §. III.

*Quid de V. Sae Naturæ vires, seret.* Ex universa vero remedium classe nullum est, quod ab antiquis ad sedandos hos perniciæ capitis morbos magis celebratum ac laudatum est, quam venarum sectio, de cujus utilitate & administratione elegans existat locus apud TRALLIANUM *lib. I. cap. 16.* qui dignus est, ut commemoretur: *melancholia, inquit, ex copia sanguinis fit, si habitus corporis tenuis, atatis vigor, si hæmorrhoidum vel mensum suppressio, si facies multo quam antea rubicundior est venæque magis turgescunt, tunc ante omnem aliam curationem sine cunctatione sanguis mittendus est & venæ sectio, si vires robusta sunt, satis generosa. Si vero vires salem non tolerant, necesse est his aut sapius paulatim educere. Si vero hu-*

*mor sanguineus cerebro quasi impulsus sit, tunc audacter venam in fronte secabis.* Sed cedro dignam & apprime utilem addit cautionem, ne ante convenientem corporis vacationem id fiat: nam, ait, *si circa caput aliquid moliri cogites prius quam totum corpus recrementis liberum reddideris, offendet magis quam juvabis copiosorem materiam ad partem affectam attrahendo.*

## §. IV.

Est quoque dein ex Græcis ARETÆUS, qui *V. Snem* summum in curanda melancholia remedium, interpositis valde utilibus cautelis, ita deprecatur: *Si crassus, biliosus & ater est sanguis, vena utique secanda est; verum non eodem die sed aliis diebus repetendo, quantum satis est sanguinis detrahatur: eodem vero die modum sanguinis mittendi vires declarabunt: medio tempore corpus, quo aliam evacuationem sustinere valeat, liberalius nutriatur: si sunt graciles & sanguinis inopes, paulum sanguinis mittendum, quatenus videlicet V. Snem vires sentiant, sed nullam noxam earum tenor accipias: quocirca, si plus, quam decet, sanguinis effuderis, natura cibi penuria de propria sede dilabitur, hoc est, labefactatur. Neque aliud remedium genus ad pessimos animi morbos vincendos opportunius magisque necessarium existimat CÆLIUS AURELIANUS *lib. I. cap. 5.* ubi præter phlebotomiam maxime omnium simul scarificationem cum hirudinum adpositione commendat his verbis: *cum status passionis apparuerit, deorso capitis atque raso cucurbitam instigimus, ad junctâ scarificatione.* GALENUS quoque *V. Snem* in ea melancholiz specie præscribit, quæ sedem in venis habet & universum corporis habitum occupat, cum e contrario Arabes in ea curanda particulares sanguinis per venas jugulares, frontis, temporum, evacuationes præ reliquis laudant, vel cucurbitulas cum scarificatione humeris applicant, vel etiam hæmorrhoides hirudinibus referant.*

## §. V.

## §. V.

Natura  
de P. Soc.  
senten-  
tia &  
admoni-  
tio.

Hanc methodum sequuti superioris seculi excellentissimi Medici FERNELIUS, RIVERIUS, MERCURIALIS, GORNIVS, SYLVATICUS, JOANN. FOATIS, BALLONIUS, idem remedium tum ad avertendos tum ad sanandos hos morbos efficacissimum omnibusque aliis longe anteponendum esse uno ore confirmant. Et profecto, si meam hoc loco interponere licet experientiam, inter præstantissima hisce morbis accommodata auxilia jure meritoque habendam esse sanguinis missionem censo, hac tamen observata cautela, ut, si sanguis crassus & grumosis addit redundantia, primo vena in pede, deinde, interjectis aliquot diebus in brachio, tum in capite, vel in collo vena jugularis provide secetur, aut stylo stramineo naribus intruso sanguinis proritetur profluvium. Tandem etiam venam in fronte in hoc modo pertundere expedit, ut collo prius deligato faciei venæ insillatur & dein lancetta non adeo acuta, ne pericranium lædatur, sed obtusa, incisio fiat.

## §. VI.

Balneorum  
et  
ceterorum  
remedia  
sunt.

At vero sunt adhuc alia, quæ tam in affectu melancholico, quam manico ob singularem, quam præstant opem a veteribus summe commendantur remedia, quæ inter præcipue eminent balnea; quo nomine non modo universalia, ubi corpus totum, vel ad præcordia tantum in aquam tepidam immittitur, verum etiam particularia, ut semicupia & pediluvia debent intelligi. Videamus igitur, quid veteres de hoc remedii genere in scriptis suis prodiderint. Primo vero omnium Alex. TRALLIANUS lib. I. p. 117. eximias ipsi laudes in melancholia tribuit: Dulcium inquit, balneorum usus, si quid aliud, melancholicis opulatur. Sed agri in balneo morentur diutius ac in calidam descendere cogantur, omnino etiam si astas fuerit in eo diutius desideant. Pari ratione ARETÆUS lib. 7. p. m. 134. melancholicos in aquis (ponte calidis) sepe commorari Tom. IV. Pars IV.

jubet: Rara enim, ait, & molles carnes ad agritudinis remissionem maxime faciunt. Nam sicca & tensa melancholia laborantibus carnes sunt. Ex Methodicis quoque est Prosp. ALPINUS, qui melancholicos tepidis balneis tum in universum corpus, tum præcipue supra capitis suturam stillantibus perfecte sanatos memorat. Vid. lib. de Med. Aegypt. p. 115. Haud dissimili ratione ad maniam sedandam veteres balnea præscripserunt, uti factum fuisse videmus a Calio AURELIANO, qui usum aquarum naturalium, ut sunt nitrosæ, maniacis summo opere suadet, idque eo magis, si odoris non tetri fuerint, quo capitis membranz quatiantur. Quod itidem exemplo suo comprobat GALENUS, qui lib. suo de locis affect. cap. 9. solo usu balnei ex aqua tepida parati plurimos se melancholicos & maniacos peransasse gloriatur.

## §. VII.

Quod vero etiamnum balnea ob egregiam virtutem suam maximam mereantur commendationem, facile quisque agnoscere poterit, si ipsorum operandi modum accuratius paulo considerare velit, qui in eo consistit. Insanix, quæ atrabilarios per intervalla invadit, accessio vix ob aliam contingit rationem, quam quod per vehementiorem partium fibroso nervorum in extremis & infimis partibus constrictionem sanguis ad superiora cum impetu feratur; unde etiam suo jam tempore HIPPOCRATES Sect. I. aph. 56. in atrabilaris morbis periculolos humorum a loco ad locum decubitus esse prodidit, qui vel paralyfin, vel convulsiones, vel insaniam portenderent. Jam vero, quum aquæ moderate calidæ duras ac strictas partes, præsertim in inferioribus locis emolliendo ac relaxando impetum sanguinis ad caput non modo imminuant atque avertunt, verum etiam vasa ampliora reddendo humorum decubitus a capite inferiora versus deducunt, ut dein, libero æquabilique humorum

Opera-  
tione  
varia.

H cir.

circuitu tum per univcrsum corpus, tum quoque ad extimas ejus partes revocato, corpus perspirabile fiat; dubitare haud licet, quin in tali casu a balnearum usu multum sperandum sit auxilii.

## §. VIII.

Quod ad rectam & optimam balnea preparandi methodum attinet, ex dictis facile poterit intelligi, aquas leviores ac subtiliores, quibus pluviales & fluviatiles annumeramus, ad præfixum scopum rite obtinendum, aquis fontanis & durioribus longe esse meliores. Et in eo quoque ratio videtur posita, quare thermæ minerales, quæ præter tenuioris indolis aquam sal subtile alcalinum minerale in sinu foveant, quales sunt Emsenses & Teunacenses, tam interno, quam externo usu ad hos capitis morbos tollendos ceteris omnibus longe efficaciores deprehendantur. Quodsi vero leviores ejusmodi aquæ pro balneis haberi nequeant, fontanæ ac duriores decoctione cum tritico & ejus fursuribus, hordeo, malva, semine lini, & radice altheæ &c. lacculo inclusis sunt corrigendæ. Nonnulli etiam eodem sine lac admiscant, vel de cineribus clavellatis, quantum sufficit, adjiciunt.

## §. IX.

Balnea ita preparata ne nimis calida sed tepida tantum modo adhibeantur, serio monemus. Horum vero ad hos morbos vincendos energia ut eo certior meliorque reddatur & sanguinis in venis cerebri stagnantis derivatio longe auspiciat succedat, opus esse putamus, ut ægri in balneo desidentis caput aqua frigida perfundatur, vel pannus frigida madidus capiti imponatur. Quam encheiretin nec ignotam fuisse CELSO ex cap. 18. lib. 6. advertere licet, ubi super caput aquæ frigidæ infusionem, demisso corpore in balneum & oleum, suadet. Et lib. I. cap. 4. ita perhibet: *nihil aquæ prodest ad caput infirmum roborandum, atque aqua frigida, quæ diutius caput quam cetera partes perfundendum, vel etiam largo ca-*

*nili quotidie aliquamdiu subjiciendum est. Idem quoque sentire ARETÆUM ex lib. ejus de morb. chron. p. 82. constat, ubi, si ægri maxime insaniunt, caput humore frigido irrigare jubet. Neque effectus hujus plane singularis ratio altius erit repetenda; quandoquidem ea frigris est vis atque potentia, ut ad cerebri membranas & vasa a stagnante sanguine nimis dilatata & debilitata penetrando ea constrictione roboret, ut inde humorum ibi subsistentium melior discussio liberiusque iter promoveri possit.*

## §. X.

Dimissis balneis ad alia præsidiorum genera progredimur, inter quæ non infimum sibi locum vendicant ipsa purgantia, quæ a veteribus non minus quam recentioribus ad abigendos mentis morbos magni semper habita fuerunt. Quorum tamen operatio quum non eadem sed valde diversa sit, dum alia mitiora alia fortiora existunt; indicandum omnino erit, quænam ex horum nimis ampla classe nostris indicationibus tum ad maniam tum melancholiam curandam satisfaciant. In eo vero periti Medici quam maxime consentiunt, quod leniora & mitiora alvum ducentia, in quorum selectu sunt manna, cassia, rhabarbarum, agaricus, folia sennæ, polypodium, cremor tartari, tartarus vitriolatus, salia aquarum mineralium neutra sub variis formis usurpata in affectu manico & melancholico præsertim qui ab affectione hypochondriaci & stagnatione sanguinis in intestinis & venæ portæ ramis ortum traxit, sint omnibus aliis, etiam acrioribus propter securum, placidum minusque tumultuarium operandi modum longe multumque præferenda, idque eo magis, si in decocto vel infuso sumta non simul & semel sed iteratis vicibus & per epicrasin operantur.

## §. XI.

Equidem, si medicorum & in primis veterum monumenta evolvimus, ex purgantibus elleborum tam album, quam

*selectiss.  
sima  
purgan-  
tia qua-  
nta sunt?*

*De purg.  
antibus  
veterum  
Forslark.  
bos judi-  
quam signa*

quam nigrum seu summum specificum ad utrumque affectum debellandum commendant, cum tamen hic subtilissimæ, imo virulentæ acrimonie sit particeps. Ita HIPPOCRATES *lib. de insomnia* ad præcavendam insaniam veratro purgare & postea optimam victus rationem instituere jubet, atque *lib. I. de dieta* §. 33. in melancholicis, formidulosis & tristibus identidem purgationem per veratrum ut lissimam censet. Cui adsentitur CELSUS qui *lib. 3. cap. 18.* melancholiam purgatione cum veratro ex magna parte levare refert, & si hoc vel semel datum parum profecerit, interposito tempore iterum dari jubet. Verum enim verò, ut veteres helleboro, elaterio reliquisque strenuissimis remediis perpetuo fere usi fuerint, nos tamen mitiorum ob inopiam id factum fuisse existimamus. Dein vero simile est, eos ideo frequentius fortiorum purgantium usum inivisse, quod tutissimas ipsorum præparationes, ut innuit GALENUS *lib. de articulis* compertas habuerunt. Sed illorum prohi! dolor monumenta temporis diuturnitate interierunt, ut pauca admodum remanserint, de quo HIPPOCRATIS de ellebore conscriptus liber, cujus initium tantum exstat, satis testatur.

## §. X.

Porro, si loca, ubi HIPPOCRATES aliquæ medicinæ partes purgationem per elleborem dictis in morbis laudant, attentius paulo inspicimus, eos hoc medicamentum nonnisi sub certo modo & vehiculo atque iis remediis conjunctis adhibuisseprehendimus, quæ magnam illius acrimoniam cicurandi vim possident, ut ideo non vehemens, sed plane mitior secuta fuerit operatio. Ita, teste DIOSCORIDE *lib. 4.* litteris tradita sunt a PHILONIDE Siculo Enneni præparatio corporis ante usum ellebori peculiaris & victus ratio, quæ tamen ad nostram usque memoriam non pervenit. Plura, quæ idem confirmant exempla repetite

licet apud ipsum HIPPOCRATEM; qui in *lib. de dieta* post somenta demum & diartam purgationem per veratrum instituit & *lib. de veratro* corpora ante ipsius usum uberiori alimento & quiete humectanda, item *lib. 6. popul.* balneo & cibo præparanda suadet: quo sine etiam tam ante quam post usum fortiorum purgantium sufficientem lactis asinini potum præbuit.

## §. XI.

Quam vero notissimum sit, non modo drastica purgantia, sed & ipsa <sup>Quarta</sup> venena arsenicalia sine ulla sanitatis <sup>noxa</sup> noxa dari posse, si corpora prius bene humectantur & alimentis demulcentibus, nutrientibus, oleosis & lacticiis præparantur vel si postea ejusmodi adsumuntur; facile poterit intelligi, nec veteres in adhibendis remediis purgantibus ullo modo deliquisse, sed ea valde cicurata & ad meliorem mitioreque indolem redacta usurpasse. Quam medendi methodum ac cautionem nec TRALLIANO ignotam fuisse ex ejus monumentis apparet, dum in *melancholia*, inquit, *blanda purgatione opus est & victu humectante, interposito balneo.* Qui enim calidioribus antidotis aut purgationibus usi sunt, præsertim hiera, agros magis suavior atque infanos reddiderunt, dum sanguinem ad siccum & acrius converterunt. Præstat igitur talibus simplicioribus adhuc medicamentis, quæ totum corpus non possunt calefacere, repurgator humectanti cibo permittere. Novissis autem, vos, me quoque plerosque ita laborantes victu potius quam medicamentis persanasse.

## §. XII.

Cui experientia sana quoque <sup>Drastica</sup> sententia est ratio: Etenim in furore, ubi omnia in effreni motu videmus constituta, nulla plane nervosum systema <sup>melancholia</sup> acrius irritandi est indicatio. Nec deinde humores atrabilarii, sive melancholici, glutinosi, crassi, acidi & pontici valis in hærescentes acrioribus opus habent moventibus, sed diluti, correcti, meabilesque & ad exitum aptiores redditati facili negotio ad excretionem stimulan-

mulantur. Et profecto si ulla in re, certe in propinandis purgantibus summa adhibenda est cautio. Nam, ut probe annotavit Joann. HEURNIUS lib. 3. p. 289. in usu magnorum pharmacorum nullus temeritatis locus esse debet, alioquin, quod turpe dictu est, suppetias ferendo magis nocemus. Atque ideo recte omnino atque perite a PLATONE dictum esse legimus, morbos diuturnos, inter quos etiam melancholiam refert, suos habere certos terminos, ad quos ante quam perveniant, si medicamentis irritentur, acerbiores fieri. Ex omnibus autem optime suo nos exemplo erudire potest providissimus ille artis parens HIPPOCRATES, quippe qui Democritum curaturus elleboro nonnisi præfens uti voluit.

## §. XIII.

Quoniam superiori loco inter causas & conditiones, sub quibus veteribus elleboro aliisque fortioribus purgantibus uti licuerit, hanc præcipuam retulerimus, quod illi innoxium, qui nos jam latet, præparandi modum calluerint; non inutile fore arbitror quædam de eodem monere. Fuerunt scilicet novissimis temporibus præclari in arte viri, qui in eo excogitando multum & operæ & temporis consumserunt, quos inter eminet LINDENIUS, qui Colleg. MSTO ad praxin chym. ubi elleborisum commendat, singularem elleborum corrigendi modum tradidit, quo eos non modo, qui insanire primum cœperunt, sed & ipsos maniacos se curasse adserit. Ipsa præparatio hæc est: Recipit radicis ellebori albi a drachma dimidia ad drachmam unam, eamque in vino, donec mollescat, decoquit, decoctam eximit, &, rejecto pristina decoctionis vino, novo vino injicit atque per noctem in loco calido relinquit. Postea infusionis vinum nunc levius, nunc fortius, prout validum esse debet remedium, exprimit, expressi drachmam unam propinquat, quæ sufficienter operatur.

## §. XIV.

Nos quidem de hac ellebori correctione ita sentimus: medentes fortioribus qualicunque ratione correctis & vi sua acri caustica privatis remediis commode carere & majorem longe fructum expectare posse, si ea solum evacuantia, quæ supra recensuimus selectiora atque lenissima in usum rite vocare satagant. Cui autem speciatim elleboro uti volupe est, de convenienti ejus præparandi modo non dissuademus; siquidem vim illam drasticorum purgantium deleteriam, quæ in subtilissimo sale acri consistit, mediante coctione diutius influita penitus enervari posse certissimum constat experimento. Et quum per similem cum aqua vel vino adornatam cocturam tenuissima illa, quæ elleboro inest, acrimonia extrahitur, manifestum est, quod remanet, drastica virtute privari.

## §. XV.

Missæ ulteriori purgantium disquisitione progredimur ad aliud remedium genus, quod consistit aquæ minerales vel pura aqua fontana, in quibus summum & præstantissimum adversus mentis morborum contumaciam situm est præsidium. Etenim, quum mania plerumque originem & fundamentum in melancholia, melancholia in affectu hypochondriaco habeat atque hic ipse a sanguine & succis vitiatas ac impuriorebus, per imi ventris viscera & intestinorum volumen difficulter progredientibus ortum & natales suos fortitur; ad obstructions vero viscerum referandas liberioreque ac faciliorem sanguinis circuitum reddendum, nulla hæcenus a multis retro seculis inventa & non modo a recentioribus sed etiam a veteribus peritis ac scitis Medicis usu probata fuerit medicina, præter providum aquarum mineralium vel frigidarum, vel calidarum usum, facile patet, quantum ab ejusmodi aquis in pertinacissimis morbis vincendis sperandum sit auxilium. Et ego sane ipse integra fide profiteor, quod nolim esse Medicus, si aquarum, præsertim mineralium

Corr.  
Alte esse.  
bori a  
LINDE  
NIO  
tradit.

Aqua  
minera-  
lis &  
fontana  
london-  
tar.



ralium virtutem ignorarem. Enimvero, quum boni ac periti Medici ars & scientia maxima ex parte in arcendis vel curandis chronicis affectibus versari debeat, hic certe parum vel nihil solidi sine prudenti aquarum naturalium tam interno quam externo usu præstare poterit. Quapropter ut Medicus harum salutarium aquarum, ratione ingredientium & virtutum accuratam sibi comparet cognitionem serio moneamus.

## §. XVI.

In pluribus  
modis  
proferatur.

Quod si vero genuinum fontium salubrum indolem scrutamur, obstupefcimus sane, tantam a benignissimo conditore ipsis concessam esse facultatem, ut pluribus medendi indicationibus in omnibus fere morbis satisfaciant. Nam spiritu elastico purissimo & sale alcalino medio minerali prægnantes decentique copia adhibita non modo humores vitiosos alterandi, crassos incidendi, glutinosos fluidos reddendi, & obstructa vascula referandi potentia pollent, verum etiam in partes solidas energiam suam exerunt, cum duras & tenfas fibras laxant & emolliunt, debiles & imbecilles roborant, emunctoria a tono suo dejecta stimulant, adeoque omnis generis salutares excretiones, sive per alvum, sive per urinam & cutim, sive etiam per uterum & venas hæmorrhoidales promoveant.

## §. VII.

La plis  
afistol  
afistol  
moderatur.

Similis, imo fere ejusdem cum aquis mineralibus virtutis est lac asinum & serum lactis tam vaccinum quam caprinum rite confectum & depuratum, cujus usus ad expugnandas chronicas passiones ab HIPPOCRATE jam olim commendatur & a peritissimis in arte viris, MERCURIALI, RIVERO RAYMUND. A FORTIS, BAGLIVIO & celeberrimo nostri ævi Medico BOERHAVIO summis ob præstantissimam efficaciam laudibus extollitur. Id quod & ego bona fide adfirmare possum: siquidem affectus valde chronicos, qui ex subtili &

virulenta humorum acrimonia suborti in imbecilliori & vitiatò nervosarum partium systemate sedem suam fixam habent, sine decenti lactis & feri lactis usu vix ex voto sanatos novi.

## §. XVIII.

Ex universa vero medicamentorum serie remedium non scio ullum quod ad causas horum affectuum eradicandas opportunius existat & in quo, ceu sale simplicissimo, natura plus mysteriorum condiderit, quam ipsum nitrum ab heterogeneis partibus depuratum. Ejus namque usus tam universalis est, ut ad omnis generis morbos, si modo site instituitur, latissime pateat. Maxime vero omnium in ea melancholiz specie, quæ ad maniam inclinatur, imo in ipso furore, peculiarem plane & laudatissimum præbet effectum, dum non modo acrimoniam humorum biliosam temperat, sed & effrenes solidorum motus placando immoderatam fervorem silit. Dolendum itaque summopere est, efficacissimum hæc remedium non modo veterum temporibus plane ignotum fuisse, verum etiam a nostri ævi Medicis ratione suæ, quam exserit in morbis, virtutis nec satis cognosci, nec in debito pretio haberi. Ex recentioribus tamen, qui ejus eximiam in nostris affectibus sanandis virtutem agnoverunt, laudandi maxime sunt SENNERTUS atque RIVERIUS, quippe qui in mania potissimum nitrum cum pauxillo camphoræ maritatum ceu specficum in usum ducendum esse adserunt.

## §. XIX.

Proposui jam ex iis, quæ opitulanti his animi morbis possunt generalia quidem, sed omnium optima remedium genera, quæ longo usu a peritissimis in arte viris probata fuerunt. Superest nunc, ut de peculiaribus quibusdam & specificis medicamentis, quæ itidem magna a plurimis laude efferrantur, nostram in experientia fundatam dicamus sententiam. Jam igitur notissimum est, in scholis Medicis

& pharmaceuticis libris ex regno vegetabilium herbam melissæ, betonicæ, verbenæ, anagallidis, salviæ, absinthii, flores hyperici, tilizæ, camphoræ, ex animantium familia sanguinem asininum exsiccatum & cum potu exhibitum, ex regno minerali martialia, cinnabarium, saturni saccharum, calcem & tincturam lunc præ ceteris commendari. Verum enim vero, ut remedia hæc singularia ex toto haud rejicimus, sed nonnullorum potius usum meliori explorationi committendum volumus; id tamen adseverare non dubitamus, parum ab iisdem solis expectandum esse emolumenti, nisi prius causis morborum tam remotioribus quam proximis corrigendis & abigendis per supra alata remedia generalia rite consultum prospectumque fuerit.

## §. XX.

*Specificum R. veris.* Dantur, præter jam dicta simplicia, varia adhuc ex ipsis artificiose parata composita, quæ ob specificam virtutem suam summis prædicantur elogiis, ad quorum censum inprimis pertinet illud a RIVERO contra maniam tantopere celebratum remedium, quod ipse pro arcano & gentilitio habere consuevit atque hoc modo paratur: Recipe fol. melissæ manipulum unum. Incidantur in spiritus vini uncis quatuor. Dein adde margaritarum præparatam drachmam dimidiam. Misce detur ad duo cochlearia. Quod quidem medicamentum, si ex æquo æstimem, non profus damnum judico. Et licet ipse genuinam ejus virtutem usu non exploraverim, in ea tamen certo respectu assignanda nullus dubito, maxime quum multos olim maniacos a passione quodam in pago Vinariensi degente, qui illud frequentius adhibuit, sanatos noverim.

## §. XXI.

*Diagnos. signum. D. anjsh. anjsh.* Probe dein animadvertendum esse arbitror, celebrem Brunsvicensium Medicum decocto quodam nigro, schmarzerarren Zrand vocato, quod, ut pharmacopæus mihi retulit, ex san-

guine asinino cum aqua melissæ & aceto vini cocto paravit, haud infelici successu usum fuisse frequentissime. Neque ego hoc remedium genus inutile censerem; siquidem præter virtutem sedativam, cujus propter sanguinem animantis particeps est, insignem etiam ab aceto vini discutientem ac resolventem obtinet efficaciam.

## §. XXII.

Laudatissime porro virtutis esse creditur B. Michaelis decoctum & essentia ex anagallide mare, qui phœniceo colore splendet, parata; quæ bina remedia mille experimentis in melancholico & maniaci delirio a se probata esse adfuit, de quorum tamen fide nondum satis mihi constare præsteor. Pulverem vero, qui a Dno CHARRAS in Pharmacop. Rog. descriptus & contra insaniam a moru canis rabidi ceu specificum commendatus ex melissa, verbenæ, absinthio, artemisia, plantagine, ruta compositur, tum ob virtutem, qua gaudet, assequantes humores discutienti, tum solidas partes corroborandi non omni effectu deficiente arbitramur.

## §. XXIII.

Ex chymicis medicaminibus spectant huc quoque flores antimonii, quorum usum plurimi Medicorum commendant, ad experientiam audeaster provocantes. Cui nec nostra contradicit observatio. Quod si enim tenaces, visciidi & biliosi in duodeno stabulantes humores vomitu evocandi sunt, flores isti, qui præ aliis emeticis antimonialibus blanda quodam & anodyne virtutis sulphure pollent, egregium pollicentur fructum. De iis, quæ opium ingreditur antidotis, quorum multæ magnæque apud Auctores laudes extant, infra plura dicemus.

## §. XXIV.

Mihi denique si ullum remedium ceu specificum, id est, quod singulari quodam & præcipuo effectu multoties se comprobavit, in hisce mentis affectibus tum præcavendis, tum abigendis commendare licet, nec certius nec efficacius.

*Diagnos. essentia anagallidis B. Mare B. Altheberg. illa.*

*Taleis contra rabiem D. Char.*

*Flores antimonii.*

*Morus corporis est opium.*

*in speciem.*

efficacius decenti & ad vires corporis  
instructura exercitatione novi. Nam,  
modo liquidum in sanguine non defi-  
ciat, hoc remedium viscidos humores  
resolvendo liberioreque sanguinis per  
omnia vasa circuitum promovendo  
corpus ab impuris sordibus per auctam  
transpirationem liberat, obstructions  
referat, adeoque omnibus aliis summe  
commendatis remediis antecellit lon-  
gissime.

## CURA PRÆSERVATORIA.

### §. I.

*De as-  
pectu  
laferu-  
nas san-  
guinis  
conser-  
vatione.*

**Q**Uum tutius factuque proclivius  
sit morbos præcavere aut recur-  
rentes eorum ictus avertere,  
quam præsentis medela ad sanitatem  
reducere; in aprico esse arbitror,  
quantum ad Medici præter ac ægroti  
commodum interfit, citam præser-  
vatoriam probe intelligere, quæ sequen-  
tibus continetur momentis. Primo  
omnium necesse est, ut sanguinis abun-  
dantiam habeatur ratio, quæ tempesti-  
va, præsertim circa solstitia & æqui-  
noctia consueta venæ sectione, vel fa-  
lutaribus per hæmorrhoidales & uteri  
venas evacuationibus promotis, aut  
si cohibitæ fuerint, revocatis minuenda  
erit. Ante vero quam venæ susci-  
pitur incisio, valde utile est, primas  
vias a viscosorum humorum colluvie  
legiori medicamento deplere. Tali  
enim ratione post sectam venam san-  
guinis per universum corpus distributio  
longe erit expeditior, ut per transpi-  
rationem depurari melius possit.

### §. II.

*Aspec-  
tuum  
modera-  
tio.*

Præter hæc inter optima remedia  
præservantia prudens affectuum ani-  
mi moderatio referenda est, quæ faci-  
le obtinebitur, si nobis ipsi non adeo  
indulgemus. Absint itaque stolta de-  
sideria, quæ tantum ullo modo tur-  
bare aut speculationibus anxiique præ-  
figurationibus occasionem suggerere  
possunt; omnes etiam nimis & ubi  
rei infixæ cogitationes æque ac profun-

diores studiorum causa susceptæ medi-  
tationes sedulo vitentur, venus sit  
pareissima & denique remota solitudi-  
ne animus jucundus & amico reficiatur  
consortio.

### §. III.

Neque tutum est, ab omni cibo im-  
pleri, sed talem fere eligere, qui nec  
concoctu difficilis nec ventriculo sua-  
mole gravis est. Vitare hinc oportet  
carnes infumatas, suillas, bubulas,  
conchilia, pisces coctos omniaque  
vaporosa & cibos quoque cum cepis &  
allio paratos, utpote quæ singula ven-  
triculum onerando crassumque ingi-  
gnendo sanguinem mirum nocent.  
Ante omnia vero corpori quantum in-  
diget, non quantum cupit impenden-  
dum est. A nimia enim voracitate,  
ad quam propter exundantem acidi in  
prima regione prægenitum admodum  
proclives sunt melancholici, non leve  
redundare damnum observamus.

### §. IV.

Potus quoque habendus est delectus;  
liquidum non omnis omnibus depre-  
henditor proficuum. In genere tamen  
notari velim, leviores semper, ut  
cerevisiam secundariam, vel puram  
aquam frigidam esse eligendam. In-  
ter vinâ modicus vini albi & non adeo  
subtilis, ut Mosellani haustus sub epu-  
lis melancholicis omnino concedatur,  
utpote qui animi corporisque vires re-  
creando mores ad hilaritatem traducit.  
Dulcia vero & potentia vina, quæ  
sunt Hungarica, Italica & Gallica  
Sect. dicta tum melancholicis tum ma-  
niacis nunquam non annotavi insensibi-  
lia. Nihil autem fere magis officit  
& ad maniae genesin contribuit, ac si  
post graviorem iracundiæ affectum  
ejusmodi spirituosus, vel etiam frigidi  
potus in copia ingurgitantur; quæ pro-  
pter, ut omnes de salute sua solliciti  
ea tempestate ab iisdem se abstineant,  
sincere monemus.

### §. V.

In eodem cum alimentis pretio ha-  
betur ea quæ nostro ævo increbuit ta-  
baci fumigatio, cujus nimium & per-  
petuum.

H: 4

petuum quasi usum, qui digestionis inimicus spissos humores ingenerat eosque in organismum facile abripit, ex toto improbamus; cum e contrario conluetum & moderatum, ad alvum lubricam servandam, recte concedendum arbitremur.

## §. VI.

*Notae co-parti-* Denique praeservandi sine summo per se commendat aeris mutationes & praesertim a regionibus nimis calidis vel frigidis ad temperiores susceptae peregrinationes. Hæ ipsæ enim non modo erroneis perverisque ideis emendandis apprime sunt idoneæ, verum etiam morus, qui per vesturam instituitur, viscerum obstructions impediendo æquabilem sanguinis per omne corpus cursum servat utilissime.

## CAUTELÆ ET OBSERVATIONES PRACTICÆ.

## §. I.

*Contra aliam variationem febrium notand.* **Q**UUM ex acutis febribus iisq; praesertim biliosis cum phrenitide junctis per opiatâ & nimis refrigerantia perperam sanatis maniam haud raro subortam observaverim, boni omnino circumspicietque Medici esse reor, non modo febres ejusmodi cholericas rationali & prudenti tractare methodo, verum etiam, ubi inclinata jam in melius valetudo est, exactam vivendi rationem cum convenienti affectuum regimine praescribere; alioquin ex phrenitide facilis ad delirium chronicum fit transitus. Similem cautionem possulant febres intermittentes contumaciores; siquidem ab iisdem per iteratas sanguinis missiones vel acres sæpiusque repetitas alvi evacuationes male tractatis, aut per adstringentia & opiatâ nimis cito cohibitis melancholiam hypochondriacam & exinde ipsum furorem concitatum fuisse constat. Sedulo itaque monendi sunt Medici, ut ab empiricis istis & indignis curationibus abstineant, ne

forte gravissimorum horum affectuum causa dici haberique possint.

## §. II.

*Circa P. sum. ra. elena subje- ctum.* Venæ sectio licet præstantissimæ in delirii utilitatis sit; multum tamen pro corporum varietate ratione loci, quantitas & temporis debet variari. Ita, quando maniacus furor plethorica, cholericâ & in ætatis vigore constituta corripit subiecta, sanguinis iterata missio, frequentiori per correctum elleborismum purgatione interposita, minus nocet, maxime si postea cardiacis, roborantibus & anodynis sedativis viribus rescindiendi prospiciamus. Ubi contra per diuturnam inedia assiduasque vigilias & contumacem corporis evacuationem furiosi viribus & humoribus temperatis exhausti fuerunt, ideoque nutrientibus magis & blandis analepticis opus habet, sanguinis detractio in majorem incidunt debilitatem.

## §. III.

*Circa se. Altema vera frontis.* Quam superiori §. V. curat: præscriptum convenientem venæ sectionis administrationem, hic loci minus censemus repetendam. De V. Sione tamen in fronte hæc habeo quæ monent: eandem scilicet in paroxysmo, ubi propter spasticam inferiorum partium stricturam sanguinis ad caput directus est impetus, nunquam utilem, sed ob majorem humorum attractionem magis esse noxiam; e contrario vero tutius rectiusque adornari, quum aut primæ viæ ab impuris sordibus probe sint liberatæ, aut si spasmo quiescente mali notabilis facta fuerit remissio. Docuit me utilissimam hanc cautelam tentata simili remedio hæmiplegicæ curatio, in qua eandem venam plus quam decies infelici admodum eventu novi incisam. Hoc in passu ex antiquioribus Medicis consentientem habeo CELSUM, cujus lib. 18. de curatione deliriorum hæc notatu digna est animadversio: *Remedia adhibere, ubi maxime furor urget, supervacuum est: simul enim febris quoque increscit. Tum itaque nihil nisi continendus*

ager est; ubi vero res patitur festinan-  
ter subvenendum est. Asclepiades  
perinde esse dixit, his sanguinem mi-  
tti, ac si trucidetur, hanc rationem  
secutus: quod neque insania esset, ni-  
si cum febre intensa; neque sanguis,  
nisi in remissione ejus, recte mittere-  
tur.

## §. IV.

Quum, gravissimo teste HIPPO-  
CRATE Sect. 6. aph. 36. melancholia  
laborantibus periculose ad cerebrum  
transfiant metallas, quas apoplexia, epi-  
lepsia, cœcitas, aut ipsa mania sequi-  
tur; omnis profecto cura adhibenda  
est, ut ne perversi ejusmodi motus  
translatorii seu seriales sanguinis ad ca-  
put congestionem procurentur, quale  
quid fieri maxime solet ab acerbis ani-  
mi perturbationibus, aut largiori vini  
potentis inter dies caniculares potatio-  
ne, vel denique omni medela, quæ  
liquida nimium excitando vires de-  
primere valet.

## §. V.

Maxime vero omnium talem no-  
xam fortiora inferunt purgantia, ut-  
pote quæ intestina ad majores spasmos  
protrahendo sanguinem ad superiora  
magis propellunt. Quæ cum ita sint,  
de purgationibus rite instituendis au-  
rea tenenda est regula MESUES, quæ  
ita se habet: in agriudimibus melan-  
cholicis non bis, non semel, sed per  
intervalla facienda est evacuatio ita  
temperata, ut natura regat evacuatio-  
nem, non evacuatio naturam. Præstat  
tamen semper alvum lubricum servare,  
& si non respondet sollicitanda est vel  
clystere, vel singulis septimanis leniori  
evacuante.

## §. VI.

Ubi ex infano amore virgines nubi-  
les & maturæ viro insaniunt, conju-  
gium efficacissimum præstat auxilium;  
ejus incomparabilem ad componen-  
dum furorem virtutem & ratio confir-  
mat & sua jam ætate rectissime agno-  
vit HIPPOCRATES, qui deo virgi-  
nes quam citissime viro cohabitare jubet,  
si enim, inquit, conceperint,

sana sum. Id quod ego ipse experien-  
tiæ conforme habere nullus dubito.

## §. VII.

Si quando furor a morfu maniaci, <sup>Et mor-  
su ma-  
niaci,  
vel can-  
is rabidi.</sup> vel canis rabidi, ut talia exempla pro-  
stant, suboritur, non fidendum est  
specificis illis, a GALENO, AE-  
TIO, RUFFO tantopere laudatis ex-  
ternis, canceris combustis, seu cineribus  
cum theriaca & radice cynosbatis,  
licheni cinereo terrestri, jecori rabiosi  
canis exterius applicato, sed loco do-  
lenti, profunda scarificatione præmis-  
sa, magna cucurbitam apponere,  
vel ferro ignito satis profunde partem  
affectam inurere & tum suppurationem  
promovere præstat.

## §. VIII.

Quum delirio affectus a scæda scabie <sup>Circa  
fontem  
les.</sup> elephantiasin quasi æmulante insigne  
sæpius levamen percepisse & maniam  
post ulcera in interioribus locis curata  
subortam trepanatione solutam fuisse  
certa experientia fide constat; fonticu-  
los & ulcera in tali casu circa spinam  
dorsii ferro inurere haud supervacaneum  
esse arbitramur.

## §. IX.

Vesicatoria in curanda mania parum <sup>Circa  
distans  
illa.</sup> vel nihil valent sed malum potius ex-  
asperant. Cantharidum quippe sales  
caustici per poros in sanguinem delati  
majorem nervosis membranarum & ipsi  
quoque duræ matri stimulum impin-  
gendo sanguinis crassi & bilioli per ca-  
put & universum corpus motum spasti-  
ca strictura augent; cum potius medi-  
camenta, quæ ob blandam anodyniam  
& antispasmodicam virtutem intensio-  
res nervosarum partium constrictiones  
demulcendi effrenemque humorum  
motum refrenandi vi pollent, in usum  
vocari debeant.

## §. X.

Licet vero remedia hæc sedativa <sup>Circa  
anody-  
na, ma-  
niaci  
vires  
opiate  
& nar-  
cotica.</sup> & anodyna in maniaco furore compe-  
scendo effectu se exserant satis egre-  
gio, nequiquam tamen eo proceden-  
dum audaciter est, ut, quæ suspectæ  
admodum fidei sunt, opiata & narcoti-  
ca ad hanc classem referre & propinare  
veli-

velimus; hæc quippe fibras ac membranas nervosas, præsertim quæ in cerebro sunt, stupefaciendo maniacos quidem insultus levant atque minuunt sed majorem & dementiaem & fatuitatem inferendo in aliud sæpe extremum ægros præcipitant. Multo magis, si quid ab anodynis sperandum auxilium est, ea sunt feligenda, quæ in malo epileptico, cujus formalis ratio in vehementi duræ matris spasmò consistit, opitulantur, ad quæ pertinent maxime castoreum, rasura unguis, alcis, cranii humani, cornu cervi philosophi. præp. radix & semen pœoniæ, pulvis noster antepilepticus, rad. valerianæ, liquor anodynus mineralis, aquæ flor. lil. convallium, tiliz, primulæ veris &c. Quibus omnibus ceu securis & utensis probatis remediis tuto fidem habere possumus.

## 6. XI.

*Circu-* In Polonia ex abicissa imprudenter  
*delitit-* plica non modo graves capitis morbos,  
*ex ab-* sed nonnunquam etiam ipsam concita-  
*stilla* tam fuisse maniam cognovimus. Quod  
*plica Po-* vero hic incidit, mirum commendari  
*spates J.* solet decoctum mucfi clavati, quo ca-  
put bis quotidie lavetur. Ita enim fu-  
turum esse dicunt, ut brevi illa, rursus  
erumpat. Linimenti mucfi clavati huic  
scopo utilissimi descriptionem qui ex-  
petit, evolvat M. N. C. Dec. Lann. II.  
*obs.* 54. ubi inveniet.

§. XII.

*Qua, in Phrenitide præstat Insyrna & antitrida.* In phrenitide, quæ quasi duræ meningis febris particularis est, in qua ejus tonus elasticus ac systole valde aucta, motum sanguinis & fluidi nervi celerrimum & tumultuosum efficit, præter interna, nictosa & blanda anodyna externe animalia, ut gallinæ vel columbæ per medium discissæ capitæque raso applicatæ non sine singulari fructu esse deprehenduntur, utpote blandæ exhalationes & anæsthisantes fibras nimis strictas relaxando ad tonum motumque naturalem restituendum plurimum conferunt.

ENARRATIONES  
MORBORUM.

### OBSERVATIO I.

**V** Ir quinquaginta annorum, sanguine plenus, a prima, statim adolescentie largiori vini potui adfectus, per sedecim & plures annos, quibus Italiam Galliamque peragravit, bis quotannis vepam secandam præbit. At vero Germaniam redux hoc consuetum evacuationis genus omisit, confectum vinum adustum, quod cum tabaci fumo in deliciis habebat, ad ebrietatem usque ingurgitavit. Aliquot abhinc mensibus, elapsis gravi percellatur iracundia, quam crebri vomitus cum larga diarrhoea & inappetentia, iuncti sequebantur. Brevi post somno fœui observabatur turbulento anxique infomnis interrupto, imo haud obscure furoris signa tum vultu tum gestibus exprimebat: mox enim tristitia & morore affectus omne hominum confortium fugebat, mox in hilaritatem effusus præter consuetudinem erat affabilis, multa sine ordine inconcinnamque garriens. Neque tamen hoc mentis alienatæ vitium diutius inhaeret, sed leviter iterum transit, vix infanie vestigia relinquens: siquidem noster intermissionis tempore omnibus rite fungit officiis cum mentis alacritate valet, atque sanctissima loquitur, ut nihil in sermone familiari infanie in ipso observetur. Sed, quum vel levissima accedente animi perturbatione, ad quam summe proclivis est, vel errore aliquo in dicta commisso ex facili redeat, neque vanum exinde gravioris & permanentis delirii timorem incutere videatur, meum amici implorat ut auxilium.

EPICRISIS CUM  
CONSILIO.

Quanta animi affectuum in motus  
corporis nostri tam fluidarum quam so-  
lida.

hidarum partium sit potentia, vel ex solo præcedenti casu adparere arbitror. Sicuti autem præcipua iracundiæ in duſus biliarios efficacia nunquam non deprehenditur: ita nihil dubii est, quin præternaturali harum partium nervolarum constrictione bilioſus humor in intestina effusus hæc ipsa ad spasmos sollicitaverit; quorum vi sanguis crassus ad caput & debile cerebrum adpulsus ibi difficulter transit variisque inanes & erroneas menti ideas impressit. Neque parum profecto ad pessimum hunc affectum ingenerandum contribuit immoderatus calidiorum potuum usus, utpote qui insigni systema nervorum maximeque cerebrum debilitandi vi pollent & haud raro vel unice, sine longa aliarum causarum serie prægresso ejusmodi mentis morbos producant. Quod autem ad peculiarem affectus nostri genium attinet, ipsum profusore leviori periodico recte omnino habere licebit, propterea quod per intervalla tantum adgreditur breviusque terminatur, neque magnam ræmoriam imbecillitatem aut sensum insignem depravationem cœnitam habet & ipsam quoque curationem facilius recipit, quam sequenti ratione adornavimus: Primo omnium æquabilis sanguinis per universum corpus distributioni ejusque a capite derivationi prospicientes consulimus, ut æger quotidie cubitum iturus pediluvium uteretur tepidis ex aqua fluviali & tritici surfuribus paratis & quæprimum curari per venam in pede sectam, aut hirudinibus ano adpositis liberum permitat exitum, unde statim melius habere cœpit. Deinde mixturam ex essent. succini, tinctura tartari & antimoni. acris consistam ex infuso theiformi, quod herbas floresque roborantes ac antispasmodicas, tilie, melisse, lilior. convallium, sambuci, anethos, chamæmeli &c. habebat, singulis diebus mane ad 40. guttas capiendam suavisimam. Tum quoque pulveres leniter diaphoretici & antispasmodici, ex pulv. Marchionis, succino præp. cin-

nabari, nitro purif. & paukillo theriacæ cœl. compositi, ante cubitum ex usu fuerunt. Denique, quum maximum in ejusmodi morbis curandis momentum in justo affectuum modamine & accuratiori rerum non naturalium usu contineatur, primo ingrata & excitandis adversis ideis opportuna objecta removere, tum vero a cibis salitis, acris & nimium conditiis abstinere, corpus maximeque pedes contra frigoris injuriam munire & calidiores sanitati insensissimos potus cane pejus & angue fugere serio iussimus. Quibus per aliquot menses probe observatis id per Dei gratiam obtinui-  
mus, ut animo successu temporis ad se redeunte æger a furibundis paroxysmis immunis plane relinqueretur.

## OBSERVATIO II.

Vir ecclesiastico munere fungens, *Affectus melancholicus manico hypoch.* annorum triginta septem, staturæ mediocris corporisque macilenti, sed multis vasibus sanguineis instructi, patre natus hypochondriaco & ad melancholiam admodum prono, per multos jam annos hæmorrhoidum fluxum singulis fere mensibus revertentem expertus bene admodum valuit. At quum studiis nimium intentus profundis meditationibus, neglecto corporis motu, plus justo indulisset, easque ad seram usque noctem nudatis pedibus protraxisset, conturgentibus simul curis domesticis, salutaris hæc excretio sensim imminuitor facta penitus tandem desit. Non multo igitur post symptomata accesserunt hypochondriaca, quæ rusticibus, statulentis, molestisque imi ventris distensionibus & torminibus coli dolore æmulantibus cruciabantur. Sed quod pessimum erat, ipsa quoque mens magis quam antea videbatur affecta; siquidem perpetuo nunc rærebat, ab exigua vel nulla plæne causa meticulosus expaveſcebat & singulis diffidens omne fugiebat consortium: quæ mentis mala brevi intervallo tanta capiebant incrementa,

ut

ut æger noctu inſomniis agitari, vitæ inſidias timere, manus cum gemitibus complicare, alte mox vociferare & ſermonem continuum ſine nexu movere, mox cogitandum & quaſi elinguentem obmutefcere inciperet. Neque tamen ſine intermiſſione perpetuo ita ſurſit, ſed malum ex parte minuitur atque tum prægreſſa frigoris ſenſatione pulſuque paulatim celeriori vehementioriſque reddito recedit. Medici varia præſcripſerunt medicamina nitroſa, electuaria, conſectiones tandemque binæ circiter ſanguinis unciz fuerunt detractæ, ſed ſine ſingulari levamine.

### EPICRISIS CUM CONSILIO.

Docet nos hæc obſervatio, ex affectione hypochondriaca melancholiam, ex melancholia maniam oriri, omniaque hæc mala ex ſola hæmorrhoidum ſuppreſſione ſuam repetere poſſe originem. Ego conſultus cum pulſum durum & plenum, urinam aquoſam & tenuem, ſomnum inquietum multique ſtipitum inſomniis deprehenderem, atque graves ſub coſtis ſporiis tenſiones preſſorias & anxietates præcordiales cum pertinaciſſima alvi obſtructione urgere comperirem, a leni evacuatione curam inchoandam ratus potiunculam ordinavi mannatam & rhubarbarinam, denuoque ſanguinem ex altera pedum vena tuſa detrahendum & pediluvium ex ſuturibus triticeis, ſapone veneto & aqua ſtuviaſi parata ante decubitus adhibenda juſſi. Inter reliqua, quæ opem tulerunt, præſidia fuerunt pilulæ noſtræ baſſamicæ bis in hebdomade ſumendæ atque pulvis ex lapidum canerorum, tartari vitriolati, cremoris tartari, nitrî puriſſ. ana drachmis duabus, cinnabarum æte præp. drachma dimidia, olei cymini guttis ſex compoſitus, qui una cum liquoris anodynî, mineralis viginti guttulis ex aquæ fontanæ unciaz octo alternis diebus propinari debuit. Dein quoque inſuſum Theiſforme ex herba veron. ſum-

mitat. millefolii & radice glyzyrrhizæ conſectum ad aliquot patellas mane ſorbillandum ſuaſi. Pro potu ordinario decoctum chinæ & cichorei cum paſſulis ſubſtitui, & ad promovendam diſgeſtionem elixirum noſtrum viſcerale baſſamicum inter epulas, quas parcioreſeſſe injunxi, adſumendum commendavi. Gravate quidem hæc omnia noſter admittebat, iis tamen paulatim adſumtis ſtatuum bona pars ruſtibus multis & ſonoris diſcuſſa fuit, anguſtiæque cum mentis furore ſedari cœpit & aliqua hæmorrhoidum excretio apparere, quæ demum fonte Egrano inſequenti veris tempore cum juſto regime potato ex voto rediit, adeoque corporis animique integritati noſtrum reddidit. Ad præcavendas tamen recidivas commendatarum medicinarum uſum diutius protrahi juſſi.

### OBSERVATIO III.

Vir quadraginta annos natus, natione Judæus, complexionis melan-<sup>Melan-</sup>cholico-cholericæ, multis laboribus<sup>cholico</sup> cum meditatione ac vita ſedentaria<sup>cholico</sup> junctis diu vacavit, ſed nihil inde in-<sup>cholico</sup>commodi perſenſit. Aliquot autem ab-<sup>cholico</sup>hinc menſibus cum de inopinato filii<sup>cholico</sup>obitu certior factus inſigni mentis per-<sup>cholico</sup>turbatione ſollicitaretur, mox mæro-<sup>cholico</sup>roribus magis magisque indulgere, circa præcordia angî, hominumque converſationem fugere cœpit. Stipa-<sup>cholico</sup>bantur hæc mala continua pedum re-<sup>cholico</sup>frigeratione, ſomnoque inquieto & minus reſicienti, nec non pertinaci obſtructione alvi, quam nonniſi ſexto ſeptimove die rite ponebat. Quom-<sup>cholico</sup>que ita adhiectus totos ſex conſtituiſſet menſes, & denuo vehementi percelle-<sup>cholico</sup>retur terrore, ipſa maniaça invaſit ra-<sup>cholico</sup>bies, qua tantopere furebat & in ob-<sup>cholico</sup>vios quoscuque irruerat, ut vinculis conſtringi debuerit. Cui malo licet ſuppetias ferre amici voluerint, nulla tamen alimenta nedum medicamenta adſumſit. Nihilominus vena brachii & frontis coactæ inciſa inſigniter pro-<sup>cholico</sup>ſuit:



fuit : siquidem inde mens efferata paulo quietior reddita ad tristes cogitationes pristinamque melancholiz ægritudinem rediit . Hanc contra dein variis pugnatum est remediis , thermæ quoque Carolinz potatæ alvum egregie duxerunt , sed malo præterea vix quicquam detraxerunt . Ego igitur in consilium aditus hanc præscripsi medendi methodum . Primo fontem Selterarum , addita ad mæsuram falis Carolinarum drachma una , per aliquot hebdomadam spatium bibendum suavisimam . Vini ventriculi concoctricem roborare studuimus elixirio nostro viscerali temperate balsamico , quod ad 70. vel 80. guttulas inter epulas porreximus . Nec omissa sunt pediluvia , quibus alternis diebus ante cubitum æger pedes ad furas usque immittere debuit . Denique singularem præstiterunt opem pulveres leniter temperantes nervinis speciebus nupti ante lecti introitum exhibiti . Potui dedimus decoctum , cuius hæc erat formula . Recipe Ralurz cornu cervi , radices scorzonæ ana uncias duas , cremoris tartari drachmas tres . Coquantur in aquæ simplicis mensuris quatuor : adde syrupi acetositate citri uncias duas . Præterea , ut abstineret ab omnibus cibis fumo induratis , acribus & flatulentis ; e contrario autem tenuioribus cum sperientibus herbis paratis jusculis , interposito vini generosi haustu sedulus uteretur , corpusque frequentius moveret , imperavimus . Quibus remediis per aliquot tempus ita continuatis optime convaluit .

## EPICRISIS .

Ex præcedente morbi historia satis perspicue apparet , quanta apud melancholico hypochondriacos , qui vitam agunt sedentariam & umbratilem nimiumque mentis fatigationibus indulgent , ad producendum furorem in ipsis animi affectibus , maxime vero subitaneo mœnore & hunc superveniente vehementi terrore vis sit atque potentia , quantaque opus sit cautione

& prudentia , ut ejusmodi hominibus , ubi jam melancholia cum malo hypochondriaco junctæ variis se signis prodit , omnis graviorum animi perturbationum subtrahatur occasio . Docemur quoque ex hoc casu egregie , melancholiam & maniam alternatim procedere , ita ut ex uno malo ad alterum facillimus fiat transitus .

## OBSERVATIO IV.

Nobilioris generis femina , vix trigessimum ætatis annum transgressa <sup>Delirio  
mentis  
cum pra-  
vidio.</sup> temperamenti sanguineo-melancholici , ob adversos quosdam a fratre sibi illatos casus , in impensam incidit , postquam vix utero conceperat , animi tristitiam ; ad quam propulsandam quum haud modicum spiritus vini haustum frequentius adsumeret , accidit , ut non multo post in ipsum maniacum furorem abrepta vehementissime insaniret ; siquidem a nemine læcessita graviter subinde irascebatur , adstantes saliva conspurcabat , vestes dilacerabat , nec uno consistere loco poterat , quin miris se modis jactans corpus spectaculo exponeret . Et sic habebat primis graviditatis mensibus ; quum vero ad dimidium gestationis tempus pervenisset , rabie paulatim remittente perfectæ ad se redit & stato tempore felicem exclusit partum . Lochia quoque dein rite fluxerunt , nec quicquam , uti solet , molestiæ puerperium reliquit ; nisi quod posthæc suspectum valetudinis statum mensuræ purgationes retentæ portenderent , quas tamen quum Medici falsa novæ imprægnationis specie decepti promovere dubitarent , factum prohi dolor est , ut feratiterum rabies animum occuparet . Varia hinc inde præscripta remedia purgantia , temperantia , specifica nihil attulerunt opis ; quare ut consilio & auxilio ego succurrerem per litteras amici me rogaverunt .

# • EPICRISIS CUM CONSILIO.

In præmissa morbi historia id maxime debet animadverti, delirium ultimis graviditatis mensibus sponte evanuisse, partu vero excluso iterum rediisse. Cujus rei ratio ita me judice, debet explicari. Quo magis fortis in utero mole sua crescit, eo plus opus habet nutrimenti; hinc major sanguinis quantitas ad uterum confluit, quæ edito partu reliquis corporis partibus denuo impertitur. Quum vero in nostra ægrotâ mensium accesserit retardatio, non modo sanguis copia increvit, sed & valde spissus & ad trajiciendum tenuissimos canaliculos ineptissimus evasit; unde facile potuit in primis viis & circa uteri regionem spastica strictura oriri, qua cruor ille tenax ad debile caput delatus rationis usum denuo turbavit. Quod ad curationem attinet, eo potissimum respiciendum putavi, ut sanguinis circuitus per totum corpus, maximeque per uterum suæ restituatur libertati. Quo fine primo suasi, ut ante decubitus temperatiora adhibeantur pediluvia, dein per menses circiter dimensum fontes Egrani decenti cum regimine & interpolitis stomachicis medicamentis tepide bibantur; circa tempus vero, quo alias ex utero ferri suevit menstrua purgatio, per aliquot dies ante lecti introitum dosis capiat pilularum balsamicarum, & sequente die mane drachma una salis aperitivi, ex lapid. cancerorum, tartaro vitriolato. & nitro compositi, superbibendo vascula quædam infusi theiformis ex floribus nervinis & antispasmodicis tiliz, primulæ veris, anthos & citri corticibus constatum. Qua methode id per Dei gratiam acquisivimus, ut ægra a malo suo sensim paulatimque liberata. nunc integerrime vivat.

## OBSERVATIO V.

Femina annum agens secundum & quadragesimum, temperamenti melancholico cholericis, animique a natura ad tristitiam valde dispositi, nunquam a viro gravida, sub regulari & ordinato mensium successu illibatam semper præ se tulit valetudinem. Interim, quum odiofo foceræ convictu per aliquod tempus uti debuerit, plena inde luctus & mœroris, nulla vel sane levissima data causa, sæpius acerbis profundere lacrimas coepit, donec dein inter ipsum mensium fluxum post graviozem itacundiz affectum delirium accessit maniacum, quod totas sex hebdomadas inhærebat. Abhinc triste hoc malum singulis sex septemve mensibus elapsis recrudescens has notas habet prænuncias: sentit ægra circa tempus cum menstrua recurrit periodus pressorium in pectore dextroque hypochondrio dolorem capitis dentiumque membranas in consensum rapientem; somnus imminuitur, & nunquam non vexant conatus vomendi, modo irriti, modo ipsi vomitus materiam, quæ aque spumose & pituitæ flavæ similis est, eructantes: fluxu demum præsentente ipse adoritur paroxysmus, qui variam ludit scenam. Mox enim dementata cantilenis & tripudio exultans in cachinnos eumpit, miroque verborum flumine delira præfert; mox tristes demisso capite solem terram inspicies diu obmutescit; mox ab omni cibo potuque abhorret, mox collecto paulum animo de magna siti conqueritur, imo nonnunquam tanta insanit vehementia, ut, nisi vi suorum cohibita, sibi aliisque manus sit illatura. Somnus præterea, qui admodum parvus est, terrificis turbatur insomnia, alvus est adstrictissima, nonnisi tertio quartove die dura scybala difficiliori expressione reddens, arteriæ exploratæ admotas manus validissimo celerrimoque feriunt pulsu, & quod notari meretur, delirii post ali-

*Delirium maniacum per violentiam ab ira causatum.*

aliquot dierum intervallum circa vespertinum tempus semper graves solent esse accessiones, quæ ægra per extremorum refrigerationes, per dolores universi corporis tensivos & maculas sublividas in brachiis pedibusque subinde obvias præsentit. Ubi finita morbi periodo mens efferata ad se rediit, præter languores omnes artus occupantes nulla rationis memorizque labe per integrum intermissionis spatium animadvertitur. Requisiti Medici pugnarunt vomitoriis, purgantibus, V. Snibus, foteriis quoque fontibus Egranis, sed parum inde misera percepit utilitatis, nisi quod horum usu delirium serius paulo redierit. Ego igitur consultus quum maximum curationis momentum in præcavendis ferilibus recidivis situm esse deprehenderem, primo omnium mentis tranquillitatem, rectamque vivendi rationem in hunc modum instituendam præcepi, ut ægra corpus frequentius, quam antea sub serena tempestate moderato exercitio moveat, pariorique & leviori victu utens potui ordinario decoctum hordei excoriatum, C. Cervi raspati, cum pauxillo corticum citri vel cinnamomi substituit. Ad temperandam humorum acrimoniam infusum theiforme ex herba melissæ, floribus tiliz & pauxillo cort. citri confectum mane bibendum suasi. Nec ego deinceps irritum aquarum mineralium effectum fore arbitratus, denuo per aliquot hebdomadam decursum fontem Egranum vel Schwalbacensem mane calide bibendam, atque balnea temperate calida ante decubitus applicanda summo opere commendavi, quæ etiam circa instans mensium tempus, interposito pilularum balsamicarum usu, locum habere possent. Denique tam præservandi quam curandi fine egregiam præstitit opem mixtura quædam ex liquoris anodynî drachmis duabus, essent. castorei drachma una & spiritus salis ammoniaci drachma dimidia composita, quam in paroxysmo pariter ac extra ipsum sub lunæ mutationi-

bus pondere XL. guttularum bis de die vel solam vel cum pulvere antispasmodico ex aqua liliorum convall. sine vino parata exhiberi iussi. Pulveris hæc fuit formula: Recipe Pulveris Marchion. C.C. philof. præp. ana drachmas duas, nitri purif. drachmam unam cum dimidia, succin. præp. drachm. unam, cinnabaris scrupulum. Alvum denique victu potius lubricante aut passulis rhabbarinis, quam fortioribus purgantibus apertam servandam imperavi, adeoque Dei gratia effeci, ut paroxysmi rariores & mitiores accesserint, Nec dubitamus fore, ut sub horum remedium usu diutius protracto, ægra a misero malo liberetur omnino.

## E P I C R I S I S.

Ex hac observatione illud notatu dignum occurrit, quod inter ipsum mentium fluxum, post vehementem iræ affectum delirii facta sit accessio: utpote experientia sæpius me docuit, graves animi perturbationes ante, sub & post menstruum fluxionem abortas pessimas passiones, imo deliria quoque, si caput natura debile existit, producere. Porro notabile est, quod recidivæ semper cum periodis mensis in scenam prodierint. Nam tota natura sexus feminini circa mensium fluxum ingentem patitur mutationem, dum motus vitales ad exteriora seu corporis peripheriam tendentes per spasticas stricturas ad interiora potius convertuntur, ut exinde totus sanguinis circulus inæqualis, & improporcionatus redditus, ad supernas & internas partes impetuosæ ruat; unde ingentium symptomatum origo. Quapropter, si in feminis deliria, vel ipsorum paroxysmos avertere velit medicus, necesse est, ut ad periodum mensium reflectat & circa id temporis opportuna remedia, quæ sanguinis circulum æqualem efficiunt & spasticas stricturas consopiant, ut fere sunt balnea téperata & blanda diaphoretica cum nitrois & antispasmodicis remixta, in usum trahat.

## OBSERVATIO VI.

*Furor  
melan-  
cholicus  
mentis.*

Militiæ præfectus, quadraginta & aliquot annorum, stature valde proceræ, sanguineo cholericus ex familia prognatus, in qua plures mentis quædam alienatione laborarunt; a prima adolescentia strenuæ computationibus interfuit & vinum ad ebrietatem usque larga in quantitate ingurgitavit. Sed nihilominus bene valuit; jam vero dimidium effluxit anni, quum ob præmaturum uxoris formosæ obitum in summam conjiceretur tristitiam, ut nullo admissio solamine omnem cibum recusaret & in omnis multas noctes transigeret. Sublequebatur perfecta mentis abalienatio, interdum cum summo furore, qui levi ex causa irritabatur, conjuncta, ita ut æger in vinculis contineri deberet. Amisso per venæ sectionem, ter intra mensem instituta, multo sanguine & datis nitro-sis hic furor quidem remittebat, sed nunquam penitus cessabat. Missus ad me consilii causa conquirebatur de pertinaci alvi obstructione & assidua vigilia, valde confusa sine ordine gariens, facies erat rubicunda & sanguine turgida. Ordinavi pediluvia temperata singulis diebus ante decubitus adhibenda & pulveres nitrosos aliquoties de die sumendos. Ad alvum apertam servandam præscripti potionem mannatam & ut sæpius æger mane lac recens multum biberet. Loco potus ordinarii commendavi aquam puram fontanam, & capiti imponendum suavis epithema, quod aquæ rosarum, aceti rosarum uncias duas, nitri purificati drachmas duas, & olei ligni rhodii guttas XII. habebat, tam felici eventu, ut intra mensis spatium æger perfecte convalesceret.

## E P I C R I S I S.

Docet inprimis hic casus, quantum in hominum animis corporibusque sibi vindictæ mœroris affectus, ob sum-

mum rei dilectæ desiderium in nobis obortus, ita prorsus, ut inde in insaniam ducantur homines, satis alioquin sani & mentis compotes. Quod quidem eo facilius evenire deprehendimus, si quis a parentibus natus est melancholicis, vel ipsa mania correptis. Sicut enim, experientia teste, morbi, quibus parentes consistantur, plerumque traducuntur ad liberos; ita nihil dubii est, quin noster ægrotus naturalem quandam per nativitatem obtinuerit cerebri debilitatem, & ad mentis morbos dispositionem, qua præsentem facile fieri potuit, ut data occasione, quæ in hoc casu diuturnus luctus fuit, in ipsam mentis alienationem inciderit. Neque parum profecto ad capitis debilitatem contribuit potuum spirituosorum abusus, quibus nihil est ad inferendam insaniam potentius. In curatione eo potissimum respeximus, ut sanguinis impetus a capite divertatur; qui vero quum ab alvi obstructione nunquam non sustentetur, primo omnium præscripti laxans mannatum & lac recens emulsum, quod in præsentem ægrotum insignem alvum laxandi exseruit efficaciam.

## OBSERVATIO VII.

Honestæ hujus loci femina, triginta *Delirium* & aliquot annos nata, vitæ otiosæ & libidinose dedita, animo æque ac corpore optime semper valuit. At vero, quum marito per inopinatam mortem orbata se coactam videret, ut propter rem angustam domi parce nimis impossibilem viveret, plena inde luctus omne hominum consortium per longum tempus fugiebat. Sat diu itaque mœrore cum tacita iracundia juncto pressa, gravem incidebat mentis alienationem; siquidem mox præter modum tristis lacrymabat, mox summe hilaris ridebat & puerorum more variis delectabatur ineptiis, mox effrenis & temeraria cum adstantibus altercari conabatur. In consilium adhibebatur mecum medicus natione Gallus, & cura.

curatio in hunc, qui sequitur modum instituebatur. Præmissa venæsectione in pede commendavimus balnea temperata quovis die vesperi adhibenda, & emulsionem refrigerantem in ipso infessu capiti cum linteo duplicato applicandam. Deinceps crebrius dedimus, interpositis ad alvum apertam servandam lenioribus laxantibus, pulveres temperantes nitrosos, atque potui solam aquam fontanam permisimus. Et quum id anni tempus esset, ut cucumeres maturefcerent & sale muriatico conficerentur, consultum duximus, inter cibos crebrius eosdem commendare; & adsumsit quoque ægra tam larga quantitate, ut nihil fere amplius cibi ad sustentandam vitam opus habuerit. Inter hæc mense circiter elapso indies major affulgebat spes convalescentiæ, quæ etiam brevi post, divina annuente gratia insequēbatur, ita, ut nunc integra tum animi tum corporis fruat incolmumate.

### E P I C R I S I S.

Nihil profecto magis sanitati est ipsensum, quam subita quædam mutatio, qualem in nostra ægrota accidisse deplorandum est, utpote quum laetum vitæ genus simul ac semel cum valde misero commutandi necessitas fuerit. In curatione ex voto obtinenda primo omnium studuimus, ut impetuofus sanguinis cursus a capite ad inferiora convertatur, quod optime præstitimus venæ sectione in pede administrata, & balneis aquæ dulcis, utpote quibus nervosæ imi ventris partes spasmos contractæ emolliuntur, & summa quoque cutis, quæ frigore tectæ, contractione affecta est, relaxatur, ut revocato sanguinis itinere ad habitum corporis, liber ipsi circuitus per univertum corpus concilietur. Quod attinet peculiarem cucumerum sale conditorum effectum, de hoc ita judicandum arbitror. Acida ejusmodi saluta vegetabilium sensibiles & mercuriales corporis partes facile irri-

tant & vellicant, uti fere videmus in tussi, ubi nervos pneumonicos ad tussim continuo stimulant; quare veritatem omnino videtur consentaneum, ut cursum sanguinis magis promoveant, quam impediant; qui vero quum in melancholicis nunquam non tardus & debilis, maxime per caput, observetur, opus omnino habet aliquo stimulo, quem dicta vegetabilia optime & sine noxa addunt. Et profecto, si dicere debeam, quod res est, ego adhuc in diversis aliis mente perversis hos fructus deprehendi utilissimos, ut ideo adferere non pudeat, quod optimum sint inter cibos mente ægrotantium condimentum.

### OBSERVATIO VIII.

Juvenis, qui vix decimum septimum ætatis annum attingit, temperamento præditus cholericus sanguineo, excitati alias & prompti ad studia ingenii, per anni decursum profundiori meditatione in inveniendâ machina, quam dicunt perpetuum mobile, dies noctesque defudavit; a patre autem soliditatis ideo accusatus, & a proposito sub inanis studii admonitione avocatus, in tacitam mœstitiâ incidit, quæ subitaneo incendii terrore adeo increvit, ut in furorem plane transierit, siquidem varia nunc de inventis suis magna & præclara jactitat, terrificis noctu insomniis agitur manu horribilia & inepta, quæ vidisse sibi imaginatur, longa serie narrat; jam se paralyticum, lunaticum vel a diabolo obsessum ipsumque dæmonem pronuntiat, & diras admodum execrationes evomit, jam muratis in mansuetudinem moribus ardentissimas ad Deum preces fundit perpetuis suspiriis ingemiscens. Præterea febrili pulsuum celeritate & admirando auditu acuminis gaudet. Cibum & potum satis quidem bene appetit, nec officio suo alvus deesse animadvertitur. Sed, quod male sperare jubet, est quod malum sine alterna requie continuum

*Delirio  
maniaci  
a nimia  
audacia  
obsessum*

faviat, nec insignem habeat intermissionem. In tali rerum statu ego consultus venam primo pedis, dein sublingualem aperiri, & pediluvii moderate calidis ægrum immitti iussi, unde furoris vehementia mirum composita videbatur. Dein operæ pretium fecerunt pulveres leniter nitrosi camphora remixti, quos circa somni tempus assumere æger debuit; nec dubito, quin vis morbi his demum remediis sit obsecuturæ.

### EPICRISIS.

Videmus ex hoc casu, quantum profundæ meditationes ad caput debilitandum obtineant potentia, ut quisque graviores exinde morbum, imo deliria quoque pertimescendi rationem habeat. maxime si aliæ & hereditariæ causæ accesserint. Adsumsit æger largum cibum, cui dissolvendo & in bonum chylum & sanguinem transmutando menstruum illud salivale, sine dubio nimio acore infectum, vix per fuit, ut nihil dubii sit, quin morbus, ut omnes aliæ chronicæ passionēs multum inde foveatur.

Plura exempla legantur in Consult. med. Tom. I. Casu. XXXIII. usque XXXVIII.

## CAPUT IX.

### DE VIRIUM LAPSU ET ANIMI DELIQUIIS.

#### THESES PATHOLOGICÆ.

##### §. I.

*Primum in homine non desinitur.*  
**S**ulla in disciplina medica doctrina clariorem meretur evolutionem; ea certe est, quæ de corporis humani viribus agit & causis; siquidem omne, quod naturæ inest robur & energia, qua vitæ animique pariter ac corporis constat integritas, qua morbi tum ar-

centur tum sanantur, qua ipsa denique mors avertitur, unice in viribus, quæ determinata quadam motus efficacia se exerunt, consistere animadvertitur. Sicut enim robusta natura corpusque firmum habendum est illud, quod integris viribus instructum, non tam facile a causis externis læditur, læsum vero vel suo ipsius robore sine insigni medicina ope sanatur: ita e contrario imbecillis naturæ indicium est, si quis ob virium infirmitatem variis obnoxius ægritudinibus ex iisdem a medicina non adiutus raro admodum emergit. Quod si dein morbos inspicimus variorumque eorum decursus, simili modo in solis viribus omnis salutis spes videtur posita; quæ enim ubi subito diutiusque succumbunt, de vita ægroti periclitari certissimum est. Quin denique ipsam, quæ morbos sæpe comitatur, malignitatem maxima ex parte in hoc virium lapsu contineri deprehendimus, ita prorsus, ut ex debili hoc statu ad ipsam mortem aditus pateat facilissimus, utpote quæ nil nisi plenaria virium, a quibus vitales in homine motus pendunt, cessatio est.

##### §. II.

Quum itaque tanta virium in nobis *Optatæ Medici-  
dis-um  
de cons-  
siti vi-  
tium.* sit necessitas, ut in corpore tam sano conservando, quam morbofo persanando nihil omnino sine iisdem Medicis valeat; sæpenumero mirari soleo, tum in tanta bonorum auctorum multitudine, tantaque medicina luce, quæ novo quotidie splendore prodit, tam pauci existant, qui utilissimam hanc in re medica doctrinam paullo accuratius explanassent. Equidem plures hinc inde in Medicorum libris occurrunt de virium causis opiniones, quas alii, qui omnes corporis tam voluntarios, quam involuntarios, vitales & mechanicos motus ad altius quoddam principium referunt, seu effectum animæ considerant; alii, qui robur & vim motricem solidorum, qua fluida reguntur, ab aereo-æthereo-elastico indolis materia mobilissima in sanguine contenta deducunt, pro stabilenda sententia

rentia sua contraria plane argumenta proferunt; attamen, quum nudis hisce nominibus & sententiarum divortiis rem ex merito nondum exhaustam evolutamque existimem, nostrum de eadem æquum rectumque iudicium in præsentī tractatione, ubi de virium defectu animique deliquiis acturi sumus, pluribus infra suppeditabimus.

§. III.

Ante vero quam specialem huius thematis suscipimus explicationem, eam re fore putamus, primo omnium dispicere, qualis virium ad naturā firmam æque ac infirmam constituendam debeat esse conditio. In quo quidem perficiendo, tenendum, quod, licet omnes in nostro corpore functiones tum animales, tum vitales & naturales unico solidorum ac fluidorum peragantur motu; minime tamen, sicut in ceteris rebus corporeis, ab ipsius efficacia & a magna movendi potentia ad insignem virium copiam & abhinc dependentem sanitatis integritatem concludi debeat. Etenim, quum a sapientissimo conditore Deo ita corporis humani constructa sit fabrica, ut viribus ad sanitatem necessariis certus tantum motuum inserviat numerus, certa mensura; facile patet, eam solum robustam & bene valentem naturam esse dicendam, ubi motuum nec nimis excessiva, nec nimis deficiens, sed valde temperata æquilibrisque advertitur proportio, cum illa e contrario corpora imbecillibus sint adnumeranda, quæ ex levi causa externa ad perversos motus facile concitantur. Cujus adserti veritas vel exinde plenius poterit intelligi, si effrenes & ad convulsivum usque gradum auctas cordis & arteriarum, reliquorumque membrorum agitationes perpendimus; utpote quæ ob summam, quam arguunt, motuum efficaciam nulla unquam ratione pro salutari & sanitati firmandæ apprime apto robore haberi possunt, sed maximam potius virium jacturam, imo mortis periculum haud raro prænu-  
*Ante vero quam specialem huius thematis suscipimus explicationem, eam re fore putamus, primo omnium dispicere, qualis virium ad naturā firmam æque ac infirmam constituendam debeat esse conditio.*

§. IV.

His prælibatis virium naturalium subiti lapsus considerationem propius accedimus, cujus tria præcipua dantur genera. Primus gradus in notabili virium corporis remissione consistit atque his potissimum cognoscitur criteriis: si insignis & insueta corporis lassitudo membrorumque ad voluntarios motus subeundos observatur inertia, si sensuum torpor, appetitus prostratio, inquietudo & circa præcordia anxietas, debilitas pulsuum & raritas extremorumque refrigeratio adest & gravitas. Alter, qui priori major est gradus ob majorem corporis animique virium defectum dicitur lipothymia, quæ cum faciei, labiorum & genarum pallore omniumque sensuum stupore, ut, quid cum ipsis agatur, plane non sentiant ægroti, adoritur. Tum quoque oculorum claritas, obductis quali tenebris obscuratur, arteriæ admotam manum exiguis feriunt pulsibus, corpus prostrernitur & partes extremæ naturali destitutæ calore intensius frigent. Tertium denique, sed pessimum gradum constituit syncope, qua homines correpti adeo animi corporisque viribus deficiunt, ut mortis imaginem sistant; siquidem omni sermonis usu privati subito corruunt, alto quasi sopore oppressi absque convulsionis aut tremoris apparentia immobiles jacent; respiratio & pulsus intercipitur, artus refrigerant & collabuntur, facies est Hippocratica & copiosus sudor ad tactum frigidus circa tempora erumpere deprehenditur.

§. V.

Superatis tam lipothymiz quam synopes accessionibus sensus inier alta sunt spiritia paulatim redeunt, cordis motus restituitur ideoque pulsus, qui antea valde debilis aut plane absconditus erat nunc vegetior erectiorque redditur, anxietates evanescent, in partes extremas calor redit, facies contracta & pallida explicatio fit & rubicundior, imo & reliquæ functiones suppressæ sensum sensumque eriguntur, ut, qui  
*Superatis tam lipothymiz quam synopes accessionibus sensus inier alta sunt spiritia paulatim redeunt, cordis motus restituitur ideoque pulsus, qui antea valde debilis aut plane absconditus erat nunc vegetior erectiorque redditur, anxietates evanescent, in partes extremas calor redit, facies contracta & pallida explicatio fit & rubicundior, imo & reliquæ functiones suppressæ sensum sensumque eriguntur, ut, qui*

videre mortui habebantur ægri, nunc integra frui sanitate videantur, nisi adhuc de insigni artuum corporisque universi lassitudine & imbecillitate querantur.

## §. VI.

Utut autem subito & præter omnium opinionem gravia hæc mala accedant, sunt tamen, quæ illorum adventum prænuntiant symptomata, quorum potissima sunt: totius corporis languor & insolens virium infirmitas, vertigo, aurium tinnitus & subitanea coloris in facie permutatio. Præcedunt quoque in nonnullis oscitationes, pandiculationes & circa præcordia anxietates, cum pulsu inæquali ac horripilationis sensu; quibus nonnunquam abdominis a flatibus distensiones & borborygmi junguntur.

## §. VII.

Ex dictis jam haud difficulter colligitur, quo modo præceps virium lapsus animique deliquia ab aliis se passionibus distinguant & a medentibus cognosci possint ac debeant. Differunt enim primo omnium epilepsia, in qua quidem leviores animi defectiones antecedunt, quam corporis moles convulsivis agitatur motibus & contractionibus, quæ tamen ad lipothymiam usque nunquam ascendunt. Differunt deinde ab apoplexia, ubi sub sensuum tam exter-  
 norum quam internorum abolitione arteriæ satis adhuc fortiter pulsant & respiratio, licet ægerrima, cum stertore remanet; quæ phenomena in simplici animi deliquio non videntur. Discrepant denique a suffocatione hysterica. In hac namque eximia quidem sensuum advertitur perturbatio, sed fauces simul summe angustantur & laqueo veluti strangulantur, arteriæ fortibus agitantur motibus & facies vivo imbuta rubore conspicitur; quæ omnia tamen contrario plane modo se habent in animi deliquiis, uti videmus, si syncope, quod sæpius accidit, præfocationi uterinæ jungitur. Tum enim dictorum symptomatum inopinata fit immutatio.

## §. VIII.

Quod attinet subjecta hisce affectionibus præ ceteris obnoxia, attenta nos docet experientia, eos potissimum homines in easdem incidere, qui aut phlegmaticam & torpidiorem obtinent naturam, aut ob teneriorem vasorum & fibrarum texturam habitus corporis sunt spongiosi sanguineque & succis pleni, nec non qui molliter in otio educati labores nisi ægerrime ferunt & a levi causa externa, ut ab aeris vel frigidiore vel calidioris temperie, a medicamentis, quin alimentis, vel solo ingrato odore facilius alterantur. Et quum ingens semper corporis inter & animi functiones a sanioribus Medicis adnotetur conspiratio, nec illos ab hisce affectibus immunes deprehendimus, qui ad imperuosas & præcipes animi commotiones, ad iram, impatentiam, metum, variasque confusas imaginationes proni existunt. Unde jam in propatulo est ratio, cur respectu ætatis præ juvenibus pueri & senes, & si sexum respiciamus, feminae magis quam viri magno virium defectui & deliquiis sint expositæ, quæ eo certius eveniunt, si femina utero gerunt, nimis tum per mensium tum lochiorum fluxum hæmorrhagiis debilitatæ sunt, vel difficili partu laborant.

## §. IX.

Quodsi nunc ad ipsam causam animi advertimus, hanc in sanguinis ejusque motus vitio ponendam esse, nemo saniorum Medicorum est, qui in dubium vocabit. Quemadmodum enim, si sanguinis temperati & sufficientis in singulas partes liber æqualisque influxus & hinc debita liquidum spirituosum per omnes nervos distributio fuerit; omne virium robur, per quod functionum, sive animalium, sive vitalium & naturalium vigorem intelligimus, quam optime constat; ita e contrario, ubi virium, quæ per immixtas omnis generis functiones se manifestat, insignis animadvertitur defectio, ibi liquidi tam arterio-  
 rum

Subjecta  
animi  
deli-  
quior;

Signa  
anterior-  
dentia.

Difficili-  
ta anti-  
mi deli-  
quior.

1) ab epi-  
lepsia.

2) ab epi-  
plexia.

3) a suf-  
focatione  
hysterica.

Consa-  
niam  
dell-  
quior  
proxima.



tum nervosi vitium subesse rectissime concluditur. Jam vero rursus in physiologia medica satis superque monstratum est, quod omnium fluidorum per corpus progressus & in organa influxus a solo corde, quod primum in nobis movens ultimumque moriens, seu suprema illa machina est, quæ motu suo omnes reliquas animat partes, unice dependeat; quare nihil dubii est, quin & corporis prostrationis & animi deliquiorum causa ab ipso cordis motu vel imminuto, vel prorsus cessante recte deducenda veniat. Qua quidem in re plenius confirmamur, si rite perpendimus, essentiali & characteristico lipothymix & syncopes signum præbere pulsus valde exiguum, vel plane interceptum, utpote qui cordis motum indicat luculentissime.

## §. X.

*Cordis  
fluctua-  
tio atque  
tremor.*

Quum itaque a cordis motu tanta, si non omnia, in nobis dependeat, haud supervacaneum erit, utilissimum hunc motum secundum causas suas naturales concinne quidem sed accurate exponere. Cordis substantiam musculosam esse non modo jam vetustissimi HIPPOCRATIS sententia, verum etiam omnium, qui nostra ætate inclaruerunt, anatomicorum adfectio est. Quodsi enim ea, quæ ad musculosam fabricam ullo modo pertinent, rite pensitamus; omnia profecto in cordis structura simili modo deprehendimus. Adest hic tendo satis validus in basi cordis vasa cingens, qui uti in omnibus musculis, ita & hic principium motus atque finis exiit, cujus progenies tum vena cava, tum in primis arteria magna rectissime statuitur, in quem duplicis generis fibræ tam mirabili dispositæ ordine inferuntur, ut musculum biventrem aptissime constituant. Fibræ enim exteriores in modum cochleæ conum involventes in oppositi lateris tendinem dextrorsum, interiores inverso inferuntur ductu. Quid? quod præter has communes cuiuslibet ventriculi propriæ sunt fibræ, quarum internæ itidem contrario mo-

do procedunt atque pro validiori sanguinis in universum corpus ejusque maxime remotas partes propulsione sinistro ventriculo & copiosiores & robustiores; dextro vero præ sinistro eique minori ventriculo in vicinis tantum pulmones flaccidæ rarioreque obtingunt. Harum præterea fibrarum idem cum aliorum musculorum fibris motus est atque contractio, quæ in abbreviatione consistit, ut tantum in latitudine adquirant, quantum in longitudine amittant, ideoque semper conus basi fiat proximior; unde etiam non tantum externe, verum etiam interne præcipue tumor observatur. Hinc cum auriculæ ventriculorum contrahuntur, parietes se invicem tangunt, & ita contentorum fluidum expellunt. Nervi quoque dein omnibus musculis animam vigoremque largientes in basin cordis vasorumque radices, quas tendines cordis esse jam ante dictum est, implantati sunt octavi scilicet & intercostalis paris furculi, ut de arteriis venisque coronariis, quæ magna copia per musculosam cordis compagem distributæ cordis motum egregie adjuvant, nihil dicamus.

## §. XI.

Moveri itaque cor ipsa ejus fabrica ipsique sensus fidem faciunt. Duplex *Cordis motus* autem est motus dilatationis, quæ præcedit & a Græcis diastoles nomine insignitur, qua cordis ventriculi distenduntur, & fibræ parietes versus elongantur, ut sanguis ex auriculis in eodem influere possit, & constrictionis, sive systole, qua fibræ contrahuntur & instar machine hydraulicæ sanguis in canales arteriosos & ex his in venosos, ex his autem rursus in auriculam dextram urgetur, ut hac ratione circulatio perficiatur.

## §. XII.

Hæc dum meditamur, dubium quoddam non adeo exigui nascitur momenti: num diastole cordis a sanguinis illa *Diastole* *unde dicitur* *prædictæ* beatæ vel distendētis copia promoveatur. Neque tamen, a solo sanguine simplicem & spontaneam hanc dependere

resurrectionem, arbitramur, eo quod manum fortiter prementem æque ac systole eludat, quale quid a sanguinis impetu fieri haud suspicandum est, maxime quom etiam evulsa omnique liquore vacua piscium corda diastolen non minus quam systolen diutius adhuc exhibere animadvertimus. Multo magis illam tam a fibrarum hujus mirifici musculi diversis ordinibus quam a liquidis subtilioris elastici, quod nervi vehunt, sanguinique spirituosii influxu oriri probabile est. Quod vero nerveum fluidum in cordis fibras influat, vel notissimo WILLISII & LOBERI experimento constat, quo nervis in cer vice octavi paris dissectis & iis qui a plexu intercostali oriuntur ligatis, sanguineque in musculosam cordis substantiam intercepto cor omni motu destituitur. Ut adeo certissimum sit, quod tam ipse sanguis motu intestino calido & particulis aereo-æthereo elasticis imbutus, quam liquidum nervorum hunc dilatationis actum egregie adjuvet. Id quod vel ex hoc experimento clarius elucescit, quod mediante calore pulsus cordis in animali deficiens, si aqua calida foveatur, ad momenta revocari possit.

## §. XIII.

Quæ omnia licet tam clare perspicueque pateant, ut in dubium vocari nequeant; sunt tamen nonnulli, qui hanc de motu cordis doctrinam, qua illud primum movens statuimus, impugnare audent, existimantes, embryoni jam prius quam cordis absoluta sit fabricatio, punctum quoddam saliens seu cordis inesse rudimentum. At vero aliam longe rationem esse judico animalis formandi & adhuc imperfecti, & formati omnibusque suis partibus instructi & in lucem editi, ut ideo ab uno statu ad alterum argumentatione procedere vix liceat. Huic enim bullulæ seu compendio inclusus est spiritus ille architectonicus, qui motui quidem per se citra multa organa expandendo & quaquaversum partes extra partes fabricando sufficit in animali vero per-

fecto nonnisi organorum beneficio perficitur.

## §. XIV.

Exposita sic cordis structura & naturali constitutione evolutoque genuino ejus usu & officio: facilis nunc via est ad præternaturalem statum pernoscendum & ad veram tam lipothymiz quam syncope, quæ omnis ævi Medicorum consensu cordis vitiatu motu nituntur, definitionem sistendam. Est itaque syncope motus cordis ad tempus sufflaminatio cum ingenti virium & tam animi quam corporis functionum defectu, ab impedito, vel minus sufficienti liquidi spirituosii per nervos & sanguinis probe temperati per vasa coronaria in musculosam cordis substantiam influxu dependens. Neque multum differentem exposcit definitionem altera animi deliquioris species lipothymia, utpote quæ nisi gradu, dum non in prorsus sublatu, sed tantum nimis debili cordis motu consistit, a syncope nihil differt.

## §. XV.

His præmissis, videamus nunc, quæ ex causis mediatis ad ferale hocce morbos inducendos suum conferant symbolum. Quum vero, ut satis ex superioribus liquet, proxima deficientis, vel plane cessantis motus cordis causa in denegato, vel minus recte se habente fluidi nervosi & laudabilis sanguinis influxu contineatur, sequitur, ut ad duo hæcce momenta animum potissimum adplicemus. Ita primo omnium certa experientie fide constat, eos, qui capitis nervosique generis imbecillitate laborant, qui dolores gravativos, vertigines auriumque tinnitus cum frequenti coryza, gravedine, oculorum caligine & somno turbulento patiuntur, ob liquidi, quod ex cerebro in nervos dispergitur, subtilissimi penuriam pravamque diathesin non modo virium summo languori, sed & ipsius animi deliquis corripit facillime.

## §. XVI.

Nihil autem prope ex omni causarum serie vehementius celeriusque no-

Definitio  
sine syn-  
copæ &  
lipothymia.

Causa  
mediata  
sunt  
propterea  
si morbi.

Objectiones  
non con-  
tra mo-  
tum cor-  
dis reser-  
vantur.

Animi  
affectus.

stros inducere morbos valet, quam graviore animi perturbationes, præsertim terror panieus, metus, & tristitia. Quamvis enim motus vitales & mechanici, cujus generis sunt cordis & arteriarum aliorumque humoribus tum secerneendis, tum excernendis dicatorem canalium, nec non ventriculi & intestinorum motus, a principio in nobis sentiente & intelligente, quod animæ nomine venit, directe & proxime non dependeant, sed motus potius voluntarii ab eodem, licet modo nobis incognito, dirigantur; id tamen attenta nos docet observatio, propter eximiam, quæ voluntarias & involuntarias functiones intercedit harmoniam, miram animi affectuum in motibus nostri corporis vitalibus pervertendis esse efficaciam. Hinc, si terroris, qui vitali motuum œconomix insensibilis est, agendi modum accuratius inspicimus, ita ipsum deprehendimus comparatum, ut partes externas constringendo nimiam sanguinis ad cor & adnexa vasa congestionem inferat; unde pressio, ut ajunt, pede extremorum refrigerationes, ingens artuum gravitas ac languor, circa præcordia anxietas, cordis palpitatio, & magna spirandi difficultas cum pulsu parvo & contracto sequuntur; quæ omnia eo certius accidunt, si abundans sanguinis copia peccaverit. Nec profecto minor formidinis & ob instans grave periculum tristitiæ in corpus nostrum potentia est; quandoquidem liquidi nervosi in singula motuum organa influxum minuendo æquabilem sanguinis progressum maxime retardat & quo minus spirituosæ ejus portio recte evolatur, impedit; ut ideo haud mirum videri debeat, si ingens animi corporisque virium dejectio inde emergat, quæ longe gravior est in subjectis languidis aut a quacunque causa, ut prægresso morbo, jam antea debilitatis.

§. XVII.

Posthæc haud paucæ supersunt earum rerum, quas non naturales appel-

lamus, quæ ad affectus nostros contribuant. Ex quibus primum libi vendicat locum incongrua victus ratio. Si cut enim alimenta bono succo referta & decenti quantitate assumta sanguini bono & lymphatico, qui viribus pabulum suggerit, generando apprimè apta exsunt; ita e contrario cibi erudiores & qui parum præbent nutrimenti, vel ipsa iocunda diutius protracta ad virium defectum & animi deliquia plurimum afferunt momenti. Præter victum, aeris quoque temperies causam nostris malis præbet antecedentem; quæ si frigida nimis & humida, aut intensius calida multisque impuris exhalationibus repleta est, corporis vigorem mirum in modum lædit. Pertinent huc pariter assidue vigiliæ diurnique & duri labores, quibus ob continuam solidorum & fluidorum actionem spirituosæ & subtiliores partes dissipantur, sanguinique massa intemperatior redditur, ut exinde, experientia teste, omnes in nobis functiones languescere incipiant.

§. XVIII.

Frequentissime porro animi contin-  
gunt deliquia, si sphacelosa in partibus <sup>sphacelosa</sup> par-  
vel exterius vel internis adparet cor-  
ruptio, qua vitali motuum œconomix <sup>corruptio</sup> nihil datur perniciosius. Id quod non solum  
modo morbi maligni & contagiosi, ut petechiæ, dysenterix, febresque pestilenciales, verum etiam chronici, quales potissimum sunt scorbutus, cachexia & hydrops suo comprobare exemplo possunt, ubi, ingruente putredinosa corruptela, mox omne naturæ robur cum cordis motu vacillat. Nec dissimilem edunt efficaciam opiata & narcotica improvide adhibita, quorum operandi ratio in eo præcipue versatur, ut effluviis sulphureis mix-  
tionis & mobilissimæ fluidorum sub-  
stantiæ inimicis hæc ipsa ita contami-  
nent, ut munere suo secundum natu-  
ræ leges ampliusungi vix queant. Sed præter hæc quoque, quod mirandum est, suaveolentia, naturæ alioquin gratissima feminis hysteriis, aut

ab alio quocunque morbo debilitatis, eorporibus eo usque aduersa deprehenduntur & nociva, ut ex eorum usu omnia in pejus tuant symptomata & ægrisympocæ correpti exanimis quasi in terram concidunt. Cuius notabilis effectus ratio, nostro quidem iudicio, in eo videtur posita, quod fortiora ejusmodi odorifera vim fluidi nervi elasticam a prioris morbi atrociam jam satis imminutam, vaporosa indole sua magis magisque supprimant, haud alio modo quam castorina, quæ pro diversa succi nervosi & fibrarum constitutione valde differentem, & nunc bonum nunc malum producant effectum.

## §. XIX.

*Præna,* Nec dein negligenda sunt ipsa venena, vel validiora causticæque indolis purgantia & emetica, quæ ob valentiores, quos in universo partium nervosarum systemate maximeque sensibili intestinorum canali crispando contorquendoque concitant spasmos æquabilem sanguinis & subtilissimi fluidi in singulas partes influxum impediunt adeoque ingentem, quin sæpius lethalem virium lapsum accersere valent. Et ex eadem causa fieri observamus, quod insignis & ad syncopen usque aucta animi defectio morbos cum immensi dolorum ferocia stipatos haud raro excipiat, quale quid pariter post graviores iracundiæ affectum minus insolitum est; unde hanc syncopes speciem veteres medicinarum auctores peculiari nomine cardiacam vocare consueverunt. Hujus namque affectus licet ea sit natura & indoles, ut exitialem vim suam in ductus biliosos præcipue exerat; fieri tamen non potest, quin ob eximium, quod hos ipsos cum ventriculo, pulmonibus & corde, propter par nervorum octavum & commune par vagum, intercedit consensum, simul omnes hæ partes sensibiles graviter spasmo afficiantur.

## §. XX.

Sæpissime non minus animi deliquiis *Hæmor-* conflantur, quorum vires a prægressis *rhagia* nimis hæmorrhagiis & quibuscunque fortioribus excretionibus debilitatae sunt. Tali ratione sæpenumero adnotare mihi licuit, homines venere immoderatus usus sensum in lipothymias, quin syncopicas incidisse affectiones. Et quid frequentius, quam a copiosis per sudorem & alvum evacuationibus, improvidis venæ sectionibus, cruentis vulneribus aliisque nimis sanguinis profusionibus, maxime si non præsentanea ope succurritur, eadem mala oriri. Nec deficit ratio: quæ enim his rebus non modo sanguinis subtilior portio, quæ virium elementum constituit, exhauritur, sed & præcipue ipsa fluidorum moles imminuitur; haud mirum est, si cordis ceterorumque vasorum dilatatio, quæ cum systole alternare debet, inde impeditur, adeoque ipse cordis motus intercipitur; quo cessante formalis mentis defectio nunc ratio adesse deprehenditur. Quod eo crebrius certiusque incidit in subjectis teneriori constitutione præditis, aut in situ erecto diutius repositis. Tunc enim sanguinis ad caput directio longe magis præscinditur.

## §. XXI.

Pari ratione motum cordis debilitare summumque inducere languorem *Sanguis* valet nimia repletio, quæ sanguini *et poly-* spisso & viscido in acceptis ferenda est, quatenus hic per angustiores vasorum coronariorum canaliculos difficulter progrediens ibi coarctatus & cordis & vasorum systolen imminuit. Nihil autem, quod per plurimos constat exemplis, ad lethalem syncopen magis disponit, quam polyposa humorum concretio cavitatibus cordis & contiguis vasis adhærens. Hæc enim concrementa dum mole sua obstruente sanguinis per universum corpus circuitum auferunt; necesse est, ut, non remoto ejusmodi repagulo, lethalis fiat exitus.

## §. XXII.

§. XXII.

*Signa prægnantia. Aliam in etia. nescio.* His expositis superest, ut nostrorum affectuum prognosin ad rectum de eventu salutari & noxio iudicium ferendum subnectamus. Hic notari maxime velim, pro naturarum & causarum diversitate & periculum quoque multum variare. Ita, qui teste HIPPOCRATE aphor. 41. Sect. II. sæpe fortiter & sine manifesta causa dissolvuntur, repente moriuntur. Subest enim plerumque polypusum cordis & pulmonum vas firmiter impactum coagulum, quod dissectis cadaveribus reperire licet. Lethiferam quoque ut plurimum syncopes observavimus, quæ post partum laboriosum, ubi feminæ ab imprudenti obstetrice ad impetuosos parturiendi conatus adhortatæ nimium delassantur, & immoderatum sanguinis per lochia patiantur profluvium, hæud raro subsequitur, quia correptæ copioso sudore frigido cum extremerum frigore perfunduntur, auram frigidam expirant, pallido faciei colore imbuuntur & nullis plane remediis ad vitam revocari possunt. Neque periculo caret illa syncopes species, quæ feminis strangulatione correptis supervenit, unde ipsas sæpe pro mortuis habitas & sepulturæ traditas novimus.

§. XXIII.

*Quæ ob- servantur. nescio.* Porro quoque ingens virium in morbis malignis, ut acutis febribus, prostratio & inter initia statim facilis in animi deliquia, sub statione maxime erecta, proclivitas in discrimine vitam poni, signum certissimum est. Nec boni ominis est sola infusa animi defectio, diffidentia & mentis altius infixæ mortis formido, licet animus præterea tranquillus beneque compositus sit, præsertim si in acutis jungitur delirium, & languida respiratio cum notabili pulsuum vel parvitæte vel tremula palpitatione. In variolis quoque confluentibus ubi ab intolerabili ardore & dolore, suppurationis tempore lipothymia, quod sæpius fit, oritur, ægri, præsertim sub litu cor-

poris erecto in præsentissimo vitæ periculo versantur. Tum enim motum corpus refrigeratur, curis constringitur: bustula disparere & mox lethiferæ succedere convulsiones solent. Deinceps in homine ob alias causas jam debilitato post vehementiorem iram, aut fortius emeticum vel purgans exhibitum syncopes suboritur, nisi in instanti convenientibus succurratur remediis, lethalis evadit. Quodsi denique in pueris a vermibus nervosas ventriculi tunicas lancinantis syncopes enascitur, plerumque funesta est; & vidimus brevi ante mortem tempore vermes e ventriculo prodeuntes mortuos.

§. XXIV.

Animi & virium defectio, quæ hysterics & hypochondriacis jungitur *Prægnantia. si salutaris.* pathemaribus, ubi a flatibus ventriculi nimis distendentibus sanguinis ad cor & pulmones fit regurgatio, curationi locum adhuc relinquit. Ubi etiam a causa externa, ut nimio conclavis æstu, balneo intensius calido, vel nimia sanguinis e vena secta detractione, præsertim in feminis & pueris corporis insignis languor vel præcepti animi virium suboritur lapsus, non adeo timendum est. Et in genere notandum: quo levioribus causis & morbis animi deliquia succedunt, eo minus alunt periculi.

THESES THERAPEUTICÆ.

§. I.

**Q**uod attinet curationem, hæc duabus potissimum indicationibus absolvitur, quarum prima *Indicationes curatæ. sola.* est, ut in ipso paroxysmo motus cordis, quicquid vitalis omniumque virium lons exiit, per convenientia & efficacia remedia citissime restituatur; altera, ut extra paroxysmum causis tollendis accommodata invenire remedia, atque recursum periculosa affectionis impedire studeamus.

§. II.

## §. II.

Qua in  
paroxys-  
mo pro-  
fus ex-  
sternat.

Primæ itaque indicationi ut satisfiat, in accessione mali ægrum in conventienti situ eoque nec nimis demisso, nec nimis elato in loco sereno, temperato ac spatioso fervare decet; dein ad influxum spirituum invitandum remediis externis penetrante virtute præditi partes sensibiles irritare & animare convenit. Quo fine præ ceteris prodest, si aqua frigida tota facies superfunditur, labia sale communi fricantur, naribus pulvis acetum cum balsamo vitæ seu aqua apoplectica adplicetur, vel ipsis sal volatile Anglicanum, quod nil nisi sal volatile ammoniaci cum oleis cephalicis rutæ, menthæ, lavendulæ imprægnatum est, adhibeatur. Nec quoque de nihilo erit oculorum palpebras cum aliquot aquæ spirituosæ s. balsami vitæ guttulis illinire, totamque pectoris regionem & reliquas partes extremas pannis calidis aqua quadam roborante imbutis fortiter fricare.

## §. III.

Qua in-  
terna.

Quodsi demum his adhibitis ad se redire incipiunt ægri, interna quoque remedia resocillandis viribus dicata exhibere convenit. Hoc nomine præclari usus est vinum optimæ notæ, maximeque vetus Rhenanum, quod omnium fere virtutem superat longissime. Neque egregio effectû destituuntur aquæ spirituosæ & aromaticæ, ad quas præcipue aquæ cinnamomi liliorum convallium, rosarum, melissæ, corticum citri, aurantiorum cum & sine vino paratæ debent referri.

## §. IV.

Qua en-  
tra pa-  
roxysmi  
condi-  
cat re-  
media.

Quicumque extra paroxysmum medela subvenire & novos mali insultus avertere cogitat medicus, diversas causas probe prius cognoscere, iisque amolendis accommodare debet præsidia. Ita, si a sævitia dolorum & graviori iracundia affectu syncope originem repetit, præsentaneum ferunt levamen blanda anodyna, maxime si cum aquis analepticis, non adeo spirituos sed aliquid simul anodynæ in sinu

foventibus propinantur. Ex illis autem summx efficaciz est liquor noster anodynus mineralis aliquot olei macis guttulis imprægnatus, vel cum duabus essentiz castorei partibus remixtus. Spectant huc quoque Laudanum Sydenhamii & pulveres antepileptici, ut Marchionis cum uno alterove grano castorei vel theriacæ coelestis permixtis quorum remedium usum tutissimum deprehendi. Ubi ab humore acido bilioso in primis viis stabulante partefque nervos arrodente, quod in hypochondriacis frequentius usu venit, syncope cardiaca nascitur, in usum vocandi sunt pulveres absorbentes, qui ex conchis præp. matrem perlarum, corall. lapidibus cancerum, unicornu fossili, crysallo montana, additis quibusdam olei de cæstro guttulis optime conficiuntur, quibus, urgente æstu præternaturali, aliquo nitri purificati grana pro dosi adjici possunt. In syncope hysterica & hypochondriaca clysteres & medicamenta ex galbano, castoreo, asa foetida, sagapeno & myrrha confecta convenienterque adhibita omne in curatione absolunt punctum.

## §. V.

Quodsi vero sub nimia per alvum & vomitum evacuatione a validis purgantibus & emeticis excitata animi invadunt deliquia; tum præter theriacalia, anodyna & analeptica lac calidum, vel decoctum hordei cum amygdalis, vitello ovi & croco paratum & sufficienti quantitate haustum virtute sua demulcente mirabile præstat efficaciam. Ubi etiam a veneno caustico gravioris periculi metus est, eadem remedia eximiam spondent opem, maxime si cum largiori olei amygdalarum dulcium expressi, vel olivarum copia propinantur. In morborum malignitate, ubi ob occultam putredinem animi obrepit defectio, mixturæ, quæ analeptica & bezoardica pollent virtute, omnium sunt præstantissimæ: quales confici possunt ex aquis cardui benedicti, scordii, cinnamomi sine vino,

Qua om-  
nia pur-  
gantibus  
prostat  
extra  
paroxys-  
mum.

vinum, rosatum, melisse citrate, mixtura simplici, aceto vini & syrupo acetositate citri, quibus pulvis bezoardicus Sennerti, vel noster iusta proportionem est admiscendus. Quodsi ob sanguinis boni inopiam a nimia ejusdem profusione inductam vires consumuntur, easdem veteris præter temperatiora analeptica, maxime omnium reficere decet alimentis nutritiis & succos restituentibus. Quo nomine summam merentur commendationem jussula carniū gelatinosa vitulinæ, bovinæ gallicæ veteris præ decoctionem cum rassa cornu cervi, taleolis citri, pauxillo macis & aliqua vini portione in olla cooperta parata; quo etiam pertinet potus succolade. Denique solum vinum generosum & annosum parva manu datum in tali casu omne absolvit punctum.

# CAUTELE ET MONITA PRACTICA.

## §. I.

**I**nterest certe quam maxime ad curationem provide & secure adornandam, ut inter lassitudinem gravatam seu oppletivam, quæ ab humorum plenitudine & expansione obtingit; ac inter debilitatem defectivam, quæ a boni sanguinis & succi nervei penuria proficiscitur, probe distinguat artifex, ne spe & eventu fallatur. In utroque casu alia subest causa; ergo & alia præscribere decet remedia. Quæ enim in priori, seu repletionis statu salutaris est sanguinis e vena secta detractio, in posteriori, ubi sanguis jam deficit, ideoque magis restaurandus est, mirum in modum nocet. Posthæc quoque probe discerni debet illa virium debilitas, quæ ab animi affectu, ut longiori trilluia & diu celata iracundia, vulgo Chagrin dicta, provenit, & quæ materiali causæ in acceptis ferenda est. Prius enim si incidit remedium maxime querendum est in moribus, atque iis omnibus, quæ ani-

mut latum & tranquillum efficere possunt.

## §. II.

De venæ sectionis administratione hæc speciatim sunt monenda, quod ip-<sup>Causa</sup>sa quidem, ubi cordis motus a nimia <sup>circu F.</sup>sanguinis congestione, quam sæpissime vehementiores intestinorum spasmi producant, supprimitur, & vasa in superioribus valde turgent, omnino locum invenit; nunquam tamen in ipsa mali accessione celebrari debeat. Major enim exinde languor inducitur longiusque malum protrahitur. Pari-<sup>Cirrip</sup>ratione frustraneum non minus, quam <sup>spiritali</sup>periculofum est lipothymia affectorum <sup>in</sup>ori liquida spirituosâ infundere, quia <sup>in</sup>facile in fistulam spiralem incidunt & suffocationem minantur.

## §. III.

Quodsi a mensibus suppressis, vel imminutis lipothymia oriuntur, summa cum cautione adhibenda sunt em-<sup>Circa il-</sup>menagoga, eaque potissimum impe-<sup>pothy-</sup>tuosius commoventia, ut balnea salina-<sup>miam a</sup>nata, crocata, & id genus alia; facile enim morbus ob majorem, quam humoribus inferunt, rarefactionem, magis ingravescit.

## §. IV.

Virium dejectio, quæ gravioribus morbis, ubi ægri jam ex sua natura imbecilliores sunt, supervenire solet, malum plerumque portendit exitum; <sup>Circa</sup>ju-<sup>nam quæ</sup>quare, ut tempestive convenientibus succurramus remediis, monet quam maxime elegans illud veterum proverbium: *principiis obsta, sero medicina paratur.*

Multo magis autem cavendum erit, ne in acutis passionibus, maxime si in vigore sunt constitutæ, iis utamur remediis, quæ ad purgationes aliasque excretiones stimulo naturam ullo modo irritare & turbare possunt. His enim necessariæ ad morbum superandum vires magis consumuntur, quibus consumtis nihil amplius opis, nihil artis in medico est. Ideo mihi quam maxime placet aurea illa regula FERNELII *lib. II. cap. 10. exhibita*, quæ

Coratio debilitas est op-pletiva & defectiva.

Ab ani-mi affe-ctibus consi-deranda.

quæ ut probe teneatur auctor sualorque sum: *Validis constantibusque viribus fidenter, quantum morbus desiderat, erit vacuandum; minus validis vel prostratis nihil proferus molendum.*

## §. V.

*Circa specifi- ca cordialia et medi- cina fo- liores.* Præcipua illa, quæ per tot sæcula pro summis cordialibus & specificis analepticis in omni virium lapsu ad superstitionem usque venditata fuerunt recedenda, qualia sunt margaritæ, lapides bezoardici orientales, os de corde cervi, lapides quinque pretiosi &c. virtutem aliorum diaphoreticorum fixorum & absorbentium minus superant, ut potius istidem longa ex parte inferiora habenda sint. Idem iudicium esto de medicamentis ex auro paratis. Quæ enim auro tribuitur virtus cordialis & analeptica, nostro quidem iudicio, vana & superstitiosa est iactantia, quæ simplicissimam vulgi medicorum & ægotantium credulitatem arguit luculentissime. Ut silentio prætereamus, quod omnem fere superet fidem, aurum ad dulces & quintas essentias alla arte chymica posse redigi.

## §. VI.

*Circa vinum.* Vinum, præsertim vetus Rhenum, quod propter acidum spirituosum omnibus reliquis analepticis longe est præferendum præter internum usum superiori loco præscriptum, exterius quoque naribus & præcordiali regioni applicatum, ad vires rescindendas præstantaneum est auxilium. Quinetiam animi deliquia, quæ subjectis sensibilibus inter venæ sectionis administrationem haud raro obtingunt, feliciter arceantur, quando ante operationem modicus optimi vini haustus adsumitur.

## §. VII.

*Circa aqua frigida potum.* Residet quoque in aqua pura frigida, opportune exhibita summa vis analeptica, maxime ubi ob nimium vel internum vel externum æstum sanguinisque rarefactionem, pereunte virium robore, lipothymia accedit. Id quod suo jam tempore rectissime agnovit CELSUS, qui ideo *lib. IV. de medicina,*

*cap. 5. frigidam aquam ad corrigenda stomachi vitia summopere commendat; & PLINIUS secundus, cui stomachus natura imbecillis & frequenter intus æstuans erat, se aqua frigida cum insigni sæpius fructu usum testatur. Vid. Epist. XVII. lib. VI.*

ENARRATIONES  
MORBORUM.

## OBSERVATIO I.

*Lipothymia in hypochondriaco febris.* JUVENIS quidam corpore macilentus, Livu pallido præditus, a longo jam tempore, ob studiorum intemperantiam, vitamque sedentariam & nimiam ciborum duriorum & flatulentorum adperentiam contractum patitur malum hypochondriacum, quod multis ructibus, hypochondriorum distensionibus, imi ventris torminibus, cephalalgis & insigni artuum lassitudine satis se manifestat. His demum malis juncta est post præviam pectoris compressionem cordisque palpitationem ipsa lipothymia, qua extrema collapsa retrigescant & pulsus parvus & debilis manum levissime vibrat. Ego consultus in mali accessione enemata ano injicienda & balsamum vitæ nostrum externe naribus & præcordiis admovendum curavi. His ubi ad se rediit æger, essentiam carminativam & essentia cordicum aurantium, spiritu nitri dulci & aliquot olei chamomillæ veri guttulis confectam propinare ejusque usum sæpius repetere jussi. Tandem, ut a cibis crassioribus æger abstineat, & largiori potu, quem antea neglexerat, imposterum utatur commendavi. Quibus probe observatis animus non amplius liquit, maxime quom postea specialiorem mali spasmodici statulenti curationem æger admitteret.

## EPICRISIS.

Lipothymias viris hypochondriacis & seminis hysteriis admodum esse familiaria.



militares, nemo facile, qui in artis negotio versatur, negabit. In utroque affectu ex solidarum partium atonia orto copiosa flatuum in prima regione progenies vera plurimorum symptomatum genetrix est. Flatus enim nimia membranarum ventriculi & intestinorum distensione liberam & aequabilem sanguinis & fluidi nervei distributionem non modo impediunt, verum etiam sanguinis ad pectus & præcordia cursum dirigendo motum cordis vitalem quodammodo sistunt. Et vero admodum simile est, vaporosum ejusmodi aerem cum chilo ad sanguinem deferri, delatum nimia expansione cordis & arteriarum systolen sufflammare. Subit hac occasione recordatio, me adhuc juvenem Medicum ante quinquaginta circiter annos Amstelodami, ubi tunc temporis versabar, interfuisse sectioni feminæ cachecticæ syncope demortuæ, in qua cor paucò sanguine refertum, sed mirum flatibus distensum reperiebatur; quam peculiarem morbi speciem tympanitidem cordis rectissime Medicus vocabat. Simili quoque ratione postea in multis cachecticis æque ac hypochondriacis dissecatis vasa sanguine exinanita, sed flatibus turgida & ampliata observavi; ut adeo ab aere in sanguinem per ductum chyliferum delato varia hypochondriacorum symptomata haud inapte explicanda veniant.

## OBSERVATIO II.

*Observatio* Sæpius iterumque mihi artem fatienscienti obigit, in morbis acutis & exanthematicis, ut variolis, petechiis, febreque purpurata, circa morbi statum inopinato fatales accedisse li-pothymias; unde mox omnibus, quæ antea placida erant, symptomatibus in pectus conversis, extrema refrigescere atque maculæ aut prorsus evanescere, aut livido tinctæ colore adpare-re cœperunt. Quid? quod, ubi animus dein, dato intervallo, ad se rediit, laborantes de summa præcordio-

rum anxietate, inquietudine somni-que defectu conqueſſi sæpius in lethalem inciderunt syncopen. Ego ubi curatius in tantæ catastrophæ inquisivi causam, adstantes plerumque in frigus ægro extra lectum commorato admissum culpam transferre consueverunt. At vero, quum etiam sub temperato conclavis calore eadem oriri mala deprehenderem, tam subitanæ mutationis causam non refrigerio, sed rectius potius motui sanguinis ad caput propter situm perpendicularem, in corporibus natura imbecillibus & vi morbi magis debilitatis tardiori & ex parte intercepto adscribendam putavi. Quæ quidem in re me plenius confirmarunt exempla eorum, qui inter largiorem cruoris e vena secta detractionem sub statione corporis erectæ perspicile animo linquuntur; cum contra in situm repositi horizontalem, collectis paulatim viribus pulsque vegetiori reddito ad se statim redire solent. Dein quoque per plures vidi phthisicos & consummatam hæcticam laborantes, qui si corporis languorem excipimus, animo adhuc satis vigeant, sed in lecto vel erecti sedentes vel extra lectum in situ erecto diutius detenti animam præter spem omnium expirant.

## EPICRISIS.

Satis, ut arbitror, luculenter nos docet hæc observatio, quantum ex situ erecto in morbis acutis & cum exanthematibus efflorescentiis in cute junctis redundet damni. Quæ cum ita sint, omnes omnino ægri, qui vel ejusmodi affectibus decumbunt, vel quorum vires a diuturniori & chronico morbo, ut phthisi & hæctica prostratæ adparent, sedulo monendi sunt, ne in ipsius morbi statu decubikum deferentes extra lectum in sella erecti diutius commorentur, aut caput cubantes sublimem habeant. Probe quoque sibi caveat medicus, ne clysteribus stimulo salino imbutis, aut, quod pejus est, fortio-

foetioribus purgantibus alvum sollicitet atque hinc crebrioribus dejectionibus aegro et lecto surgendi & in situ elevato le continendi occasionem præbeat; imo quoque, si alvus sine stimulo fluida exiit, eam sub decubitu deponendam fusadeat. Denique, si forte ex improviso ægrum in ejusmodi morborum vigore in situ erecto collocatum deprehendat, consultum erit, analeptici & vires labefactasatas confortantes remedia protinus succurrere omnemque adhibere operam, ut, quæ timenda sunt, funesta symptomata tempestive avertantur & ægrorum saluti rite prospiciatur. Plura de hac re legi possunt in dissertatione mea de *situ corporis in ejus morbo*.

### OBSERVATIO III.

*Lipothy-* Femina triginta & aliquot annos  
*miseria* nata, gracilioris fed amplioribus venis  
*et vicia* instructi corporis habitus, ob vitam  
*spem* sedentariam & adversos quosdam car-  
*ditas.* sus flatulentias cum alvi adstrictione  
per aliquot tempus passa, inopinate  
quondam circa menstruz purgationis  
periodum insolitas circa lumbos; os  
sacrum & uterum spasticas pensentit  
stricturas cum ventris torminibus jun-  
ctas, quæ dein ad pectus usque proten-  
sæ tanta fiebant atrocità, ut sum-  
mam præcordiorum compressionem &  
anxietatem cum suffocationis metu in-  
ducerent. Sed, quod pessimum erat,  
crebriores simul accedebant lipothy-  
miz, quæ tamen erumpente parciiori  
mensium fluxu cum reliquis sympto-  
matibus remittebant, agramque sui  
iterum reddebant compotem. Reli-  
quo tempore pulsus fatiserat plenus &  
subdurus; & quam novum mali incur-  
sum alvi perpetua compressio cum ce-  
phalalgia stipata minaretur, meum  
maritus auxilium imploravit. Ego igitur,  
probe pensitatis omnibus, primo  
sanguinem e vena pedis tusa detrahen-  
dum suasi. Deinde ad alvum referendam  
mensiumque negotium in ordinem re-  
tundendum [a] quoddam aperitivum ex

equali falis Carolinarum, nieri purificati, magnefiz albæ & tartari vitriolati portione compofitum ter in feptimana, præmiſſis antecedente vefpera XV. pilulis noſtræ præparationis balfamicis, ad drachmam unam mane ſumendum commendavi. Denique ad ſpafmos ſedandos ſumma cum euphoria datum eſt liquor noſter mineralis anodynus cum eſſentia caſtorei & croci remiſtus. Quæ methodo id per Dei gratiam conſecuti ſumus, ut ægra impoſterum a gravis mali recurſu libera perſe anſerit.

*E P I C R I S I S.*

Restissime hæc affectus lipothymia uterina spasmodica meretur appellari. Haud enim novum, sed frequentissimum admodum observatio est, feminas ante mensem eruptionem vehementibus circa dorum & partes genitales doloribus & spasmis affligi, qui totam viralem morum æconomiam turbando & inaequalem sæpiusque largiori sanguini ad superiores partes cursum efficiendo spirandi angustiam, præcordiorum anxietatem, quin ipsam lipothymiam concitare valent. Quod vero si evenit, eo potissimum medentis dirigendum est consilium, ut plethora immituta visciditateque humorum resoluta criticæ sanguinis excretionem per uteri vias promoveantur.

#### OBSERVATIO IV.

Vidua generosa quinquaginta annorum, graciliori corporis habitu plumbeique faciei colore prædita, post præviā mœstitiā & vitam omnīs laboris expertam de magno pondere cor aggravante & respiratiōem impediēte ægrius conqueſcit fuit. Arteriz ad tactum exiguis ac languidis pulsabant iſtibus, urinz paucæ reddebantur & albæ atque dein crebriores accedebant animi defectiones, quas non adeo multo post, præcedentibus dorſi & lumborum doloribus inænis sanguinis ferorū

ex utero sequebatur profusio; unde agra viribus mirum exhausta tandem diem obiit supremum: Sectione post mortem instituta hepar deprehendebatur tumidum, subdurum & sub albicante colore imbutum. Cor & reliqua vasa paucio vel nullo plane sanguine erant repleta; pericardium contra apparebat crassum & copioso sero, librarum pondus superante repletum.

### E P I C R I S I S.

1.) Affectus hic recte dicti potest cachexia cum hydropes pericardii, morbo admodum raro, juncta; cujus causam prava & copiosa seri viscidii abundantia constituit, a qua pallidus faciei color, urina limpida & pauca, virium summus languor cum functionum vitalium laesione, obstructio viscerum & serosi sanguinis excretio derivari commode possunt.

2.) pulsum valde diminutum & crebriora animi deliquia quod attinet, veritati admodum consonum est, quod hanc itidem a nulla alia causa, quam ab humore in pericardio sensim crescente & pressione sua contractionem cordis impediendo dependant. Quae vero complicata fuit respirationis difficultas haud immerito sanguini viscidiori per pulmonum vasa segnius transiunt debitaque vesicularum pneumonicarum expansionem remoranti ascribitur.

3.) non mirandum est, pericardium incrassatum fuisse repertum; siquidem in omnium nostri corporis partium, quas hydrops invadit, membranis idem fieri deprehendimus. Nascitur vero pericardii hydrops hac ratione: Cor vasis gaudet coronariis, & ut elegantissime monstravit RUYSCHIUS, multiplici ac dardaleo flexu per exteriorem superficiem internamque musculorum substantiam ramificatis: gaudet quoque ipsum pericardium arteriis, venis & vasis suis lymphaticis per superficiem ejus dispersis, quorum inventionem Cl. NUCKIO

debemus; quibus disrumpitis ingens serasit promanatio. Similem ferme casum habet BALLONIUS in Epb. l. 1. ann. 1570. Joannis Platarii vidua, inquit, hydropes pulmonum, qua laborabat, inseruit. Per triginta annos de oppresione pectoris conquesta difficultatem spirandi habuit. Pulsus erat intercisus & intermittens. Sinistrum latus inclinata agrotas facile syncope corripiebatur. In sectione cor aqua natabat, nec facile movebatur e capacitate thoracis: aqua putrescentis libra sex educabatur.

### OBSERVATIO V.

Illustris matrona, longae sed macilentioris staturae, primo statim tempore cum utero gerebat, de pectoris oppressione & difficili respiratione cum alvi adstrictione juncta conquesta fuit. Ad quintum gestationis mensem quum pervenisset, frequentes incidit lipothymias, quibus abigendis circumstans muliercularum cohors multa spiriturosa & vires depressoas resocillantia propinabat, sed malum nihilominus recrudebat. Tunc ad agram invensendam ego accersitus alvum nimis durum statibusque turgidam deprehendi & nimiam sanguinis abundantiam, quae pulsu arteriarum satis pleno se manifestabat, in vitio esse putavi; quare consilium dedi, ut mox clystere alvus subduceretur & dein sanguis & vena brachii incisa detraheretur. Denique passulis rhabarbarinis alvum semper apertam servandam curavi, unde effectum est, ut femina a molestis symptomatibus sensim liberata tandem iusto tempore vegetum excluderet infantem.

### E P I C R I S I S.

Non tantum a defectu sanguinis & inopia, verum etiam a nimia ejus redundantia vires cum motu cordis sufflaminantur saepissime. Ad functiones enim rite peragendas natura certa gaudet

gaudet proportionem, certa æqualitate ac moderamine, adeo ut vel parum vel nimium noceat motibusque inimicum sit. Et in eo quoque potissimum artis opus versatur, ut medicus causas æquilibrium excedentes convenientibus remediis ad moderamen reducere laboraret.

## OBSERVATIO VI.

*Syncope  
lethalis  
a P. Sae  
inpro-  
vide ad-  
missa.*

Vir quadragenarius, corporis animique sensibilibus ac debilis, qui diu jam ex ventriculi inflatione alvique obstipatione, quas mala diæta sibi contraxerat, laboravit; propter graves animi commotiones per aliquod hebdomadam intervallum quiete, appetentia & viribus privatus pejor habuit. Varia hinc inde præscripta & adsumpta medicamina nihil tulerunt opis, quare Medicus ultimum remedium in sanguinis missione situm arbitratus venam secandam curavit, sed tam funesto eventu, ut non multo post æger lethali syncope correptus animam expiraverit.

## EPIGRISIS.

Quid in nostro casu imprudentius, quid inconsultius potuit excogitari, quam in viro extreme debilitato & ad incertam ferme redacto venæ sectionem admittere, quæ virium reliquias una cum sanguine simul sustulit. Probe itaque monendi sunt juniores Medici, ne, ubi vires diuturno mœnore, aut alia quacunque causa fractæ & enervatæ sunt, sanguinis vacuationem concedant.

## OBSERVATIO VII.

*Syncope  
lethalis  
a ob  
aperta  
lædente*

Vir annum agens quinquagesimum, spongiosi corporis habitus, per complures annos podagra divexatus, ob infortunium quoddam in diuturnum incidit mœrorem, unde ciborum inappetentia, alvi siccitas & virium languor originem sumserunt. Accersitus

Medicus propinabat aquam litiorum convallium vinosam cum grano extra-cti opii sumendam; idque remedium genus, ob vim suam, quam exlerere videbatur, somnum conciliantem per aliquot hebdomades continuare jubebat. Tantum autem aberat, ut auxilii quidpiam æger inde reportaret, ut potius, ingravescente virium languore, crebriores pateretur lipothymias. Præterea perpetuo sudore mædebat frigidus, arteriæ exiguis micabant ictibus, & singultu demum superveniente ex hac vita discedebat.

## EPIGRISIS.

Quam inepte subjecto spongiosiori, cujus robur ventriculi & universi corporis diuturnior tristitiæ affectus jam mirum antea debilitavit, opiatum fuerit oblatum, saniorum judicio relinquo. Interim ad pleniorum morbi & mortis historiam adhuc pertinet, quod hepar, aperto cadavere, quoad concavam partem suam nigrum, corruptum & sphacelofum fuerit inventum & latior macula subnigra in dextro ventriculi latere pariter ac diaphragmate apparuerit. Ceterum vasa mirum erant exinanita & omni præce sanguine vacua.

## OBSERVATIO VIII.

Virgo octodecim annorum, tenera admodum constitutionis, ob fluxus *Lipothymia cum* menstrui, quem parcius iusto vix bis *an-* mensibus, quem parcius iusto vix bis *mens-* antea experta erat, defectum multis *is ob* subinde malis, ut ciborum fastidio, insigni membrorum gravitate atque motum valde impediende torpedine cum virium prostratione juncta afflicta. Ad tot mala debellanda Medicus & pharmacopæus remedia præscribunt sanguinem nimis commoventia, ejus generis sunt pilulæ ex gummatibus confectæ & elixir proprietatis cum sabina oleo remixtum. Corpus quoque dimittitur in balneum, sed nihil inde emergit commodi, ut potius graviore *aug-  
mentum  
concreta-  
ra.*

excitatz fuerint læsiones; liquidem nunc ægra animo crebrius linquitur, sanguinem cum magna præcordiorum anxietate expuit, & intolerabili capitis dolore afflicta bis vel ter in septimana epilepticos & convulsivos patitur motus. His ita constitutis ad nos deplorata venit & sub cura nostra sanitatem pristinam, mensium fluxu restituta, sic consequuta est.

Primo quidem omnium sanguinis missionem in pede repetitis vicibus, sed parcius instituendam præcepimus. Tum insulum theiforme ex herba veronicæ, mellisæ & floribus chamomillæ ad aliquot patellas mane forbillandum; inter epulas vero elixirum nostrum viscerales temperate balsamicum adsumendum & per aliquot tempus continuandum suavisimus. Denique cubitum ituræ pulverem nitrosi & cinabarinum cum pulvere nostro antiepileptico remixtum porreximus & quæ antea nimis calida usurparat balnea aquæ dulcis nunc solum tepida & admodum moderata adhibere iussimus.

### EPICRISIS.

Si ullo in morbo, certe in feminarum affectibus sanandis multum curæ & cautionis medicus debet adhibere maximeque eo respicere, ut cursum mensium recte prudenterque dirigat. Ad quod felici cum successu perficiendum, opus est, ut non modo corporis naturam, habitum & victum, sed & veras irregularis vel plane deficientis fluxus percrutetur causas & ad hæc singula medendi methodum instituat.

Discimus præterea ex hac morbi historia & curatione, nihil esse perniciosius, quam balneis nimis calidis, vel medicamentis calidioribus & volatilibus sanguinem commovere ejusque excretiones, obstructis adhuc & angustatis viis, moliri. Sanguis enim nimium rarefactus, ob validam, quam insert, valorem distensionem

Tom. IV. Pars IV.

seu diastolen motu suo magis sistitur; quam promovetur; ut ideo longe graviora concitentur mala, qualia sunt in capite epilepsiz, in corde lipothymiz & syncopes, in pulmonibus suffocationes & id genus alia.

### OBSERVATIO IX.

Sæpius iterumque mihi in artis exercitio adnotare licuit, puerperas haud infrequenter periculosas, imo funestas incidisse animi defectiones, si peringentes tempore partus perpellos labores valde debilitatæ ingentem sanguinis copiam post partum amiserunt. Quod enim si accidit, lochia dein parcius fluunt & circa septimum plerumque diem omnis putridæ materiæ effluxio cessat; unde ex levi tantum causa, ut situ corporis erecto, lipothymiz origo. Venter quoque præterea statibus utplurimum tumet & parum per alvum excrementorum secedit. Sub tali rerum statu ego præsentaneam tui operem perinjecta enemata, eaque tantum domestica ex floribus chamæmeli, sambuci, semine anethi, cymini & pauxillo salis parata. Exterius castoreum naribus fuit admotum & demum, ad materiæ putridæ ex utero effluxum promovendum, pilulæ nostræ balsamicæ singulis tribus diebus, interposito pulvere bezoardico cum uno alterove grano castorei maritato, datæ fuerunt. Nonnullis etiam ad vires amissas restaurandas modicum vini Rhenani haustum concessimus.

### EPICRISIS.

Quando post partum immodica sanguinis contingit profusio, vires inde nimium depreste salutari lochiorum & feri impuri ex uteri mandris expulsionis mines sufficiunt; unde non mirum, si subsistentes ibi humores putrescent viriumq; majorem defectionem efficiunt. In ipsa curatione caute omnino

K

proce-

procedendum, &c., ut supra diximus, primum clysteribus, dein benignis laxantibus & irritantibus humoris putridi expulso promovenda est.

## OBSERVATIO X.

*Epistola  
mia &  
more a  
cibus &  
post  
morbum  
ingressa  
at.*

Vir quadraginta annorum, parvæ & gracilioris staturæ, opifex ferrarius, ex febre acuta, qua ob graviores iracundia affectum correptus laboraverat, convalescens cibos supra modum appetit, qui ipsi ab uxore magna in copia parantur; quos inter præcipue pulicula ex simila & lacte confecta & caro anserina nominari debet. His magna cupiditate ingestis non multo post ingenti premitur anxietate præcordiorum, inquietudine & extremorum refrigeratione: vires simul labescunt & velut emortui jacent; accedunt crebriora animi deliquia & placida denique mors.

## EPICRISIS.

Egregie sane confirmat memorabilis hæc hithoria aphorismum HIPPOCRATIS 31. Sect. 2. *Cui a morbo cibum optime capienti non confirmatur corpus, malum;* &c., quod idem gravissimus Auctor alio loco urget, inter vires corporis & cibos servandam esse proportionem; ita ut, quo magis hæ languant, eo minori viâtu utendum sit. Cibi enim minus concocti & reventi non modo mora corrumpuntur & inde graviorum morborum causa sunt, sed & sola mole sua vires destrunt potius, quam erigunt. Quæ quum ita sint, omnibus infirmis & ex morbo vix convalescentibus necessaria est cautio, ne corpus nimis cito alimentis repleant. Et ideo quoque pessima habenda est vulgi consuetudo, qui vires valde exhaustas ciborum copia restituendas esse falso sibi persuadet. Novum hinc plures morbis mox liberatos, qui cibis, etiam optimis & nutrientibus usi in pristinum vel alium morbum inciderunt. Et quem fugit, milites

diuturnis vigiliis, inedia & laboribus defatigatos, quando hiberna ingressi cibos nimis avidè ingurgitant, gravioribus usque maxime acutis morbis succumbere.

Præter allatos, adhuc aliquot notatu dignos casus suppeditant consultationes nostræ medicinales Tom. I. Sect. I. Casu XIV. & casu XXXI. &c.

## CAPUT X.

DE SUBITA MORTE ET MORBIS ALIIS INSANABILIBUS, EX VITALI SANGUINIS PER POLYPOS INTERCEPTO CIRCUITU ORTIS PRUDENTER PRÆCAVENDIS.

## THESES PATHOLOGICÆ.

## §. I.

Celerè subinde & inopinata morte homines in ætate flore constitutos bonoque & robusto corporis habitu a natura donatos e vivis sæpè numero tolli, res est per experientiam exploratissima. Neque dein jejuna lætè plebem, quin medico obscurum sit, plures dari longas & graves, diagnosi æque ac prognosi difficiles ægritudines, quæ omnem medendi respuentes rationem vitam hominum auferunt. Quæ vero quo frequentius sunt obvia, & quo major omnium ejusdemque ætatis hominum animis insita suit sciendi cupiditas; eo sane magis mirandum est, veras & genuinas horum effectuum causas diutius latuisse absconditas: donec tandem nostri temporis felicitate medici corpora ejusmodi morbis defuncta cultro anatomico crebrius cœperunt dissecare & interiores viscera illustrare recessus. Dicit enim vix potest, quantum ars nostra debeat anatomie studio ceu primario suo fulcro, ita ut affirmare haud dubitaverim, vel ejus solius

folius ope atque cultora præsentī seculo plus rei medicæ accessisse splendoris, incrementi ac certitudinis, quam, ea neglecta, reliquis retro seculis omnibus. Quemadmodum vero frequenti corporum dissectione multiplices subitaneæ mortis & periculosissimorum morborum detectæ fuerunt causæ; ita ex omnibus maxima & præcipua est, quam constituunt innumera illa ex fluidis in solidam massam concreta vasisque majoribus cordis & pulmonum firmiter impacta coagula, jam polyporum nomine nota; quæ dum vitalem & liberum sanguinis per corporis canales circuitum interceptando omnis generis functiones, una cum vita evertere valent, eaque propter curatu difficillima existunt, providum & de hominum salutē sollicitum artis peritum omnino admonere videntur, ut per idonea remedium genera fonticas istas causas præcavere & in tempore studeat avertere. At vero, quum perpauci, quod scio, medici hætenus fuerunt, qui hocce utilissimum in re medica argumentum in libris suis ex merito pertractarunt; non abs re, sed operæ utique pretium judicavi, id ipsum speciali capite hoc loco proponere.

§. II.

Polyporum ex-  
stantia  
per ob-  
serva-  
tiones  
anato-  
micas  
monstra-

Primo itaque, ut comprobemus, polyposas illas concreciones, seu mortis & immedicabilium morborum causas, in apertis post mortem cadaveribus haud infrequenter deprehendi; placet ex immensa observationum faragine perpaucis tantummodo veterum æque ac recentiorum hunc in finem commemorare exempla. Ita apud BARTHOLINUM, in lib. ejus de lactæ thoracis cap. XIV. relatum legitur, ipsum in iis, quos subita morte extinctos cultro anatomo subjecisset, majora cordis vasa sanguine concreto inventisse repleta; quod etiam optime testatur facit BONETUS anatom. præf. lib. II. Sect. 2. obs. 5; ubi de morte repentina a corporibus extraneis in cordis sinibus repertis prolixius agit, & FRIDERICUS LOSSIUS obs. 15.

lib. I. qui mentionem injicit pueri, tres annos nati, qui, quum omnibus vegetus ac integra sanitate fruens videretur, præter spem omnium in sinu matris exspiravit. Dissectione corporis instituta viscera perfecte apparuerunt sana, ut præter sanguinem in cordis ventriculis valde coagulatum nullam mortis causam suspicari licuerit. CAROLUS quoque FRACASTORIUS, cui multa corpora celeri morte perempta diffecandi occasio obtigit, nil nisi sanguinem intra cordis ventriculos & vasa pulmonalia concretum ipsisque tenaciter adhærentem vidit. Et quidem ex infarctu vasorum complures repente deficere, vel unicum idque gravissimum PANAROLI testimonium probat, qui luculenter prodit, anno 1656. feraci subitaneorum mortium tempore, plures a sanguine intra cornu venæ retento fuisse strangulatos, ideoque aperto corpore tam vehementi strenuæque mortis viriati, quam insignem vasorum infarctum, ostendisse causam. Nec denique omitienda est egregia observatio Joannis DANIEL HORSTII, qui in manu d. ad med. in sinistro cordis ventriculo se albicantem invenisse pituitam testatur, & RIVERRI, qui Cens. I. obs. 82. materiam crassam, compactam & omnino albam, lardum coctum referentem in sinistra cordis auricula hominis cito extincti annotavit.

§. III.

Ex dictis jam & adductis satis apparere arbitror, omni tempore in corde vasisque majoribus solida ejusmodi concreta ex sanguinis massa fuisse progenita, quæ subitam mortem aliasque insanabiles produxerunt ægritudines. At, quum nulla plane in veterum monumentis polyporum, sic dictorum occurrat mentio, haud inique statimur, hancce denominationem antiquioribus medicis ignorari, a recentioribus vero ideo maxime istis coagulis fuisse impositam, quod plerumque multos emittunt ramos per canales adjacentes hinc inde dispersos. De qua vero

K. 2. inter-

interpretatione ut plenius rectiusque constet, sciendum est, veros polypos ea solum concretamenta esse dicenda, quæ ex albicante & fibrosa substantia firmius paulo sunt compacta & propterea a sanguine congrumato multum differunt. Hic enim licet variis corporis nostri partibus, maximeque utero & cordi inherens multorum magnorumque morborum causa existere possit, genuini tamen polypi nomen minus recte meretur, sed pseudo-polypi nomine apud auctores ut plurimum venit.

## §. IV.

His præmissis, non inutile, sed potius tractationi nostræ valde videtur accommodum, ipsam rationem exponere, qua polyposæ massæ tantam in genus humanum edant stragem. Sunt autem polypi tum potissimum gravium morborum mortisque causæ, si quando mole sua aucti, vel, quod sæpius fit, a levi tam interna quam externa causa de sede sua dimoti libero sanguinis circulo ex uno cordis ventriculo per pulmonum vasa in alterum obicem ponunt eumque pervertunt, aut quando orificia vasorum penitus occludendo motum sanguinis vitalem omnino tollunt. Quamdiu enim coagulata ejusmodi massæ tantum tenuiores cordis aliorumque vasorum lateribus adherent, sanguinis circuitum non adeo vehementer impediunt, nec inde functiones manifesto lædunt. In quo quidem & experientiam habemus suffraganem, utpote quæ optime docet, concreta ejusmodi corpora in cordis auriculis & sinubus ob multiplices anfractus fibrillasque carneas, & circa vasorum divaricationes in aliis quoque partibus hæzere, at nihilominus adhuc liberum sanguini concedere posse iter. Cujus insignem fidem facit memorabilis & fere admirabilis observatio VESALII, quæ exstat lib. 1. cap. 7. de corporis humani fabrica, ubi probatissimus hic auctor commemorat, se quondam in sinistro cordis ventriculo glandulosæ, sed subnigricantis car-

nis reperisse libras propemodum duas, corde instar uteri extenso; & addit: ægrum, licet pulsus miris modis fuisset inæqualis & varius, nihilominus multis ante mortem mensibus veluti sanum obambulasse; donec tandem postremis vitæ hebdomadibus pulsuum tantæ accidissent intermissiones, ut ex novem mensium intervallo tres, vel duos solum tactui occurrerint.

## §. V.

Proximum nunc est, ut per singulos morbos eundo fusius explicemus, quanam ex illis sint, quos polyposæ concretæ progignunt, vel pertinaciter fovent, vel etiam ad malum disponunt exitum. Hæc dum meditamur, primo se nobis offerunt variae pectoris affectiones, inter quas præcipue referri merentur, ex acutis pleuritides & peripneumonix, ex chronicis omnis generis asthmata & ipse catarrhus suffocativus, tussis convulsiva, phthisis & hæmoptysis &c. Hæmoptysin quod attinet, crebrior nos docet observatio, hanc æque facile ob sanguinis viscosi nimium congesti stagnationem ad polypos disponere, atque ab his iterum progigni. Quodsi enim polyposi istis repagulis æquabilis ac liberior sanguinis per vasa pulmonalia progressus ac transitus turbatur, fit omnino, ut sanguis in capillaribus arteriæ pulmonalis vasculis accumulatur, tandemque, maxime in dispositis, rupto quodam ramulo, excernatur. Et ideo quoque plane non insolitum est, in hæmoptycis post mortem dissectis ejusmodi concrectiones deprehendi, quod optime confirmat historia in consultationibus nostris medicis, Tom. 1. Sect. 2. casu 73. p. 346. aliata: Laboraverat scilicet juvenis, septendecim annorum, hæmoptysi cum febre lenta, in quo post obitum in arteria pulmonali visui se obtulit callosum concretum. Simili ratione BONETUS anatom. prætic. Tom. 1. lib. 2. Sect. 5. p. 654. de spurio sanguinis recenset sectionem cadaveris hæmoptyci a Sylvio in ipso nosocomio

*Polypus  
dispo-  
nunt ad  
pestiferos  
morbos,  
ut hæ-  
mopty-  
sin.*

*Quæ ratio  
est  
polyporum  
morbosorum  
causæ  
sint.*



comio Leydenſi ann. 1664. adminiſtra-  
tam, in cujus uiroque cordis ventri-  
culo deprehenderunt materiam craſ-  
ſam, fibroſam & quaſi carneam, quæ  
in omnia vaſa ex corde exeuntia ex-  
tendebatur. Præcipue vero talem  
maſſam ex jugulari ſiniſtra eduxerunt  
tres ſpithamas longitudine ſuperan-  
tem. Erat autem iſta materia, cui  
multum grumoli adhærebat ſanguinis,  
in iſtis cordis ventriculis craſſitie ſat  
inſigni carneiſque cordis fibris, quas  
ſuis fibrillis amplectebatur, ſingulari  
modo annexa. Ceterum in medio ap-  
paruit ſanguis grumofus videbaturque  
minuſcula vaſa habere. Idem valet de  
phthiſi, teſte noſtra & BAVHINI  
experientia, qui apud Gregor. HOR-  
STIUM in opp. Tom. I. pag. 134. ſe in  
phthiſicis & hydropicis ſemper ſere  
polypos annotaſſe, expreſſis verbis  
meminit. Plura qui deſiderat, conſu-  
lere poteſt NEDHAMIUM de forma-  
tione ſuſus cap. 2. & MALPIGHIUM  
de polypo cordis, item HARDERUM  
obſ. 45. 46. 47. &c.

§. VI.

*Aſth.* Aſthma, maximeque illud quod  
*maſa* immedicabile exiſtit, & qui abhinc  
*peſtoris* dependet peſtoris hydrops, tantum  
*hydrop.* non ſemper a polypis generatur & ſu-  
*ſum.* ſtentatur. Hinc nos ipſi plena fide teſ-  
tari poſſumus, aliquoties nobis obſi-  
giſſe occaſionem hoc morbo deſuncto-  
rum corpora diſſecandi, ubi in corde  
pulmonumque vaſis polypos, vel ſeru-  
m ſœcidum in thoracis cavo extra-  
vaſatum deprehendimus. Nec deſunt,  
quæ idem confirmant, auctorum me-  
dicorum hac de obſervationes. Ita  
Cl. D. GRÆVIUS, caſtrenſis Medi-  
cus, qui ante viginti circiter annos,  
me præſide, diſſertationem de aſthma-  
te convulſivo habuit, ſe in quinqua-  
ginta militibus, quos incidit, aſthma-  
te & hydropo peſtoris exſtinctis poly-  
pos, cordis ventriculos obſidentes in-  
veniriſſe teſtatur. LANCISIUS quo-  
que libro ſuo de motu cordis p. 38. nota-  
bilem ſecert caſum, qui ita ſe habet:  
Juvenis viginti quatuor annorum,

Tom. IV. Pars IV.

graciliſſimus, pravoque aere & viſtu  
uſus crebrioribus cordis apprehenſio-  
nibus & lipothymis, cum gravi an-  
helitu extremorumque refrigeratione  
junctis corripiebatur. Arterix exiguis  
& inæqualibus pulſabant ictibus & ve-  
næ jugulares una cum abdomine mi-  
rum intumeſcebant; donec tandem  
miſer lenta febre decedebat. Diſſectio  
cadavere cor mirum in modum repe-  
riebatur flaccidum exiguæque molis,  
cum polypis utrumque ventriculum  
opplentibus & pericardium tenaciter  
an nexum. Plures obſervationes nota-  
tu digniſſimas de aſthmate, cui ple-  
rumque peſtoris hydrops junctus ſuit,  
legere licet in DIEMERBROECKII  
anatom. lib. II. cap. IX. pag. 401. BAR-  
THOLINI epiſt. 2. cent. IV. & epiſt.  
56. cent. II. nec non in HARDERO  
obſ. 56. ſeqq. LOWERO de corde cap.  
2. PEZOLDO obſer. 58. 61. RUY-  
SCHIO obſ. 19. item in M.N.C. Dec.  
II. ann. IX. obſ. 174. & Dec. III. ann. 2.  
obſ. 185.

§. VII.

Neque vero ſolum pericardii & tho-  
racis hydrops aſthmati a polypis indu-  
cto frequenter jungitur, verum etiam  
aliorum corporis partium hydropicæ  
intumeſcentiæ exinde ſuos repetunt  
natales. Hinc in artis exercitio nihil  
occurrit frequentius, quam ut aſth-  
mati ſpaſmodico-convulſivo, a di-  
ſta cauſa orto, ſtatus cachecticus,  
tumores pedum œdematoſi, imo ipſe  
aſcites ſuperveniant. Quando enim  
cumque ſanguinis ex dextro cordis  
ventriculo per pulmones in ſiniſtrum  
progreſſus, obſecto ejuſmodi repagu-  
lo impeditur; fieri non poteſt, quin  
univerſa ſanguinis per venam cavam  
circulatio tardior, lentior impeditior-  
que fiat, & magnæ hinc inde ſtagna-  
tiones in locis interioribus, maxime-  
que in hepate oriuntur; quo dein ob-  
ſtruſto, vel plane indurato ſanguis  
ſubſiſtere incipit in meſenterio omni-  
buſque venæ portæ ramis: unde ſerum  
ſecedens ad vaſa regurgitat lymphati-  
ca, quæ nimium diſſenta in hyda-

K 3

tides diducuntur, quibus disrumpit ex-  
tialis feri contingit extra vasorum al-  
veos effusio. Qua de re dignæ sunt quæ  
evolvantur observationes apud RHODIUM  
Cent. III. obs. IV. PEYERUM  
in hist. anatom. cap. VI. Speciatim vero  
WEPFERUS in cachecticis diu & fre-  
quentius ex morbis decumbentibus  
corpora fibrosa & pituitosa annotavit.  
Vid. ejus exercit. de apoplexia pag. 196.  
& 200. & SMETIUS in miscell. me-  
dic. lib. X. pag. 537. singularem allegat  
casum de oedemate in utroque crure,  
a polypo tenso & subduro, quod ad fe-  
mora usque protensum tumorem plen-  
num & durum in imo ventre, umbi-  
licum inter & pubem effecit, qui tan-  
dem totam abdominis regionem occu-  
pavit. Ratione haud dissimili BONE-  
TUS ex BOYLEI tractat. de apople-  
xia obs. IX. polypos refert in cordis ven-  
triculis duarum mulierum, quarum  
altera hydropem, altera cachexia obiit,  
& ALBINUS diff. de polyphis thes. V.  
notabilem affert hydropis speciem,  
quam observavit in viro per aliquod  
tempus dispnoæ cordisque palpitatio-  
nibus & anxietatibus afflicto, qui tu-  
mores in brachiis, venasque valde ru-  
midas & in nodos protuberantes, a  
polypo sat magno, ex auricula dextra  
in truncum venæ cavæ ascendente ra-  
mosque emittente, habuit. His vero  
ita constitutis hydropem lethalem ef-  
fic, pro certo habendum est.

§. VIII.

Sed missa ulteriori asthmatis &, qui  
hoc sæpenumero comitatur, hydropis  
consideratione, reliquos pectoris mor-  
bos ex polyphis oriundos dispiciamus.  
Ex his vero præcipue hoc referendus  
est catarrhus suffocativus. Quæ enim  
anatomen hoc morbo defunctorum si-  
sunt observationes, plerumque poly-  
posas concrectiones, ceu præcipuas  
mortis causas repertas fuisse confir-  
mant. Testantur vero id maxime  
BARTHOLINUS cent. II. 86. GREI-  
SELIUS in M. N. C. ann. 1670. obs. 74.  
& MALPIGHIUS de polypo cordis  
pag. 170, quippe qui in omnibus spo-

plesticorum, vel catarrho suffocativo  
extinctorum apertionibus tam in cor-  
de, quam in cerebro, imo non raro  
in utroque simul, corpora callosa, vi-  
scida & glutinosa observavit. Neque  
sicco, ut ajunt, pede transeunda est  
cordis palpitatio, quæ ut plurimum  
& si chronica est, tantum non sem-  
per polyposis coagulis in acceptis se-  
renda est. De qua tamen quum jam in  
priori Tomo Med. nostr. systemat. ejus-  
que Sect. II. cap. 1. §. 9. leq. proluxus  
egimus, B. lectorem eo remittimus,  
transituri ad inflammatorios illos ac-  
valde acutos pectoris morbos, pleuri-  
tidem veram & peripneumoniæ, qui  
ex indurata sanguinis, propter poly-  
posas concrectiones, stagnatione sæpe  
sæpius suam mutuuntur originem. Id  
quod satis superque testantur peritissi-  
mi in arte medica viri, quos inter no-  
minare placet MALPIGHIUM,  
qui loc. cit. affirmat, pleuriticorum ca-  
davera non in præcordiis tantum, sed  
& in hepate & venoso genere frustula  
alba copiose continere. WILLISIIUS  
de febr. cap. XI. pag. 130. apertis pleu-  
ritide mortuis corporibus in cordis si-  
nubus & vasorum circa circum cavita-  
tibus sanguinem in frustula & glome-  
ros longos concretum fuisse memorat.  
PEYERUS quoque exercit. anatom.  
memoriæ prodidit casum sexagenarii,  
qui pleuritis in peripneumoniæ mu-  
tata obiit. Facta cadaveris incisione,  
in corde magni ac tenaces apparuerunt  
polypi, adipis frusta mentientes.

§. IX.

Sed non modo in corde & annexis  
pulmonum vasis, verum etiam in aliis,  
maximeque venosis canalibus polypos  
ceu immedicabilium morborum cau-  
sas generari, demortuorum sectioni-  
bus & autopsia satis superque constat.  
Ita gravissimas & pertinaces cephalal-  
gias, apoplexiam & deliria quoque a  
polyphis intra venas jugulares & in ce-  
rebrî sinubus repertis concitata fuisse,  
observationes a WEPFERO, PEYE-  
RO, WILLISIO, BLASIO, item  
in M. N. C. descriptæ abunde docent.

Si

Cater-  
um  
justa-  
stium.

Morbi  
capitis.

Exhibet  
et.

Si qua vero corporis nostri pars ad polyporum generationem præ ceteris apta est atque disposita, certe uterus huc referri debet, in cuius vasis venosis, ob miram & tortuosam complicationem & abhinc dependentem impeditiorem sanguinis circuitum corpora ejusmodi polyposa ex sanguine viscido concreverunt facillime; quæ postea frequentioribus abortionibus, immodicis uteri hæmorrhagiis, copiosis lymphæ & feri per uterum effusionibus, ipsique hydropi & sterilitati causam præbent amplissimam.

§. X.

signa  
polypo-  
rum.

Consideratis itaque insanabilibus curatuque difficillimis, quæ ex polypis pronascuntur, ægritudinibus, non alienum esse iudico, quædam suppeditare phenomena, ex quibus cognoscere liceat, an polyposa ejusmodi conereta in præcordiis, ubi præcipuam sedem obtineant, lateant recondita. Sunt vero ex omnibus, quæ id testatum faciunt, signis præcipua 1.) diurnior cordis palpitatio, eaque ex levi sæpius causa, ut animi affectibus & a cibis stultentis alvumque constipantibus recurrens. Harum enim rerum ea est natura atque conditio; ut æquabilem sanguinis circuitum perturbando majorem ejus ad cor imperum efficiant, ubi supra modum congestus & accumulatus quum, propter positum a polypo obstaculum, haud amplum satis semet expandendi invenit spatium, cor æque ac vasa ipsius violenter distendit, & hinc insignem anxietatem & convulsivum cordis motum, quem palpitationem dicunt, inducit. Ex quo mox alterum emergit indicium, pulsuum scilicet inæqualitas & cum lipothymia sæpe juncta intermissio. Pulsus enim sicut generationis cordis motum & universum sanguinis per singulas corporis partes progressum testatum facit quam optime; ita si irregularis, vel plane intermitteus est, ceteris paribus, justam inicit suspicionem concrementi ejusdem polyposi, quod mole sua obstruente

debitam cordis aliorumque vasorum constrictionem & abhinc dependentem sanguinis per ea transitum valde perturbet, aut ad tempus prorsus intercipiat. Nec denique ex signis polypum denotantibus excludi debet frequentius spirationis, sine causa manifestæ, impedimentum, præcordiorum, ob spasticam pectoris stricture compressionem, & qui huic plerumque jungitur, dolor circa cor fixus; utpote hæc singula, si fere perpetua sunt, de impedito sanguinis a corpore quodam peregrino circuiitu testantur luculentissime.

§. XI.

Sequitur nunc, ut missis generalioribus, de polypis paulo pressius agamus, ipsumque generationis modum subjungamus. Tenendum autem primo omnium est, non omnes polypos unius ejusdemque esse texture, coloris & magnitudinis. Nonnulli equidem satis observantur solidi, duri & ex fibris ita compacti, ut tendines firmiores referre videantur; alii contra sunt molliores, ex pelliculis mucilaginosi & minus crassioribus coagulantia, membranaque exterius involuti. Quidam, si magnitudinem spectemus, mole sunt satis grandes, ut aliquot uncias pondere æquent; quidam minores & multas interdum partes adiposas immixtas habent. Colorem dein polyporum valde esse differentem, si dem nobis faciunt variz ipsorum apud auctores, maxime antiquiores, obvia denominationes; siquidem mox sub idea pinguedinis, quam alii albam & candelæ sebaceæ similem, alii ex albo flavescerem & nullam offum calefactam æmulantem perhibent; mox sub specie carnis, mox vero aliis designati veniunt vocabulis, quorum hic numerum ire nimis prolixum foret. Differt porro quoque in eo, quod nonnulli in dextro, nonnulli in sinistro cordis ventriculo radicati vel plures, vel pauciores in adherentes arterias & venas emittant ramos; nec non quod alii per se, mole sua sat ma-

gna, alii vero nonnisi vi quadam e loco suo dimoti, vasorum ostia occludendo, feralem corpori humano inferant noxam.

## §. XII.

Modum autem, quo polyposa ejusmodi corpuscula generantur, sat gravibus induciti rationibus talem concipimus, ut existimemus: materiam ipsi præbere particulas chyli & lymphæ graviores, viscidioresque & fixiores, utpote quæ motu facile coeunt & in unam compinguntur massam, ut fibroso-membranaceum corpus constituent. Quod quidem abunde satis confirmant tot physica circa polyporum generationem suscepta experimenta. Instar vero omnium optime erudire nos potest RVYSCHIUS, vir de re anatomica meritissimus, qui in *thes. anat.* VI. fidem facit, se ex sui ipsius sanguinis fero, sola conqussatione pseudo-membranam, ut loqui amat, confecisse, quæ plurimis staminibus seu fibris fuisset pertexta veramque membranam ita repræsentasset, ut eandem a natura productam omnes crediderint. Id quod & alio loco asserit, quando *thes. anat.* I. II. p. 14. sola fortiori conqussatione, per horæ spatium continuata se polyposam materiam ex cruore suis recenter mactati fecisse refert. His ita demonstratis in promptu nunc est distinctam polypi supeditare ideam ipsumque definire, quod sit concretum quoddam solidum, fibrosum, ex viscidiori lymphæ parte per fortiorem motum sive impulsu factum.

## §. XIII.

Polypi licet in utroque cordis sinu, & tam venosis quam arteriosis generentur ductibus; attentioni tamen observatione cognitum exploratumque habemus, eosdem facilius & frequentius in ventriculo & auricula cordis dextra, quam sinistra, & in venis magis proignis, quam arteriis. Nec adeo obscura est hujus rei ratio: chylus enim, qui mediante vena subclavia in venam cavam & ventriculum

cordis dextum fertur, crassioribus refertus particulis, motu accedente lentiori, facilius partes deponit graviores, quarum amplexu complicatis cordis trabibus, unum quasi corpus efficitur. Dein, qui venis vehitur, sanguis, ob vim venarum contractilem nimis debilem tardiori procedit gradu consistentiaque crassior existit & ponderosior arterioso, unde facile dimittit partes crassiores, quæ, ubi præsertim non intime mixtæ leviter cohærent, vi gravitatis suæ, ad fundum lateraque magis tendunt. Aliter vero res sese habet cum sanguine arterioso. Hic enim, quum non modo ab elastico arteriarum motu insigniter in cursu suo promoveatur, verum etiam in pulmonibus subtilissima aereo-ætherea materia imbutus & per minima vascula transpressus intime miscetur; ideoque & pondere levior, & colore rubicundior redditur: facile patet, quare hic præ venoso ad polyporum generationem minus sit dispositus.

## §. XIV.

Ætatem si spectamus, non ii solum, qui provectoris, sed & qui <sup>Polypus progerat</sup> ineuntis & non adeo maturæ ætatis sunt, polyposis concretionibus deprehenduntur obnoxii. De adultioribus equidem id mihi facile concessum iri confido. Placet igitur nonnulla ex auctoribus anatomæ practicæ asserere exempla, quæ certiores nos reddere possunt, infantes quoque monstrare ejusmodi polyposa inclusa sæpissime gerere. Ita de concretionem polyposa, in puerulo, aditum in cordis auriculam obturante confertur ALBINUS, *dissert. de polypo cordis* pag. 16. & BONETUS *sepulchret. anat.* lib. II. *Sect. XI. obs. VI.* ubi de polypis sat magnis, in sinibus cordis filiolis repertis eleganter agit. Haud dissimili modo in juvenis sexennis, atrophia consumti utroque cordis sinu adnotavit polypum D. SNELL. *Vid. ejus dissert. de cordis polypo* pag. 18. & DORSTENIUS in *E. A. C. Dec. II. ann. 3. obs. CLIII.* de quatuor corporibus in sinibus.

Generatio  
ipso.

Dissolutio.

Polypus  
facilis  
generatur  
in locis  
cordis  
ventriculi  
auriculæ  
dextrae  
& sinistrae.

Polypus  
progerat  
in ætate  
adultioribus  
concretionibus  
deprehenduntur  
obnoxii.

sinistro cordis ventriculo puelli cujusdam inventis perpulcre dissevit. Portentofum quoque polypum in adolescente describunt E. A. C. Dec. III. ann. 2. obfer. 18. quod & multis aliis exemplis probari poffet, si his jam immorari liceret. Interim non negandum esse censemus, consistentis ætatis homines natuque paulo majores, ad polypos generandos, præ reliquis esse proclives. Facilius enim, peractio jam nutritionis negotio, quam eodem adhuc vigente, sanguis & copia & temperie excedens accumulatur; idque eo magis, si quis, ob copiosa amplioraque vasa, & imminutum solidorum elaterem, ad plethoram producendam dispositus, vitæque sine motu desidi & diæta minus convenienti deditus fuerit.

§. XV.

Respectu sexus, nunquam fere non viros magis, quam feminas, polypis & morbis inde oriundis videmus expositos. Cujus quidem rei hanc subesse puto rationem; quod in sequiori sexu, subdebito menstruæ purgationis successu, non adeo facile sanguinis incrementum, & ob fibrarum laxitatem majoremque humorum fluiditatem, sive sanguinem multo sero imbutum, ægrius fit, ut crassiores particule invicem coeundo concrecant.

Præterea & hocce momentum singularem meretur animadversionem, in regionibus maritimis & septentrionalibus longe plures, quam in calidioribus terris observari polypis mortuos; quod, meo quidem iudicio, præter aerem frigidum & impeditius perpirationis negotium, præcipue victui crassiori, ut piscibus marinis, pani grossiori & carnibus fumo induratis atque salitis; ex quibus tenacior multique particulis terrestribus refertus chylus & abhinc quoque sanguis spissior ingeneratur,tribuendum erit.

§. XVI.

Progredimur ad alias, quas præcætarflicas dicunt, causas penitendas. Ex his vero principem suo jure obtinet.

locum, nimia sanguinis redundantia. Etenim, propter auctam, sub plethorico statu, valorum distolent fibræ suum amittunt elaterem; unde eorum minuitur systole sanguinisque progressus mirum in modum fit retardatus & perfacilis particularum terrestrium datur cohesio. Emergit porro exinde valorum obstructio; quæ quantum polyporum generationi faveat, vel unicum illud confirmat experimentum, a LANCISIO in cane vivo institutum. Constrinxit scilicet laudatissimus hic vir filo cerato ratham quandam arteriæ iliacæ, in quo elapsis 15. aut 20. diebus, secato citra ligamen polyposam invenit concretionem. Vid. lib. de aneurismatibus præpos. XXXVIII. p. 124. Nec adeo difficile est, hujus phænomeni veram eruere rationem, utpote cum, facta ejusmodi compressione, tenaciores & ad reflexionem minus mobiles sanguinis partes invicem agglomeratæ lateribus valorum sensim paulatimque adherere incipiunt; donec aucta earum mole densum & fibrosum, quod polypi nomine venit, constituant corpus. Et sane Verum enim vero, non minus nimia sanguinis abundantia, quam ingens defectus ejus inopia ad obstructions & concreciones polyposas viam pandit facillimam. Hinc mihi a magnis crebriusque repetitis hæmorrhagiis sepiissime morbos, ex polypis ortos advertere licuit. Dum enim fibræ, ob nimiam distensionem laxiores porique redditi sunt ampliores; omnis generis crassos v. scidosque humores, transmittunt qui polypis progignendis aptime existunt idonei.

§. XVII.

Proceritas corporis nimia sicut ad præcætarflici generis morbos; ita præcipue ad polyporum generationem & omnia, quæ hanc excipiunt mala disponit. In excellis enim, seu longæ stature corporibus difficilior fluidorum ad perpendiculum est ascensus; hinc circulatio per totum corpus fit tardior & facile stagnationes obstructionsque oriuntur viscerum, maxime

vera.

In vi-  
si po-  
nem  
quam  
sequi-  
tiam.

In re-  
gionibus  
septen-  
triona-  
libus  
magis  
quam  
calidioribus.

Causæ  
polypo-  
rum præ-  
cætarf-  
licas  
dicuntur.

Præcætarf-  
licas dicuntur  
quæ præcætarf-  
licas dicuntur.

vero pulmonum; ubi sanguis difficiliter progrediens in minimis vasculis subsistit & sedentes ponderosiores partes successu temporis in densam compinguntur massam. Si cui hæc non sufficiunt, quantumvis clara satis & certa; hunc plenius convincere potest tum mea, tum aliorum hac de re experientia, quæ optime testatur, arduæ proceritatis corpora humilioribus ut plurimum alacritate viriumque robore multum cedere atque morbis ex lentiori sanguinis circuitu & stagnatione oriundis, ut polyposis concretionibus, phthisi, asthma & dyspnoeæ, aliisque, longe magis patere.

## §. XVIII.

*Frigit. dei pps. 101.* Nihil autem prope magis corpus nostrum adeo lædere tantalque eidem noxas & ipsam præmaturam mortem inducere valet, quam frigidus potus, post intensam corporis commotionem & incalcescentiam largiter & celeriter ingestus, de quo GALENUS, *lib. de sanit. tuenda*, præclare non minus quam vere ita sentit: quod spirandi difficultatem & tussim inducat, cerebrum debilitet & fluxiones inde concitet, ventriculum imbecillum reddat nervosque lædat. Ea namque perniciosa frigoris est potentia, ut non modo intestinum fluiditatis motum sistendo sanguinem coagulet, verum etiam partes terrestres & gelatinosas præcipitet; unde non mirum esse debet, si obstructions, inflammationes, &c., quod in rem nostram dictum sit, humorum concretionem oriuntur; quas quotidiano quisque experimento conspiciere potest, si sanguis calidus e vena secta profluens in aquam frigidam immittitur, vel quando aqua calida, in quam sanguis missus fuit, interjecta mora, refrigeratur. Tum quippe, fibrosam & graviorem partem decedere ac præcipitari, jucundo comparebit spectaculo. Possem nunc quoque plura, eaque tragica proferre exempla, quæ exitialem frigidus potus noxam luce clarius demonstrarent. At quum multa jam sint alio loco a

me & viris doctissimis studiose tradita, nolo his tempus consumere.

## §. XIX.

Quantum ex censu caussarum ad *Acido & spirituosorum & spirituosorum abusus contri-* nocivas humorum coagulationes *ritus & abusus* buat, quotidiana prohi dolor experientia loquitur, ipsaque confirmatio; siquidem certo constat experimento, sanguinem fluidiorem e vena emissum, affuso acido quodam liquore, vel spiritu vini rectificato in duram mox coalescere massam. Jam quidem facile nemo, qui rem accuratius examinat, dubitabit, hæc pariter in corpore humano, licet non eodem plane modo & tempore, posse contingere: si quis tamen dubitet, memor modo sit, in quam graves & diuturnas ex viscerum obstructione pullulantes morbos, quales sunt phthisis, cachexia, hydrops, asthma convulsivum & nimix hæmorrhagix, strenui spiritus vini potatores sua ipsius culpa incurrant.

## §. XX.

*Acidit. spiritus.* Nec reticere licet animi affectus, maximeque iram, terrorem & tristitiam; utpote qui polyporum & abhinc dependentium morborum generationi sat gravem suppeditant causam. Nolumus jam curiosius inquirere in abditas tam peculiaris effectus rationes, sed potius memorabiles quasdam in hujus rei fidem adducere historias. Ex his vero notatu digna mihi videretur observatio MALPIGHII, quæ refert: ægrum, aliquin satis robustum, ex timore in magnam pulsus inæqualitatem & obscuritatem, præcipue in sinistro carpo incidisse, absque febre & recurrente spirandi difficultate; sed brevi tandem post, per sputa, quandoque rubicundi sanguinis portionem, quandoque copiosa alba quædam frustula, polypis haud dissimilia excrevisse; postremo vero, turgentibus superioribus, ex coercita sanguinis copia suffocatum interiisse. RIVERRIUS quoque *Cent. IV. obs. XXI.* notabilem recenset casum cujusdam nobilis,

bilis, qui quum graviore quondam & inopinato percelleretur terrore, de summo conqueffus est cordis tremore, spirandi difficultate pulsuque intermittente & inaequali, donec non adeo multo post suffocatione interit. Aaperto post mortem pectoris cavo cor cum valis majoribus oppleta fuere & in sinistro cordis ventriculo inventae sunt carunculae rotundae, substantiam pulmonis emulantes; quarum major ad avellanæ magnitudinem accedens arteriae aortae præcludebat ostium.

§. XXI.

Uti mo loco non prætereundum videtur, præposteras illas in nimis hæmorrhagiis & intermittentibus febribus, per adstringentia, opiata, martialia & peruvianum quoque corticem &c. curationes ad difficiles chronicas & plane immedicabiles ægrotudines, quæ a concretis polypis nascuntur & foventur, non parum conferre. Et profecto certa adleverare fide possum, me in praxi mea medica quinquaginta & aliquot annorum, nullum majus ab ullo remedium genere, quam ab his ipsis, intempestive & improvide adhibitis observasse damnum, ita ut non modo celeres & lethales morbos, quales sunt apoplexiæ, epilepsiæ, catarhi suffocativi; sed & diuturnas & chronicas passiones, ut phthisin, asthma convulsivum, malum hypochondriacum & hystericum, enormes hæmorrhagias, lentasque & hæcicas febres hac ratione productas noverim. Si rationem querimus, unde tantorum malorum origo; sciendum ante omnia est, morbosicarum affectionum causam in impeditiori ac retardato sanguinis & humorum per minima & capillaria corporis vasa circuitu potissimum querendam esse. Tali enim ratione naturales se- & excretiones, quæ itidem per minima & ex subtilissimis valis constata emunctoria sunt, mirum quantum retardantur & variè hinc inde stagnationes, viscerumque infarctus & indurationes cum mille aliis symptomatibus propullulant.

Jam, si quis in tali rerum statu, ubi jam sanguinis & humorum crassities lentiorque fluidorum per canales corporis circulatio præsto est, vel ubi graviores, qui vasa fortiter angustiant, spasmus adsunt, medicamenta adstringentia & humores magis incrassantia, vel etiam sedativa propinare velit; non poterit non insigniter nocere, & leve tantum malum longe gravius efficere. Id quod eo magis certiusque evenit, si perversus horum remedium usus diutius justo protrahitur; nihilque superest dubii, quin polypus, seu immedicabilium morborum causæ, hac ratione sat commodè possint produci, quos etiam in permultis morbis ab empyrica hac & detestabili curandi methodo subortis partim ex signis haud incertis augurari & prædicere, partim ex corporum post mortem institutis sectionibus ob oculos ponere mihi licuit.

§. XXII.

Et sic causarum, quæ ad ingenerandos polypos concurrunt, vidimus potissimas; omnibus enim seorsim explicandis diutius immorari, non adeo necessarium putavi, tum quod rariis occurrant, tum vero maxime, quod ad dicta a nobis perfacile possint referri.

CURA PRÆSERVATORIA.

§. I.

Ea est perversa mortalium iadole, <sup>Talys</sup> ut raro principis morborum ob- <sup>magis</sup> stare cogitent, sed tum demum medi- <sup>præca-</sup> cum & medicinam anxie querant, <sup>quæ</sup> quam mala per longas moras aucta & <sup>curan-</sup> mortem in propinquo vident; unde <sup>ter-</sup> vero nihil aliud efficiunt, quam ut fatalem sibi diem, quem tempestivo remedium usu avertere potuissent, maturius accersant. Peccant sane in hac re eo gravius ægroti nostri polyposi, quo certius & multa experientia testatus est, nonnisi difficilem ac dubiam, imo, ubi longius malum inva-

luit,

luit, plane nullam ipsis contingere sanationem. Si quid enim in huius generis morbis, qui impedito sanguinis ob polyposum repagulum circuitu nituntur, auxilii, si quid opis expectare licet, maturatu opus, eoque a medico respiciendum est, ut concrementorum istorum generationem in tempore impediat, vel eorum, si jam ad sunt, augmenta & noxios effectus praescindat. Equidem jam, qua ratione hoc perfici debeat & quid utilissime hoc fine suaderi possit, candide proponam.

6. II.

*Polypodium  
in ge-  
nerale  
prae-  
sente  
con-  
sistenti  
dieta.*

Et primo quidem, ut polyporum generationem prohibeamus, omnis cura eo dirigenda erit, ut sanguis spissior diluatur & resolvatur, commodeque in iis, qui ejus copia abundant, imminuatur. Ad quod præstandum præ ceteris incunda est recta vivendi ratio, quæ his fere momentis absolvitur: Victus eligatur parior, tenuis atque humectans, remotis cibis, duris, acidis, salisii multumque alimentis præstantibus. Potus sit naturæ conveniens & bene dilutus. Quo fine commendanda est cerevisia levis & probe defæcata, vel pura aqua fontana, tum sola, tum ad vinum temperandum adhibita, vel etiam decoctum ex speciebus blanda aperitiva virtute præditis confectum, quas inter præcipue radices chinæ, scorzonæræ, farfaparrillæ & cortices ligni falsasfræ, etc. referre lubet; tali enim ratione effectus diluens & resolutorius belle impetrabitur. His jungerunt labores & frequentia corporis exercitia, quibus sanguinis fluiditas & æqualitas per singulas partes circuitus egregie juvatur. Sed probe sibi omnes, maximeque plethorici & obesi vitæ otiosæ dediti cavere debent, ne motum repentino initio vehementiusque instituant, Nimum enim exinde sanguis ad pulmones propellitur, ubi progressu suo impeditus facile coagululum subit. Ad quod impediendum, mox aliquicadidi bibere præstat; quod eo magis ne-

cellarium est, si corpus ab intensiori commotione calidum postea refrigeratur, vel, quod pessimum est, ingridus potius in copia ingurgitur. Aer præterea sit purus, serenus ac temperatus, isque nec nimis calidus, nec nimis frigidus & humidus. Hic tamen si vitari nequit, itidem consulitum erit, insufa theiformia nonnunquam calide adsumere, quæ transpirationis negotium promovendo egregium attenuantem molecularæ cœmentes disungentem spondent effectum.

### §. III.

Exultent dein graviore animi affectus, maximeque moror, ira atque terror. Si quando vero ab ipsis alteratum corpus fuerit, mature in usum vocentur, quæ effrenes motus compeſcant & valde turbatum sanguinis circuitum aquabilem denuo reddant. Ita, si contra subiti terroris noxas pugnandum est, maximam merentur commendationem medicinæ resolventes blandamque perſpirationem moventes, quia hæc ratione id, quod forte in humorum massa coagulari cœpit, optime resolvitur. In hunc finem fummo cum fructu semper a me datum fuisse memini pulverem marchionis, sive solani, sive cum aliquot liquoris mei anodynî guttulis ex aqua cinna-momi, vel mellisæ citratæ vinosæ sumtum, cui non male aliquot infusi calidi patellas superbibere iussi; quam methodum etiam in iis, quos diuturnus mororis affectus confecit, utilissimamprehendi. Præter hæc in vehementiori terroris affectu summo pere commendanda est moderatio corporis exercitatio, qua cor adiutum fe facilius a sanguinis nimium congesti mole liberare poterit, ut eo minus dein mali quicquam timeri debeat. Pessime itaque sibi consulunt, qui statim a terrore quieti se tradunt vel somnum profundum capiunt.

§. IV.

Prospiciatur dein, ut alvus bene  
respondeat, quæ si forte obstructa est, Libero  
clysteribus mature applicatis, vel pi-  
lulis



¶. Si-  
alibi:

Medico-  
mentis  
conco-  
nientibus,

lulis balsamicis solvenda est. Nec mi-  
nori prudentia opus est, ut & reliquæ  
humoribus tam secerneendis, quam ex-  
cernendis dicatæ viæ apertæ liberæque  
serventur, ne, quod facile evenit,  
his oculis sanguinis mæsa impura  
reddatur. Inprimis autem curæ sit,  
ne qua excretio sanguinis naturalis, ut  
in viris hæmorrhoidum, in feminis  
mensium, supprimatur, aut retentio  
longior insuper habeatur. Tunc enim  
perfacile periculosæ sanguinis ad alia  
loca fiunt congestiones, quas providus  
artis peritus convenienti venæ sectio-  
ne, pilulis & aliis medicamentis blan-  
de balsamicis ac temperantibus quam  
optime poterit avertere. Nec denique  
artificiales sanguinis evacuationes sunt  
negligendæ, quæ eo strictius debent  
observari, si quis multo sanguine tur-  
geat ipsasque diuturna consuetudine  
quasi naturales reddiderit.

#### §. V.

Præmissis hæc dietæ regulis, ex  
remediorum classe, ad sanguinem  
spissum incidendum ac resolvendum,  
subjungenda sunt salia medix & alca-  
linæ naturæ, ut arcanum duplicatum,  
tartarus vitriolatus, nitrum, sal di-  
gestivum Sylvii, sal aperitivum no-  
strum, oleum tartari per deliquium,  
terra soliatæ tartari & liquor nitri fixi  
&c. Ex spirituosiss huc pertinent essen-  
tia pimpinellæ albæ, tinctura antimo-  
nii acris, & id genus alia. Nullum  
autem, quod scio, ex toto medica-  
mentoribus penitus datur remedium,  
quod in dissolvendis fibrosis & ad con-  
cretionem pronis in sanguine partibus  
tantam præstaret efficaciam, quam  
aquæ minerales, præsertim illæ, quæ  
alcalino sale imbutæ temperatiorisque  
indolis sunt; quo nomine landem me-  
rentur acidulæ Emfenes ac Selteranæ,  
thermæ Aquigranenses præcipue ve-  
ro Carolinæ, quæ sale suo omnia cor-  
poris emunctoria aperiant, impuras  
fordes abluant & evacuant, sangui-  
nemque crassum & viscidum resolvunt  
ac diluunt utilissime.

#### §. VI.

Hactenus quidem modum, quo  
præcavenda sit polyporum generatio,  
satis, ut arbitror, dilucide monstra-  
vimus. Videamus nunc, quid facien-  
dum sit, si jam signa quædam emi-  
cant, quæ polypum cordi vasisque ma-  
joribus inhærentem testantur & qua  
ratione præcaveri debeat, ne majora  
capiat incrementa. Sciendum itaque  
est: ubi polypus adhuc incipiens est ac  
pituosus, non omnem abjiciendum  
esse spem ejus resolvendi: quod sali-  
bus alcalinis & duplicatis, quæ exopra-  
ta tenaces humores resolvendi vi pol-  
lent, dieta tenui, sufficienti & san-  
guinem diluente potu, omniumque  
maxime aquis Carolinis poterit præ-  
stari, quarum usu prudenter admini-  
strato ego per plures, qui non vanam  
polypi intus latentis suspicionem in-  
cutiebant, sanatos novi. Quodsi vero  
jam in fibrosam & duriorē abiit sub-  
stantiam polypus, omni studio con-  
tendendum erit, ne aut majora su-  
mens augmenta, aut e loco suo dimo-  
vens vasa penitus obstruat citoque ho-  
mines interimat. Ad quod efficien-  
dum opus maxime omnium est, ut  
sanguinis nimia abundantia impedia-  
tur, ejusque fluiditas iis rebus probe  
conservetur, quibus id commodè fieri  
posse superiori loco diximus. Sed ca-  
vendum, ne ubi spirandi a polypo dif-  
ficultas est, vena in brachio secetur,  
quia tum major, imo suffocatoria sit  
congestio. Fugiantur præterea omnia  
spirituosa, nimius motus animique  
perturbationes, quæ singula sangui-  
nem partim coagulando, partim nimis  
cōmovendo malum deterius reddunt.

#### §. VII.

Ultimo loco non inutile erit, quasi  
cautiones, quæ sanguinis fluxus &  
motuum febrilium tractationem con-  
cernunt, subungere. In utroque casu quæ-  
tū a medicis delinquatur, plurimis prohi-  
dolor exemplis comprobatur & a nobis  
jam supra salus evictū est. Quapropter  
sincere moneo, ne forte medicus in hæ-  
morrhagiis sistendis curationem solis  
adstrin-

Polyp  
jam va-  
si labo-  
ratus  
quomo-  
do tra-  
standi

Contra-  
stria en-  
rem hæ-  
morrhagi-  
um & fe-  
brilium.

adstringentibus absolvere satagat, sed potius convenienti sanguinis detractio-  
ne, & temperantibus, leniter quæ auo-  
dynis medicamentis, nec non inferio-  
rum partium, frictionibus æquabile  
sanguinis iter restituere laboret. Fe-  
brium curationem quod attinet, sum-  
ma adhibenda est cautio, ne nimis ci-  
to supprimantur. Quo scopo tutissi-  
mum erit, blandis aperitivis & eva-  
cuantibus remediis decenter uti; qui-  
bus dein medicinæ resolventes ac tem-  
perantes cum roborantibus commode  
possunt interponi atque subungi.

CAPUT XI.

DE AFFECTIONE PHTHISICA,  
SIVE TABE.

THESES. PATHOLOGICÆ.

§. I.

*Thi-  
sis  
nam  
est  
C. 158.* **N**ULLA, si cordis machinam exce-  
ssum perim, in universo corpore no-  
stro pars est, quæ ad vitam & tuen-  
dam & sustinendam præstantior sit  
usus, quam ipsi pulmones. Hi quip-  
pe sunt genuina sanguinis fabrica, in  
qua lymphæ chylosa & nutritia cum  
sanguine intime miscetur ipsique affi-  
milatur; hi sunt egregium illud viscum,  
quo spiritum vitalem, seu fluidum ære-  
o æthereo-elasticum, quod cordi soli-  
dissimèque partibus omnibus suum robur  
& vim systolicam præstat, intus hau-  
rimus. Quanta autem pulmones præ-  
relliquis partibus utilitate gaudent &  
prærogativa, tanta e contrario, imo  
ferè graviora sunt, quibus hinc inde  
parent, mala, quæ ego quidem a pec-  
uliari eorum textura deducere minus  
dubito. Hanc enim, ubi rite dispici-  
mus, ex meris vesiculis membranaceis,  
quæ aerem recipiunt, ex nervis,  
qui subtilissimum fluidum recondunt,  
& diversis generis valis, quæ sangui-  
nem & lympham vehunt, deprehen-

dimus constructam, ut usque eo non  
mirum esse debeat, si ob tot minimo-  
rum vasculorum myriades frequentes  
inibi sanguinis congestiones, stagna-  
tiones & obstructions, ex his vero  
varii generis oriantur ægritudines.  
Has inter præcipue referenda est pesti-  
ma ista affectio, quæ in medicorum  
scholis dicitur phthisica, de cujus ori-  
gine, progressu & curatione in præ-  
senti hoc capite strictim sed utiliter  
differere proposuimus.

§. II.

Est autem phthisis, corporis conta-  
bescencia, cum lenta febre, spirandi  
difficultate, molesta & continua tussi  
atque copioso phlegmatis materiazque  
corruptæ ac purulentæ sputo juncta;  
ab insigni pulmonalis substantiæ lesio-  
ne, per scirrhosam vel ulcerosam cor-  
ruptionem, vel abscessum inducta,  
ortum ducens.

§. III.

Equidem dantur variz, quæ itidem  
cum febre & nonnunquam molesta tus-  
si ac vitiozæ materiæ rejectione stipatz  
sunt, tabis species, quas tamen ob  
prognosin & curationem multum dif-  
ferentem cum vera phthisi non con-  
fundere debet medicus, utpote sine  
notabili pulmonum labe contingunt.  
Ita, certa observationum fide constat,  
non raro tabem ex gonorrhœa simpli-  
ci & pollutione nocturna diutius inse-  
stante suam mutuare originem, de  
qua jam olim HIPPOCRATES lib.  
VI. epidem. Sect. VIII. Text. 47. mentio-  
nem fecit. Neque plane insolitum est,  
a nimio veneris usu, a cacochymia &  
depravata succi nutritii indole in scor-  
buticis corporibus contabescentiam  
oriri; salvo tamen adhuc & integro  
pulmonum parenchymate. Idem fere  
animadvertimus in morbo isto infanti-  
bus tam infesto, atrophiaz, ubi ob  
scirrhosam glandularum mesariaorum  
indurationem succi chylosi & nutri-  
tionis inservientibus liberum ad sangui-  
nem iter prohibetur; unde superiores  
partes marcescunt, venter inflatur,  
lenta adest febris, difficilis cum tussi  
spira-

spiratio urget & alvus nimis fluida existit. Nec deinceps pro phthisi semper habenda est illa morbi species, ubi cum corporis extenuatione lentaque febre tussis & dejectio plus minus saniosa adest. Scipissime enim accidit, ut salva pulmonum compage, ex remotioribus partibus, ut mesenterio, utero, vel renibus, abscessu vel ulcere obfessis sanies ad pectus transferatur. Denique etiam probe distinguenda est phthisis a tussi valde chronica cum ejectione copiosi phlegmatis juncta, sequente tabe viriumque prostratione & calore præternaturali; quæ quidem mala autumnali & vernali tempore subiecta ad catarrhales morbos proclivis sæpe sæpius corripunt diutiusque vexant, sed nihilominus naturæ & beneficio feliciter cedunt.

## §. IV.

Ne cui vero vel minima in cognoscenda phthiferos ab aliis morbis differentia superfit delinquendi occasio, operæ pretium arbitror, certa quædam signa, ex quibus vera phthisis cognosci possit ac debeat, hoc loco recensere. Placet autem ex veteribus, qui in historiis morborum conscribendis longe sæpe accuratiores esse solent recentioribus, locum Calii AURELIANI, qui lib. II. cap. XIV. legitur, huc transferre, qui ita se habet: *Phthifica passio fit frequentius antecedente sanguinis fluore, aliquando etiam longi temporis tussicula, sive catarrho, quo pulmonum profunda & intima partes lacerantur & primo levius tunc ulcerantur. Sequitur agrotantes febricula latens, qua initium, inclinante die, accipis, atque veniente luce levigatur, adjuncta tussicula plurima initio noctis atque fine, cum sputis saniosis ac parvulis quidem, deinde autem plurimis. Iis vero, qui ex fluore sanguinis in istam veniunt passionem, primo sanguinolenta sputa efficiuntur, tum sacculenta, tum livida, vel prasina & in ultimo alba atque purulenta, dulcia vel salsa, cum voce rauca aut elangosa & difficultate spirandi atque genarum*

*rubore, & ceteri corporis sinereo colore. Cibi fastidium sequitur & major sitis; quibusdam gravis doloris sensus est vulnerati pulmonis, ut etiam ejus fibras expuans pulsus debilis, durus ac dein formicularis. Sequitur præterea inflatio pedum & pejorante passione ventris efficitur fluor & phlegmata carbonibus injecta terri sunt odoris. Merentur dein hic adduci HIPPOCRATIS verba, quibus imminetis phthiferos signa eleganter tradit. Sunt autem in lib. I. de morbis text. 9. fere hæc: *Fit phthisicus, si pituita a capite in pulmonem desillat, & primum quidem ut plurimum latentes desinit tussimque tenuem exhibet, & sputum paulo amarius solito & aliquando tenuis adest calor; temporis autem progressu exulceratur pulmo & intus ulceratur a pituita inhærente & putrescente & gravitatem exhibet pectori & dolorem acutum ante & retro, caloreque acutiores in corpus incidunt. Quanto vero majus tempus progreditur, tanto magis puri siccum ejicitur & febris acutiores fiunt & tussis fortis ac continua, & inedia vexat & tamen alvus inferno turbatur.**

## §. V.

Propositis itaque genuinis nostri affeclis characteribus, videamus nunc, quasnam tantorum malorum causas in dissecclis phthifis defunctorum corporibus reperire liceat. Quo fine potissima, quæ mihi ex innumeris auctorum observationibus & autopsya anatomicâ innotuerunt momenta paucis suppeditabo. Primo autem in omnium fere, qui phthisi decedunt, pulmonibus lobum vel dextrum, vel sinistram, vel utrumque simul pleuræ & costis, vel etiam in dorso vertebra adeo firmiter adnatumprehendimus, ut cultro difficillime possit separari, plerumque etiam locus iste putrido sero, sive ichore scatet. Deinde in nonnullis, præsertim emphysematicis, unum lobum a prægresso longo abhinc tempore pectoris morbo, penitus absorptum, alterum inflammatum fuisse observamus.

in Nosocomio infans hunc, observari videtur, cuius pulmo dexter sanus, sinister v. parvus parvulus & y fons. fons, omni in abgepass abierat.

vimus, qui mortis causam constituit. Tum quoque ut plurimum in altero pulmonum lobo vomicas, sive ulcera clausa, diversæ magnitudinis & numeri, adnotavi, quæ dissecta partim pus crassum, partim fluidum continebant. Ubi in eodem vel altero lobo, maximeque superiori ejus parte incisio facta fuit, cavitates sat amplæ pure & phlegmate, ejusdem fere generis ac coloris, quod per os ante rejectum fuit, repletæ in conspectum venerunt. Fit porro nonnunquam, ut in pulmonibus nodosis & scirrholis ulcera serpentina, fistulosa & instar cancri vicinas partes exedentia, quæ ichor foetidum & sanguinem recondunt, offendantur. Nec defunt exempla, ubi tubercula scirrholosa & instar acinorum dura reperiuntur, quæ materia tophacea, calculosa & putrida scatent. Post ea non prætereundum esse existimo, quod cor plerumque flaccidum ejusque vasa polyposis concrementis sint indurata, de quo phænomeno memorabilis exstat observatio in M. N. C. Dec. II. obs. 35. In pericardio quoque, imo non raro in ipso pectoris cavo ingens feri impuri & foetidi diffusi copia. Quod denique ad abdominis aliasque partes attinet, vasa ut plurimum sunt exsanguia, hepar magnæ molis & pallidum, mesenterii glandulæ tumefactæ, omentum absumptum & omnis pinguedo tam internarum quam externarum partium conspectui se offert. Qui paulo curiosior plura de phthisicorum sectionibus exempla legere cupit, consulat modo M. N. C. Dec. I. ann. 1. pag. 62. 63. item ann. 2. pag. 235. ann. 3. pag. 190. Dec. II. ann. 4. obs. 35. & 118. ann. 8. pag. 214. ann. 9. 245. Cent. III. & IV. obs. 118. Cent. VIII. obser. 105. Cent. IX. obs. 16. 26. Cent. X. obs. 143. VERZASCHAM obser. 100. LOSSIUM obs. 11. PAWIUM obser. 22. PLATERUM lib. III. obs. 189. 690. PEZOLDUM lib. 63. 64. 74. & 92.

## §. VI.

Ex hisce satis apparet, quam gravis & demum exitialis pulmonum, cem

visceris vitalis, sit læsio, quæ mortem induxerit. Nunc erit inquirendum, quænam causæ ad tantam læsionem in exquisita phthisi contribuant. Has inter primo omnium referri debent stases scirrholæ, substantiam pulmonum mere vasculosam, vesiculosam & membranaceam obfidentes, quæ, si invalescunt, ob continuum & reciprocum aeris transitum aliasque causas, difficillime tolluntur. Qua de re dignus est, qui hic inferatur, locus HIPPOCRATIS, qui exstat in lib. de intern. affect. cap. IV. in hunc modum: *Quum pulmo sanguinem in se ipsum traxerit, aut pituitam falsam, & non rursus dimiserit, sed in ipso coacta & compacta fuerint, ab his tubercula sunt in pulmone & suppurantur: ab initio & per totum morbum suffis acuta sicca obtinet, & rigor & febris, & dolor in pectore & in dorso incumbis, aliquando etiam in latere & erecta cervice spiratio vehemens incidit, deinde corruptis pus & multum exspuit. Non possum quin hisce HIPPOCRATIS verbis comparem fere similia ARETÆI, quæ in lib. III. cap. VIII. exstant; phthisici, inquit, autem quam manifestis signis præsertim sputo putrido & purulento se prodit morbus, in pulmonibus sovent tubercula, sive nodos scirrholos, a materia viscosa lenescente atque in duriciem abeunte, & ita sabidi per plures annos vivunt, ante quam in altum corruptionis vel abscessus transeunt. Hac si adsunt, in pulmonibus suffis sicca, valida, sonora cum acuto vel pungitivo sensu in pectore spirandique difficultate indierum faciunt, & a profundiori aeris attractione & inspiratione angustia quadam & renisus in pectore percipitur suffisque vehementior fit, maxime etiam post validam corporis exercitationem.*

## §. VII.

Verissima quidem sunt allata Hippocratis & ARETÆI verba: nobis tamen nonnulla, quæ forte meliori illustrationi inserviant, adjicere licebit.

De hisse  
nos la-  
dunt &  
1) suber-  
cula,

bit. Tubercula ista materia viscida repleta plerumque initium constituunt vomitarum, quæ nil nisi diversæ magnitudinis ulcera sunt, membrana ambiente cincta. Ejusmodi vomitæ, si adhuc minores sunt, tussii interdum ejiciuntur. Quodsi vero mole sua crescunt interiusque rumpuntur, abscessus inde fiunt & cavitates cum spuito purulento copioso phlegmate mixto, & tunc vera adest phthisis. At vero quandoque ipsi hi nodi scirrholi, qui diutius se celarunt, ut præter siccam tussiculam vix ulla præbuerint indicia, ob materiam intus retentam & acrem factam in ulcus abeunt cancrum & fistulosum serpens ac foetidum, quod ita vicinas partes consumit & in putrilaginem convertit, ut teste FO. RESTO *lib. XVI. obs. 14. C. 53.* asperæ arteriæ frustula ejecta, & juxta SYLVIIUM *in obs. lib. II. cap. XII.* venæ pulmonalis furculi tussii excreti fuerint.

## §. VIII.

Verum adhuc sunt alia phthiseosis initia, maximeque hæmoptysis, ubi incaute a medentibus tractatur, aut si paullo major eruoris portio est, quæ spuito ejicitur. Tum enim facile sanguis ex pulmonem vasculis intra vesiculas aereas extravasatur & stasi concepta putrescit, partes vicinas corrodit ac demum sinuositates efformat, vel in nodos & tubercula coit. Et profecto, si vel meam unius hac de re experientiam adducere licet, certa asserere fide possum, dimidiam fere partem phthisicorum, qui se curæ mæ tradiderunt, ab hæmoptysi prægressa & male curata primam mali sui originem accepisse. Quibus dein quoque annumerari debet secundam veteres catarrhus falsus longo tempore pectus insecrans, quem pressio, ut ajunt, pede, phthisica affectio non raro excipere solet. De quo in sequentibus plura dicemus.

## §. IX.

Jam vero non immerito quæri posse video, unde causæ jam proposuimus ori-

Tom. IV. Pars IV.

ginem suam habeant. Nostra hac de re sententia hæc esto: sanguinis & humorum in vasis stagnationes, ubi firmiter iis insistant, sicut plurimorum morborum, ita etiam phthiseos sunt genetrices. Fluida enim quando extra motum progressivum constituta in circulum non aguntur, pristinam suam temperatam naturam mora amittunt, & valde alienam, impuram, salsamque & acrem induunt; vel etiam minima vascula nimium opploendo obstructions, indurationes atque scirrhefcentias efficiunt. Perniciosas vero hæc sanguinis & humorum in pulmonem vasculis stagnationes non aliunde fieri deprehendimus, ac si fluida in nimia copia & cum impetu ad partem per se valde languidam & a tone dejectam compulsa congeruntur, ut, quantum venæ ac arteriis receperunt, non possint reddere.

## §. X.

Verum quamplurimæ sunt causas, quæ pernicipalem sanguinis & humorum in pulmonibus stagnationem inducere & ad phthisin remote conferre valent. Inter eas precipua debetur animadversio hereditariæ dispositioni, qua liberi a parentibus phthisicis progeniti, dara occasione, in eandem labem incurrunt facillime. Consequentem hac in re habemus tam experientiam, fidissimam rerum testem, tum auctores probatissimos. Ex his audiamus saltim doctissimum FERNELIUM, qui in *patholog. lib. 5. cap. X.* hæc eleganter prodit: *qui tabida de stirpe sati sunt quasi hereditario jure omnes necessario tabe marcescunt; hocque malum sepius vidimus in ejusmodi familiis ordine grassari.* Et ratio quoque in promptu est. Etenim, quum illa a parentibus accepta ad morbos proclivitas potissimum in prava partium solidarum conformatione, sive tali fibrarum ac vasorum laxitate consistat, qua humores appulsi non debito modo ac nisu ulterius possunt promoveri; in aprico est, cur ii, quorum pulmones natura debiles ex-

L sunt

2) hæmoptysis

3) catarrhus pectoris

origo hæmoptysis

Causa media in sunt dispositio hæmoptysis

sunt & flaccidi, præ ceteris in varios pectoris morbos maximeque phthisin sint propensi, Quibus dein, teste gravissimo HIPPOCRATE, adhuc ii debent adnumerari, qui pectus a natura depressum & angustum obtinent, qui scapulas instar alarum prominentes costasque in thorace protuberantes habent, nec non qui oblongi colli vel etiam gibbosi sunt.

## §. XI.

Temporaria sunt seu quæ obolent cum la juvenibus.

Deinceps certa constat experientia & vel solius HIPPOCRATIS comprobatur testimonio aph. IX. Sect. V. homines, qui habitus corporis gracilioris ac tenerioris, statutz proceræ atque ætate juvenes sunt, a XVIII. ad XXXV. ætatis annum hæmoptysi neque ac phthisi valde esse obnoxios, vix aliam ob rationem, quam quod in hac ætate vasa sint teneriora longæque facilius, quam quidem in provectioribus, expansa dissolvantur. Ut plurimum vero omniumque facillime hæmoptyica & phthisica accidit affectio viris & juvenibus, qui temperamento præditi sanguineo-cholericæ facile animo commoventur & in pueritia frequentes narium hæmorrhagias perpassi sunt, præsertim si nimio motu incallescunt. Tum enim sanguis magna in copia & impetuosius ad superiora & pectus compulsi per minima arteriæ ac venæ pulmonalis vascula libere itinere ad cor redire nequit; unde ramorum majorum a subsistente sanguine nimis expansiones, disrupsiones & denique extravasationes fieri necesse est.

## §. XII.

Dicitur perverum.

Ex diæta perversa causam hic præbet antecedentem intemperativus potuum spirituosorum usus. Quod quidem non adeo difficili indiget probatione, quum satis cuique spectatum sit in regionibus vitiferis sicut omnes pectoris morbos ita maxime hæmoptysin ac phthisin longe esse frequentiores, quam in aliis. Hinc etiam HOFERUS in *Hercule med. lib. 1. cap. III.* rectissime arguit, phthisicam

affectionem in Austria inferiori non aliam ob causam endemie grassari & tam innumeros rapere, quam ob vini generosioris, præsertim matutino tempore, abusum.

## §. XIII.

Progredimur nunc ad eas causas *Ad præ-* considerandas, quæ salvi humoris in *Arter-* pectore decubitu procurant, quem *catarr-* antiquissimi medicorum promissæ *ham* ex *disposi-* capite deduxerunt, quasi passim ab eo *ti* sanguis *refl con-* humoris in pectus delapsus fieret. Sed *gialis.* non satis perspicuum & in experientia fundatum est hocce iudicium. Multo magis nimia sanguinis serosi ad pectus, præcipue vero ad fauces totumque canalem asperæ arteriæ, quæ tunica glandulosa interna obita est, congestio accusanda videtur; idque eo magis in subiectis serosioribus & gravidiæ, coryzæ crebrisque catarrhis per omnem ætatem obnoxiiis. Quod si enim plus sanguinis & seri ad glandulosas partes per arterias appellitur, quam per vasa venosa potest regredi, ingens serosi laticis contingit secretio, qui copia increfcens, admissio aere frigido, coagulatur & tandem magna læpe copia ejicitur. Procedente tempore & malo diutius perseverante, accedentibus adhuc aliis causis, ut cruditatibus ex prava diæta & digestionis vitio collectis, transpiratione impedita, vel profundo animi mœrore &c. serum induit naturam fœcalem & corrosivam adeoque successu temporis vesiculas pulmonales & vasa tenerissima corrodit.

## §. XIV.

Ex dictis & adductis jam facili negotio poterit perspicui, quantopere rigidi & septentrionales venti ac tempestates *Arter,* pluviosæ, nebulosæ ac frigidæ, quæ *midæ* tonum vasorum pulmonalium relaxando, fordes in eis accumulunt, *plu-* adeoque malum adaugent, tabidis ac *gialis.* phthisicis sunt insensæ, ut propterea aphor. HIPPOCRATIS. X. Sect. III. veritati omnino æstimemus consentaneum, qui autumnum expressis verbis tabidis declarat noium. Et profecto,

fecto, si ullo in morbo ingignendo magna aeris est potentia, est sane in pectoris affectionibus maximeque phthisi; unde etiam TULPIUS in *obs. med. lib. II. cap. X.* causam, quod in Hollandia tam frequentes sint vomicae & phthises, locis uliginosis & aeri continuis vaporibus putridis referto tribuit rectissime.

## §. XV.

Transimus nunc ad eos morbos inquirendos, qui ad phthisin disponere solent: inter hos vero primo loco referri debent variolae. Hinc ego pet-  
*Ad phthisin contrahunt morbi phthisis, si vasa pectoris moleculis per multos annos durantibus, ut tussis sicca, sensu doloris acuto, spirandi difficultate, tabe & lenta febre infestati & accedente demum abcessu mortui fuerunt, quos inter praesertim serenissimum Saxoniae Principem referre legemus. Eadem fere scena luditur post morbillos. Nam in hisce exanthematicis affectibus magna feri peccat acrimonia, quae non modo in principio horum morborum nervosis pulmonum membranis fitius inhaerens tussim siccam & sat molestantem concitat, verum etiam, expulsionem materiae ad corporis superficiem facta, insignem in hoc viscere debilitatem relinquit. Jam si aegroti forte maturius, quam quidem materia vitiosa omnis transpiravit, liberiori, maximeque vernali & autumnali aeri sese exponunt, per facile evenit, ut restitans malae indolis materia ad interiora recedens ut plurimum pulmones debiles petat, irriter, exulceret. De quo legi meretur Thomas BARTHOLINUS Cent. IV. *hiflor.* 43. & MICHAELIS *praxi clinica* part. I. lib. III. cap. V.*

## §. XVI.

Neque plane insolens & ab expectantia alienum est, ex aliis pariter cutis efflorescentiis, ut scabie, gutta rosacea, maculis scorbuticis & purpura retropulsis phthisicam labem saepius habuisse subortam. Quod idem fieri ob-

servamus post suppressos copiosos sudores, post intempestive tractata capitis vel pedum ulcera, vel etiam post fonticulos praemature consolidatos. Nec desunt exempla, quae etiam ab erysipelate, doloribus podagricis & arthriticis repressis, & incautius tractatis phthisicam affectionem docent prognatam. Etenim quum acris & caustica materia hac ratione intus retinetur & per venas ad sanguinem resorbetur, fit inde, ut ad nervosas easque tenerrimas pulmonum membranas delata firmius ipsi inhaereat easque irritando confringat; unde vasa coarctata obstruantur & demum corrodantur necesse est. Memini quoque, a curato tumore scirrholo sub axillis & pone aures phthisicam affectionem inductam, ut nihil denique dicam de frequenti phthiseos ab haemorrhoidibus vel menibus suppressis generatione.

## §. XVII.

Denique non praetermittendum esse arbitror, dari exempla, licet non adeo frequenter obvia, quae optime nos convincunt, phthisicam tabem, *Nimia humorum coagula-*  
praeter supra dictam haemoptysin etiam ab aliis fortioribus haemorrhagiis commode posse induci. Quod quidem potissimum valet de ejusmodi subiectis, quae vel per nativitatem, vel ob contractam ab aliis causis pulmonum atoniam ad hunc morbum disposita existunt. Cujus adfert sanam quoque rationem habemus suffragantem, quae non minus superabundantem, quam deficientem sanguinis copiam statibus producendis nos docet aptissimam. Unde videant, qui phthiseos proximam causam in sola plethora repositam sentiunt, quantum sibi & expectantiae contradicant.

## §. XVIII.

Singularis superest quaestio, quae in utramque partem a medicis agitur, utrum phthisis sit contagiosa? Ego ve-  
*Phthisis non est contagiosa, vel ea causa*  
ro neutiquam vereor hoc asserere, vel saltem eo restringere, ut ejusmodi contagiosa miasma, si non ad phthisin inducen-

dam, tamen, si dispositio jam adsit, ad promovendam existimem idoneum. Nam mirabilis certe & valde multiplicativa indolis est omnis materia ulcerosa & corrupta, ut prorsus, ut plurimum morbi maligni & per contagium grassantes, quales sunt scabies, lepra, variolæ, ulcera antiqua sordida, in peste carbunculi, imo quoque dysenteria &c. exinde deducendi veniant. Neque tamen tam malignam nostri miasmatis naturam esse censeo, ut e longinquo & subitaneo quasi impetu homines inficiat, sed tum demum, si quando propinquius & continuo cum phthisicis converſentur. Confirmant nos in tali judicio ferendo celeberrimi in arte medica viri. Ita RIVERIUS *Cent. 1. obs. 99.* notabilem refert casum ancillæ, quæ per contagium heræ suæ, cui diu nocturne ministravit, in phthisin incidit, & *Cent. IV. obs. 92.* mentionem injicit puellæ, quæ a sore phthisico cuidam mammas præbente phthisin incurrit. Aliud exemplum nobis affert SCHENCKIUS, qui in *obs. lib. II. obs. 133.* memorat, ita contagiosa esse confirmatorum phthisico rum sputa, ut medicus illa olfaciens factus inde sit phthisicus. De quo etiam consuli potest *obs. de phthisi et contagio in M. N. C. Cent. IX. obs. 62.* descripta.

## §. XIX.

Progrediendum nunc est, ad prognosin nostri mali suppetendam. Veram phthisin inter graves & curatu difficillimos morbos vel primo loco esse collocandam, non modo in vulgus tot tristibus exemplis cognitum exstat, verum etiam a medicis longa experientia est comprobatum. Ipse HIPPOCRATES *lib. 1. de morb. Sect. II.* ita judicat: *tubercula cum sunt, necessitatem habent, ut interimant.* Cui adſentitur GALENUS *lib. IV. de loc. affect. cap. VIII. & V. method. med. cap. 1. & VIII.* & CELSUS *lib. III. cap. 22.* quod si vera phthisis est, inquit, inter initia protinus occurrere necessarium est, nec facile hic morbus, cum

inveteravit, evincitur. Ex recentioribus de insigni phthisin sanandi difficultate vid. FORESTUS *obs. 45. lib. XVI.* & RODERICUS a FONSECA *Tom. 1. consult. 58. & Tom. II. consult. 48.* nec non TIMAUS a GULDEN-KLEE in *epist. lib. III. epist. 2.* ubi hæc habet: *ingenue fateor, in tota mea praxi, quam 37. annis exerceo, neminem exiis, qui ulcere pulmonum affecti fuerunt, integre sanitati restituere potui, etiamsi nihil intentatum reliquerim, quod ad curationem hujus mali ullo modo facere poterat, neque ab aliis celeberrimis medicis quempiam restitutum vidi.*

## §. XX.

Verum enim vero, licet phthiseos <sup>sed in-  
scriptus</sup> curatio sit difficillima, imo, si ad tantum fastigium pervenerit, ut a vulgo quoque signis manifestis cognoscatur, supra omnem humanam artem posita, nolim tamen facile idem de omni, præsertim in incunabulis quasi suis adhuc hærente, prædicare. Namque plura mihi cognita sunt exempla eorum, qui a vulnere pulmonibus inflicto, vel a præcedente hæmoptysi & ruptione vasorum minimorum, nec non post pleuritidem & peripneumoniam pectoris abscessu & vomitibus laborarunt, sed nihilominus tempestiva medicatione a malo suo penitus fuerunt liberati. Pari ratione mihi & aliis observare licuit, perplures a phthisicis parentibus genitos, qui pectus interius depressum & scapulas instar alarum prominentes habuerunt, qui ad iram valde proclives sanguinem in pueritia ex naribus, citra ullam causam externam, frequentius stillarunt, salsæque ad fauces & pectus defluxiones cum tussis sicca & serina, æstivo etiam tempore infestante passim carnemque mirum amiserunt & non longe post pastum calorem volarum perceperunt, florido adhuc genarum colore existente, in integrum congrua medicina & dieta fuisse restitutos. Imo denique pulmonum abscessus, ubi ingenti in copia pus album,



album, æquale & unius coloris fuit ejectionum, reliqua tamen pulmonum substantia nondum corrupta, nec scirrhus indurationibus, vel fistulis ulcerosis obfessa, neque cordis & pulmonum vasa concretis polyposis infarcta fuerunt, convenienti methodo tam diætetica quam pharmaceutica feliciter vidi sanatos. Id quod innumeris aliis exemplis confirmare possemus, si ad longius excurreremus tempus nobis suppeteret.

## §. XXI.

Jam prævideo, quid obijci mihi hic posset: Scilicet, qui fiat, ut tam raro phthisi, vel tantum incipienti obtingat curatio. At vero, quæ id multo sæpius prohibent, varæ dantur causæ, quas inter hæc mihi potissima esse videtur, quod non satis evidentia signa diagnostica semper suppetant, quibus de veræ phthiseos præsentia ejusque genuinis causis certiores reddamur. Quam in rem egregia sunt verba FERNELII, qui in *patholog. lib. 5. sup. X. latens abscessus*, inquit, *seu vomica, vitium imprimis additum, sæpe nec laboranti, nec medico notum, quo laborans ipse nec consueta munia intermisit, nec se morbo teneri putat, causamque interitus nesciens intus gerit sub pectore: non pauci tamen inopinato e vivis hora quadrante erepti sunt, in quibus dissectis non alia mortis causa comparuit, quam repentina vomica in pulmonibus disruptio, qua per suffocationem fit vita exstincta. Omnibus tamen sic affectis nullo non tempore ante, quam vomica rumperetur, adfuit cruenta cum tussi excretio, corporis gravitas, pectoris levis oppressio & spiritus diffinitas, quibus tabes raro comes. Sed hæc signa aliis quoque affectibus communia sunt. Præter hæc vero de admodum difficili phthiseos diagnosi plenius nos convincere possunt frequentes medicorum, etiam sæpe clarissimorum, circa eandem ætatem, & eadem aetate, pauci habentur, qui in chronica cum ætate tardiori denudatione affecti marerint.*

Tom. IV. Pars IV.

paullo crassiores, coloris ex albo viridis rejiciunt, aut qui tussim stomachalem hypochondriacam ex vitiosis primarum viarum saburra ad pulmones delabente subortum diutius experiuntur. Fit quoque, ut asthma humidum, præsertim ubi post suppressas hæmorrhoidum vel mensium excretiones, factamque inde in dispositis humorum ad pectus regurgitationem & congestionem originem sumserit, pro phthisica affectione non raro venditur. Nec denique obcurum esse poterit, lentam febrem cum tussi & repentina corporis extenuatione & colliquativis sudoribus junctam, quæ arthritide, podagra vel scorbuto affectis nonnunquam supervenit, ad phthisin sæpissime referri, cum tamen nulla in pulmonibus continui solutio reperitur. His vero ita constitutis, quum tam anceps, tamque difficilis veræ tabis pulmonalis sit cognitio, facile poterit colligi, quam incerta sit curatio, quæ illi debet esse superstruata.

## §. XXII.

Sed accedit adhuc alia non minoris momenti causa, quæ phthiseos & inde de subortæ hæticæ sanationem impedit: quod scilicet perpauci medentur sint, qui idoneis ad hoc negotium pertinentibus medicamentis recte & circumspecte uti norunt. Nam si ullo modo, certe in phthisi curanda, ob tantam remedium contraindicationem medicum opus est prudentia. Postulat enim phthisis laxantia & humectantia, postulat leniora traumatica & adstringentia, imo postulat nonnunquam blanda anodyna &c. quæ nisi debita cautione justoque tempore & exacta circumstantiarum habita ratione adhibentur, longe gravius malum efficiunt, tantum abest, ut levaminis quicquam afferant.

## §. XXIII.

Præmissis hæc generalioribus ad prognosin spectantibus, nunc de futuro eventu morbi nostri tam salutari quam perniciosi pauca erunt subiungenda. Sciendum itaque,

I. 3 specm

spem in angustio esse positam, si hec siccus calor magis magisque increfcit & pulsus etiam primo mane fertur citatior, si caro cum viribus consumitur, neque hæc aliquo modo per somnū reficiuntur. Quod quidem plerumque evenit, si, quo plus puris adest, eo minus expectoratur. Tum enim acrius illud fit & scdus carbonibusque injectum tetro odore nares ferit, & eo magis quoque febris augetur. Si porro accedit summa spirationis cum metu suffocationis difficultas, si ægri in eo latere, ubi latus lobi est, non possunt jacere, si odorem cadaverosum ex ore spirant, si vox rauca, sudores colliquativi, diarrhoea & pedum cum dolore quandoque juncta intumescencia superveniunt, capillique desuunt, mortem in propinquo esse certissimum est. Quod si denique expectoratio prorsus supprimitur, ægri sensim paulatimque, maxime sub situ capitis elatiori, mentis satis compotes spiritum emittunt.

## §. XXIV.

Progn.  
si salu-  
eas.

Contra vero meliora sunt speranda, si vires adhuc constant & respiratio est liberior, si appetentia ciborum ac digestio salva, si sputum, quod ejicitur, album & æquale est, nec febris hecica urget. Major tamen sanationis spes apparet, si æger est boni corporis habitus, si pectus habet amplum & si deest hæreditaria dispositio, calor sit mitior & alvus compacta deponit. Hac enim ratione phthisici, præsertim convenienti diætæ & medicamentorum usu adjuvi per longos annos vitam sæpe possunt protrahere, quam in rem magni momenti sunt verba WILLISH, quæ lib. de medicamentis, operat. Sect. 2. cap. VI. de tæbe seu phthisi in hunc modum prodidit: Accedit interdum, inquit, foveam quandam, aut forsitan binas in pulmionibus efformari easque circum circa parietes callosos obstruere, ita ut materies ibi collecta in massam sanguineam minime transferatur, sed quotidie tota, copia licet ingens, expectoretur. Taliter affecti,

quasi tantummodo fontanellam in pulmone haberent, spiritum etsi multum & crassum, imo flavum & quasi purulentum omni mane, aliquantulum in toto die rejiciunt, tamen alias satis sani degunt, bene respirant, comedunt & dormiunt, iuvantur, aut saltem bono corporis habitu persstant & non raro persanescunt. Hinc nonnulli dicuntur phthisin per 30. 40. annos habuisse & morbum cum usque ad vitam terminum, haud proinde abbreviatum, protraxisse. Et quæfecto notabile est circa pulmonum ulcera, quod salvis reliquis visceribus sine notabili corporis contabescencia per plures annos possint durare. De quo videri potest KERKINGIUS in spicilegio anatom. obs. 72. & BARTHOLINUS Cent. II. hist. 14. Nec adeo conceptu est difficile. Uti enim natura interdum vitiosa excrementa per ulcus extremarum partium, vel etiam artificiale, ut tantanellam insigni cum emolumento expellit; ita cur idem non possit locum quandoque habere in pulmone ulceribus equidem non video.

## §. XXV.

Sed demum non parum pariti medici interest, specialiora illa, quæ phthisicorum convalescentiam manifestant, signa probe nosse. Hæc quidem optime tradita legimus apud ARETÆUM lib. III. cap. 1. quare digna censemus, quæ huc transferamus: Si versantur in melius phthisi laborantes, tussis longior & ravior fit, plura excernuntur saniosa spusa & humidiora, multa per ventrem aquæ exturbantur, urina copiosa excernitur, licet nondum quicquam in ea subsadat, vox sonantior clariorque redditur, somni longiores, quantum satis est, efficiuntur, præcordia remittuntur, dolor interdum ad scapulas in remissione transit, anhelitus rarus, lenis, sed cum vocis asperitate fit: & ita sane morsem effugiunt.

Signa  
convales-  
centiæ.

*His omnia pertinet ad apthos  
Hic, Loui, unde deponitur est,*

C. U.

*Superam adagabro, fofale de cur de a pofante in gray  
libro a Clauys. Wigam typi 1700 miffo.*

## CURATIO.

## §. I.

*Methodus phthisicis medendi triplicis, curativa, mitigativa & præservativa.*

**P**RO diversa mali phthisici statu atque conditione tam ratione temporis & causarum, quam respectu virium ægrantis medendi methodus & apta remedium appropriatum applicatio multum omnino differt. Nobis eam in curativam, in mitigativam & præservativam dispescere placet. Prior locum habet, ubi talis causarum status & circumstantiarum ratio est, ut spes restitutionis in integrum affulgeat & idoneis medicamentorum usus sanationem adhuc promittat. Mitigativa verò ea est, ubi tanta vis morbi est, ut ejus expugnatio nec ab optimis remediis sit obtinenda, sed in id potius debeat incumbi, ut urgentia symptomata mitigando pejoraque ac funesta avertendo vitam ad longius tempus prolongemus. Tertia denique præservatoria sicut in universon ad morbos graves præcavendos omnium est optima, facillima & securissima; ita etiam in nostro affectu, ubi adhuc est in incunabulis, principem suo merito locum tuetur.

## §. II.

*Curatio phthisicis locum habet.*

**A**ccedimus jam ad methodum medendi curativam. Hæc locum maxime invenit, ubi a vnicuique rupta abscessus apertus oritur & magna puris ejicitur copia, quod sæpissime evenit post pleuritidem & peripneumoniam male terminatam, post hæmoptysin & vulnera pulmonibus inflata, salva reliqua pulmonali substantia eaque nec erosa, nec scirrhusa. Quo in casu nec rectius nec melius datur præsidium, quam lactis cura decenter usurpata, qua ego per plures phthisicos, in cymba charontis quasi hærentes sanatos pristinaque redditos valetudini novi. Nam si ullum est remedium, quod non heri aut nudiù tertius natum, vel quatuor tantum experimentis comprobatur, sed quod triginta se-

culorum omniumque inter omnes nationes medicorum jugi & constanti experientia saluberrimum & præclari in phthisi curanda usus est deprehensum, certe est lac & cum hoc prudenter instituta curatio, de qua utilia quædam hinc loco tradere operæ erit pretium.

## §. III.

*Effectus lactis.*

**E**t primo quidem ut certiores fiamus, lactis usum esse vetustissimum primis mnx temporibus, quo salutari arti majus statuere pretium cøperunt homines, ab optimis medicis, ceu summum phthisicos remedium esse commendatum, & re erit, certa, quæ id comprobent, testimonia ex veterum monumentis in medium afferre. Primus itaque, qui lacti plurimum in sanando tribuit, suo jure dicendus est HIPPOCRATES, quem postea secutus est GALENUS, qui multus in commendando lactis ad phthisin usu, & lib. V. meth. med. cap. 12. mentionem injicit loci, quem vocat Stabias, aeris puritate, pectus pabulo & lactis ibi emulsi salubritate celeberrimi, ad quem frequentissime confluerit, ad sanitatem recuperandam elumbis phthisicorum cohors; non secus, ac nostris temporibus ad acidulas & thermas, recuperandæ per aquas sanitatis gratia, convenire quotannis ægri solent. Qui mos & curandi methodus, teste ANDREA BACCIO, Romanorum doctissimo medico, etiam ante centum annos Italiæ viguit. Nam lib. IV. de thermis egregius hic auctor ita scribit: *Neapolitani medici pro ultimo refugio agros phthisicos, & qui sanguinem expuunt, vel ejusmodi thoracis ulcera & alia vitia patiuntur, ad Tabearum mittunt, cum successu adeo salubri, ut sint, qui totam in iis degant vitam.*

## §. IV.

*Quod auctoritatem ARETÆI.*

**E**st quoque inter veteres eosque prætiosissimos medicos ARETÆUS, qui lib. VII. de morbo chron. non dubitavit alterere, phthisicos, si multum lactis potent, nulli alio egere auxilio. Præcipue verni hoc referri debet TRAL-

LIANUS, qui in omnibus prope pectoris morbis lactis usum in suis de re medica libris summopere suadet. Ita memorabilis existat locus in *lib. VII. pag. 309.* ita se habens: *quod si corpus totum alimentum non sentiens contabescere manifesto inceperis, neque thorax multum puris contineat, etiam solum lac ipsi dari debet: Et asininum omnia alia antecellit, quod probe purgat.* Alio loco commemorat: *agere spirantes asinino lacte adjutos subinde conspexi, quum opportune esset datum: omnia enim, quæ pulmonum cavernis infixæ sint, refectione redditis morigera.* Et de hæmoptysi loc. cit. pag. 304 hæc habet: *omnes hæmoptysici lacte utantur. Neque enim medicamentum, aut cibum, aut aliud quippiam adeo accommodum ipsis ac utile, quam lac: Et qui per inopia solo ipso constanter, longiori tempore usi sunt, omnes in totum consanuerunt.* Porro addit: *novi quendam, qui cum toto anno lac bibisset Et comedisset, Et a vino abstinuisset, ab hæmoptysi Et puris spatio liberatus fuit, ut nec posset in phthisin incidere.*

## §. V.

Verum enim vero, demonstrandum etiam a priori est, quare lac tam celebre tamque incomparabile in pectoris morbis sit præsidium. Primum vero scire licet, lac nec unius esse generis, nec ejusdem quoad omnia virtutis, sed pro diversitate animantium, & pabuli peculiares quasdam possidere facultates, quæ seorsim sunt expendendæ. Primo omnium se nobis offert lac asininum, quod summo in pretio semper a veteribus habitum fuit, multumque habet feri dulcis, sed parum terrea caseosa & pinguioris substantiæ, quare nec facile coagulatur & ad conficiendum caseum & butyrum minus aptum existit. Serum ejus abstergentem & laxantem, humectantem & acrimoniam temperantem possidet facultatem. Hoc sequitur caprillum, quod non tam ferocum est, quam asininum, neque tam bene laxat & ab-

stergit, sed consentientiæ est crassioris; & quia frondibus arborum, quæ ali- quid resinosi continent, vescuntur capræ, ad consolidationem partium suppuratarum plurimum valet. Lac bubulum pinguius est, multumque ter- ræ, sed minus feri habet; unde etiam multum ex eo butyri & casei confici solet. Habet virtutem temperantem, nutrientem & consolidantem. Humanum lac ad usum medicum præ aliis videtur præstantissimum. Nam dulcissimum omnium est ejusque nutriendi vis insignis abunde apparet in infantibus. Differt vero etiam lactis virtus pro diversitate pabuli & herbarum, quibus animantia vescuntur. Hinc vernale salubre admodum est, quia tunc vegetabilia multis succis temperatis turgent, cum contra hibernum, quia tum animantia feno & stramine vescuntur, minus salubritatis habeat.

## §. VI.

Hicce expositis facile nunt judicatur, lac ideo in omni pectoris affectu & tabescentia universale remedium dici & haberi posse, quod omnibus medendi indicationibus satisfaciat. Primo enim, ad acrimoniam humorum, quæ irritationis, vehementioris tussis & corrosionis præcipua causa est, insigniter temperandam, mitigandam & demulcendam, lacte præcipue vaccino nihil deprehendimus efficacius. Nam uti veneni corrosivi arsenicalis vim noxiam infringere valet; ita multo magis spicula salum corporis nostri involvere poterit atque obtundere. Ubi porro scopus & intentio est, viscidos & crassos humores detergendi, ulcera purgandi, alvum laxandi urinamque movendi & assluxum humorum a partibus affectis divertendi, asininum reliquis omnibus, propter copiosum serum dulce abstergens, est præferendum. Ubi virtus consolidandi & conglutinandi fauciatis partes expetitur, caprillum satisfaciet. Ad partes vero verò tabe consumptas nutriendas & ad vires deperditas restaurandas nec salubrius nec valentius datur humano lacte,

*La Pte  
vitus  
pro di-  
versita-  
te ani-  
mantia  
nammi-  
natur.*

*In pec-  
toris  
morbis.*

At, præsertim, quando ex mammis mulierum, nullo accedente aere, quo spirituosum elementum avolat, hauriatur. Quam in rem memorabile est, quod doctissimus WEPFERUS in epist. ad Verzaschum scribit. Certe divini quid tam in humano, quam asinino lacte latet, quod antehac nunquam credidissem, nisi id sensibus comperissem. Vidi his meis oculis, quasi novos homines inde factos fuisse. Nam legitimo ejus usu habitum firmiorem, colorem nitidiorem & vires robustiores plurimi acquisiverunt.

## §. VII.

*Ufus seu  
et lactis.* Sed non modo in lacte, verum etiam in ejus sero, si rite paratum fuerit, magna & efficax & interdum quoque potentior ad chronicas pulmonum & aliorum viscerum passiones sanandas virtus residet quam in lacte ipso. Nam, si vasculorum in visceribus obstructions, quæ fere initium dant longis morbis, referendæ sunt atque expediendæ, si lentæ ac tenaces humores dissolvendi, si emundioria aperta servanda & partes calore torridæ sunt humectandæ, serum lactis, ex quocunque animalis sit petitum, ipsi lacti anteferi debet. Legi de hoc argumento fusius potest nostra *dissertatio de mirabili feri lactis virtute.*

## §. VIII.

*Lactis  
usus in  
pectus ad  
bibitio-  
nem con-  
ficitur.* Ex hisce adductis clare liquet, non modo in pectoris affectibus, sed etiam in difficillimis morbis sanandis non sine ratione, sed consentiente experientia ab antiquissimis & peritioribus nostri temporis medicis hac maximi semper habitum fuisse. Totum vero arcum in recto & prudenti ejus usu ad morbos tum curandos tum mitigandos, unice consistit. Quod si enim quis & alimentis & medicamentis minus recte uti easset, plus detrimenti affert quam emolumenti. Quam regulam inprimis ex recentioribus tenere debent, qui, nescio ex qua causa vel quo affectu, lactis usum medicum penitus rescire, damnare & infanare omnibus viribus contendunt.

## §. IX.

*Lactis  
virtus  
augetur  
pabulo  
medica-  
to.* Quamvis vero per se satis eximius sit usus lactis ejusque feri ad multas indicationes in phthiaseos curatione adoranda absolvendas; negari tamen minime potest, salutarem ejus energiam pro diverso scopo obtinendo diversis modis & rationibus secundari posse & exaltari: quod sequentibus demonstratum dabimus. Et primo quidem, lactis vis mirum intenditur ac vere medicinalis redditur, si animalibus, quorum lacte fruimur, pabulum medendi scopo accommodatum & quodammodo medicatum exhibemus. Etenim, a diversa alimenti, quo animalia & homines vescuntur, indole, lac etiam, quod præbent, differentem acquirere facultatem, non est quod dubitemus, præsertim quum vel quotidiano consilet exemplo, medicamentum purgans nutriti oblatum, per lac quoque infanti surgenti communicari. Laudandi igitur sunt antiquiores artis nostræ antilites, qui ut lac meliorem obtineat efficaciam asinis vel capris inter pabulum ejusmodi obtulerunt herbas, quæ ad morbum, quem curandum susceperunt, virtute aptissime specificæ splenderunt. Hinc est, quod GALENUS *loc. cit.* memorat, herbas in Stabiis nascentes, quales sunt gramen, polygonum, melissophyllum, rubus, hederæ, cyttisus, lentiscus &c. lac animantium, si hisce vescantur, efficere saluberrimum. Quem eximium morem & nos usque eo felicitum successu sequuti, vel depurationem moliti sumus, hordeum, scabiosam, icordium, charrefolium, arnicam, hyssopum, veronicam, mærub. album cum pabulo miseri iussimus; si vero consolidandi fuit intentio, plantaginis species, hederam terrestrem, agrimoniam, millefolium, faniculam, consolidam majorem, pulmonariam &c. pascui loco obijcienda curavimus.

## §. X.

## §. X.

Admix-  
tione a-  
quarum  
salubris

Verum, adhuc fuit alii modi lactis virtutem medicamentosam pro varia intentione augendi, scilicet per varias & appropriatas admixtiones, quas inter præcipue eminet, miscela lactis cum aquis mineralibus, de qua ego, sine omni ostentationis nota, vere asserere possum, quod primus fuerim, qui ipsam in Germania introduxit. Nam quum ante triginta & plures abhinc annos aquarum salubritum, in nostris regionibus scaturientium, tam calidarum, quam frigidarum ingredientia encheiresi chymica scrutatus nullum sal acidum & vere vitriolicum, sed potius alcalicum & medium, cum subtiliori terra & tenuioribus martis particulis in ipsis deprehenderim, experimentum feci, lac cum ejusmodi aquis remiscendi, idque tam felici cum successu, ut exinde in compluribus chronicis, maximeque pulmonum affectibus vel tollendis vel leniendis tam admirabiles viderim effectus, qui nec a solo lacte, nec a thermis vel acidulis seorsim adhibitis potuissent expectari. Unde mirandum, imo plane dolendum est, plurimos antea fuisse & adhuc esse, qui in phthisi & pulmonum exulceratione acidulas exultimant nocentissimas easque nec per se, nec cum lacte mixtas adhibere audent. Duos tantum ante nostram ætatem excipimus celeberrimi nominis medicos, quorum alter ex majoribus est Raymundus Joannes FORTIS, qui Cent. II. Consil. 20. 27. 28. 30. & maxime 34. acidularum usum commendat adveniente inquit, tempore, quo aque acidule in valle solis nascuntur opportuna sunt, quæ pulmonum ulceribus saluberrima ac præstantissima a nobis quandoque fuerunt expertæ, ad easdem tanquam ad unicam sacram anchoram confugiendum consulimus, cui remedio, si malum non cesserit, minus decoctis, lacti aliisque ejusdem facultatis cefsurum fore arbitramur. Alter ex recentioribus est MORTONIUS, qui medicatas aquas in pulmonum morbis

salubres esse perhibet, *phthysiol. p. m.* 68. si pulmones tumoribus steatomatosis cum calore miti hecticò obfessi atque hoc pacto, scribit, plurimos phthysicos multos annos harum aquarum usu, cum appetitus & virium restitutione, caloris hecticì & tussis minoratione, atque majori respirationis libertate restitutos & sine ulla recidivatione sanos redditos vidi.

## §. XI.

Ego autem licet in morbis, qui ex pulmonum substantia soluta, præsertim graviore pendent, non facile aquas minerales, quæ validioris indolis sunt, suaserim; multiplici tamen experientia confirmatus testor, illas ipsas, quæ mitiorem obtinent genium faleque alcalino valde turgent, ut sunt fontes Selterani vel Carolinz thermæ, cum lacte sive asinino sive caprillo decenti proportionem mixtas non modo in tussi chronica rebelli, cum dolore thoracis compressorio, spirandi angustia, lento calore & tabe juncta, verum etiam in profunda pulmonum supuratione & vera phthysi exoptatissimum præstitisse levamen. Hac enim ratione ad lentam, vicidam materiam dissolvendam, ad obstructions capillarum vasorum referandas, & ulcera detergenda ac depuranda lac majorem & præstabiliorum acquirere virtutem. Multo vero magis lactis cum aquis mineralibus potus indicatur, quando hæc pulmonum vitia ab affectione hypochondriaca, scorbutica, arthritica, vel etiam calculosa, quod non raro evenit, foveantur. Plura de connubio illo lactis & aquarum saluberrimo legis possunt in disert. quam ex professo de hac materia prodidi.

## §. XII.

Fuit autem hæc methodus, hæc per varias admixtiones corrigendi jam præcipis medicorum cognita atque consueta. Hinc plura in HIPPOCRATIS, TRALLIANI, AETII & ARETÆI monumentis consignata existant exempla, ubi lac aquæ permixtum

mixtum phthisi laborantibus præceperunt, vel etiam inprimis hydromel lacti additum exhiberunt, cui miram Hippocrates tribuit efficaciam, dom lib. II. de diata illud ipsum pulmonem emollire, tussim sedare, sputum educere & urinam movere perhibet. Hæc dum meditamur, insignis occurrit locus apud Cl. SPONIUM in aphorism. novis Sect. V. aph. 99. qui non modo externum & vulnerarium, verum etiam internum aquæ calcis usum in impetigine & lepra curanda fummis effert encomiis atque deini miscelam hujus aquæ cum lacte egregie commendat, his verbis: *Quinimo, inquit, quod magis mirum, in ulceribus internis, diarrhoea, dysenteria &c. hæc aqua cum lacte, aut sero lactis pota mixta præstat, ut ex Dno de Clusæ, celeberrimo inter Santes & Vasesnes practico addidit.* Nec ego quidem hanc methodum facile improbarem, siquidem in dysenteria cum intestinorum exulceratione juncta lac cum fonte Selterano mixtum incomparabilis semper deprehenderim efficacie.

## §. XIII.

Cum in-  
fusi &  
decocti.

Sed ulterius progrediamur ac quibusnam aliis remediis lac commode possitungi inquiramus. Ad pulmonum vitia graviora in propriè sic dicta phthisi emendanda infusa & decocta ex herbis vulnerariis & pectoralibus confecta non modo a medicis, sed etiam a vulgo omni tempore summo in pretio habita fuisse, res in artis exercitio notissima est. Herbe autem, quæ huic ului potissimum accommodatæ laudantur, sunt speciatim consolidamajor cum radice, consolidasaracenicam, tusilago, plantago acuta, pulmonaria maculosa, fanicola, scolopendrium, scabiosa, veronica, agrimonia, hedera terrestris, marrubium album, millefolium cum summitate hypericum cum floribus, flores rosarum, & id genus alia, quæ vel cum cerevisia, vel cum aqua, adjectis ficibus, melle, femineque forniculi & anisi stellati coquuntur. Neque desunt

exempla, quæ insigni cum phthisicorum emolumento hæc ipsa adhibita testantur, quum si simplex saltem abscessus vel ulcus, sine induratione scirrhusa, sine concretionem polyposa adit, multum utique ad partes læsas consolidandas possint conferre. Nihilominus non iniciandum est, ejusmodi decocta non raro propter vim suam adstringentem magno fuisse damno; maxime ubi duristuberculis pulmones inter initia sunt obsessi, vel si quando ad hæmoptysin intempestive sistendam adhibentur. Sanguis enim extravasatus hac ratione facile subit coagulatum, minimaque vascula obstruuntur, ut hinc longe major sanguinis & humorum in pulmonibus fiat stagnatio, ad producendam veram phthisin aptissima. Quod in periculum ne incurramus, ejusmodi infusa vel decocta cum portione vel æquali vel dimidia lactis miscere præstat, unde vis eorum adstringens ex parte infringitur & simul acrimoniæ humorum temperandæ propicitur utilissime.

## §. XIV.

Quod si deinceps primæ viæ ab humorum vitiosorum colluvie sunt repurgandæ, solia fennæ, rhubarbarum & manna cum lacte vel solo, vel aquato & acidulis temperatioribus diluto, vel etiam cum sero lactis commode possunt infundi leniterque decoqui, quum alias phthisici sensibilibusque naturæ homines facile a purgantibus, etiam mitioribus lædantur. Vidi quoque, ubi in primis luxurians acidæ saburra in primis viis progenies fuit, magnesiæ, quæ nonnisi subtilissimus calcis vivæ elutriatus flos est, ad drachmam unam vel duas cum aliquot lactis caprini uncis datam egregie alvum subduxisse.

## §. XV.

Ad tussim ferinam omnesque vires cum somno eripientem demulcendam, ad acrimoniam temperandam partemque contrictas relaxandas veteres olim insigni cum utilitate diacorda, quorum præcipua ex succis & semine

papa-

papaveris sunt composita, adhibeantur, recentiores verò massas pilularum de cynoglossa & de styrace, quæ iusta & refractori dosi propinata fructu suo non destituuntur, præscribere solent. Nihilò tamen minus hæc singula magis proficiunt, quando cum haustu lactis circa somni tempus offeruntur. Expedit quoque nonnunquam, ubi magnus humorum ad pectus affluxus & major in tussi diuturna & phthifica corruptio metuenda est, ad divertendum humorum impetum, quæ urinam cient remedia modeste in usum trahere. Cui scopo itidem lac & ejus serum in usum potest vocari ejusque vis diuretica aliquo modo augeri, si cum semine selleri, petroselini, dauci cretici, milli solis, violarum &c. invicem probe conquassatis insufum porrigitur.

## §. XVI.

*Pectus illi  
loco datur  
cum  
balsamo  
pectoralis  
alio.*

Præter jam dicta super sunt adhuc alia remedia in latione pulmonum phthifica tam ad depurationem, quam ad consolidationem summe proficua. Quo nomine maxime splendent & effertur balsama sic dicta pectoralia & vulneraria; quorum licet in medicorum libris multæ ac variz extant formulæ, nobis tamen probatissimas tantum & a peritissimis in arte viris inventas hic recensere placet. Primum vero locum merito obtinet celebratissimum illud MEUBOMII, Professoris medici experientissimi, balsamum, quod ita componitur: Recipe olei hyperici æthiopi uncias duas, spermat. ceti drachmas sex, terebinth. Venet. puriss. drachm. tres, sanguin. dracon. drachmam unam, laudani opiatii grana sex. M. detur a drachma una ad duas. Nec minoris efficaciz esse deprehendi, quod in hunc modum paratur: Recipe ol. amygd. dulc. uncias duas, stiorum sulph. a calce viva sublimar. drachm. duas. Coque leni calore. Adde balsami de Copaiva drachm. unam, spermat. ceti, ceræ flavæ ana unc. dimidiam, extract. croci drachm. dimidiam, ol. anisi, fœnicul. macis

ana guttas X. Quibus succedit tertium hac ratione conficiendum: Recipe mellis optim. Prussici, diacod. Montani ana unciam unam, essent. myrrh. aquosæ & inspissat. unciam dimidiam, stor. sulph. extr. summitat. millefol. drachmas duas, croci liquidi drachm. dimidiam, ol. macis, lign. sassafr. ana gutt. VIII. Hæc nobilissimæ virtutis balsama, quando iis utendi indicatio est, non meliori vehiculo, quam cum lacte asinino, caprino, vel vaccino, convenienti quantitate possunt exhiberi.

## §. XVII.

His ita excussis quæ ad methodum medendi curativam pertinere visa sunt, accedimus jam ad curam palliativam seu mitigativam, quæ phthisi affectos a gravioribus & vitæ insensis accidentibus immunes reddere ipsique vitam, licet valetudinariam diutius protrahere allaboramus. Hocce curationis genus in iis potissimum locum invenit, ubi intensior carnesque & vires sensim depascens calor urget, qui plerumque ob materiz acculentæ cum sanguine mixtionem accedere solet, quæ vitalis cruor inquinatus per motum intestinum ebullit, acriorque & salior evadit. Ad restinguendum igitur hunc æstus & acrimoniam humorum temperandam, remedium non datur lacte præstantius, tumque lac vel asininum, vel humanum convenienti dosi & sub iusta diætâ exhibitum omne solvit punctum. Eodem quoque fine emulsiones, quæ semina LV. frigida mai. papav. albi, decoctum hordei, vel C.C. aquam rosarum, lilior. convallium, cerasorum nigror. julepum rosar. &c. habent, frequentius possunt propinari. Horum lacticiniorum virtus mirum adjuvatur, si cum pulveribus temperantibus nitrosis, quorum magna, etiam in incipiente phthica, vis est, exhibentur. Possunt autem hi pulveres in hunc modum componi: Recipe matris perlar. lap. cancor. ana drachmas duas, nitri puriss. drachm. unam, olei destill. macis



macis gutt. IV. M. detur ad drachmam unam.

## §. XIX.

*Bala-  
naque  
delata.*

Nec, ad mitigandam symptomatum atrociam, negligenda sunt balnea aquae dulcis cum decenti quantitate lactis vaccini & nitri purif. portione remixta, quorum beneficio partes strictae, tensae & aridae humectantur & relaxantur, tussisque calor ac somnus placidiores redduntur. Quamobrem etiam in ipsa curativa methodo nonnunquam locum habere possunt aptissimum.

## §. XX.

*Insa-  
ne de-  
cessa.*

Ubi calloso & inveterato ulcere pulmo est oblitus ac quotidie sputum pure mixtum, non sine notabili corporis virumque decremento ejicitur, unice providendum est, ut acrem salisquam sanguinis & humorum dyscrasiam depurando ulteriorem pulmonum exulcerationem avertamus; quo fine temperatiora insufa, quae ex hedera terrestri, herba costi, chæresol. veron. scabiosae, tussilaginis & pulmonar. optime conscribuntur summam merentur commendationem. Sed ut crebrius & satis longo tempore adhibeantur necesse est. In subjectis serosioribus & catarrhis obnoxii ubi a magna humoris impuri ac serosi ad pulmones decumbentis colluvie malum indutum & sustentatum fuerit, ad inhibendam majorem ad pectus congestionem pro potu ordinario decoctum rad. chinæ & lign. santali rubri cum passulis, quod ab auctoribus summo opere laudatur, cum bonis ægrorum rebus poterit substitui.

## §. XXI.

*Sacchar.  
resolut.*

Tandem quoque in tali rerum statu curandum est, ut tonum pulmonum, quantum quidem fieri potest, conservemus. Cui scopo obtinendo saccharum rosaceum cum præscripto decocto sæpius assumtum insigniter velificatur; quod simplex remedii genus non modo olim Arabum doctissimi medici, & inter hos maxime AVICENNA maximopere commendarunt, verum

etiam recentiorum nonnulli vel solum ad phthisin tollendam & mitigandam æstimant idoneum. *Vid. ZACUTUS LUSITANUS in prax. admir. lib. I. obs. 139. & M. N. C. Dec. II. ann. IV. observ. 19. & SYLVATICUS in consil.*

## §. XXII.

Transimus nunc ad curam præservatoriam, cujus ratio in eo consistit, ut irruentem hunc morbum ab his, qui vel natura, ætate, corporisque habitu, vel ex commissis in diæta erroribus ad ipsam proclives existunt, tempestive occurrente causis avertamus, aut ubi jam adit quædam in pulmonibus læsio, eam convenienti remediorum usu vel plane tollamus, vel ne ulterius progrediatur, impediamus. Jam vero superiori loco abunde satis evictum credo, in subjectis temperamento sanguineo cholericis, corporisque habitu graciliori præditis, ab anno ætatis XVIII. ad XXXVI. phthisin, seu sputum purulentum cum magna tussi & spirandi angustia junctum ex hæmoptysi non modo plerumque nasci, verum etiam frequentius repetere; quare præcipuus medici labor esse debet, ut cruenta hæc dejectio, ceu gravissima & fontica causa perite omnibusque modis abigatur, vel ita saltem moderetur, ut ne exinde ad phthisin fiat transitus.

## §. XXIII.

Ad quod quidem ex voto exequendum matura & sufficienti, imo nonnunquam repetita sanguinis missione, nec certius nec securius datur remedium. Qua in re consentientem habeo omni tempore experientiam & peritissimorum medicorum auctoritatem. Sufficiat tantummodo ex celeberrimi nostri ævi medicorum BOTHERBAVII, *proximica*, quam, ipso invito, anonymus quidam edidit, dignum attentione locum hic inferere, qui ita se habet: *Si quis hominem ex phthisica familia natum velit curare, tunc summa ope est anisendum, ne hæmoptoen accipiat,*

*T pfer-  
quarta  
subi ad-  
bibidm*

*Hæmo-  
ptysis  
crassan-  
da p.  
Sicut.*

si hoc efficiat, tunc curabis, aliter non. Hinc circa decimum septimum annum venesectio bis terve instituenda, simul vesctiones adhibende sunt & in hac curatione usque ad vigesimum quintum annum continuandum. Nota mihi fuit familia, ubi pater materque & omnes liberi phthisi mortui sunt, unico filio superstiti, quem hac ratione curavi; & jam plus quam 50. annos natus vivit, & phthiseos. tempus secundum Hippocratem supervixit, nullaque mala signa habet.

## §. XXIV.

Et re-  
medie  
semper  
adhibe-

Præter sanguinis missionem in reum non naturalium usu summa tenenda est moderatio; quare ut ejusmodi ægroti a vehementiori animi corporisque commotione, potu spiritali, & omnibus, quæ sanguinem ullo modo in orgasmum abripere valent, probe abstineant, necesse est. Et quum ab hæmoptysi per medicamenta, quæ validiori adstringendi facultate pollent, imprudenter tractata prona ad phthisin via sit, illa ipsa cave pejus & angue esse fugienda per se liquet. Convenit tunc magis lac cum aqua pura mixtum pro potu adhibere, leniora ex manna & foliis sennæ laxantia, & pulveres sanguinis ebullitionem compescentes ex conchis, matre perlar. lap. cancror. & nitro in usum vocare hisque singulis decocta vel infusa superius descripta apte subjungere.

## §. XXV.

Debat.  
a Celso.  
proferri  
pote.

Nihil vero est, quod corpus a vera phthisi immune reddere, vel incipiendi possit occurrere, quam recta vivendi ratio, quam optime inter veteres præscripsit disertissimus CELSUS, qui in lib. III. cap. 22. hæc habet: Inter initia protinus occurrere necessarium. Opus est, si vires patiuntur, longa navigatione, calæ mutatione, sic, ut densius quam id est, ex quo discedit æger, petatur; ideoque apertissime in Alexandriam ex Italiaitur. Si navigationem aliqua res prohibet, lætica, vel alio modo corpus dimovendum est,

tum a negotiis abstinendum est, omnibusque rebus, quæ sollicitare animum possunt, somno indulgendum, cavenda destillationes, ne si quid cura levaret, exasperetur; & ob id vitanda cruditas, simulque sol & frigus. Os obtegendum, fauces velanda, iussicula suis remediis finienda. Eoque tempore bibenda aqua, lac quoque recte dari potest.

## §. XXVI.

Recte omnino CELSUS in regimine dietetico præscribendo potissimum urget motum corporis & aeris selectum. Cum quo fere concinit experientissimus Angliæ Medicus Sydenhamius, qui equitatione se multos a phthisi præservasse & liberasse testatur. Neque parum interesse putat, quo quis aere utatur, dum phthisici, inquit, ruri versantes ab aere longe melius sanantur, quam urbani: nam aer valde purgat pulmones, & plus quam ultum remedium curat. Quæ quidem in re plenius confirmamur, si rite perpendimus, ob quas causas præcipue fiat, ut in Belgio & Anglia tam innumeri phthisi pereant & horum dimidia fere pars ex hæmoptysi in trulentum hunc morbum incidat. Nam certe non modo crassior victus hic accusandus venit, quum ejusmodi gentes meracissimos cibos, multam carnem & pisces marinos cum spiritu vini confectos assumunt; unde chylus & sanguis ingeneratur crudus, qui in pulmonibus facile stagnans ad phthisin disponit; verum etiam, omniumque maxime aer impurus & carbonum fumo valde refertus huc debet referri, quo bronchiales glandulæ & membranae cum extremis & capillaribus arteriis pulmonalis vasculis exsiccantur & hinc successu temporis vitalis hujus viscens tabescentia inducitur. Eandem noxam inferunt tempestates frigidae & venti aquilonates, qui nunquam fere non pulmonibus, maximeque senum & ad phthisin proclivius sunt infensissimi, ita prorsus, ut non exigua pars hominum inde succumbat. Nihil vero

Asie  
us.

vero pejus est, quam adversus ejusmodi ventum vel ambulando, vel currendo, vel alio quocunque modo se acrius movere. Non raro enim hac ratione homines, imo & animantia, ut equos, in pulmonum abscessus incidisse memini.

## CAUTELE ET MONITA PRACTICA.

### §. II.

*Cautele  
necessa-  
ria est  
ob reme-  
diorum  
cautela-  
in dica-  
tione.*

**S**i illius est morbus, qui non modo accuratam dixit observationem, sed præcipue circumspæctum ac providum remedium postulat usum, certe truculentus iste pectoris affectus phthisis est; in qua se tanta sæpe medentium medicamentorum adhibendorum objicit contraindicatio, ut, nisi omnibus probe consideratis, facile possit errare juvandoque nocere. Ita ad expectorationem promovendam requiruntur bechica dulcia, pingua, syrupi, incrassantia & mellita, quorum tamen immodico usu non modo tonum pulmonum, sed & ipsius ventriculi destruimus, adeoque copiam crudidatam & majorem humorum in pectore decubitus arcessimus. Calor lentus exsiccans desiderat diluentia, humida ipsamque lætis potationem, quæ vero in tussis humida affluxum humorum, quibus pectus obstruitur est, adaugent. Ulcera dein sordida putrida postulant balsamica resinosa, cujus generis sunt myrrha, terebinthina veneta, balsamum de Copaiva, Peruvianum aliaque balsama consolidantia vulneraria, quæ tamen motum intestinum & calorem augendo detrimentum asferre solent.

### §. II.

*Quod  
amplius  
illius est  
causa.*  
**S**i ulterius progrediendo dispicimus, eandem difficultatem deprehendimus, in molestis istis ac pæne convulsivis, quæ in tussis serena diuturna ab humorum acrimonia concitantur, pectoris commotionibus. Hæ ipsæ enim anodynæ, papaveraceæ, oleosæ & som-

niferis volunt levari, quæ tamen paullo frequentius adhibita vires mirum prosternunt. Exesa, dissoluta & aperta pulmonum vasculosa substantia vulnerariis & leniter adstringentibus debet consolidari; ast humores extravasatos, qui excerni deberent, quum intus retinent atque expectorationem supprimunt, corruptionem magis adaugent. Ulcera quoque si quis velit ad consolidationem perducere, affluxum humorum debet impedire, quod tum vulnerariis & lignorum decoctis, tum pulveribus ex bolo armena, terra sigillata, hæmatitide &c. compositis perficitur; si quando vero topi, tubercula, & indurationes adsunt, ut hæc majora sumant incrementa, efficiet. Ad calorem hæticum compescendum, nihil est utilius, nihil efficacius pulveribus nitrosis. Sed nec hi omni tempore exoptatum præstant effectum, dum alvum facile irritant, systalticamque ventriculi & intestinorum vim imminuunt. Lætis denique cura eximium in hisce affectibus asfert levamen. Nihilominus tamen in statu plethorico & juvenili, ubi phthisis incipiens & multa acidæ cruditatis progenies cum lenta febre est, ipsam sæpe observavi nocentissimam.

### §. III.

*Cautele  
etiam p.  
etiam ex  
etiam p.  
etiam p.*  
**S**anguinis per venam sectam missio sicut in phthisi incipiente & ad hanc præcavendam, in juvenili ætate, est utilisissima; ita scopo curativo, ubi per morbum & calorem vires valde consumptæ sunt, minus quadrat; nisi forte ad unciam tantum unicam aut dimidiam pro ventilatione sanguinis admittatur. Purgantia paulo validiora, ut aloetica, scammoniata, elleborata, multo magis emetica, tum vires infringendo, tum temperatum humidum educendo, mirum in modum nocent. Hinc ubi humores a pectore derivandi leniterque per alvum evacuandi indicatio est, hoc sine manna, tamarindinata & quæ ex rhabarbaro, agarico & sennæ foliis consunt laxantia, omnium sunt commo-

dissip.

diffima. Quodsi vero nimix humorum copix imminuendx parva dosi data non sufficiunt, aut si humores nimis crassi & visci, qui minima vascula obstruunt, resolvendi & educendi sunt, pilulz de succino Cratonis, aut quæ ex gummi ammoniaco, croco, mercurio dulc. extracto rhabarbar. aloes &c. conficiuntur, aptissime possunt substitui.

## §. IV.

Crisis aeris.

Motus & corporis exercitatio, maximeque equitatio a perissimis tum pristinx tum nostræ ætatis Medicis in hectica & phthisi curanda mirum laudatur. Sed inter initia morbi & ubi ætas juvenilis corporisque habitus plethoricus est, hæmoptysin sæpe revocando plus mali arcessit. Neque etiam utilis est, ubi ingens pulmonum læsio & vomitarum præsentia metuenda est: nimio enim corporis motu, qui curru & equo absolvitur, quam facile funesta inducitur inflammatio. Longe tamen aliter res se habet cum tabe hypochondriaca, in qua moderata sæpiusque repetita corporis exercitia locum inveniunt aptissimum.

## §. V.

Crisis aeris asum.

Aer quo temperatior, quo purior & serenior est, eo magis phthisicis deprehenditur proficiuus. Quodsi itaque nimis humida ejus intemperies est, quæ relaxato & ab infarctu tumido pulmonum visceri mirum quantum nocet; convenit omnino, atmosphæram corpus ambientem per suffimigia ex masticæ & succino particulis balsamicis imbueri, vel per myrrham electam in ore desentam & saliva solutam serem inspiratum balsamicum reddere.

## §. VI.

Crisis aeris phthisicæ a catarrho &amp;c.

Quum sæpius a catarrho falso, vel acri quadam caustica materia ex aliis locis ad pulmones per metastasin translata exulcerationis phthisicæ fiat initium, ad affluxum hinc derivandum & evacuandum, tutus non minus quam utilis esse poterit caustici usus, quo inter scapulas & in cervice adhibi-

to imminuentem phthisin feliciter sublata legimus apud RIVERIUM in obs. Cæm. II. obs. 61. 78. Cent. obs. 92. & SCHENCKIUM obs. 56.

## §. VII.

Ad curam cum lacte vel solo, vel <sup>Crisis aeris</sup> aquis mineralibus nupto secure & efficaciter instituendam, sequentes necessario tenendæ sunt cautiones:

I. Considerate debet inquiri, an ventriculus ejusmodi polleat robore, ut digerere iterumque expellere hoc medicamenti genus possit.

II. Consultum est, ut ante, quam ipsa potatio suscipiatur, prima regio a viscidorum & acidorum humorum colluvie probe depuretur. Ad quod quidem perficiendum commodissimum est, infusum laxans maneat stimulo tartareo exalatum propinare.

III. Præstat primis diebus lac vel asinum vel humanum mane hora VI. aut VII. & a meridie hora V. ad sex vel octo uncias haurire, & dein per gradus ad copiam paullo liberaliorem ascendere.

IV. Quando per sex vel octo dies æger potationi indulget, remedium leniter laxans & collectas interea sor-des blande educens est interponendum, idque quovis sexto die repetendum.

V. Propotu vinum & cerevisia exulet & potius prisana ex hordeo, C. C. & corticibus citri eligatur. A cibis quoque, qui concocti sunt difficiles & pravos ingenerant succos, serio est abstinendum; contra vero juscula ex testudinibus, canoris stuvialibus, carne vitulina & gallina cum herb. lactuc. & cichor. hortensi confecta eximie sunt utilis.

VI. Denique ad vim ventriculi concoctricem, quæ semper sere languet, promovendam elixir quoddam balsamicum pectorale & stomachicum, quod myrrham elect. crocum, nucistam, cort. aurant. trifol. fibrin. radicem glycyrrhizæ habet, inter epulas assumere expedit.

## §. VIII.

*Græca  
sudoris  
colli-  
guntur  
vires.*

In nimis & colluctatis sudoribus, qui in phthisi & hæctica vires mirum exhauriunt, præter serum lactis & emulsiones, species de hyacintho, si cum refracta portione nitri & dimidio laudani opiatî grano pro dosi miscentur, exitium afferunt solum. Quodsi vero a vehementia tussis, qua valde exagitur sanguinis & humorum massa, nimia sudoris contingit profusio, lenè & correctum opium, quale est massa pilular. de styrace, vel Wildegansii cum pulvere temperante optime datur, utpote quod tussim sedando sudorem compescit. Si vero præter tussim colligans massæ sanguineæ æstus sudoris causa existit, clarissimi viri MORTONIUS & PIT-CARNIUS corticem peruvianum cum grano laudani opiatî præscribere non verentur.

ENARRATIONES  
MORBORUM.

## OBSERVATIO I.

*Tussis  
phibifica  
cum  
corpore  
tabe  
fragili  
horum  
sibus fe-  
bricitate  
sensata.*

**S**Tudiofus viginti quinque annorum, natione Frisus, teneri & macilenti corporis, ob inordinatum vitæ genus, maximeque frequentiores a vino & spiritu vini crapulas ac detestandum veneris abusum, vernali superioris anni tempore incidebat in tussim, cum febre catarrhali, tam vehementem & continuam, ut omni somno privatus vires mirum amiserit. Tussim siccam excipiebat valde humida, qua ingentem lenti & viscidî phlegmatis, variegati coloris, rejiciebat copiam. Aderat simul magna pectoris angustia cum spirandi difficultate, atque invalescens febrilis æstus non modo carnem penitus absumebat, ut instar sceleti æger appareret, verum etiam vires ita prorsus enervabat, ut movendi potentia, imo ipsi sensus imminui viderentur. Plures ex medi-

Tom. IV. Part IV.

corum numero consuluit, qui pectoralibus, analepticis, sero lactis & pulveribus temperantibus nitrois tantî morbi pertinaciam oppugnarunt & nihil penitus, quod levamen ullo modo ferre posset, intentatum reliquerunt: sed quum ex omnium sententia nihil spei ad salutem reliquum videretur, evenit, ut fragis hortensibus vescendi appetitu flagraret. Adsumit ex permissione nostrâ quædam & succum luxit ac deglutivit, idque crebrius repetiit, nihil inde turbarum in prima regione, sed vires potius quodammodo relevatas sentiens. Quod quum animadverterem, diutius horum fructuum usum protrahere jussi. Paruit æger consilio & per diem magnam quantitatem cum appetentia devoravit. Et en! prodigio similis conspicebatur effectus. Elapsis enim tribus hebdomadibus quum pro quindécim imperialibus æger, comedisset vires, quæ antea prorsus dejectæ erant, magis magisque se erigebant, ardens calor desolvebatur, noctes erant placidiores, tussis mitior, respiratio faciliior & sic contra spem omnium evenit, ut intra duorum mensium spatium optime convalesceret.

## EPICRISIS.

Instar miraculi certe hæc cura in hac urbe habita fuit, quum ceteris, etiam probatissimis remediis, nihil juvantibus a fructibus succo refrigerante turgidis natura optimum levamen acceperit. Ex quo discimus, latitare interdum in vegetabilibus & fructibus specificam quandam adversus graves & diuturnos morbos efficaciam, ita, ut usu malorum chinensium satis diu continuato pertinacem isterum sublatum, & largiori malorum persicorum usu affectionem melancholicam noverim sedatam. Temperati quippe & fermentescibiles ejusmodi succi egregia pravam humorem dyserasiam immutandi vi pollent.

M

OB-

## OBSERVATIO II.

*Tussis phthisica* Studiosus Hallensis viginti & aliorum quot annorum, qui per annum, & eo in quod excurrit, otio, veneri & Baccho multum litaverat, a parentibus ad justam temeritatis poenam luendam in carcerem traditus. Sed inde ira valde commotus non multo post affligitur truculentis imi ventris torminibus & spasms, pereunte simul ciborum appetentia. Accedebat tussis sicca convulsiva, quæ noctu maxime infestans omnem fere somnum adimebat. Jungebatur ægra spiratio & incendium carnem cum viribus mirum consumens. Sub tali rerum statu, quum æger omnia fere medicamina respiceret, pro potu ordinario ptisanam ex hordeo & C. C. paratam & mane ac vesperi serum lactis acidulum, adjecit cancerum lapidibus temperatum, cum syrupo papaveris albi assumendum commendavi. Tussim siccam succedebat valde humida, qua miram phlegmatis purulentis cum striis sanguinis mixti reddebatur copiam, tantaque spirandi angustia vexabatur, ut in momenta suffocatio instare videretur. Ordina vigigitur lac asininum mane & vesperi ad libram unam & ultra bibendum; & ut alternis diebus mæne pinguedinis caninæ recentis uncia dimidia, circa decubitus veropulvere temperante cum duobus massæ pilularum de styrace granis maritato uteretur, suavis sui; unde æstus paullo mitior, somnusque placidior fieri cepit. Absoluta post aliquot hebdomades hac lactis cura accessimus ad decoctum, ex speciebus vulnerariis & pectoralibus concinnatorum usum, qualia composuimus ex herbis veronica, scabiol. fanicul. agrimon. hederæ terrestr. scolopendr. plantag. acut. quas invicem cum cerevisia secundaria, adjecit ficibus & melle, decoqui iussimus. Inter alimenta præcipue lac cum amylo & oryza mixtum, nec non placetas ex farina triticea tenuissima,

lacte, butyro & vitelloovi cum passulis minoribus & concisis pomis Borsdorfianis confectas commendavi. Quorum remediorum ope, absoluto duorum mensium spatio, integre convalescit.

## E P I C R I S I S.

Plura mihi in memoriam incidunt exempla juvenum, qui ex immoderato vini & spiritus vini usu in phthisicam affectionem prolapsi ejusmodi remediis, contra spem omnium pristinae sanitati fuerunt restituti. Nec adeo obscura est hujus rei ratio. Etenim in juvenili & vegeta adhuc ætate, ubi, reliquis visceribus salvis, humores a nimio spirituoso potu valde exagitati per externam refrigerationem, aut alium affectum in pectus decumbentem subsistunt, indeque inflammationem & abscessum formant; omnino temperantia & consolidantia remedia plus salutis asferre solent, quam ubi abdominis viscera obstructione alioque vitio laborant, vel ipsi pulmones a longo tempore labem contraxerant, vel etiam concretionibus polyposis sunt repleti.

## OBSERVATIO III.

Vir quadraginta annorum, sanguineus, ad iram valde proclivis, olim militæ mobilique & inordinato vitæ generi deditus, nunc in otio & quiete vivens, neglecta, cui antea fuerat, venæsectione, varia ad fluxum hæmorrhoidalem sensit molimina; qui cum minus succederet, venæ sedales cruore inibi stagnante satæ cum dolore & ardore valde intumuerunt. Accessit chirurgus huncce tumorem externe corrosivis tractavit remediis; unde ulcus prodiit mali moris fistulosum, quod latius serpēdo vicinas partes exedit, nostrumque per annum & ultra pessimis cruciavit incommodis. Consulti itaque sunt alii rei medicæ & chirurgicæ magis periti, qui per sectionem &

& remedia convenientia interna consolidationem ulceris procurarunt. Sed elapso mensis spatio vehementi æger corripiebatur tussi, qua ingravescente non modo multam & viscidæ & purulentæ materię exspuebat quantitatem, verum etiam quæ adfumebat alimenta, ob vehementem ventriculi irrationem, sere omnia reddere coebatur. Aderat simul magna spirandi difficultas; corpus, quod antea sat pingue & robustum erat, tabe consumi, vires cum appetitu prosterni & alvus supra modum fluida fieri incipiebant. Medicamentis contra hæc mala præscriptis nihil proficientibus, ego tandem vocatus ægrum accessi; & quum pulsum non adeo celerem, nec calorem, nisi post iracundiæ affectum, in quem vel levissima data causa facile incidebat, magnam deprehenderem, sequentem ingressus sum medendi methodum.

1.) Pro potu ordinario commendavi decoctum ex radice chinæ, sarsaparillæ, scorzonæræ, ligni. sassafras & herbis santiculæ, pulmônæræ, & marrub. albo, additis passulis & ficibus, constatum.

2.) Ad sedandum vomitum & ventriculum roborandum exhibui elixirium nostrum viscerale, cum dimidia liquoris anodynæ mineralis & essentię corticum aurant. portione remixtum.

3.) Cremor hordei cum amygdalis dulcibus, vitello ovi & saccharo cando, adjecto quandoque olei amygdalarum dulc. cochleari, aut pinguedinis caninæ recentis portione, sæpius fuit oblatus.

4.) Bolum armenię cum extracto millefolii & florum chamomillæ, vulgar. æquali pondere in pilularum formam redactum circa horam decubitus, singulis fere diebus, ad drachmam unam assumere suasi.

5.) Fonticuli utriusque brachio fuerunt inusti, qui magnam ichoris fœtidæ quotidie fundebant copiam. Nec denique sanguinem e vena tali rufa parciore quantitate detrudere negleximus.

Quibus remediis intra sex circiter hebdomadam spatium id per Dei gratiam consequuti sumus, ut æger a molestis, quæ antea valde urgebant, symptomatibus liberatus, prillinæ integritati fuerit redditus.

### E P I C R I S I S.

Phthisica hæc affectio a metastasi, seu, ut Hippocrati dicendi mos fuit, palindrome, tum sanguinis per hæmorrhoides exitum non invenientis, tum materię ulcerosæ ob fistulam consolidatam intus retentæ suam traxisse originem videtur. Neque ignotum, sed in re medica satis obvium est, ab antiquis ulceribus fistulosis, & fonticulis quoque præmature consolidatis, a tumoribus glandularum scirrhis, ut colli & parotidum resolutis, a gutta rosacea, scabie & aliis cutis descædationibus per topica imprudenter cohibitis, materiam vitiosam excrementitiā, per metastasin ad mollem & spongiosam pulmonum substantiam translatam ibi per moram ulcus formasse. Quæ cum ita sint, ad derivandum ejusmodi decubitus haud sine ratione fonticulos brachiis admove-re iussimus, & reliquam curationem non validis, & humores multum exagitantibus remediis, sed potius lenissimis temperantibus, demulcentibus & roborantibus perficiendam judicavimus.

### OBSERVATIO IV.

Femina viginti annos nata, de morbo Phthisico, sinistro hypochondrii dolore, alioquin adstrictiori & contumaci tussi humida diu conquesta incidit ante biennium, prægressa fortiori corporis commotione, in hæmoptysin, ad quam sedandam a medicis pariter ac vulgo varia & sine dubio adstrictivæ indolis oblata fuerunt remedia. Cessavit fluxus, nec postea rediit, sed simul menstrua purgatio, quæ satis antea liberalis fuit, emanavit, & cum protinus angusta cum pectoris oppressione

M 2 sione

sione & insigni virium decremento successit spiratio. Ante anni spatium molestia eaque continua tussi elidebatur materia purulenta, cum striis sanguineis & mucro viscido sat copioso mixta, corpus magis magisque ob depressam ciborum appetentiam contabescebat, virium indies major erat lapsus, augebatur calor, pulsuumque a sumto cibo celeritas. In tam miserabili statu posita a me petiit consilium ægra. Ego itaque curam lactis asinini cum tertia parte fontis Selterani mixti, & crebriorem sacchari rosacei usum per mensem & ultra continuandum suasi, interposito circa vesperam pulvere temperante ex conchis præparatis, lapid. cancrorum succo citri imbutis & pauxillo nitri composito, quem cum emulsione seminum IV. frigidorum adsumere debuit. Cerevisiam quoque pro potu interdixi, & denique ad ventilationem sanguinis parciorem venæ sectionem circa solstitia & æquinoctia commendavi. Qua methodo probe observata, quum insigne virium allevamentum perciperet ægra, per litteras mihi magnas egit gratias pro consilio & auxilio non sine fructu suppeditato.

### EPICRISIS.

Si ullo in morbo medici perverſa medicamentorum applicatione miseris ægrotantibus multum afferunt damni, certe in nimis sanguinis excretionibus per adstringentia id fieri certissimum est, ut ideo non modo de adstrictivis validioribus præposuere usurpatis, verum etiam de mitioribus, quæ innocentis alias indolis sunt, vulnerariis & pulmonariis, imo ipſo Peruviano cortice tristes quotidie casus attentiori medico in artis exercitio observare liceat. Et hinc nihil prope frequentius occurrit, quam quod ab hæmoptysi, per ejusmodi adstringentia perperam tractata phtisica affectio suam trahat originem, de quo quidem optime præmissa morbi historia convincere

nos poterit. Quod vero si incidit, statim inter initia morbi, quæ potissimum in humoris corrupti & putrefacti stagnatione vasculorumque pulmonalium infarctu consistunt, succurrendum est; quo sine nec securius nec præsentius datur remedium asinino lacte, cum fonte Selterano, vel Carolinis thermis ad dimidiam vel tertiam partem permixto: cujus remedii ope obstructions & stagnationes dissolvuntur, acres & falsi humores temperantur, ac denique per alvum & urinam educuntur utilissime. Præter hæc vero quum simplicissimum hocce remedium laudabili exsuccas partes nutriendi vi polleat, nihil dubii est, quin simul viribus insigne accedat augmentum. Nec quidquam exinde detrimenti in corpus redundat, si modo secundum regulas, quas supra præscripsimus, rite usurpetur.

### OBSERVATIO V.

Ego, quum non ita pridem in aula <sup>Stingula</sup> vicina Martisburgenſi versarer, a doctissimo Archiatro Dno Claudero <sup>Stingula</sup> relatum audivi singulare casum, qui ita se habet. Vir aliquot supra triginta annos natus, boni & pleni corporis habitus, robustæ naturæ & integra semper valetudine gavissus ante duos circiter annos in dextro thoracis latere dolorem persensit pressorium cum spirandi quadam angustia, maxime sub ascensu scalarum, junctam, nihilominus amplissimum, quo fangebatur, munus alicum sine ulla molestia obiit. Sed accidit, ut in natalitiis Principis a frigido potu in corpus saltando commotum & calefactum liberalius immisso protinus de insigni corporis viriumque languore conqueſtus per universum corpus horrorem tantamque pectoris compressionem perciperet, quæ omnem spirationem adimere videbatur. Sequébatur postea intensus febrilis calor & ingens cum tremore artuum tussendi conatus, sed sine omni <sup>expe-</sup>



expectoratione; noctes transigebat æger insonnes & elapsis septem diebus suffocatus animam expirabat. Corpus dissectandum jussit Dux Serenissimus, & ecce pinguedine, quæ duos pollices latitudine æquabat, totum corpus erat obductum. Omentum apparebat multa pinguedine instructum & reliqua imi ventris viscera, hepar, lien, pancreas, renes sana erant & integra. Aperto pectoris cavo primo omnium in conspectum veniebat pericardium, quod præter multam pinguedinem nihil ostendebat præternaturale. Incisione facta in dextrum cordis ventriculum conspiciebatur concrementum crassioris substantiæ polyposum, quod in venam cavam tam adscendentem quam descendentem protectum harum capacitate valde arctabat. Inspectis pulmonibus lobus dexter, qui costis veris artissime accretus difficillime poterat separari, materiæ innatabat foetida & purulentæ, libras propemodum duas pondere æquantis, in qua complures corruptæ pleuræ partes hinc inde hærebant dispersæ. Diaphragma quoque in superiori parte ab incumbente putrida materia valde corrosum & sinister pulmonum lobus, qui adspectu sanus adparebat, cultro dissectus totus materia corrupta purulenta erat refertus.

### EPICRISIS.

Licet morbus, quo vir generosissimus perierit, non proprie ad phthisin referri possit; eum tamen in hunc finem potissimum hoc loco inferere lubuit, ut evidenter adpareat, quam brevi tempore & quamfacile vitale pulmonum viscus in sano & integro corpore possit lædi atque lethallyter corrupti. Causam tam atrocis & subitanæ catastrophes jure meritoque rejiciendam puto in subitam inflammationem, quæ in corpore plethorico & vasis cordis majoribus polypo obsessis liberioremque sanguini motum prohibentibus per potum frigidum ca-

Tom. IV. Part. IV.

lenti corpori ingurgitatum inducta in magnum abscessum degeneravit, qui cessante expectoratione eeleriter increfcentis totamque pulmonum substantiam depascens brevi spatio vitales exstinxit motus.

### OBSERVATIO IV.

Studiofus juris viginti quatuor annos habens, corporis tenerioris ac strictioris, staturæ mediocris, ex liberaliori vini potu & paullo vehementiori corporis sub pilæ lusu exercitatione incidit ante biennium in hæmoptoen crebrius recurrentem. Sedata hac sanguinis rejectione, dolorem in pectore pressorium cum spirandi augustia corporisque marcore retinuit. Sequebatur postea immanis tussis circa decubitum maxime, ob molestiam muci in laryngem destillationem, infestans, qua magnam sputi mucosi & quandoque purulenti reddebatur copiam. Interim adhuc salva gaudebat appetentia, nec quidquam a sumtis cibis molestiæ, nisi quandoque, quum mediocritatis regulam neglexerat, pressorium in ventriculi regione dolorem sentiebat. Non multo post accidit, ut ob contumeliôsâ cum comilitone contentionem gravi percelleretur iracundia, unde mox in pejus conversis omnibus, de ciborum fastidio, majori præcordiorum anxietate & somno inquieto conqueri cœpit. Histandem, prævia horripilatione, jungebatur febris continua, tantaque spirandi & expectorandi difficultas, quæ, omnem adimendo spiritum, perpetuam minabatur suffocationem. Adhibebantur optima, quæ in hoc casu commendari solent, remedia, sed in cassum datis omnibus, æger brevi post animam assabat. Dissecto cadavere mesenterium, omentum omnesque reliquæ interiores partes pinguedine fere carebant. Ventriculus cum duodeno rubicundis maculis erat obsessus & pulmones, qui bruni erant coloris, pleuræ fere undique & in utroque latere tenacissime

M 3 adnati

*Tabes  
pulmonis  
nata  
super  
venit  
et febre  
intermitt.*

adnati inveniebantur. Dexter pulmonum lobus scirrholis tuberculis & parvis vomicis obfusus sanguineque extravasato repletus videbatur. In sinistro conspiciebatur cavitas contenta materia purulenta turgida; cujus quantitas non minoris aestimari posse videbatur, quam quinque unciarum. Denique dextrum cordis ventriculum occupabat polypus, ramum fat magnum in arteriam pulmonalem emittens.

### E P I C R I S I S.

Quod hic juvenis diu admodum ab hæmoptiæ sibi ingentem pulmonum labem, quæ sine dubio in scirrholis tuberculis posita fuit, contraxerit & nihilominus sua subire munia rite poterit, non adeo mirandum est; quum per experientiam abunde constet, magnas terribimo huic visceri læsiones induci & tamen vitam ad ferros usque annos nonnunquam posse protrahi. Interim discimus ex hoc casu, ad vitia pulmonum exacerbanda & inflammationem lethalemque abscessum ingenerandum nihil fere potentius esse, præter febrem, vel acutam, vel intermittentem & inprimis vehementem animi commotionem. Quare quibus pectore laborantibus longius vivere volupe est, commendandum arbitror, ut ab omni tum animi tum corporis excessu abstinendo moderatissime vivant.

### OBSERVATIO VII.

*Thibistana* Hæc viginti sex annorum femina, a parentibus phthisi demortuis progenerita, quarto puerperio exacto in violentam incidit tussim cum serosis defluxionibus ultra dimidium anni graviter infestantem. Quatuor abhinc mensibus febre correpta fuit tertiana male morata, quæ spasmodicis pedum sub frigore & declinatione tractionibus copiosis sudoribus mirum fatigavit. Varia hinc inde præscripta medicami-

na quum nihil tulerunt opis, tandem ad corticis chinæ in electuario usum perventum est. Conquievit inde febris, sed longe graviora accesserunt pathemata; siquidem glandulæ colli intumuerunt, dolores pungitivi & pressorii in sinistro pectoris latere, cui ægre incumberebat ægra, cum anxia spiratione & calore vespertino ceperunt ingravescere, menstrua purgatio immitti viriumque robur magis labefactari. Ego igitur in consilium adscitus non dubitavi ratione & experientia suffultus, præmissa ventris per potionem mannatam expurgatione, præscribere usum acidularum Egratarum cum tertia lactis caprinæ vel asini parte remixtarum, quas repetendas per integrum mensem mane ad mensuram unam, sub convenienti diætæ regimine, bibere jussi. Pro potu ordinario decoctum radicis chinæ cum passulis & inter epulas, ad stomachum roborandum, elixir nostrum balsamicum viscerale semendum; lateri vero thoracis sinistro dolenti glandulisque colli tumidis imponendum suasi sequens emplastrum: Recipe gummi bdell. myrrh. sagapeni, anisæ singulorum unciam dimidiam, sperm. ceti, ceræ ana unciam unam cum dimidia, flor. sulph. drachmas duas, pulv. croci drachm. dimidiam, olei anisæ, camphoræ ana drachm. unam. M. f. l. a Emplastrum. Neque vero spem felicitatis hæc curatio; quippe quæ finita insigni symptomatum levamen percepit ægra, tantum quod in integrum, ob inordinatam mensium successum non fuerit restituta. Suasi igitur, ut elæosacharum myrrharum in frequentiore usum ducat, quod ita paratur: myrrhæ optimæ uncia una ex libra una aquæ, adjecta salis tartari drachma una, coquitur; quod remanet a coctione, est magma gummoso resinoso temperatus, myrrhæ saporem & odorem adhuc referens, cujus drachma una cum uncia una sacchari cantariensis mixta vel singulis diebus, vel quam maxime circa instantem mensum

sum periodum cum infuso Thee vel Coffee sumitur utilissime. Est enim hoc remedii genus & pectori & utero amicum atque a me per aliquot annos summa cum euphoria sæpius commendatum.

### E P I C R I S I S.

Ex phthisicis parentibus natæ semina nisi a puerperio exactam diætā habent rationem & sibi ab aere frigido animique affectibus cavent, perfacile, si præsertim lochia non rite fluxerunt, latentem resuscitare morbum solent; quod & ante aliquot annos in persona Serenissima annotare mihi licuit. Dein in naturali ad phthisin dispositione, quid? quod in omni prava viscerum constitutione febris tertiana & biliosa, tam acuta, quam chronica superveniens mali est ominis, dum malum non modo exacerbat, sed & immediate reddit. Multo vero adhuc majus periculum ostendit, si adstringentibus præmatre supprimitur. Tum enim plerumque mensium fluxus valde turbatur atque pervertitur, ut postea ejusmodi morbi curatio medenti multum facessat negotii, nec nisi convenientibus & generosioribus cesset remediis.

### OBSERVATIO VIII.

Phthisi-  
bubina-  
lis sine  
utroque  
vicio.  
Studioſus medicinæ industrius, qui mihi quondam a manibus fuit, vigin-  
ti aliquot annos natus, temperamen-  
ti sanguineo-cholericæ, ad impatientiam & iram valde proclivis, ob hæreditariam, quam a parente phthisico acceperat, dispositionem vernali & autumnali tempore crebrius laborabat tussi, raucedine & interdum cruento, licet pariori sputo; quæ dein, inito matrimonio & physici munere obtento, ita increſcebant symptomata, ut materiam purulentam sæpius rejiceret corporeque fere penitus contabesceret. Sed nihilominus infusus herbæ veronicæ cum lacte caprino mixti & conser-

væ rosarum continuo usu, nec non venæsectione ter in anno administrata per triginta adhuc annos, quæ Dei gratia est; servatus est felicissime.

### E P I C R I S I S.

Cognita mihi sunt adhuc alia exempla juvenum, qui vel a parentibus, vel ex inordinata academica vita phthisicam pulmonum dispositionem obtinuerunt similibusque correpti symptomatibus vitam satis diu protraxerunt. Ita memini Doctoris medicinæ Silesiaci, qui tali labe affectus in nostra academia, præter accuratam viſtus observationem, solo frequentiori infusi theiformis ex veronica & pulmonaria cum lacte temperati usu, adjectis nonnunquam olei tartari per deliqu.XX. guttulis vitam ad multos annos prolongavit. Quod vero, si evenit, indicio est, ulcera quædam aperta callositate superinducta in aliqua pulmonum parte, salva reliqua eorum substantia, latere. Quamdiu itaque per congrua remedia tum motuum & humorum temperatura conservatur, tum obstructio & inflammatio in hoc viscere avertitur, nihil metuendum periculi est. Hæc scribenti in mentem incidit summe Reverendus Theologus Helmstadiensis Calixtus junior, qui olim superstes mihi retulit, se per triginta fere annos quotidie, sine ullo respirationis detrimento expuisse pus album foetidum, & nihil addidisse præter venæsectionem bis quovis anno iteratam & decoctum rad.chinæ & saffras cum passulis, quo ad mensuram dimidiam continuo uteretur.

### OBSERVATIO IX.

Quum Mindæ Westphalorum, an Empe-  
te quinquaginta & quinque annos, *ma a pe.*  
provincialis medicæ munere fungens, *ripura-*  
degerem, sequens mihi obtigit nota-  
bilis casus, quem hic inferere placet *curia*  
Consiliarius regius, vir floridi & san-  
guinei habitus, ea tempestate, quum *causa*  
M 4 peri-

peripneumonia populares habebat circuitus, vehementi febre, cum sputo sanguineo & ingenti spirandi difficultate juncta corripiebatur. Decrescebat equidem morbi & febris vehementia, sed elapso mensis spatio invadebat tussis, pectoris oppressionem gravitatemque inducens, calor circa vesperam lentus affligebat, appetitus sequebatur prostratio, & corpus, valde antea obesum, consumpta pinguedine, mirum emaciatum apparebat. Tandem quadragesimo ab accessione febris die simul & semel cum maximo impetu tanta puris flavi ex ore ferebatur eopia, ut aliquot libras pondere æquaret. Excipiebat mox respiratio facilior, unde ego accersitus nigratus sum & summas divinar benignitati gratias habendas esse edixi, quod tanti periculi abscessus non intra thoracis cavitatem ruptus & æger, ut subinde usu veniret, ob nimiam materiam ad asperam arteriam congectionem suffocatus fuerit. Erum vires non adeo multum dejectas deprehenderem, de salute quidem recuperanda non desperandum, ipsam tamen curationem paulo longius protrahendam esse nuntiavi, quam in hunc, qui sequitur, modum institui. Primo laxante manato & rhabarbarino primam regionem a sordibus deplendam & dein dimidiam lactis vaccini tepesacti mensuram, instillata balsami cujusdam pectoralis drachma una, singulis diebus mane bibendam suavi. Balsamum autem illi erat confectum: Recipe olei hyperic. vetustis uncias duas, flor. sulphur. drachmas duas, coque leni calore. Colaturæ adde terebinth. venet. drachmas duas, croci drachm. dimidiam, ol. anisi, nucistæ destillat. ana guttas XII. M. Inter cibos quam maxime juskula avenacea & hordeacea cum jure carnis vitulinæ, gallinæ & cancrorum fluviatilium succo parata, & loco potus mox pitisanam, mox decoctum chinæ & herbarum pulmonarum, cum passulis commendavi. Quarta a prandio hora iterandum jussu lactis tepidi

usum cum electuario, quod ex confervæ rosar. uncis duabus, hæmatitidis præp. boli armen. ana drachmis duabus & convenienti syrupo papav. albi portione compositum ad drachmas duas devorare æger debuit. Ad flatus, quibus venter fere perpetuo erat turgidus, discutiendos injici jussi clysteres emollientes & carminativos. Tandem vero, ut externis pariter succurrat remediis, pectoris tam anteriori quam posteriori parti impositum fuit emplastrum ex gummi bdell. sperm. ceti, axung. humana, cera, flor. sulph. croco & oleo anisi confiatum. Qua methodo tantum, per Dei clementiam profeci, ut intra binos menses integro vir amplissimus convalesceret & ego non exiguum inde famam in juventute mea rerulerim.

### E P I C R I S I S.

Abscessum, seu empyema a peripneumonia æque ac pleuritide male progressa facile posse nasci non modo gravissimo Hippocrati testimonio, sed & certa longe experientia fide constat. Neque minus in eo concursus est medicorum sententia, permagnum & vix medicabile hoc malum esse habendum: nam si intra thoracis cavum rumpitur ejusmodi empyema, raro evadunt ægri: si intra pulmonum substantiam contingit disruptio atque pus ad asperam arteriam magna in copia congeritur, perquam facile suffocatione jugulantur. Dei itaque & naturæ benignitati in nostro ægrotante jure meritoque est tribuendum, quod medicamina, in juvenili ætate a me commendata tam felicem habuerint successum. Ceterum quoad curandi methodum hoc potissimum debet animadverti, magnam sæpe quorundam remedium in longis morbis sanandis esse efficaciam, si convenienti dosi, ordine, & quod præcipuum est, satis longo tempore usurpentur. Multa enim medicamentorum varietas crebriorque mutatio tantum abest ut ægrum juvet, ut ipsum potius in deteriorem & lethalem sæpe statum præcipitet.

O B.

## OBSERVATIO X.

*Tab. h. p. a nimia sanguis supra singulare casum requisivit iudicium & consilium, quem hoc loco recensere operæ arbitror pretium: illustrissimi stemmatis femina, duo deviginti annos nata, quæ tum ob texturam corporis teneram aptamque membrorum figuram, tum ob eximiam ingenii animique alacritatem cuique se commendat inuienti, jam inde ab octavo ætatis anno multis catarrhalibus pectoris faucibus defluxionibus, coryzâ, tussim, raucedinem inducentibus tentata fuit, quæ licet a febre cum alvi dejectione subsecuta soluta remiserunt, tussis tamen cum vocis quadam asperitate sæpius recrudescens pertinacius inhæsit. Decimum supergressa annum crebra multaque saltatione, nulla ramen subsequente aut lassitudine, aut anhela spiratione, corpus strenue exercuit. Quindecim annos habenti exire primum recto ordine cœperunt mulieres purgationes, quæ non multo post, initis matrimonii legibus, ipsi gravidæ subsisterunt, & quom octimestre absolvisset gestationis tempus, primo noni mensis die parturire cœpit enormi conatu, per duodecim horas durante; ad quem allevandum quater medici detrahi jusserunt sanguinem: & sic tandem infans prodit enecatus. Lochia quoque dein rite fluxerunt, nihilominus decimo a partu die sollicitabatur tussis secca, cum enormi capitis dolore æstuque febrili stipata, qua parcam pituitæ non adeo viscidæ excreabat copiam, remanente oris quadam ariditate febreque quotidie recurrente. Hæc contra mala varia remedia nihil tulerunt levaminis, ut potius lentescens ille viresque & carnosus corporis lubstantiam depascens calor, quia pastus major fit, cum largo sudore quotidie assigat, nec non tussis uulsa pectoris consilio, cum crebra pituitæ ad puris idolem nunc accedentis excreatione vehementer urget; licet ceterum res-*

piratio sine raucedine facilis sit, alviq; beneficium optime semper conslet.

## EPIGRISIS CUM CONSILIO.

Exhibet hic casus exemplar verę phthiseos, seu pulmonum exulcerationis, cum febre lenta ad hæcticam inclinante; id quod multa validaque tussis, crebrior mucidæ cum pure mixtę materię rejectio, sudores colliquativi, tabida corporis viriumque consumentio, æstus volaticus & pulsus a sumtis cibis celebrior testatur faciunt luculentissime. Quodsi autem hujus mali veram prosequamur originem, dubitare non licet, illud ipsum a nimia sanguinis, ob crebriores venæsectiones, iactura proxime esse deducendum. Etenim hæc ratione humorum per omnes corporis, maximeque excretionibus inservientes partes mirum fuit turbatus; unde non modo vitalis ille cruor naturali temperie sua immutatus ac serosior factus formandis hinc inde stagnationibus opportunissimus exsistit, verum etiam pulmonibus a perpeßis catarrhis crebriorique tussis jam antea debilitatis eo facilius labem inducere potuit. Dignamen est, quæ probe teneatur observatio, phthisin æque facile a nimia sanguinis abundantia oriri prudentique ejusdem per V. Snem imminutione averti, ac a boni cruoris defectu ejusque inconßulta detractione, maxime in corporibus tenera & vasorum & fibrarum constitutione præditis, posse generari; quale quid in puerperis a nimio lochiorum fluxu exhaustis sæpe iterumque observare mihi licuit. In prognosi nostri mali suppeditanda statim in incipiti rem esse prædixi, nihilominus curationem, si ipsi adhuc locus superesset, in hunc modum putavi instituendam. Primo consului, ut lac asinum ad tertiam partem cum Selterana, vel alia ejusmodi principio alcalino imbuta aqua remixtum quater de die ad octo unciarum pondus bibatur. Quodsi vero harum aquarum deesset copia, seri lactis dulcis libram medicam, addita

nitri

nitri purificati & salis tartari portione, mane & a meridie potendam commendavi. Deinceps hora quarta vespertina & ante decubitus adsumi debuit pulvis, sequentis compositionis: Recipe cornu cervi sine igne præparati, mandibulæ piscis, boli armen. spec. de hyacintho, nitri purif. solutionis oculor. cancr. succin. præp. ana drachmam unam M.F. pulvis, div. in XII. partes. Tandem commendata fuit recta vivendi ratio, ut nimirum ægra lectissimis ex carne caponis elixa ac vitulina paratis utatur iusculis, quibus herbæ plantaginis acutæ, scabios. pulmonar. maculosæ, agrimonix, hederæ terrestr. card. bened. cum cancris fluviatilibus cotulis inter decoquendum fuerint adjectæ. Et quum magna vis in potu sita sit, ab omni alio abstinere & pro potu ordinario hoc sanguinem purificans decoctum eligere consultum duxi: Rec. cornu cervi raspati, rad. scorzonæ, chinæ, singulorum uncias IV. rasuræ lign. santal. rubri, rad. cichorei ana unciam unam cum dimidia. Concisa d. s. species, quarum duæ uncæ in tribus aquæ mensuris per tres horæ quadrantes coquendæ.

Et hæc fuerunt, quæ proponenda duxi remedia. Sed non multo post nuntiatus mihi fuit, illustris ægrotam, ante consilii mei adventum placide exspirasse.

### OBSERVATIO XI.

Circa generaliorem affectionis phthisicæ tractationem utilem hoc loco inferere placet observationem; quod videlicet in longævo artis exercitio annotaverim, homines proceræ admodum staturæ, vegetos & robustos, in optimo ætatis flore constitutos pessimis istis, qui ex pulmonum labe nascuntur ægritudinibus, quales sunt hæmoptylis, asthma, tullis chronica & convulsiva, empyema, febres peripneumonix & pleuriticæ ipsaque phthisis & hæctica, frequentius esse

obnoxios, & apertis eorum post mortem cadaveribus plerumque concretiones polyposas in cordis cavitatibus atque pulmonum vasis deprehendi. Causas tam peculiaris phænomeni si paulo curatius inquirimus, has observamus potissimas. In celsis ejusmodi corporibus, testante pulu debiliore & tardiori, sanguinis progressus atque circuitus nunquam fere non tardior est ac impeditior, quam in personis mediocri statura præditis; quippe tum difficilis admodum est sanguinis ex inferioribus & tam remotis a corde partibus, propter perpendicularem situm, ad pectus & caput ascensus; gravia enim, per leges motuum, natura deorsum tendunt & guttæ sanguinis retardantur ab aliis, in quas allidunt. Accedit dein, quod procera hæc corpora plerumque sint pinguiora & ad subeundos strenuos labores minus apta vitæque desidii magis dedita; unde circulari humorum motu retardato, ut spissiores & crassiores evadant succi necesse est. Jam, si forte talismodi ad ostentationem nati homines paulo vehementius & diutius, e.g. armis bellicis, exercentur, massa sanguinis & humorum, ob validiorem musculorum motum, magno cum impetu ad cor & pulmones compellitur, & quum æquali tenore ac nisu per minima pulmonum vascula non possit ferri, sunt inde omnino humorum in vasis stagnationes, sunt distensiones, disruptiones & extravasationes, quæ ad recensitos pectoris morbos aditum parant amplissimum. Ob eandem quoque stagnationem accidit, ut secedentes solidæ & crassiores sanguinis partes invicem cum coeant temporisque progressu in majorem compactæ molem valorum alveis arctissime adhærescant & hac ratione æquabilem sanguinis per cor & pulmonum viscus circuitum impediendo morbosas istas pectoris affectiones magis obfirmant contumacioreque reddant.

## E P I C R I S I S.

Quanto difficilior est morborum, qui firmam in pulmonibus sedem & causam obtinent, sanatio; tanto facilior & tutior est ab hisce preservatio. Igitur præter ea, quæ jam superiori capite hoc sine commendata sunt, suadeo 1.) ut proceri ejusmodi homines a vita motus experte abstinendo corpus perpetuo exercent; hac tamen observata cautela, ne motum paullo validiorem & nimis laboriosum instituant. Namque hæc major motus species sicut in morbis, qui a viscerum, maximeque hepatis prava constitutione, & impeditiori sanguinis per ipsa circuitu proficiuntur, summum tam preservandi quam curandi scopo fert auxilium; ita econtrario pulmonibus & morbis abhinc prodeuntibus valde est infensa, ut usque eo non modo ad hos ingigandos, verum etiam exacerbandos multum conferat momenti 2.) ut misso omni potu spirituosiori, ut spiritui vini & cerevisiæ crassiori, potum tenuiorem, eumque nec nimis calidum, nec nimis frigidum assumant, nec in victu cibis nutrientibus plus iusto indulgeant 3.) ut circa æquinoctialia tempora secta vena redundantem sanguinis copiam imminuendam curent 4.) ut sibi caveant, ne post longiorem quietem motionem vehementius & repentino quasi initio instituant; quod autem si fecerint, mox infusum veronicæ & flor. bellidii in largiori quantitate hauriant. Et hæc est facilis & genuina gravissimos & fere immedicabiles hos morbos mature avertendi methodus, quam, si rite adhibetur, non sine fructu fore confido.

## OBSERVATIO XII.

*Observatio* Pervulgata est opinio, iis plerumque omnibus, qui viscera non habent, esse a-  
*quarum* integra, maximeque gravem in pulmonibus lisionem foventes phthisica  
*minera-* passione laborant, aquarum minera-  
*rum* a-

lium usum esse infensissimum. At vero hoc assertum non universale, sed cum grano salis esse intelligendum, ego quidem multiplicit edoctus experientia bona adleverare fide possum. Novi enim nonnullos, qui ulcere pulmonum, sine febrili tamen æstu, affecti insignem purulentæ & ichorosæ materiæ quotidie rejecerunt copiam & a moderato Carolinarum usu, ob liberiores inde redditam respirationem facilioremque materiæ vitiosæ expuitionem, ob ciborum adpetitum totiusque corporis vigorem restitutum optime habuerunt, licet in totum sanitati non fuerint restituti. Nec dissimili ratione novi alios, qui tussi valde humida & pertinaci per aliquot annorum decursum graviter affecti, frustra datis omnibus alias expertis contra tussim remediis, a Carolinis cum iusto regimine potaris egregie sunt allevati, aut a molestissimo hoc affectu penitus liberati. Ita mihi in memoriam venit semina generosa, temperamenti sanguineo-phlegmatici, laxiorisque corporis habitus, quæ ex inordinato vitæ genere & potissimum immoderata ciborum incongruorum adpetentia, ante octo circiter annos, in tussim incidit valde contumacem humidam, quæ per multos annos laborioso ac vehementi pectoris non minus ac abdominis conatu ingentem viscidum phlegmaris, varii coloris, per vices eiecit quantitatem, quæ intra nycthemeron collectim integram adæquabat libram. Jungebatur simul, absque tamen febrili calore, angusta spiratio corporisque universi languor, cum pallore faciei multaque & crebriori vomitione. Hæc contra mala quam ab omnibus, quæ magna in copia devoraverat, medicaminibus, nihil retulerit levamenis, ego consultus prudentem & moderatum Carolinarum usum suasi. Renuebant quidem consilio tum medicum ægrotantis amici; malo autem ingravescente ægra per excelsos montes salutares hos fontes adiit eoque per mensem & ultra secundum methodum

a me

a me præscriptam bibit, tam felici successu, ut non modo tussis vehementia cum nimia muci viscidæ ejectione remiserit, verum somnus etiam placidior & respiratio liberior reddita inde fuerit. Sequenti anno eandem curam non minori fructu iteravit; & licet malum exinde non prorsus cessaverit, longe tamen mitius factum fuisse ægra mihi læta nuntiavit.

### E P I C R I S I S.

Id omnino firmissimum & in experientia satis fundatum esse largior, morbos, qui ob nimiam viscerum, maximeque pulmonum læsionem, ob æstum febrilem & præsentem virium lapsum lethales habendi sunt, a potu fontium salubrium minus sanari, sed potius ad funestum perducunt exitum. Tali enim ratione ob stagnationem & extravasationem aquarum in corrupto viscere magnamque in eodem continui solutionem longe major infertur putredo. Id quod eo magis evenit, ubi humor vel in cerebro, vel in thoracis & abdominis cavitate extra vasa effunditur, vel etiam polyposa in cordis & pulmonum valis hærent concrementa, quæ liberum sudorum circuitum impediunt. Contra vero, ubi non tanta viscerum læsio humorumque corruptio, quæ ex viribus dijudicari debet, nec febrilis calor adest, optime sane hæ aquæ, dum aperientem, abstergunt, viscidofque humores per omnia emundant, & præcipue per alvum evacuantem ac simul roborantem possident virtutem, fructum ferunt præstantissimum. Sed ut convenienti regimine, ordine ac dosi adhibeantur, necesse est.

Plures de phthysi observationes reperire licet in Consult. & Respons. med. Tom. I. Sect. II. casu LXXV. LXXVIII. LXXIX. XCIX. & C.

## C A P U T XII.

### DE CACHEXIA ICTERICA.

#### THESES PATHOLOGICÆ.

##### §. I.

Quamvis plures sint cachexiæ, <sup>Dispositio 186.</sup> sive depravati corporis habitus species, nobis tamen jamjam de ea speciatim agere animus est, quæ flavescens & nigricans corporis colore sese prodit, & icteri, seu morbi arcati & regii nomine in scholis medicis insignitur, nihilque aliud est, quam vitiatum & corruptum sanguinis & humorum, ab admixta bile excrementitia, propter vitium in biliferis ductibus, status, functiones universi corporis multum lædens cutimque externam flavo vel livido colore deturpans.

##### §. II.

Signa, quibus se manifestat hic morbus, sunt præcipue sequentia: Primo in tunica oculi albuginea flavedo conspicitur, quæ demum univerſa cutis imbuatur; urina crassa & obscure rubra mingitur, linteamina instar croci tingens, fæces vero alvinæ coloris sunt pallidi. In peiori statu saliva quoque flava exspuitur & omnia adsumpta saporis sunt amaricantis. Præterea affecti de sensu quodam violentæ stricturne, pressionis & tensionis in dextro hypochondrio, neque minus de angustia circa præcordia, respirandi difficultate, totiusque corporis conqueruntur lassitudine.

##### §. III.

Longe adhuc prolixius & accuratius <sup>Historia morbi ab Astruc tra-</sup> hujus morbi historia & progressus a medicorum antiquissimis, maximeque ARETÆO in lib. III. cap. XV. describitur, sequentem in modum: <sup>ditur.</sup> Icterus universi habitus agrius est, & membrorum singula indicia apparent, perspicua vero sunt & ea, quæ in albiſſimis oculis cernuntur & frontis <sup>secum.</sup>



secundum tempora color flavus exquisitus efflorescit. Quicunque nigro arguato labrant, in his ater color viridi commixtus apparet. Idem frigus, imbecillitas, desides, tristis atque demissi animo sunt, tetrum odorem exhalant, gustatum amarum habent, spiritum non facile ducunt, in ventriculo morsus percipiunt, alvi excrementa porracea, subnigra, arida sunt, agere descendunt; urina valde colorata est, ad nigritum vergens. Ad hanc crudelitatem labrant, cibum desistant, vigilant, morant, melancholia agitantur, at in albiore arguato color est ex albo & viridi temperatus; mente sunt hilariiores, cibos accipere primo eos piget, sed ubi ceperunt, naviter comedunt, facilius quam priores concoquunt; alvi purgamenta sunt alba, arida, cretacea, lotium reddunt crocinum. In utrisque corpus omne pruriginosum est, calor in naribus exiguus & mordax percipitur, gustatus amarorum non amarum, lingua enim bile suffusa non sentit, dulcium vero amarus. Si nullius visceris calefactio fuerit evidens, sine noxa est, sed diuturnior. Si perseveraverit & viscus inflammatione vexatum fuerit, in aquam intercutem desinit, multi & sine aqua intereunte sudore colliquaturo interierunt. Ex quibus adductis evidenter elucescere arbitror, singulas fere corporis functiones in morbo hoc præter naturam affici. Neque ratio & longinquo erit repetenda. Nam sicuti sanus & vegetus functionum status a temperata & laudabili sanguinis & humorum crassi quam maxime dependet & sustentatur; ita e contrario si hæc ipsa ab impuris & pro majori vel minori gradu corruptis humoribus viantur, non mirum est, actiones inde corporis nostri tum vitales, tum naturales & animales plus minus accipere detrimenti. §. IV.

Multo vero magis de bilis excrementis singulari partes tam fluidas quam solidas immutandi efficacia convincere nos possunt variz de eadem apud auctores observationes. Ita san-

guis e vena icterici emissus spuma & consistentia flavus adparet, teste Theodoro ZWINGERO, qui in icterico quandoque ne guttulam quidem unicam rubicundi & floridi cruoris deprehendisse, sed sanguinem per venæsectionem curiositatis gratia emissum flavæ jumentorum urinæ similem non sine mentis stupore observasse scribit. Imo in semina quadam, inquit, summæ icterica conspeximus sanguinem & urinam, quam crassam emisit, sibi invicem simillimam fuisse, post 15. vero dies quibus icterus integre prope modum discussus fuit, sanguinem ad aliquod uncias extractum maxime rubicundum ac floridum exstitisse. Neque viscera & intestina, ut pulmones & ventriculus naturalem colorem retinent, sed æque ac pinguedo & membræ flavedine plus minus saturata tinguntur. Qua de re consuli possunt Zacchus LUSITANUS in praxi admirabili lib. III. PALESENIIUS in M.N.C. ann. 4. obs. 194. & THONNERUS, qui in obs. lib. III. de ictero obs. 1. mentionem inijcit cardinalis eujusdam Romani, ictero defuncti, cujus singula membra flava invenit. Insuper quoque ossa flavedine imbuta & arte quasi tincta in puero ex matre icterica nato deprehendit KERKRINGIUS in spicileg. anatomi. cui symbolum suum addit DOLEUS in Encyclopæd. medica lib. III. cap. VIII. ubi in viro quadragenario, ictero demortuo, omnia tum abdominis tum thoracis viscera & ipsum cerebrum cum ossibus & cartilaginibus icterica tinctura i.e. flava adfecta Hanoviz vidit. Notatu præterea dignissimum est, quod GALENUS & SEXTUS EMPIRICUS scribunt, ictericos ob oculorum colorem flavedine infectum omnia objecta flava intrueri. De cujus observationis fide MERCURIALIS in prælect. Bononiensibus valde dubitavit, quia nec Celsus, nec Cælius Aurelianus, nec Aetius, nec Avicenna hujus symptomatis mentionem fecerint. Nos tamen bina exempla in ætate virili constitutis observasse testamur.

§. V.

observ.  
notandum  
est, quod & mentis  
partes tam fluidas  
quam solidas immu-  
tandi efficacia con-  
vincere nos possunt  
variz de eadem  
apud auctores obser-  
vationes.

## §. V.

*Differ-  
tia mor-  
bi iſte-  
rici.*

Deinceps ad veram morbi iſterici indolem accuratius diſcogendam & ad meliorem exinde ratione cauſarum, eventus & curationis dijudicationem formandam hæc monenda eſſe ducimus, quod multum hiæ affectus, per quem ſpeciatiſſimè iſterum ſiavum intelligimus, inter ſe differat. Namque conſtanti experientia comprobatur deprehendimus, aliud valde eſſe contumacem ac diuturnum & difficulter admodum medicamentis expugnari, aliud brevi tempore ceſſare & remediis facile cedere; aliud dein perpetuo inhxere, aliud tantum ſtatim reverti periodicis & certis modo horas perdurare atque etiam in quibuſdam eſſe anniverſarium. Datur præterea iſterus vel idiopathicus, vel ſymptomaticus. Illius quidem cauſa aliis viſceribus, maxime hepatis, inhxereſcit; hic vero aliis morbis ſuperueniens nonnunquam colicæ convulſivæ hyſtericæ, cardiacæ & paſſioni iliacæ, vomitioni & purgationi poſt validius adſumptum emeticum aut purgans medicamentum jungitur. Eſt quoque criticus, qui interdum ſalutis in febribus acutis præbet indicium, interdum pejorem ſtatum præſagit, quod fieri ſolet, quando inflammationi ventriculi jungitur, vel hæc iſterum ſequitur. Poſtremo ingens omnino inter iſterum ſiavum & nigrum tam ratione cauſæ, quam periculi notanda occurrit differentia, utpote in hoc longe gravior humorum corruptio & viſcerum læſio, quam in illo debet ſuſpicari.

## §. VI.

*Conſe-  
quenti-  
a mor-  
bi iſte-  
rici.*

Præmiſſis ſic potioribus, quæ ad morbi hitoriam pertinent momentis, diſcipiendum nunc erit de veris noſtris mali & ſymptomatum cauſis. Jam vero unanimis medicorum ſententia eſt, in iſtero tantum non ſemper hepar præter naturam eſſe affectum; videamus igitur, quomodo hæc læſio ad malum noſtrum contribuât. Quodſi autem perpendamus, nebuliſſimum

hepatis viſcus a natura in hunc potiſſimum finem tanta ductuum varietate & copia inſtruſtum eſſe, ut ſulphureum, aduſtum & cum lymphæ viſcida quaſi alcali ſatum, quod bilis nomine venit, a ſanguinis & humorum maſſa ſeernat, ſecretum per peculiareſ canales ad duodenum, ad promovendam ibi digeſtionem, deferat; facile intelligimus, impedito vel proſuſ intercepto bilis ad inteſtina itinere huius ad vaſa lymphatica ipſumque ſanguinem fieri regurgitationem, adeoque proximam & principalem iſteri addeſſe cauſam. Et quum tali ratione ſerum & ſuccus nutritivus bile inſufficiuntur, explicatu faciliſſimum eſt, cur color cutis in ſiavum mutetur, nutritio vitium capiat & urinæ cræſſæ atque ruſo tinſtæ colore mtingantur; neque minus inde pater ratio, cur non ſiavo colore per alvum prodeant excrementa, cur digeſſio ciborum langueat & multa circa primam regionem percipiantur incommoda.

## §. VII.

Sed paullo altius & ſpecialius erit inquirendum, quænam ſub tanta iſtericorum differentia, quam ſupra monſtravimus, præcipue in hepate partes ac viæ præter naturam affici ſoleant & a quibuſnam cauſis vitio laborent. Has ipſas vero vel in vitio materiæ vaſa obſtruentis, vel in motibus ſpaſmodicis vaſa coarctantibus in univerſum poſitas eſſe quiſque theoriæ medicæ gnarus facile poterit dijudicare. Utriuſque igitur ſtatus peculiarem inſtituamus diſquiſitionem.

## §. VIII.

Et primo quidem, ſpaſmos iſtero ſæpenumero præbere originem, in experientia omnino fundatum. Quandoque enim, quod ſæpius accidit, ſubito iſterus invadit, brevique tempore terminatus per periodos iterum recurrit, tunc ſane nec in materia peccante, nec in vaſorum obſtrictione & inſarctu, ſed potius in ſpaſtica ductus cholodochi, qui tunica valde ſenſibili nervoſa præditus eſt, contri-

*Hæc paſſio  
laſſo du-  
pitel  
modo la-  
dua ſunt.*

*ſpaſ-  
moſis.*

Atione causa residere videtur. Quamobrem deprehendimus, a vehementiori ira, qua nihil ad inducendum ictum potentius est, neque minus a corrosivis & drasticis tam purgantibus quam vomitum cientibus remediis, vel ab ipsa bile in cholera, cardialgia & principio febrium biliosarum, ictum subinde oriri, quippe quæ omnia rite invicem comparata de spasmodica ductuum biliferorum testantur luculentissime. Ut nihil denique dicamus de anatomicis eorum, qui ictu perierunt, sectionibus, in quibus nonnunquam ne minimam quidem a calculosa, vel mucida & viscosa materia obstructionem in ductibus, qui bilem ad duodenum vehunt, reperire licet.

## §. IX.

Progredimur ad alteram causam, *a) ob obstructionem* vaforum obstructionem, de qua quidem eo minus dubitare licebit, quo frequentiori constat observatione, cylindrum felleam non raro insignis magnitudinis calculus esse repletam. Quod itidem valet de reliquis ductibus hepaticis & imprimis cholocho, qui non modo calculis magnitudine, figura & colore inter se diversis, verum etiam gypsea, tophacea & viscosa materia sæpenumero inveniuntur obfessi, ita tamen, ut quo illa magis mollis ac solubilis est, eo symptomata leviora subsequantur. De quo consuli merentur M. N. C. ann. 1. obs. 44. & BONE-TUS in sepulchreto lib. III. Sect. VIII. obs. 36.

## §. X.

*Calculi, quando ictu causa sunt.* At vero non semper a calculis vias bilarias infarciens ictus solet induci. Ita ETTMULLERUS in praxi Part. II. pag. 54. confirmat, dissectam fuisse mulierem, ex cujus vesicula felles plures lapides majores minoresque fuissent collecti, quæ tamen ab ictu libera mansisset. Cui adjungendum esse censeo, quod Cl. Liphensium Professor D. Petermannus in vetula Torgensi præter 17. lapides nihil ferme lucci biliosi in cystide fellea depre-

benderit, cum tamen ictus mali prorsus expertus fuerit. *Vid. ejus differt. de serutino ictu ex calculo vesicæ felleæ.* Quæ cum ita sint, reddenda a nobis est hujus phenomenon ratio, quæ nostro quidem judicio haud dubie inde erit petenda. Quamvis calculus in vesica fellea non movetur, sed quietus jacet, non secus ac calculus in renum tubulis nullas creat molestias. Simul vero ac e loco suo deturbatus ad ductum cysticum propellitur, ibi hæret & vehementi distensione atrocem dolorem & spasnum, qui totum ductuum biliariorum systema in consensum trahit, progignit & sic morbum nostrum graviaque cum ea complicata symptomata producit; quæ dein, excluso per alvum calculo, ut a nobis sæpius observatum est, ex toto quiescunt.

## §. XI.

Sunt vero quædam signa haud fallacia, quæ calculorum in ductibus biliaris indicant præsentiam, qualia potissimum sunt gravis & lancinatorius in hypochondrio dextro circa scrobiculum cordis dolor, constanter cum aliquali remissione assilgens, cum summa præcordiorum anxietate, spirandi angustia, pectoris compressione, nausea & nonnunquam ipso vomitu, alvi constipatione, inquietudine & vigiliis junctus. Quibus accedit, quod ejusmodi ægrotantes non erecti, sed dorso flexo incurvati incedere possint.

## §. XII.

Verum enim vero, non tantum a bile in ductibus biliaris concreta, *a) ob obstructionem* verum etiam si materia tenax, viscida biliosa minimos ductus secretioni bilis dicatos infarciit, ictus progignitur. Hoc enim si incidit, non ad ductus biliarios, sed per distenta vasa lymphatica bilis cum lymphæ ad sanguinem deferatur necesse est. Quam in rem digna est, quæ annotetur observatio Jacobi CAMENICENI in epist. ad Matthiolum pag. 184. qui vidit hepatis venas in parte ejus cava prius quam in commune illum caudicem portæ de-

sinunt, obstructas lapillis eas distendentes, foras nigris, intus flavescens. Quorum & illud referendum est, quod de glandulis arteriæ hepaticæ & sellis ductui ad intestina tendenti adjacentibus apud BORELLUM pag. 326. legitur, quarum mole & tumore hic ita comprimebatur, ut vix aliquo conatu instrumentis tenuissimis esset transitus; quinimo ab excrescentiis carnis compressionem aut oclusionem cholodochi causari CABRULGUS observ. chirurg. X. & MECKERN observ. chirurg. 43. annotant: & ab omnimoda ejus exsiccatione & obstructione omnem viam interceptante icterum subortum in cardinali quodam Florentino post mortem se vidisse perhibet ARGENTERIUS in lib. IV. aph. Hipp. quamvis hæc observationes sint rariores.

## §. XIII.

Causa  
mediata  
est sunt  
plethora.

His ita deductis, deveniendum jam est ad causas mediatas inquirendas, quæ ictericæ cachexiæ potissimum videntur. Ex quibus præcipua se nobis offert plethora, seu major sanguinis & humorum, quam natura ferre potest, copia. Quod quidem non adeo mirum videri debet. Etenim quum per hepatis viscus etiam in statu naturali ob venam portæ, impulsu sufficienti destitutam languidior est circularis motus, sit omnino, ut accedente plethorico statu sanguis spissior & viscidior facilius inibi stagnet minimaque vasa obstruat. Unde etiam fieri observamus, in cachexia leucophlegmatica, in scirrhus & induratione hepatis, ob deficientem partium biliosarum leparationem, cutis colorem ex flavo viridescentem adparere. Nec quidquam superest dubii, quin pessima indolis icterus, quem nigrum appellant, ingentem & fere immedicabilem hepatis labem magnamque humoris biliosi corruptionem pro causa & fundamento agnoscat.

## §. XIV.

Tarver-  
si dila-  
ta.

Ex diæte vitio causam ictero præbent antecedentem cibi discepti, qua-

les sunt pisi, fabæ, lentes, caseus &c. utpote qui ob rudiorem crassioremque texturam suam, maxime si magna ingeruntur copia, difficiliter digeruntur sanguinemque ingenerant spissum ac impurum. Huc quoque referendi sunt ex potulentis vina acida, austera, cerevisiæ acefcentes & aquæ, quæ argillosas & tophaceas secum vehunt particulas; quæ tamen omnia longe pejorem exserunt effectum, si vita accesserit sedentaria ac somnolenta. Nichil vero tam potenter ad morbos ex hepatis vitio oriundos confert, quam immoderatus vini generosi & præsertim adusti abusus, unde chylus, & lymphæ nutritiæ coagulantur bilique magna & sanitati summe insensa inducitur dyscrasia. Præterea ad malum vitæ regimen pertinent quoque animi affectus, ex quibus præter iram, quam jam supra inter præcipuas nostræ mali causas retulimus, mirum quantum valet longior tristitia, quæ dum sanguini crasso ingigendo & abhinc procedenti tardiori ejusdem circuitui apprimè velificatur, ad icterum chronicum & contumacem aut producendum, aut revocandum existit aptissima.

## §. XV.

Denique etiam non raro ex aliis <sup>Progres-</sup> morbis prægressis icterus suos repetit <sup>si mor-</sup> natales. Hinc febres intermittentes per remedia adstringentia intempestive suppressas sæpenumero icterum sequi, præter experientiam testatur RAMAZINUS, qui a tali febre per corticis chinæ usum perperam cohibita icterum subortum in libris suis annotavit. Neque rarum, sed in praxi medica satis obvium est, a mensibus vel hæmorrhoidibus obstructis vel retardatis icterum enasci.

## §. XVI.

Transitus nunc fiat ad suppeditandam prognosin, quæ medico ad estimationem aucupandam debet esse commendatissima. Hæc vero, prout ipsa subjecta respectu ætatis, corporis habitus, roboris & naturæ differunt, vel

vel prout cauſſæ vel atrocioreſ vel mi-  
niores ſunt, tam ratione durationis  
quam eventus mutum omnino differt.  
Quando enim hoc malum iuniores in-  
vadit homines & ſimplex tantum ac  
ſolitarium eſt, non cum alio morbo,  
ut quartana, malo hypochondriaco,  
vel obſtructione ex hepatis ſciirho  
complicatum, nec adeo longum tem-  
pus durat, convenientibus remediis  
tam dieteticis, quam pharmaceuticis  
ſolvi poteſt facillime. Quod ſi vero ſæ-  
pius poſt curam, colore ſlava in ni-  
griorem vergente, recidivat & indu-  
rationem hepatis junctam habet, ſu-  
neſti ut plurimum eſt eventus, quia vel  
in heſticam, vel hæmorrhagiam eor-  
nem terminatur. Si a vehementiori  
iracundiæ affectu, vel a purgante &  
emetico draſtico, ob ſpaſmodicam in-  
teſtinorum ductumque biliferorum  
ſtriſturam iſterus oboritur, commo-  
da medicinx in tempore adhibere fa-  
cile cedit. Difficiliorem vero admittit  
ſanationem, ſi aut longiori triftitia  
fovetur, aut ſi corpus a morbo antea  
perpeſſo valde debilitatum invadit.

## §. XVII.

Qui febri jungitur iſterus, ſæpius  
illius criticam aſſert ſolutionem. Ita  
in praxi aliquoties annotandi occaſio  
fuit, febres, quæ cum ſpaſmibus ventris,  
vomituque biliſo & intensiori æſtu  
ſtipatæ in corporibus hypochondriacis,  
primæ iracundia ſuſcitantur, iſtero ſu-  
perveniente feliciter fuiſſe terminatas,  
quod jam olim confirmavit HIPPO-  
CRATES, qui lib. IV. aph. 64. quibuſ-  
cunque, inquit, per febres, die ſepti-  
mo, aut nono, aut undecimo, aut de-  
cimo quarto iſterus incidit, bonum eſt  
ſalutare, niſi dextrum hypochondrium  
obdurnetur. Haud diſſimili ratione  
iſterus in febribus intermittentibus,  
inprimis ſub paroxyſmi initio exortus,  
nullum portendit malum: nam illo  
ſinito & hic ipſe evaneſcit. Qui vero  
inflammationi hepatis, vel duodeni  
aut ventriculi accedit iſterus, in an-  
cipi ægrum eſſe ſignificat. Sæpe etiam  
gravidas circa ultimum geſtationis

Tom. IV. Pars IV.

tempus adoritur qui tamen tempeſtiva  
ſanguinis miſſione facile ſupprimitur.  
Calculus in cſtyde ſellea contentus,  
ſi inſignis eſt magnitudinis, adeo ut  
totam ferme veſiculam oſpleat, cauſ-  
ſa ſæpe eſt iſteri graviffimorumque  
ſymptomatum, quorum poſſiſſima  
ſunt, dolor ardens circa ſcrobiculum  
cordis in latere dextro, tormina circa  
idem ſatus ſæviſſima, naufæa, vomit-  
us, lipothymæ, respirandi difficul-  
tas cum torido faciei aſpectu. Quæ ve-  
ro ſi incidunt, periculoſus morbi ſtatus  
eſt, qui tandem in aſcitem deſinit le-  
thalem. Hinc etiam aliquoties in iis,  
qui hiſce ſymptomatibus deſuncti ſunt,  
diſſectis totam veſiculam ſelleam cal-  
culus vidi reſertam & circumjacentes  
partes, ut colon & fundum ventriculi,  
ſlavo colore contaminatas atque exte-  
rias, ob bilis forte acrioris per poros  
cſtylicos tranſuſudationem corroſas. Ita  
quoque ratione aſthmati convulſivo,  
quod plerumque hydropeem tam thora-  
cis, quam abdominis poſt ſe trahit  
mortiferam, ſæpiſſime cauſſam præ-  
bet veſicæ ſelleæ a ſubſtantibus copio-  
ſis concrements calculoſis repletio.

## §. XVIII.

Ad nigredinem vergens iſterus ob  
magnam eamque malignam, quæ ſi  
terreſtris & acido-corroſivæ indol-  
is eſt, humorum corruptionem lethali  
ut plurimum inſert ſymptomata,  
nec curari ullo, aut niſi ſummo nego-  
tio poteſt. Talis inſeſtus quam maxi-  
me eſt ſenibus, & facile in maraſ-  
mum, in cachexiam, tumores oede-  
matofos, eryſipelas malignum, ſpha-  
celum, vel etiam in moleſtas degenerat  
hæmorrhagias.

## THESES THERAPEUTICÆ.

## §. I.

IN curatione iſterici prudenter &  
circumſpecte adornanda primo ſta-  
tim cauſarum, corporum, & temporis  
aliarumque circumſtantiarum haberi  
debet ratio; ſiquidem pro ſingulorum  
N. diverſ.

diverſitate, illa ipſa etiam aliam poſtulat methodum. Quodſi enim, uti ſæpius abira, a validiori medicamento, aut veneno aſumto, vel per conſenſum ex colica ſpaſmodica hæmorrhoidali & hyſterica evenire ſolet, iſterus ſubito corpus invaſerit & adhuc recens eſt; a vehementiori duſtum biliorum per hepatis penetralia diſperſorum ſtriſtura illum oriri, vero eſt ſimillimum, atque tum medicus primam indicationem exſequi ſtudeat: nimirum, ut tenſæ & conſtriſtæ partes relaxentur, adeoque bilis tam ſecretio ſuſpenſa, quam ejus ad inteſtina deſcenſus impeditus naturali reſtituatur libertati, atque deſum, ut bilis acrimonia, quæ ſpaſmorum genetrix eſt, mitigetur ac contemperetur.

## §. II.

*Rel-  
que in  
ſeruat  
medica  
menta  
latera* Diſtinſcopis obtinendis egregie inſerviunt emulſiones, quales ex ſeminibus IV. frigidis enaj. papaveris, & cannabæ &c. quod ob ſulphur vaporoſum, quo præ aliis imbutum eſt, præcipue a SYLVIO commendatur, cum aquis ſedativa virtute præditis, ut ſorum tiliz, acaciæ, primul. veris, lilior. convall. chamomill. vulg. millefolii, ceraſorum nigrorum, addita ſyrupi papav. albi portione, commode poſſunt parari. Egregiæ porro & expertæ hoc ſine virtutis eſt liquor noſter anodynus, ſi cum aliquot olei macis deſtillati guttulis, vel in affeſtibus colicis & hyſtericis cum eſſentia caſtorei, croci & laudano opiato Sydenhamii maritetur. Ad mitigandam vero humorum acrimoniam pulveres abſorbentes leniter nitroſi, qui ex lap. cancror. conch. matris perlar. pulveris Marchion. ana drachma una, ſaecini præp. nitri purif. ana drachma dimidia, olei macis gutt. IV. conſieri poſſunt, operæ faciunt pretium, quibus pro circumſtantiarum ratione aliquot ex tracti caſtorei, vel croci grana ſunt addiſcenda. Vehiculi loco inſervire poſſe ſerum lactis & lac purum aqua dilutum, vel emulſio amygdalina,

vel etiam decoctum avenaceum cum uno alterove olei amygdalarum dulcium cochleari permixtum.

## §. III.

*Quæſ  
ſterna* Externa quoque anodyna & paregorica præcordiali regioni tepide applicata inſigne ſerunt levamen; quo ſine commendanda eſt veſica floribus ſambuci, chamomill. vulg. millefolii, ſalvix &c. ex lacte coctis repleta, vel ſi hæc moleſta videatur, epithema ex theriaca, oleo nucis moſchæ expreſſo, ſpermate ceti æquali pondere mixtis, & pauxillo croci ac camphoræ compoſitum ſcribiculo cordis applicari poſſe utiliſſime; ædque eo magis, ubi cardialgia, ſeu gravis ventriculi ſpaſmus cum nimia vomitione jungitur. Nec ſpernenda eſſicacius ſunt enemata ex ſpeciebus paregoricis cum lacte coctis & ſufficienti pinguedinis vel olei chamomillæ cocti quantitate conſecta, utpote quæ, ceu balneum internum, partes ſpaſmo doleſifico correptas ſolent leniuntque inſigniter.

## §. IV.

*Eadem  
preſent  
ad paſ-  
ſum in  
calculo  
ſidera-  
det.* Eadem quoque methodo iſſidemque uti remediis expedit, ubi peritæx iſtericis confuſeſtis ſpaſmis ex calculis doctui cyſtico aut cholidochæ firmiter impactis enaſcitur. Atque tum ſi non minorem præſtant effectum, quam quidem exſerere ſolent, ſi calculus renum uretheribus in hærens graviffima in circumjacentibus nervoſis partibus parit ſymptomata, quibus propter ſpaſmum relaxatum ſubſilatis, natura ſæpe ſuis ſolius viribus utens ejusmodi obſtaculum ex iſtis anguſtiis deturbat feliciffime.

## §. V.

*Indica-  
tiones  
curæ  
via in  
iſtero  
ab ob-  
ſtruſſio-  
ne oritur.* Et hæc ſunt poſſiſſima, quæ iſtero, ex ſpaſmodica duſtum biliorum ſtriſtura ſuborto, faciliuſque tranſeunt ſatisfaciunt remedia; videamus tamen, quænam in contumaciori ſæpiuſque recidivante malo, quod vaſorum hepatis obſtruſſioni debetur, ineunda ſit medendi via. Vix aliæ autem ſunt indicationes, quam ut 1.) duſtum

Autum biliariorum obstructions a biliosa, viscida & terrestri cretacea amurca invicem concreta provenientes dissolvantur, atque hac ratione liberior bilis ad duodenam cursus, ad rite peragendum chylicationis negotium, restituatur 2.) ut vasa bilis secretoria a sanguine tenaci, viscido infecta convenientibus remediis referantur, ut succum biliosum ad ductus biliarios libere transmittant. Denique 3.) ut valde retardatus ac impeditus sanguinis circuitus, qui obstructionum concretionumque constituit fundamentum, per totam vasculosam hepatis substantiam naturalis reddatur & æquabilis.

## §. VI.

Hisce indicationibus explendis, mea quidem sententia commode inferrent, quæ recensebimus, remedium genera. Ex eis his longe eminent decocta, seu apozemata, quæ ex speciebus specifica quadam humores viscidos resolvendi & occlusas hepatis vias aperiendi facultate gaudentibus adaptantur, cujus generis sunt radices quinque aperiennes, si ex aqua coctæ, vel etiam in syrupum, qui in pharmacopæis prostat, redactæ assumentur. Spectant huc quoque herbæ lactiferæ, ut lactuca, scorzonera, taraxicum, tragopogon, sonchus, endivium, hie-racium &c. quæ si cum aqua decoquantur, aut si succus recens cum sero lactis vel asinino lacte offertur, eximiam præstant opem. Idem tenendum esse arbitror de succo graminis recentis. Hinc celeberrimi Batavia Medici SYLVIVS & BOERHAAVE de vaccis & bovis referunt, quod eorum hepar hierno tempore, quum scano & stramine vescerentur, calculis esset repletum, qui æstate, quum recenti gramine pro pabulo uterentur, amplius non apparent: dubio procul quod succis harum herbarum solus hepatis a viscidis & coagulatis humoribus optime repurgatur. Nos itaque ictericis decoctum radices graminis, erynchii, cichorei, fœniculi &c. pro potu ordinario insigni cum fructu commendavimus sæpissime.

## §. VII.

Tum vero nullum est, quod in omnibus hepatis morbis, adeoque etiam in ictericis curanda, præsentem, certiorum ac efficaciorum virtutem præstet remedium, quam aquæ minerales tam frigide quam calide, sub convenienti regimine potatæ, utpote quæ tum ob aquarum subtilium principio elastico spirituose imbutarum copiam, tum ob sal medium, quo turgent, minerale, in lentis humoribus dissolvendis, in oppilatione vasorum referenda & omnis generis excretionibus promovendis magnam habent potentiam. Et profecto si dicere velimus quod res est, raro admodum vel prolus non icterus recidivans & chronicus sine convenienti fontium salutarium usu, quales præcipue sunt acidulæ Egranæ, Spadanæ, Schwalbacenses & thermæ Carolinæ, ex voto poterit sanari.

## §. VIII.

Nec insuper habenda sunt salia neutra sive medii generis, quæ ob insignem aperitivam, deterisivam & tam per diuresin quam per alvum leniter evacuantem virtutem inter medicamenta adversus ictum proficus specialem merentur commendationem; ex quorum censu sunt terra foliata tartari, tartarus tartarizatus, sal polychrestum, arcanum duplicatum, nitrum purificatum & antimoniatum, solutio ocul. cancr. cum succo citri; tartarus vitriolatus & borax &c. Huc pertinent etiam salia ex aquis mineralibus, Egranis, Carolinis, Sedlicensibus & Epsonsensibus elicta; quorum vis mirum intenditur, si cum sufficienti quantitate aquæ, feri lactis, vel decocti longiori paullo tempore adhibentur. Nec præterire licet rhabarbarum, quod in hepatis affectibus ad humores dissolvendos & corrigendos specificæ & spectatissimæ est virtutis, sive in substantia cum dictis salibus remixtum, sive cum herbis supra laudatis in vipo insusum, sive in tincturam & essentiam cum terra

foliata tartari redactum propinetur.

## §. IX.

Ultima  
indica-  
tio po-  
nitur  
robora-  
tio.

Ultima denique mædendis debet esse iacentio, ut tonus valorum hepatis debilitatus atque dejectus, qui obstruccionum & concretionum causa existit, remediis blande roborantibus & tonicis restituatur. Quod quidem martialia, eaque præsertim liquida, ut tinctura martis pomata, cydoniata, Ludoviciana, aperitiva Zwolfferi, nec non peruvianus & cascariæ cortex, in pulvere vel in decocto oblatus, optime præstant. Quo scopo etiam acidula pyrmontana, quæ martiali elemento præceteris imbutæ sunt, laudem merentur eximiam.

## CAUTELE ET OBSERVATIONES PRACTICÆ.

## §. I.

Cautele  
circa  
omnem  
medicam.

**E**Metica in ictero sæpe sunt indicatissima & præsentissima. ferunt operi; sæpe veroprehenduntur summe perniciofa, quando videlicet ex ira vehementiori, vel ex spasmo venticuli & cardinalgia, vel a colica spasmodica ortum morbus duxerit, vel etiam si ductui cystico in hærescens calculus graviores circa præcordia efficit anxietates. Quod si vero iisdem utendi indicatio est, leniora qualia ex radice Ipecacuanæ cum uno grano tartari emetici conficiuntur, in usum vocare præstat, quæ dein, ubi amurea-biliofa, in duodeno subsistens & ductus cholodochi orificium claudens bilis transitum impedit, vel ubi materia tenax biliofa, non adeo concreta, sed mobilis ductus obfistit hepaticos, hanc ipsam evacuando, opitulatur utilissime. Ea enim emeticorum vis est atque indoles, ut in ductus biliferos, qui ex tunicis valde nervosis cunbatur sunt, operationem suam diffundant &, eorum systolen augendo, humores vitiosos egregie exturbent.

## §. II.

Circa  
progre-  
ssum.

Validiora purgantia ideo quod spasmos adaugent, motus sanguinis exagitant & vires enervant, nunquam non in nostro malo observantur noxia; hinc suo jam tempore HIPPOCRATES lib. de ratione viftus in acutis ictericos inter eos retulit, quos non purgare oportet: nam periculo, inquit, expones & nihil proderit. Et lib. de affect. Scd. V. ubi curationem morbi regii tradit, purgantium mentionem iniecit in hunc modum: corpus balneis calidis extrinsecus emolliendum, alvus vero & vesica mædæfacienda. Morbus autem fit cum bilis commota sub cutim versetur. Quæ si noveris vir idiota, non similiter ininvitabiles morbos intideris. Solent enim morbi ex parvis occasionibus magni ac diuturni fieri. Ex qua quidem ad cibos aut potiones spectant vel sorbitiones, vel mædicamenta, quæ doloris gratia exhibentur, ea omnia sine periculo admoventur, si juxta præscriptum adhibeantur. Quæ vero pharmaca purgant bilem aut pituitam, in his periculum consistit & culpa mædendis imputatur. Ex quo præcetero loco clare apponere arbitror, Hippocritum adhibuit medicamentorum, quæ bilem infercutem ferunt, ut sunt purgantia, penitus in ictero damnafle & medicos, qui imprudenter iisdem utuntur, idiotas & moris causam recte omnino habuisse. Neque minus graphici verbis summam, quæ ex purgantibus cholagogis in corpus nostrum redundat, noxam deoribit CELIUS AURELIANUS lib. III. cap. V. Vitandam probamus, ait, frequentem & variam medicaminum potationem, quæ seleducero promittuntur, siue ventris fluxus etenim seis extenditur & cibi fastidium duplicatur & corporis fortitudo immittitur, & cibi accepti corrumpuntur, & omnia corporis materia adulterio medicaminum deterior fit: quod facere videmus eos, qui sapissime ac sagaciter absinthium, aloem & colocynthidem dari probaverunt.

## §. III.



## §. III.

Circu  
sudori-  
fera &  
balnea.

Sudorifera, præsertim nimis calida & volatilia, quæ expansivo sulphore suo intestinum humorum motum exagitant, penitus a cura sunt excludenda, utpote biliosi humores, qui viscidæ sunt consistentiæ per angustos subcutaneos meatus non transmittuntur, sed rectius omnino per hepatis colatorium & renale cribrum volunt expurgari. Neque minus caute procedendum est cum balneis nimis calidis, in ipso morbi statu ac paroxysmo adhibendis. Neque obscura est hujus rei ratio. Etenim, quum obstructi sint pori cutanei, ictERICI non facile sudant, sed nimius calor, sanguinem exagitando & humores acriores reddendo, vasculorum sanguiferorum in aliis locis concitat rupturam. Contra verò tepida & temperatiora, quæ ex aqua fluviali cum fursure triticeo & lacte sunt balnea, si spasmodorum circa primam regionem urget vehementia, securius possunt admitti. Possunt quoque sine omni noxa, si morbus in declinatione cutisque emunctorium parvum est, ad flavum colorem penitus detergendum, paullo calidiora cum herbis emollientibus & deterfisvis parata adhiberi utilissime.

## §. IV.

Circu  
medica-  
menta  
amara.

Medicamentis amaricantibus, quæ ex radice gentianæ, trifolii fibrini, centauro minor, absynth. carduo bened. &c. preparari solent, magnæ in ictero sanando ab auctoribus hinc inde tribuuntur laudes. Verum hæc ipsa plus sæpe detrimenti, quam emolumenti asferre, multiplici edoctus experientia testor. Equidem videtur eorum usus ob hanc rationem utilis, quod defectum bilis supplendo, ciborum digestionem & excretionem facili- tent. Nihilominus tamen minus, quum una cum chylis ad sanguinem trans- eunt, sulphureas biliosas impuritates coacervando, malum pertinacius red- dunt. Si quid vero ab hisdem in primis visis sperandum est utilitatis, tum maxime id fieri deprehendimus, quando

Tom. IV. Pars IV.

impuras fordes per alvum, quæ valde obstipata est, expurgant. Namque nec bilis, nec alia amara temperaturæ humorum vitalium sunt amica, sed simul cum stercore debent ex- cerni; & ob hanc rationem rhabarbarum magni est faciendum, imo & amara supra commemorata in infusis cum vino possunt concedi, si cum purgantibus lenioribus, ut rhabarbaro, foliis fennæ, agarico & salibus tartareis adfociantur.

## §. V.

Circu  
mercuri-  
alia.

Quoniam in utroque ictero summa humorum peccat impuritas seu caco- chymia, ex mercurio parata medica- mina, quæ alias a nonnullis commen- dantur medicis, sunt infensissima. Unde a mercurio dulci in minori etiam dosi sub pilularum forma exhibito gingivarum intumescientiam cum summo oris sordore, nec non cardial- gias anxietates cum appetitus virium- que prostratione originem summis- se novi. Mercurius enim non modo cum acidis, verum etiam, & multo magis cum alcalinis salibus mixtus valde corrosivam & venenatam induit naturam.

## §. VI.

Circu  
venæsec-  
tiones.

Venæsectiones præservandi potius, quam curandi sine habent locum. Nimia enim sanguinis redundantia circularem fluidorum motum, qui in hepate semper tardior est, magis imminuendo, ad morbos hepatis in- gignendos multum omnino contri- buit. Neque tamen morbo jam præ- sente & plethora urgente, ad gravio- ra symptomata avertenda, penitus dissuadenda est sanguinis ventilatio, ut ipsa potius magnam pollicetur fructum, si a suppresso mensium vel hæmorrhoidum fluxu malum subor- tum aut sustentatum fuerit. Quod itidem valet, si quando post quinquagesimum annum, quo menses solen- niter cessare solent, semine hoc mor- bo corripuntur.

N 3

§. VII.

## §. VII.

Circa topica notare convenit, quod hæc ipsa hepatis regioni applicata infignem sanguinis & humorum perductus hepaticos curcuitum adjuvandi vim habeant, adeoque ad auspiciationem nostri affectus curationem permultum conferant. Ego hoc sine scilicet opato cum fructu usus sum cataplasmatibus, vel sacculis herba absinthij, marrubij, menthæ, & floribus chamomill. rom. & vulg. repletis & ex vino rhenano coctis, vel etiam emplastro sponato Barbette bene camphorato, aut diachylo simplici cum croco remixto.

## §. VIII.

*Chro  
alimen  
861*

Sed in affectu nostro persanando alimen-  
torum quoque summa habenda  
est ratio, probeque dispiciendum, an  
aegri natura iisdem ferendis par sit, ut  
pote non omnibus omnia conveniunt.  
Quod quidem potissimum observamus  
circa potum. Alii enim serum lactis,  
alii solam aquam fontanam, vel cum  
cremore tartari & saccharo, vel etiam  
vino rhenano & succo citri mixtam,  
alii cerevisiam pro potu cum fructu su-  
munt, cum contra alii haec omnia re-  
spiciant. De vino autem in genere re-  
spondendum suadeo, quod modice debeat  
dari; siquidem omne spirituosum plus  
nocet quam prodest. Inter cibos qui  
maxime sunt removendae carnes in-  
firmat, pisces, placentae & cum buty-  
ro friza, nec non omnia leguminosa,  
exceptis fructibus aquosis, ut sunt ce-  
rasa, ribes, cucumeres, pruna cocta,  
&c. qui ut plurimum innocentis sunt  
usui.

§. IX.

*Diata  
ad pra-  
serva-  
tionem  
anill.*

Ad praeservationem mali & aver-  
tendam recidivam aeris mutationes  
peregrinationes, ac sufficiens corporis  
exercitatio omne ferunt punctum ;  
quibus largior congrui potus usus ani-  
mique tranquillitas utilissime potest  
subiungi. Hinc nota mihi sunt exem-  
pla eorum, qui his omnibus pruden-  
ter adhibitis ieteritiam pertinacem su-  
perant felicissime ; sicut contra diutur-

ENARRATIONES  
MORBORUM.

## OBSERVATIO I.

**F** Emina triginta annorum, macilentz & sanguineo-cholericæ constitutionis, in aram valde proclivis ad vitam sedentariam & varios in dieta commissos errores per trimestre spatium uteri purgationem non experta, corripiebatur haud ita pridem dolore in hypogastrica regione tam acuto, ut corpus erigere vix valeret. Sequebatur dein diarrhœa biliosa, quam sedatam mox excipiebat cardialgia, cum faciei pallore & crebrioribus stripatapnothymis. Aliquot dies post universum corpus flavescere contaminabatur colore; urine sedebat crassæ & crocæ, feces albefcentes, & circa serobiculum cordis continuo urgebat dolor pungitivus atque pressorius. Sub tali serum statu tunc agra requirebat consilium. Ego igitur omnem curationis scopum eo dirigendum ratus, ut spasticæ stricturæ relaxentur, sequentem inii medendi methodum. Primo ordinavi mixturam antispasmodicam, ex liquoris nostri anodynî, essentîæ croci, castorei, corticis au-

*Ilex*  
*colina*  
*billofa*  
*spuma-*  
*dicus*

maior æquali portione & aliquot olei macis guttulis compositam, de qua tertia quavis hora XXX. guttas cum pulvere præcipitante nitrolo ex aqua aliorum convall. adsumere iussi. Exteriorius imponendum suavis sacculum, qui flores chamomillæ roman. crocum & flores macis continebat, ex lacte coctum. Dein circa tertium diem, ad expurgandam ab impuris fordibus primam regionem, propinavi pulverem ex rhabarbari selecti scrupulis duobus, æremoris tartari scrupulo uno & nitri purifigranis sex confectum; pro potu vero ordinario duas partes aquæ cum una lactis parte remixtas commendavi. Quibus per aliquod tempus rite usurpatis dolores quidem & spasmi penitus quiescebant; atramen quum mensium negotium in ordinem redire renuebat, suavis fui, ut elixirium nostrum viscerale & circa instans menstruum tempus pilulæ nostræ balsamicæ in frequentiore ducantur usum.

## EPICRISIS.

Ictericum frequens colicæ biliosæ spasmodicæ esse symptoma, pluribus mihi exemplis cognitum est; cuius causam non æque facile in bilis acrimoniam in intestinorum volumine hærentem, quam potius in sanguinem biliosum in intestinorum tenuium nervosis admodum tunicis stagnantem putare rejiciendam. Spasmus inde concitatus tantæ sæpe potentia est, ut non solum nervas stomachi membranas, sed & totum ductum biliosorum systema in consensum rapiendo vehementi strictura afficiat. Qui ejusmodi colicæ succedere solet alvi fluxus, boni ut plurimum ominis est, neque ideo facile sistendus; alioquin motus spastici fursum vergentes malum longe reddunt deterius. Multo magis intallica cum ictero juncta accommodatum purgans insignis est usus. Ita ROLFINKIUS in dissert. de tartaro contra Mercatum, qui in hoc casu purgandum esse negat, præcipue com-

mendat jalappam, cujus innocentem usum vel fuorispius exemplo satis comprobatur, dum colica & hinc ictero sæpe correptus pulverem ejusmodi purgarem non sine fructu adhibuisse testatur. Ceterum ex præfata morbi historia intelligere licet, feminas cholericas, remanente mensium fluxu, corporisque refrigeratione & vita sedentaria accedente, semper fere graviores incurrere dolores & spasmos, ad quorum recidivam prævidendam præcipua medici debet esse intentio, ut mulieres per uterum purgationes pristina restituant integritati.

## OBSERVATIO II.

Vir quinquaginta annorum, consiliarius intimus Hannoveranus, temperamento præditus sanguineo animo, quæ mobiliori, laetæ & vinose dietæ adfectus, nunquam venæsectionem passus, incidit post usum aquarum Schwalbacenium, quas neglecta accuratiori dietâ biberat, in gravem diarrhoeam cum tetro oris fœtore & truculentis intestinorum doloribus stipatam. Pessimis hisce symptomatibus sedatis in scenam prodibant dolores cardiaci, qui per totum dorsum usque ad scapulam protensi per periodos multam figebant crucem; appetitu tamen somnoque integris permanentibus. Accedebant dein ictericæ passionis indicia, quæ flavo cutis colore, urina crassa & obscure bruna, linteamina croceo colore tingente, nec non facibus albis, abunde se manifestabant. Tentarunt equidem medici ad tollenda hæc mala plurima remedium genera, sed irritò plane effectu: nihil enim profecerunt decocta aperientia, nihil purgantia, nihil martialia & amaricantia, tantopere alias commendata. Tandem ego consultus fuasi usum acidularum Pyrmontensium, quæ ad mensuram & ultra quoridie potæ, interposito stomachicorum amarificantium & pilularum polychrestarum usu, & causam & morbum

bum cum symptomatibus sustulerunt felicissime. Hoc tamen notabile videtur circa hunc ægrum, quod sub potu harum aquarum salubrium urina, quæ alias tenuis & limpida mingi solet, croceo imbuta colore secesserit, neque prius evanuerit, quam affectu & flavescente cutis colore penitus sublatis.

### E P I C R I S I S.

Facile, credo, medicinz peritus perspiciet, huncce affectum firmam habuisse sedem in hepatis ejusque ductuum obstructione & sic ex liberiori bilis per hosc ductus ad duodenum transitu intercepto fuisse prognatum. Dolor acutus cum magna anxietate cardialgica, nec non gravativa lateris pressio vix aliunde suam duxerunt originem, quam a bile, quæ ex stagnatione in ductibus & vesicula fellea acrior reddita per tenues, præsertim vesiculæ tunicas transsudavit ipsasque ventriculi & intestinorum membranas valde sensibiles arrodendo ad spasticas concitavit stricuras. Transsudare autem bilem ex cystide fellea posse, testatur anatome, qua non semel sed aliquoties bilem instar guttularum dextræ ventriculi parti, vel colo inherentem, hasque partes penetranti flavo colore tinctas annotasse memini.

2.) causa quoque hujus affectus querenda erit in nimia ductuum biliariorum, maxime cholidochi, a bile copiosius inibi stagnante distensione; etenim quum nervosis hisce partibus propter ramum intercostalem & vagum magna cum orificiis ventriculi, cum diaphragmate & ipso œsophago intercedit conspiratio, non mirum est, si altera harum partium præter naturam affecta & omnes consentientes reliquæ simili malo affligantur. Oris sactor accessisse videtur, quod forte ob bilis balsamicæ defectum putrilago reliquiis chymi fuit inducta. Sæpe etiam impurius & excrementitius in narium & faucium peristromate hærens lymphæ tetræ ejusmodi odorem

exhalat, uti quidem videmus in cachexia & scorbuto affectis.

3.) docet hic casus quam optime, non dari potentius, nec efficacius ad inveteratas obstructions, in quibuscunque partibus debellandas præsidium, ipso aquarum salubrium usu, quæ & copia aquæ, & activo minerali principio instructæ oculos tubulos aperiant, atque hinc omnibus aliis pervulgatis & in pharmaceutica re natis remediis præferendæ sunt longissime. Sed necesse est, ut conveniens accedat vitæ regimen, quo neglecto, contrarius sæpe effectus sequitur, quod exemplo fontium Schwalbacensium satis evictum arbitror.

### OBSERVATIO III.

Generosissima Consiliarii aulici uxore, juvenula, formosæ admodum faciei teneræque & sanguineæ complexionis, utero primum gravis, incidit octavo gestationis mense in icterum, qui excluso dein fetu per totum puerperii tempus duravit. Non multo post denuo concepit utero, & licet venam bis secandam præbuerit, aliquot tamen ante partum diebus eandem labem incurrit, qua nihil obstant iterum secundo partu incolumem peperit filium. At vero, quum nunc pertinacius quam quidem antea hoc malum inhereret, maritus a me petiit, ut ipsi succurrerem consilio, ne rursus gravida tam molesto affectu tentaretur. Ego tum in vitæ victusque rationem inquirens deprehendi, generosissimam hanc feminam vitæ sine labore desidi, dietæ vinosæ & somno nimis indulgere, ejusque loci cerevisiam bibere valde nutrientem, ac plerumque alvum habere obstructam. Unde causam mali in nimia sanguinis redundantia repositam arbitratus suavisor fui, ut loco potus ordinarii aquam potaret vino dilutam, atque utrum gestans tam circa tertium vel quartum mensem, quam circa septimum & novum sanguinem e vena secta detra-

heret.

hendum curet; alvum vero, si impigra & obstructa esset, passulis rhabarbarinis referaret. Quibus probe observatis peperit adhuc diversis temporibus tres liberos ab icteri accessione libera.

### E P I C R I S I S.

Ictericam hanc passionem a sola plethora, quæ sub tali vivendi genere in gravidis valde increfcit, productam fuisse, nihil est dubii. Nullum enim viscus a nimia sanguinis copia plus labis contrahit, præter hepar, in quo uti secundum naturam paullo difficilior & lentior est sanguinis circulatio; ita hæc sub plethorico statum magis impeditur: & quum tali ratione sanguis a sordibus biliosis minus rite depuretur sed propter coagulata bilem reliqua ad sanguinis massam deferatur, icterus generatur facillime. Interim discimus, venæ sectionem præsentissimum & optimum adversus icterum a plethora esse remedium, quam in nostro casu eo magis utilem prospecti, quod meminerim, ægræ tantis maxime, insigniter plethoricam, ante decennium graviditatis tempore quartana correptam iterata venæsectione, frustra datis aliis medicamentis, feliciter fuisse sanctam.

### OBSERVATIO IV.

*1811. In a matre. Post partum. vi ad hepar. prægraviditas.*  
Femina sexaginta annorum, habitus corporis phlegmatici, per fere annum fere annum rheumaticos dolores in humero dextro experta fuit, qui quum duobus abhinc mensibus, relicta priori sede, dextrum sub costis spuriis occupabant hypochondrium, sequebatur in his locis vehemens pressorius & constrictivus dolor, per sex hebdomades tanta vehementia infestans, ut ægra inde nec sterntare, nec bene respirare potuerit. Urina simul secedebat crassa, turbida & saturato bruno colore tincta; facies apparebat livida & subviridis. Non multo

post vehemens ille dolor simul & semel expirabat, e contrario autem ægra interne in affectu latere perespiebat sensum explosionis, a quo os ingenti suffundebatur amarore, ut fauces bile infectas omnesque, quos adsumebat cibos amaro sapore exalimaret imbutas. Sumto itaque ex consilio medici emetico, tribus vomitionibus bilem rejiciebat copiosissimam, & non multo post feces, quæ prius albidæ erant, colore flavo rursus per alvum secedebant. Interim semper adhuc conquiritur ægra de oris amaritie & siccitate, de appetitus prostratione & quod urina, quæ colorem brunum jam amisit, mingatur adhuc turbida. Nullum præter vinum assumit liquorem, quod ipsi solum vacare videtur amaro sapore, totum autem corpus marcere indies magis magisque conficitur, pulsus fertur debilis & frequens, & faciei color pallidus permanet acque flavus.

### E P I C R I S I S C U M C O N S I L I O.

Recte omnino hic affectus, qui nunc in marasimum lentamque febrem inclinet, originem summisse statuitur ab humoribus, ex humero dextro per metastasin ad dextrum hypochondrii latus ipsumque hepatis viscus delatis. Neque dubitandum, quin humores visceri, crassi ad has partes delapsi obstructions ductuum hepaticorum effecerint; quibus forte apertis non modo sensus quidam, micæ Rost in Leibe, obortus, verum etiam, obocipiosam bilis in ventriculum & duodenum effusionem, vomitiones cum continuo oris amaritie concitatae fuerunt. Ipsa enim bilis tam firmiter palati, œsophagi & lingue adheret tunicis, ut lacta commotione, particule ejus actiores nervorum papillis insinuatæ amarum ejusmodi saporem facile inducant. Quum vero acidi liquores, ut vinum, egregie sulphureas, bilio-

fas

fas & acres partes, infringendi vi polleant, non mirum est, si nostra ægrota maxime iisdem delectetur. In curatione eo potissimum respiciendum existimavimus, ut nimia bilis acrimonia temperetur alique beneficium conservetur. Quo sine commendavimus primo temperatius decoctum, cum vini & spiritus nitri dulcis portione remixtum pro potu ordinario adhiberi debuit. Dein præscripsimus pulverem, qui rhabbarum, lapides cancrorum & nitrum continebat. Hæc tria enim ad bilis acrimoniam, in sinu ventriculi & duodeni hærentem temperandam leniterque & sine molestia evacuandam præsentissimæ sunt efficacie. Discimus præterea ex hac morbi historia, quod etiam per metastasin humor in corporis aliqua parte stagnans ad alia loca, maximeque viscera, dimoveri ipsique insignem possit noxam afficere. Hinc non ignota nobis sunt exempla, ubi tumor oedematofus medicamento quodam repellente acido, vel etiam per terrorem aut paroxysmum febilem ad interiora repulsus ventriculi hepatisque regionem occupavit, ibique dolores, vomitus, anorexiam, flatulentiam, ardorem & demum veram excitavit isthericam; quæ tamen omnia disparere symptomata, si tumor pristinum locum occupavit.

## OBSERVATIO IV.

*Diffusa, gravior, cum febre, cum insensibilitate.*  
 Vin literatus, consilarii munere fungens, annorum triginta septem, corporis macilentioris, loco vini in prandio spiritum vini tenuemque cerevisiam bibens, post prægressum diuturnum mororem, accedente simul vita sedentaria, in lentam incidebat febrem, cum plenaria appetitus prostratione & istherico corporis colore stipatam. Nihil varia hinc inde data proficiebant remedia, ut potius malum inde pertinacius fieri videtur; donec tandem lenius vomitorium, ex tartari emetici grano uno & pulveris

Ipecacuanne granis XV. compositum & bis assumptum integram reddebat valetudinem. Aliquot annos post istherica hac passione longe affligebatur gravius; siquidem nunc salivam exspuebat flavescens & de sapore omnium, quæ assumebat, amaricante valde conquerebatur. Alvus raro, nisi clysteribus vel suppositoriis admonita reddebat excrementa, quæ instar argillæ erant compacta, & urina quæque mingeatur bruna, sedimentum deponens crassum atque copiosum. Circa curationem huius mali maxime erat notabile, quod omnia, expertæ alias virtutis remedia, quæ sunt rhabbarina, pilulæ polychrestæ balsamicæ, antispasmodica & sedativa, essentia & extracta amaricantia, nec non insula aperitiva, magnam præcordiorum anxietatem, nauseam & vomendi conatum, imo nonnunquam ipsum vomitum concitarent. Unicum quod ferre poterat, medicamentum erat salaperitivum, ex sale Carolinarum, nitro purif. solutione ocul. cancr. & tartaro vitriolato confectum, quod cum sufficiente potu, quem aqua pura fontana cum quarta parte vini & paulillo succi citri remixta præbebat, parca sed crebriori dosi assumebat. Insuper quoque externe cataplasma ex herba absinthii, scordii, floribus chamomillæ, & semine cymini in vino coctis regioni hepatis applicare, idque refrigeratum crebrius iterare iussit. Et sic binis mensibus elapsis, sponte soluta alvo ingens excrementorum siccorum, cretacei coloris, per quatuor dies secedebat cumulus; unde sensim paulatimque feces albæ reddebantur flavæ, color cutis naturalis cum appetitu redibat, & æger, quæ Dei gratia erat, pristinam recuperabat sanitatem.

## EPICRISIS.

Docet in primis hic casus, quantum ægrotantium nature quoad usum & operationem medicamentorum differre.

ve inter se soleant, ita profus, ut quæ aliis insigniter conferunt, aliis mirum sæpe noceant, quod quidem in morbis chronicis, ubi ventriculus est sensibilibus magnaque vitiosorum humorum colluvie scatet, frequentius experiri mihi licuit. Cura in hoc ægrotante, quæ salubris & sufficienti congrui porus usu fuit peracta, omnino optimum tulit levamen, quod vicariam quasi opem aquarum mineralium præstitit. Externa vero cataplasma & fots in pertinacibus ejusmodi morbis sanandis nunquam non observavi proficua & sæpe cum præsentanea mali remissione usurpata; siquidem non modo urina inde dilutior facta, sed & feces alvine in flavas mutata plenariam convalescentiæ spem pollicebantur, quum contra iidem sepositis morbus mox pristinam induebat indolem. Scybala demum dura & cretaceæ consistentiæ fuisse dejecta, meo quidem judicio ab acido lymphæ gastricæ & succipancræatici, sub bilis defectu valde exsuperante, quo adstruta ex parte fuerunt coagulata, recte venit deducendum.

## OBSERVATIO V.

Femina quadraginta annos nata, succi sanguinisque plena gravi per aliquot tempus morere, ob filii unici obitum, affecta in enormem incidit æteri hæmorrhagiam, qua sedata corrigebatur paroxysmo febrili, cum frigore artuumque rigore & vehementi vomitione stipato. Jungebatur simul altero die icterus, unde mox color curis commutabatur in flavum, urinae secedebant turbidæ & opacæ, stercora alba. Remittebat equidem per intervalla hoc malum; quoties tamen vel ob prægressam animi commotionem, vel ob intempestivum acidorum & lacticiniorum usum novi accedebant insultus febriles, protinus icterus cum omnibus revertebatur symptomatibus; donec tandem post multas iterationes sponte terminatus per-

anni spatium silebat. Tum vero indopinato eadem ludebatur fabula: siquidem præcedente febre cum vomitu & pungitivo in regione dorsali dolore auriginosus color in conspectum denovo prodibat, qui intra biduum quidem evanescebat, sed, quod notabile erat, singulis hebdomadibus circa diem solis, statum veluti tempus servando, recedens per integrum fere annum in hærebat pertinacissime. Hinc ego consultus thesauri Carolinas, subjuncto subinde & interpolito elixirii balsamici & pilularum balsamicarum usu, sub convenienti regimine bis in anno potandas suas, tam exoptato cum successu, ut ægra inde feliciter restituta nunc a terro malo libera degat.

## EPICRISIS.

Illud maxime omnium in præfata casu debet animadverri, quod statim temporibus per annum prope spatium, febrili horrore præcedente, icterus productus & paucorum intervallo dierum terminatus fuerit. Cujus quidem speculæ effectus non adeo facilis videtur ratio. Nos tamen in genere genesis hujus mali ita concipiendam arbitramur. Primo quidem omnium spastica ductuum biliariorum strictura, quæ naturale bilis ad duodenum iter impedit, vel profus sufflaminat, recte debet accusari; quæ si diutius durat sæpiusque recurrit, effici omnino solet, ut viscidiores atque terrestres bilis partes ob moram invicem coeuntes primum in molliores, dein in duriores vasa bilifera obfidentes abeant concretiones, quæ transiens in hepate rursus secreta bilis continua partium viscosarum adpositione temporis successu adauget. Et quum hæc ratione ipsa quoque bilis acrior evadit, non mirum est, si a sufficienti ejusdem in duodeno stato tempore collecta copia nova spasmi suggeritur materia; qui tanto facilius celeriusque, inverso canalium biliosorum motu, vasa

Inter  
paroxysmum  
febrilem  
quiescit.

Vasa

vasa lymphatica effundant, quanto major a subsistente intus tenaci materia vasorum adest angustatio. Ex qua proposita theoria liquido patere arbitror, ad talem spasmodicum crebriusque recurrentem icterum curandum nonnisi præstantissimæ efficaciz remedia, quæ altius penetrando, humores crassos resolvunt, vasorum minimorum obstructions abstergendo expediunt atque totum sanguinis per hepar circuitum restitunt, in usum esse vocanda. Ex omnibus vero vix nullum datur certius, & præstantius, quam *theriac Carolinæ*, quæ sub convenienti dextra & interpolito utilium medicamentorum usu potatæ ob sal, quod vehunt, absterisivum ad infarctus referandos impurasque sordes per alvum & urinam eliminandas longe sunt aptissimæ. Unde simul in propatulo esse judico, cur, memorante **CELSE** *lib. III. cap. XXX. ASCLEPIADES* aquam falsam purgationis causa in ictero curando per bidduum bibere jussit, atque vinum græcum falsum ad ventris solutionem conservandam commendaverit,

## OBSERVATIO VI.

*Icterus flavus in alvum transmutatus*  
Vir quidam quadragenarius, ob inordinatum vitæ genus multosque in Baccho & venere excessus jam longo abhinc tempore doloribus arthriticis & cardialgicis obnoxius incidit ab iracunda animi commotione in icterum, pessimis stipatum symptomatibus. Inestabant quippe per intervalla atrocissima circa dextrum ventriculi orificium atque pylorum tormina; jungebatur sudor frigidus, inappetentia, summaque inquietudo, sine celeriori tamen articularum pulsatione. Hinc in consilium accercebantur plures iique satis periti medici; neque vero prohibere poterant, quæ minus hæc mala per satis longum tempus crebris recedissent accessionibus. Tandem aurigo sensim paulatimque declinabat in icterum nigrum. Ordinabat itaque medi-

cus balneum per aliquot dies continuandum; quod vero quum fortasse adhiberetur calidius, tanta subinde morbus capiebat incrementa, ut æger longe truculentiora ventris tormina cum spasmo vesicæ, per noctem potissimum infestante, magnaque ischuria & continuo desidendi stimulo experiri deberet. Sequabatur hinc indies major corporis extenuatio & ingens virium languor, qui demum cum extremorum refrigeratione ingravescens ægrum diuturniori vitæ usura omnino privabat. Corpus ita exanimatum tradebatur mihi sectioni, qua instituta nullam nec in partibus externis, neque internis reperiebam pinguedinem & admodum parcam sanguinis in venis copiam. Intestina statibus erant distenta brunique coloris; vesica urinaria naturali longe conspiciebatur crassior & punctis nigricantibus referta. Hepar exploratum ad tactum inveniebatur durum & colore ex flavo viridescente imbutum; vesicula autem fellea nigra, humore viscido instar picis nigre repleta, ductus cysticus prorsus angustatus. Denique duodenum cum dextro ventriculi orificio & intestino colo obscure flavo colore tincta & exteriori parte corrola videbantur.

## EPICRISIS.

1.) Icterus flavum, nisi provida excipiat medicatio, in corporibus cacochymicis, ubi eximia succorum est depravatio, persacile in atrophiam transmutare icterumque nigrum, ut plurimum lethalem, compluribus pro! dolor exemplis evictum habeo. Progressu enim temporis, nisi bonus & laudabilis, sed crudus potius & acidus ad sanguinem transferatur succus chylosus, ex bile flava fit nigra & corroliva, a qua non modo coloris flavi in lividum mutatio, verum etiam acutissimi ventris dolores cum spasmo vesicæ admodum dolorifico juncti debent derivari. Nihil autem



tem profecto ad exacerbandam ejusmodi hæmorum acrimoniam est potentius, præter validius calidum, vel oretenus adsumtum vel exterius adplicatum. Hinc ego a balneis fervidius jussu adhibitis in ictericia nigra, præter effrenem ac lethalem gingivarum hæmorrhagiam, cujus supra mentionem fecimus, enormem quoque diarrhæam & in femina mictionem cruentam vidi productam.

2.) Cystis fellea humore tenaci facta clare subindieat, quanta particulæ in sanguine sulphurearum atque biliolarum a naturali crasi fuerit deflexio, quam veteres, licet observationibus minus suffulti non inepte atram, & multorum rebellium morborum causam, dicere consueverunt. Nec dubitare licet, quin a bilis, in fellea cystide firmiter inclusæ, acriori & subtiliori parte, per poros transudante & vicinas partes arrodente truculenta ista crasi scrobiculum cordis pathemata speciatim fuerint concitata. De quo conferri possunt STALPARIUS *van der WIEL* *Gen. l. obs. 47.* TULPIUS *obs. lib. 2. cap. 27.* & M. N. C. dec. I. ann. III. obs. 100.

## OBSERVATIO VII.

Per litteras ante annum operam meam requisivit vir quidam Serenissimo Principi a consiliis, cujus uxor aurigine sæpius recurrente diu afflicta nullis hæcenus remediis ad pristinam reduci sanitatem potuit. Ipsa autem quadraginta & duos annos nata, staturæ mediocris corporisq; multo sanguine turgida, vitæ sedentariæ & victui crassiori dedita illibatam semper præ se tulit valerudinem. Verum, elapso abhinc decennio, quum sub ipso nientium fluxu prægelida hieme aliquot milliarium iter conficiens corpus nimium refrigerasset, menstrua per uterum purgatiō, quæ a primo eruptionis tempore semper recte se habuit, mirum quantum excepit immutari, atque mox parcius, mox copiosior, mox per plures, mox

per pauciores secessit dies, nullumque servando ordinem modo anticipavit, modo postposuit. Quare varia suborta fuerunt pathemata, quibus ante biennium accessit ipsa icterica passio, quæ convenienti quidem remedium operemissit, sed post anni dimidium denuo invaluit & abhinc singulis fere mensibus circa consuetum menstruum tempus inopinato rediit, absque ullis sui adventus indicibus. Novissimam vero accessiōnem hæc præcesserunt signa. Scilicet ægra vehementes in dorso & inter scapulas dolores cum præcordiorum anxietate & alvi obstructione, in quam etiam extra paroxysmum valde proclivis erat. Exceperunt vomitus, & tunc flavus in universo corpore prodiiit color. Ego igitur ut satisfacerem mariti precibus, ad hocce malum præcavendum hac usus sum medendi methodo. Primo omnium, ratione dietæ commendavi sufficientem corporis exertationem & ut ægra, a cibis fumo induratis atque salitis abstinerem, jussu ha cum radice graminis, cichorei, asparagi &c. cocta; pro potu vero ordinario decoctum radicis chinæ & farfaparillæ sæculo adsumeret. Dein ex medicamenti ad alvum apertam servandam suavi passulas rhabarbarinas, interposito salis nostri aperitivi ad drachmam unani usu, alternis diebus capiendas. Tum inter epulas elixir nostrum viscerale balsamicum & circa tempus, quo paroxysmus invadere consuevit, elixir quoddam antispasmodicum, quod hquorem anodynum mineralem, essentiam croci, castorei & succini habebat, ter in die capiendum obtuli. Denique, ubi dolores urgerent eum spasmis & flatibus, elysma emolliens & carminativum ano injiciendum & circa instantem mensium perierum pilulas nostras balsamicas alternis diebus sumendas curavi. Quibus benediscite Numine effectum est, ut malum primo rarius accederet, & postea a cura vernali cum fonte Selterano recte insilitura penitus cessaret.

## EPICRISIS.

Varia sunt, quæ ex hoc casu anno-  
tari merentur momenta, quorum po-  
tissima recensēbimus:

1.) Egregie docemur, feminas sub  
menstrua purgatione, a frigoris vehe-  
mentia cohibita perfacile, nisi mox  
accommodata succurratur medicina,  
in statum valetudinarium conjici posse;  
ex quo difficulter admodum emer-  
gunt.

2.) Intelligimus, ab irregulari  
menstrui successu, concurrente simul  
ex diætæ vitio plethora, generari spa-  
smos, qui naturalem bilis ad intestina  
cursum sufflaminando, icterum saepe-  
numero produciunt; & quum circa  
menstrui tempus in ejusmodi subjectis  
semper solent esse vehementiores,  
non mirandum arbitror, cur tum  
temporis novæ mali factæ fuerint ac-  
cessiones.

3.) Confirmatur, morbos ejus-  
modi chronicos remedium tam diæ-  
teticorum quam pharmaceuticorum  
usu omnino vinci posse & superari,  
sed ut convenienti dosi, tempore &  
ordine adhibeantur necesse est.

## OBSERVATIO VIII.

*ſſerius  
febris  
bilioſa  
junctus* Per duodecim annorum, a largiori  
uvarum acidarum usu febre corripie-  
batur bilioſa, cui adjungebatur icte-  
rus, cum tumore circa hepatis regio-  
nem subduro & ingenti præcordiorum  
anxietate ac inquietudine stipatus.  
Urina simul reddebatur atramento ſi-  
milis & feces alvinæ per integros tres  
dies secedebant nigrescentes. Hinc  
ego vocatus dedi pulveres absorbentes  
leniterque nitrosos, cum rhabbaro  
mixtos, quos parva sed iterata dosi  
offere jussi. Pro potu commendavi  
lac ebtyratum; & exterius dextro hy-  
pochondrii lateri apponendum suavi  
cataplasma supra descriptum; quorum  
remediorum usu egregie demum con-  
valuit.

## EPICRISIS.

Quæ recensuimus mala jure merito-  
que a perversa uvarum comestione  
sunt deducenda, Nihil enim infanti-  
bus majores creare molestias potest,  
quam fructus immaturi & acidi, in  
copia adsumti, eo quod non modo al-  
vum adstrictiorem bilemque corrosi-  
vam reddunt, verum etiam chylum  
& lympham coagulando, visceribus  
sanguineis obstructions inferunt,  
quæ si in hepate contingunt, prona  
ad icterum via patet. Ex hinc est,  
quod etiam ob pomorum acidorum  
usum icterum observaverit RHODI-  
US *Cens. III. obs. XIX.*

2.) Ego quoque non raro icterum  
a vermibus vidi subnatum, concu-  
rentem simul febre vaga. Tum vero  
infusum rhabbari cum passulis, in-  
terposito pulvere salino, ex tartaro  
vitriolato, nitro & cornu cervi uſto  
egregiam commodat operam. Quod si  
vero

3.) Icterus, sicut in nostro casu,  
febris jungitur & pulsuum adest celeri-  
tas cum siti orisque ardore, lac eb-  
tyratum, præsertim mense Maji,  
præsentissimæ est efficaciz, quod jam  
olim Simon PAULLI in *botan. quatri-  
part. pag. 30.* in tali casu summopere  
commendavit.

Plura de ictero exempla reperire li-  
cet in Respons. ac Consult. medicin.  
Tom. II. Sect. III. Casu XVII. XIX.  
LVII. & CXIX. Speciatim vero de  
doloribus & spasmis a calculo felleo  
ortis vid. Med. Syſtem. Tom. IV. P. II.  
Sect. II. Cap. III.

## CAPUT XIII.

DE CACHEXIA ET  
CHLOROSI.

## THESES PATHOLOGICÆ.

## §. I.

*Cachexia de-  
fectiva*  
**D**E cachexia acturi in limine sta-  
tim hujus disquisitionis monen-  
dum esse ducimus, quod sub hac voce  
prævum & subitum corpus habi-  
tum, cum sædo cutis colore junctum  
intelligamus; qui a vitiosi seri abun-  
dantia viscerumque tono dejecto  
oriundus singulas corporis functiones  
perturbat & labefactat insigniter.

## §. II.

*signa  
defectiva*  
Veræ & essentialis morbi cachectici  
notæ hæc sunt potissimæ: color cutis  
pallidus cum virore albicans & flave-  
lens; corpus, paullo plenius & tu-  
midius, tactu frigidum & molle adpa-  
rens, neque minus infirmum & grave  
cum vacillatione crurum & anhelitu,  
præsertim sub adscensu scalarum diffi-  
cili, pedum intumescencia ac inflatio,  
mentis torpor, animus deses, som-  
nus gravis, palpebrarum intumescen-  
tia, pulsus tardus & mollis, urina  
alba & turbida.

## §. III.

*diffinitio  
morbi a  
Cæliano  
restans  
ordialis*  
Equidem cachexiæ nomen HIPPO-  
CRATI ignotum fuisse videtur; ejus-  
dem tamen non adeo obscura mentio  
est & expositio sub morbis lienis lib. de in-  
ordialis. term. affectio. paragrapho 34. & 35.  
legitur. Omnium optime vero a CÆ-  
LIO AURELIANO & ARETÆO  
specialibus & propriis signis hæc mor-  
bi species, cum sub junctis causis, de-  
lineatur. Quare pretium erit operæ,  
quæ de iis prodiderunt, huc adpone-  
re. Primo CÆLIUS AURELI-  
ANUS lib. III. Cap. VI. hæc profert.  
*Cachexia, sive malus corporis habitus  
nascitur intemperantia agrotantis, vel*

*curatione mala medicantis, aut post  
agritudinem tarda resurrectionis causa,  
item ex purgantibus sæpissime datis,  
vel ex saxeæ duritiis hepatis, aut lienis,  
vel ex fluxu hæmorrhoidum longissimi  
temporis, item ex febribus longo tempe-  
re corpus afficientibus; aut materia  
purulenta collectionibus, aut vomitu  
post vespertinos cibos, & his similibus.  
Est autem ipsa quoque passio sæpissime  
hydrops antecedens causa aut macula-  
rum in superficie corporis; sequitur ca-  
checticus pallor subalbidus, aliquando  
etiam plumbæus color, debilitate tar-  
dus ac piger corporis motus cum infla-  
tione inani, aliquibus etiam ventris  
flor cum febricula in plurimis latente;  
quæ circa vespertam magis augetur;  
pulsus creber ac sensus, cibi fastidium  
& vini major appetentia; urina sellæ  
& extensio venarum.*

## §. IV.

*lib. I. cap. XVI. Ab æt  
virescente  
defectiva*  
Dein ARETÆUS lib. I. cap. XVI. hunc morbum ita describit: Cachecti-  
cor sequitur corporis gravitas, pallor  
subinde repetens, venter flatibus re-  
fertur, oculi concavi, somni graves,  
torporem assidentem; stantibus pedes  
intumescunt. In ventre ac in omni cor-  
pore caloris imbecillitas est, ad omne  
opus abjectus & prostratus animus;  
sudor pruriginosus, tardæ spirituum du-  
cant, arteriarum motus languidi, de-  
biles ac frequentes sunt. Extrahitur  
morbus in multum tempus; intestino-  
rum difficultas adest continua. Ali-  
menti elaboratio ad cognitionem perti-  
nens debilis admodum atque invalida  
est. Labis hujus causæ sunt: hæmo-  
rroidum suppressio & conjuratorum vo-  
mituum retentio & ab excretionibus  
quies, & ab ingentibus laboribus  
otium.

## §. V.

*Cachexia  
defectiva  
virescente  
defectiva  
chlorosis*  
Quem in genere cachexiam dicunt  
morbum, is in virginibus, quæ non-  
dum menses expertæ sunt, aut si ipsæ  
inordinati & partiores fluunt, chloro-  
sis denominatur, itemque morbus vir-  
gineus & febris alba; de qua maxime  
agit HIPPOCRATES lib. de virgi-  
nibus.

quum morbis, nihilque aliud, quam cachexia species est, iisdem, quibus cachexia, signis sese prodens: Facies enim est pallida, interdum subflava, labiorum insolitus pallor, oculorum subsistentia, palpebrarum livor, ingens membrorum lassitudo, animi torpor, pedum frigus, gravitas & ad movendum inertia, appetitus dejectio, cum nausea & vomitu, somnus turbulentus, pulsus languidior; urina citra colorem mingitur valde aquea, in progressu turbida. Accedunt frequentissime, præsertim sub scalarum adfensu, respirandi difficultas, cordis tremor & palpitatio, intumescencia & inflatio pedum. Sæpius quoque jungitur pathemata cardialgica cum intercurrentibus capitis doloribus & animi deliquiis.

## §. VI.

Causa  
proli-  
mpe.

Quod causam nostri morbi ejusque accidentium proximam attinet, hæc ipsa quidem consistere videtur in nimia sanguinis impiei & humorum viscidiorum ac minus spirituosorum abundantia, ob naturalem tonum, vigorem & robur partium solidarum, maximeque viscerum chylicationi, sanguificationi & depurationi infervientium valde labefactum in corpore collecta. Etenim ob partium fibrosarum & vasculosarum atoniam lentior & tardior fit sanguinis circuitus, & hinc secretionum æque ac excretionum negotium saluberrimum impunitur; unde sordes excrementitiæ, viscidæ, biliosæ, salæ & serosæ, quæ in hepatis & renum colatorio fecerunt & foras ejici debent, maxima ex parte retentæ impurum plane ac intemperatum reddunt sanguinis serum & succum nutritium. Temporis successu fibræ motrices illius subcutanei cribri æque suo naturali privantur robore; quare hæc sordes minus rite & feliciter per cutis colatorium colari possunt ac rejici, unde in corpore reticulari, cuticulam & cutim intercedente, a tincto sero pallidus, subviridis & flavefcens color cum aliquali

corporis intumescencia suboritur, ipsaque nutritio penitus depravatur. Et quoniam sub tam depravato sanguinis & humorum statu subtilissimum illud ac tenuissimum cerebri & nervorum fluidum, quod veteribus naturæ, recentioribus spirituum animalium nomine veniens fibris solidis vigorem & vim elasticam conciliat & functionibus quoque animalibus præest, non amplius a sanguine & lymphæ probe temperata & pura, sed multis aquosis, viscidis & vappidis contaminata sordibus nutritur ac sustentatur; consequens omnino est, ut illud ipsum insignem contrahat labem ejusque vis ac energia tam in animalium, quam vitalium actionum negotio mirum quantum labascet & imminuatur. Unde non mirum videri debet, si ingens corporis gravitas & languor, appetitus prostratio, ad somnum & soporem proclivitas, animi tristitia sensuumque corporis simul juncta insistant.

## §. VII.

Ad tantam vero sanguinis & humorum dyscrasiam & quæ abhinc proxime emergit, cachexiam maxime omnium viam pandit habitus corporis, cuius natura valde laxa & spongiosa, qui in fibrarum motricium mollior, vasorum exilitate & copia tendinumque tonuitate consistit. Quare etiam sequiorem sexum præ virili omnesque eos, qui sanguineæ & phlegmaticæ sunt complexionis, præ aliis nostro morbo valde observamus obnoxios. Nam ejusmodi corporis status & habitus ad sanguinem & serum in majori copia generandum admodum est idoneus; & quia sanguis in hisce subjectis circulator tardius, evadit spissior, lentior & ad exiguis excretoriorum, maximeque hepatis canaliculos obstruendos magis aptus.

## §. VIII.

Otiolum quoque vitæ genus & plethorica laboribus consuetique exercitationibus quies & remissio, non modo experientia, sed etiam ARETÆO loc. cit. teste, recte causis adnumeratur.

Causa  
media-  
ta sunt  
habitus  
corporis  
ac progre-  
ssus.

Plia se-  
dantur  
et  
inter-  
mittunt  
in  
vita.

tur procacitate, eo quod ad humorum copiam, impuritatem, tardiorum circulum, stagnationem viscerumque tam sanguificationi quam depurationi dicatorem obstructions permultum confert. Quæ quidem mala eo magis incidunt, si major ciborum, præsertim infantium, viscidorum, belliarum, acidorum & qui difficilius dissolvuntur, est adperentia, quam natura debilis & viribus exhausta ferre, digerere & in utilem probeque temperatum succum chylosum potest convertere; unde ingens cruditas acidarum aque ac viscidarum est proventus, quæ dein primum impuritatis in massa humorum fundamentum existunt. Valet enim omnino commune illud proverbium: vitium primæ coctionis, quæ fit in primis viis, non facile corrigitur in secunda, quæ in visceribus sanguificationi & depurationi inservientibus peragitur, multo minus in tertia, quæ actu nutritionis absolvitur.

## §. IX.

Potus quoque, circa quem varii committuntur errores, varie ad nostrum affectum tam in sexu sequiori quam nobiliori disponit. Femine enim ut plurimum parum adsumunt potulentorum, ita ut sæpius vix semel intra unius diei dimensum bibant: per quotidianas autem, quæ in corpore sunt, excretionem multum a massa sanguinis & humorum decedit fluidi; quod nisi restituatur, necessario humores evadunt spissiores & ad liberorem per minima vascula circuitum minus apti; ad infarctus contra & oppilationes, quæ nostri mali causa existunt, magis idonei. Nostrum jam tempore largior potus Coffee nimis concentrati usus in sexu sequiori præcipua existit causa chloroseos, præsertim quando femine, vitæ nimis otiosæ deditæ, & quæ adstrictioris sunt alvi, ipsum cum multo saccharo quotidie bibunt. Tali enim ratione spissior jam existens sanguis multis sulphureis, adustis & oleosis imbutis particulis; quarum

Tom. IV. Pars IV.

nisi sufficiens cum ipsa bile per hepatis ductus excretorios fit separatio, & qualitas & color lymphæ immutetur necesse est. Neque ex alio fonte derivanda videtur ratio, quod purpureæ scorbuticæ hac hominum ætate sint familiarissimæ. In sexu vero nobiliori peccatur quam maxime nimia potus spirituosus, vinosus & consistentioris teretibus abundantia, utpote quæ non satis liquidos & tenues humores reddunt vitales, sed potius, eorum coagulum inducendo, ad nostrum morbum permultum conferunt momenti.

## §. X.

Neque minorem in nostro malo ingenerando obtinet potentiam prava aeris, maximeque frigida & humida <sup>Aeris</sup> <sup>latus</sup> <sup>partes</sup> intemperies, dum externam corporis superficiem aut constringendo aut relaxando salutare transpirationis negotium prohibet, adeoque ad humorum impuritatem eoacervandam plurimum valet. Hinc etiam observamus, sub atmosphæra nebulosa & turbida diutius persistente & ventis simul ex occidente flantibus, itemque tempore vernali & autumnali, aut si quis in locis valde humidis, paludosis humilibus conclavibus commoretur, vel dormiat, frequentem morbi cachectici esse proventum.

## §. XI.

Aditum quoque ad nostri affectus genesis animi faciunt pathemata <sup>Animi</sup> <sup>pathemata</sup> quarum ea est vis atque potentia, ut proxime in partes nervosas, maxime omnium vero in ventriculum & universum intestinorum canalem mere nervosum & membranaceum agendo, motum harum partium peristalticum functionemque naturalem valde imminuant & labefactent. Nocent vero quam maxime & ad invehendam cachexiam & chlorosin admodum disponunt gravis terror, diuturnus moror & suppressa iracundia, eo quod excretionem sanguinis criticam per menses ac hæmorrhoides vel nimis augent, vel retardant & cohibent.

O

§. XII.

## §. XII.

Enim vero, & certa ac frequens observatio, & probatissimorum Medicorum auctoritas confirmat, quod nimis imminuta, alias salutare & critica sanguinis superflui per uterum & anum expurgationes non modo cachexia & in feminis chloroseos, verum etiam aliarum gravissimarum & pene incurabilium passionum præcipue causæ existant. Nam quodocunque sanguis consuetum exitum per ordinarias has vias, vel ob spasmos, vel ob nimium crasserum humorum infarctum non habet, stagnat, vitiatur, corrumpitur & ad vasa regurgitat majora & viscera; quorum tonum, ac functionem vitiando varia & gravia pathemata in remotis etiam partibus sæpius excitat. Morbus ille, virgineus qui indigitatur & circa pubertatis tempus virgines viro jam maturas frequenter infestat, unice ab impedita hac expurgatione sua mutatur incubula. Id quod perpulchre explicat Joannes LANGIUS in *Epist. medicin. lib. I. epist. XXI.* his verbis: *id temporis natura ducit sanguis menstruus ad matricis loculos & venas ab hepate defluit: qui quum ob illarum angusta oscula, qua nondum patuerunt, viscosis quoque & crudis humoribus obstructa & denique ob sanguinis crassitiam erumpere non possit: tum rursus per vena cavae majorisque arteriae propages ad cor, hepat, diaphragma & præcordiorum venas regurgitat: capiti quoque bona pars impertitur & circa viscera accidentia gravia parit, dissonant, tremulum cordis palpitum, hypochondriorum inflationem, stomachi fastidium, cardialgiam. Sed eadem mala non tantum virgines & juvenculas, sed & conjugatas, quin imo seniores eo corripiunt tempore, quo fluxus mensium secundum naturæ ordinem solet cessare, vel ubi ille ex quacunque alia causa fuerit sufflaminatus. Nec dissimili ratione in sexu nobiliori consuetus hæmorrhoidalis fluxus suppressus, qui robur ac tonum*

partium deiciendo, vasa pravorum succorum copia implet, ad affectum cachecticum concurrit.

## §. XIII.

Verum enim vero, nihil quoque frequentius evenit, quam ut post enormes & fere incompecebiles, sive per uterum sive per venas sedis hæmorrhagias, nec non per graves vulnerationes, chronici & rigidi sic dicti valdeque pertinaces morbi, quales sunt cachexia, lencophlegmatia, anasarca, cedemata pedum, vel etiam atrophia, cum summo virium languore, enascantur. Sicut enim omnes partium functiones, ubi secundum naturæ ordinem fieri debent, a convenienti sanguinis probe temperati copia ejusque libero per omnes canales progressu & circulo sustentantur, & inde robur ac vigorem suum accipiunt: ita necesse est, ut, exhausto pene vitali ejusmodi fluido, ingens partium & viscerum fiat imbecillitas, & ingens functionum præstandarum læsio ac imminutio. Maxime omnium vero ventriculus cum adnexo intestinorum canali suos patitur manes, quippe cujus atonia & imbecillitas imminuta quoque concoctionem & ob corrupta alimenta multas parit cruditates, quæ in venas & habitum corporis transeunt non modo vitiosam efficiunt nutritionem, sed & ipsa viscera sanguificationi humorumque depurationi dicata, ut sunt hepar, lien, renes, &c. insigniter lædunt, & quo minus munere suo rite fungi possint, prohibent. Accedit illud, quod deficiente justa sanguinis & humorum copia minima & capillaria vasa, maximeque ea, quæ tum secretioni utilium, tum excretioni inutilium succorum infervant, non aperta maneant, concidunt & angustentur, adeoque longe magis suodefraudentur munere; unde ingens impuratum origo.

## §. XIV.

Nec aliam tubesse puto rationem quam nimiam boni & laudabilis sanguinis

*Sanguis enim est crassior, nec alius.*

*Morbi præterea sunt per quos sanguis crassior, nec alius.*

guinis iacturam, quod ii potissimum, qui a longis morbis, maximeque a febribus & dysenteria nondum plenius convalescerunt, sed adhuc imbecilles plus ciborum ingerunt, quam languida ventriculi actio digerere potest & in bonum succum transmutare, cachexia admodum sint expositi. Quod manifestum, experientia teste & antiquissimis medicorum consentientibus, & illis frequentius evenit, qui per pravas & imprudentes morborum curationes, quales cum fortioribus purgantibus, vel etiam adstringentibus ad nimias hæmorrhagias, & paroxysmos febrium suppressivos instituere solent, nimis sunt debilitati. Etenim, pessima omnino indolis ista sunt medicamina, quæ vires, in quibus omnis naturæ energia residet, nimium exhaustiunt. Et talem censum jure prope suo subeunt drastica evacuantia & quæ minimos tum inutilibus excernendis tum humoribus depurandis dicatos canales constriungunt & obstipant remedia, quibus imperitis medici non modo nostrum affectum, sed & alios plures eosque lethales morbos accersunt sæpissime.

## §. XV.

*Differ-  
tia ca-  
chexia  
ab alia  
morbo.* Quoniam nostrum affectum cum aliis morbis multum intercedit affinitatis, operæ erit pretium, ut enodemus, in quantum illis accedat, in quantum discrepet. Primo itaque sciendum est, cachexiam a chlorosi & a fluore albo quoad essentialia morbi indolem minus differre, sed tantum quoad sexum & subjectum, sive sedem causæ, quæ in nobiliori sexu in ventriculo & hepate, in sequiori vero in his & utero simul querenda est, aliqua ex parte discrepare. Neque minorem cachexia cum cacochymia alit convenientiam; siquidem hæc æque ac illa ingentem impurorum humorum in vasibus supponit præsentiam, tantum quod magis ab intemperantia & primæ digestionis vitio, quam a prava reliquorum viscerum naturalium constitutione nascatur; unde ex majori ca-

cochymia gradu, qui in nutritione depravata consistit, ad cachexiam demum fit transitus. Deinceps & illud probe observandum est, quod non omnis sordus & pallidus faciei adfectus pro essentiali cachexia characterem haberi debeat, utpote qui ab omni graviore morbo sæpissime remanet, & vel ex collecta vitiosorum humorum in primis viis colluvie, vel ab iracundia affectu suppresso, vel a spasmo ventriculi oritur, sed convenientibus remediis facile cedit. Multum quoque cognitionis cachexia habet cum ictero. In utroque enim affectu nutritio est depravata, faciei & cutis color luridus, visum languor, mentis torpor, viscerumque & ventriculi magna atonia & læsio; nihilo tamen minus in componendis differentiis, quod in ictero a sola bile ex biliferis ductibus, vel obstructis, vel spasmodice contractis, per vasa lymphatica ad sanguinis massam regurgitante hæc mala originem sumant, quum contra in cachexia ventriculus, lien, hepatis renisque simul graviter afficiantur, adeoque hæc gravior & rebellior sit, ita prorsus, ut, nisi curetur, in icterum nigrum transeat. Differt quoque affectus noster ab anasarca & leucophlegmatia, utpote in his major partium inferiorum observatur inflatio atque durities & post impressionem digitorum foveæ relinquuntur, quod in cachexia, nisi jam proxime ad horum affectuum gradum accesserit, minus contingit. Neque deir negligenda est, quæ cachexiam & atrophiam intercedit differentia. Equidem in utroque morbo magna partium fluidarum peccat impuritas, viscerum atonia & nutritionis vitium; ast in atrophiam corpus exenuatum indies magis magisque contabescit, & nulla prorsus adest nutritio, quæ tamen in nostro affectu vitiosa est & copiosior; unde corpus plerumque amplius habet molem. Denique etiam discrepat cachexia a scorbuto. Nam in omni quidem scorbutus est cachexia, & vix reparabilis humorum dy-

scrafiz, ex variis doloribus, exulcerationibus cutisque descædationibus conspicua, quæ vero in cachexia nondum ad tantum pervenit gradum. Quodsi vero hæc junguntur accidentia, dici solet cachexia scorbutica.

## §. XVI.

Quoad prognosin nostri mali id tenendum esse arbitror, quod cachectici pro varietate ætatis, temperamenti & vitæ generis multum omnino inter se discrepent; & pro majori vel minori humorum viscerumque labe faciliorem vel difficiliorem recipiant sanationem. Ita, si ætatem respicimus, senes præ juvenibus, eo quod ipsa senectus cachexiæ species est, nostro affectu longe gravius afficiuntur; imò non raro exinde in atrophiam & marasum incidunt. Dein, quæ subito nascitur cachexia, uti fere ob intemperantiam pravamque ciborum digestionem post longos morbos evenit, facilius tollitur, quam quæ ex viscerum vitio hepaticæ vel lienis scirrhosa obstructione paulatim succrescit. Hinc etiam ubi viridescens & in nigrum vergens color adparet, qui plerumque latentis viscerum læsionis, ob corruptæ bilis admixtionem, indicium præbet, majus periculum subest, quam ubi pallidus tantum color, qui solam phlegmatis abundantiam subindicat, cutim occupaverit. Præter hæc sciendum: quo diutius malum in hæsit, quo major jungitur spirandi difficultas, hypochondriorum tensio atque durities, & quo magis vires labascunt, ut syncope quoque intercurrat, eo plus reformidandum esse periculi. Neque facilem curationem admittit, ubi ex hæmorrhoidum fluxu vel prægresso, vel sæpius recurrente malum fuerit subortum. Nullus insuper datur morbus, qui tam facile in hydropem tam anasarcam quam ascitem, in atrophiam & ipsam quoque hecticam inclinat, quam ipsa cachexia, præsertim hinc mox ab initio convenientibus succurratur remediis. Chlorosis denique, si modo non negligitur, non adco periculosa est, ne-

que ad longum tempus durat, sed vel matura mensium restitutione solvitur, vel in juveniculis virginibus solo conjugio feliciter curatur. Mulieres vero, quæ diutius chlorosi laborarunt, aut steriles fiunt, aut morbosam ac debilem edunt prolem.

## C U R A T I O . . .

## §. I.

EXpositis itaque & pervestigatis <sup>Indica-  
tione</sup> nostri affectus causis, ordinis <sup>llores  
coram  
ria.</sup> potulat ratio, ut iisdem submovendis aptam & accommodatam inveniamus medendi methodum, quæ, nostra quidem sententia, sequentibus absolvitur indicationibus. Primo quidem eo respiciendum ducimus, ut sanguis & humores crudi, spissi & impuri corrigantur & per congrua emunctoria e corpore ejiciantur; horum vero loco subtilis chylus, sanguinis & humorum promoveatur generatio. Dein, ut referatis viscerum minimorumque vasorum oppilationibus liber & æqualis sanguinis per omnes corporis tam externas quam internas partes restituatur circuitus, & denique, ut nimis dejectus ventriculi & intestinorum viscerumque tonus roboretur.

## §. II.

Primum itaque, antequam ad humorum pravorum respiciatur correctionem, opera medico danda est, ut fontem præcludat, ex quo ejusmodi humoribus majus accedit incrementum. Fontem hunc constituit ventriculus cum adnexo intestinorum canale, ex quo cruditates prodeunt viscida, mucida, acida, quæ per incidentia digestiva corrigi & ad mobilitatem debent præparari, quo eo commodius possint eliminari. Huic scopo quam maxime commoda sunt salia sic dicta neutra, cujus generis sunt; tartarus vitriolatus, arcanum duplicatum, solutio oculorū canceri cum succo citri, terra foliata tartari, sal polychrestum, <sup>que be-  
moram  
corro-  
sionem  
causa-  
nt.</sup>



sal Carolinarum, Egranarum, tartarus tartarifatus, sal abſynthii, quæ cum ſufficienti aquæ vehiculo ſoluta oportet exhibere. Hæc quippe ſi repetita, vel majori præbentur doſi, præter effectum incidentem & reſolventem, alvum quoque movent & ſordes efficaciſſime educunt. Quod ſi vero non ſuffecerint, poſt ejuſmodi præparationem evacuantia ſubjungenda veniunt, quæ ex myrrha, gummæ ammoniaco, extracto rhabbarbari, abſynthii, panchymagogi Crollii, cinnabari, ſucciſ & ſale ſuccini; ſumtis ad drachmam dimidiam æqualibus partibus parantur. Ex ſcrupulo uno poſſunt tormari pilulæ viginti, totidemque adſumi. Speſtant hucetiam præ omnibus aliis noſtræ pilulæ baſſamicæ, quæ tonum & robur ventriculi labefacturum ſimul egregie reſtituunt & confortant; vel etiam in forma liquida infuſum vinoſum apparari poſſe ex radice pimpinellæ, armoracæ, cichorei; rhabbarbaro, agarico, corticibus aurantiorum recentibus, ſummitatibus centaurei minoris, cremore tartari & paſſulis minoribus, quod quotidie in aurora per dies decem ſufficienti quantitate erit hauriendum. Neque minorem ſpondet efficaciâ aqua ſedlicenſis ad libram dimidiam cum ſyrupo ſtorum perſicorum, vel cichorei cum rhabbarbaro, aut roſarum ſolutive ad unciam unam alternis diebus per vices potata. Si vero alvi nimia eſt ſtriſtura, conſultius eſt, per leniter evacuantem potionem mannatam, quam mannæ electæ unciz duæ, cremoris tartari drachma una, rhabbarbari & niri puriſ. drachma dimidia, in aquæ fontanæ unciiſ octo ſoluta conſtituant, ſordes educere.

## §. III.

Expurgatis ſic probe primis viis, operam navare oportet medicum, ut totam humorum maſſam puriorem & fluidiorem reddat, atque inſarctos emunctuorum canaliſculos aperiat, quo eo melior ſanguis & ſeri fiat ſeparatio. Cui ſcopo obtinendo infer-

Tom. IV. Pars IV.

viunt decocta, ex radice ſarſaparillæ, chinæ, ſcorzonæ, cichorei, ſaſſafras ligni ſaſſaſtras & cinnamomo parata, quæ dilutiora potui ordinario poſſunt dari, concentrata, vero mane in lecto ad perſpirationem liberioſiorem promovendam adſumi. Juvabit quoque interdum mane in lecto ſudorem exſpectare, qui elicitur; ſi eſſentia ſuccini & pimpinell. cum tinctura antimon. & liquore cornu cervi æquali pondere ſumta ad quadraginta guttas ex decocto calido propinatur. Nec incongruum erit, pro re nata ad diureſin ciendam tincturæ tartari drachmam unam cum decocto interponere.

## §. IV.

Maxime omnium vero ventriculi habenda eſt ratio, cujus tono roborando aptiſſima ſunt elixiria ſic dicta ſtomachica; quæ inter eminentiſſima Michaelis ſtomachale in B. Parentis mei theſauro pharmaceutico deſcriptum, noſtrum baſſamicum in notis ad Poterium propoſitum, ſal volatile oleoſum cum tinctura tartari remixtum, elixir ſtomachale ex eſſent. gentian. rubr. & corticum aurant. recentium, nec non elixir baſſamicum ex extracto centaurei. min. cardui bened. abſynth. gentian. myrrha, ſuccino, croco, corticibus aurantiorum recent. ſine menſtruo ſpirituſo cum tenui ſaſſa tartari lixivio paratum. Quæ medicamenta, maxime ſi inter epulas, vel ſtatim a cibis ſumtis offeruntur, non modo ad alimentorum digeſtionem blandamque chyli ſpirituſcentiam conciliandam, verum etiam ad naturalem & baſſamicam humorum temperiem reſtituendam viſcerumque tonum roborandum, magis miræque ſunt efficaciæ; ſed ut paulo diuturnior uſus accedat, neceſſe eſt.

## §. V.

Quodſi hiſce remediis morbus rebellis cedere nolit, ad aquas minerales quarum eximius in cachexia tam rili quam feminina uſus eſt, deveniendum erit. Omnibus tamen hoc

O 3 fine

sine longe præferendas esse puto acidulas Pyrmontanas; quibus ego non semel sed sæpius chlorosin, ex mensium obstructione enatam, in corporibus etiam ad spectu tenerioribus curatam novi. Ejusdem cum hisce virtutis sunt fontes Spadani, utpote ambo subtilissimo martiali elemento imbuti non modo spissos humores fluxiles & mobiles reddunt, atque obstructos emunctoriorum meatus referant, sed & tonum ac robur viscerum augendo, sanguinis per universum corpus circuitum egregie promoveunt.

## §. VI.

Martialis  
sum  
asus.

Præter jam recensitas aquas medicatas, martiali principio turgidas, alia quoque medicamenta martialia cum salinis & balsamicis maritata commodeque exhibitum non inepte pro speciosis & efficacissimis ad cachexiam & chlorosin sanandam habentur remediis. Utut vero varix proflent martis compositiones chymicæ aque ac phar-maceuticæ, nulla tamen magis se mihi commendare videtur, quam crocus ejus subtilissimus, qui non ex chalybis, sed solius ferri, quod copiosius phlogiston recondit, cruda limatura, aqua pluviali conspersa & calori solari expolita conficitur. Præstat tamen hoc medicamentum cum aliis accommodatis remediis permiscere. Hinc ego radicem pimpinellæ, ari, cionamomum acutum, sal tartari & saccharum, quæ insignem in humoribus incidendis præstant effectum, adjicere solitus sum, tam felici eventu, ut inde virgines, quæ chlorosi cum enormi capitis dolore aliisque symptomatibus stipata diu laborarunt, feliciter restitutas viderim. In forma liquida tincturæ martis pomata, cydoniata & cum succo citri parata, præsertim vero Zwoelferiana reliquis omnibus palmam præripiunt. Egregie tamen horum medicaminum intenditur efficacia, si cum sufficienti decocti supra descripti quantitate, vel etiam cum jusculis, quibus radices aperitivæ graminis, sichorei, petroselinii, aspa-

ragi, fenniculi &c. incocta fuerunt, exhibentur.

## CAUTELE.

## §. I.

**S**I ullo in morbo, certe in cachexia apprimè necessarium est, ut <sup>Cautele circa P. Sionem</sup> quam primum fieri potest, malo occurratur; alias gravis metus est, ne, si curatio tardior accedat, in atrophiam, scorbutum & hydropem æger præcipitetur. Quodsi igitur cachexia ob consuetam sanguinis excretionem <sup>sanguinis</sup> suppressam corpus occupavit, operam dare medicum oportet, ut ipsa com- <sup>modis</sup> modis remediis revocetur. Quo fito, nisi vires ex longiori mali persistencia enervatæ id prohibent, venam secare sanguinemque in parviori quantitate, sed iteratis vicibus, e.g. per triduum, detrudere juvabit. Quod auxilii genus jam olim ab HIPPOCRATE <sup>in libr. de morb. mulier.</sup> §. 3. commendatur, & iis potissimum saluti est, quibus solennis per uterum purgatio deficit. Inimicissima contra iis est venæsectio, qui mole vitioforum humorum turgidi parum sanguinis intra venas fovent.

## §. II.

Præter dictam venæsectionem prudenter institutam corporisque purgationem in cachexia ex mensium vel hæmorrhoidum obstructione suborta magna quoque vis residet in thermis Carolinis, quarum convenienti interno usu talismodi excretiones diu suppressas ego revocatas novi. Sed cavendum ab illis est, ubi morbus ex nimio hæmorrhoidum vel mensium profluvio originem traxit.

## §. III.

Sanguine in mensibus suppressis decenter detracto viscerumque obstru- <sup>Cavea</sup> ctionibus per aquas minerales vel medicamina martialia remotis, fluxus nonnunquam sponte sequitur. Quod vero sin minus evenit, necesse est, ut ægræ per horæ circiter spatium immitantur balneo tepidiori, quod ex herba <sup>matri-</sup>

matricariæ, melissæ, artemisæ, pullegii, fabiæ, floribus chamomill. roman. salviæ, baccis lauri &c. apparatus ad stagnantes humores dissolvendos, mucidamque & tenacem seri materiam per uteri ostiola expurgandam sæpius deprehendi utilissimum.

## §. IV.

Circa  
medica-  
menta  
validia  
10.

Cachectici nunquam violentis tractandi sunt medicamentis; quem in finem sedulo fugienda sunt omnia validiora purgantia, sudorifera & balnea quoque calidiora, per quæ sæpe perniciose pravorum humorum ad nobiliores partes sunt metastases.

## §. V.

Circa  
martialia  
10.

Quoad modum utendi martialibus (scire licet, quod 1.) eorum efficacia per sufficientem corporis motum & exercitationem debeat promoveri 2.) cura ad dies decem & quindecim ita continuari, ut tertio vel quarto die lenne purgans remedium, uti sunt pulsat. rhabarbarinæ interponatur, 3.) quod sufficiens & diluens potus cum exacto vitæ victusque regimine simul in usum vocatur.

## §. VI.

Conjunctio  
in Jan. cap. XIV.  
de chlorosi.

Observavimus una cum HIPPOCRATE & PLATERO in praxi cap. XIV. virginibus pallidis ac moribolis, si nubant & viris jungantur, interdum prima nocte menses fuisse eruptos & in ordinem redactos, cum colore vivido & insigni incolumitate subsequuta; quapropter matrimonium ceu summum in hoc casu remedium commendare licebit.

## §. VII.

Cautela  
circa  
tumores  
pedum.

Pedes frigidi & tumidi in hoc morbo probe testis & in moderato calore sunt servandi. Involvantur quoque linteis arte compressis, ut laxitas emendetur & promior humorum ad cor fiat refluxus. Quodsi vero nimium intumescunt, sacculi calidi ex milio, fursibus & sale confecti sunt imponendi. Circa pediluvia notandum, quod ipsa locum non habeant, ubi tumor jam invaluit, sed tum præter jam dicta rectius adhibentur frictiones cum lin-

teis asperioribus calidis instituentur.

## §. VIII.

Quod denique diartam tam præparatoriam attinet quam curatariam, Diartam frigidam humidam, nec non conclavia paullo decliviora, vaporosis humoribus repleta, pro somno capiendos sunt insensibilissima. Inter cibos autem eos potissimum, qui difficiliter solvuntur, quales sunt fructus horæi, acidi, lacticia &c. omni vitare modo oportet. Nocet quoque aqua sola pro potu sumpta, quam ideo vino bonæ notæ Rheno & Mosellano diluere præstat. In genere vero notandum, quod cachexiæ morbus a nimia ciborum comestorum copia sæpius oriatur & sustentetur; quare abstinentia & cura per inediam omnium pharmacorum vim in tali casu superat longissime.

ENARRATIONES  
MORBORUM.

## OBSERVATIO I.

V Ir sacerdotali munere fungens, temperamenti sanguinei corporis, Carben-  
nita a  
diuturno  
no ma-  
1000.  
rilque habitus spongiosi, victui crassiori & crevisse consistentioris potui adfectus, per viginti annorum decursum singulis fere mensibus cum euphoria cruentas habuit sedes. At quum duobus abhinc annis ob detestandum filiz patratum stuprum diuturno affectus fuerat cum tacita iracundia morore, salutaris hæc excretio hæmorrhoidalis sensim sensimque immiuitior facta penitus demum subleat; unde appetentia ciborum periit, facies antea florida mutata fuit in flavescentem & flaccidam, pedes intumuerunt, difficilisque nunc respirare cepit. Consuluit itaque rei pharmaceuticæ peritum, qui vinum laxans singulis diebus mane per mensem & ultra bibendum obtulit, a quo sex septemve vicibus quotidie alvum deposuit. Potui ptisanam, & ex cibi sola juscula avcnacea in largiori copia haurienda

commendavit, nec irritō effectū; utpote non modo tumor pedum cum reliquis symptomatibus ex voto remisit, verum etiam respiratio faciliior inde facta fuit: nisi quod consuetus hæmorrhoidum fluxus in ordinem nondum redierit. Non multo post derepente æger in vehementes circa regionem lumbarem incidit dolores, cum urinx multo salubro refertæ scissione junctos, qui usque dum sæpius recurrendo misere nostrum cruciarunt. Ante anni vero quadrantem tumor utrumque pedem, maximeque sinistrum cum difficiliore anhelitu denuo occupabat: status simul sinistrum hypochondrii latus mirum distendebant & sæpius calculosa concretiones, præcipue post esum unius ateriulve taleoli raphani rusciani sale conditi, cum urina exercebantur. Ego igitur consultus, quum vasa sanguine admodum turgida deprehenderem, ob pedes nimium tumidos venam in brachio secandam & loco cerevisiæ crassioris ptisanam ex hordeo, rasura cornu cervi & corticibus cistibibendam suasi. Dein singulis diebus mane salis aperitivi, ex polychresto thermarum Carolinarum & nitri crystallisati æquali portione compositi drachmam unam in libra dimidia aquæ solvendam dedi: tenueruntque iusculum superbibere, & alternis diebus circa horam decubitus pilularum nostrarum balsamicarum no. X. devorare iussi. Denique ad status discutiendos essentiam corticum aurant. liquori anodyno nupam cum elixirio viscerali alternatim in prandio sumendam obtuli, esum raphani rusciani interdixi ipsumque potius plantis pedum imponendum commendavi. Et sic intra mensis spatium, remittentibus sensim symptomatibus, fluxus hæmorrhoidum rediit saluberrimus, & jam melius æger habere cepit.

## E P I C R I S I S.

Dilucide omnino ex præfata morbi historia adparet, quantam in universa motuum & functionum naturalium œconomia pervertenda gravique & chronico morbo per fluxus critici suppressionem arcescendo gravior & diutius inhærens animi affectus obtineat potentiam. Deinceps utut a vino laxante singulis diebus per mensem cum abstinentia adhibito status cachecticus fuerit sublatus, mirum tamen non est, hunc non ita multo post rediisse, quum hæmorrhoidalis fluxus, a quo originem ipse traxit, nondum in ordinem fuerit redactus. Symptomatum complicatorum, me quidem iudice, talis reddenda erit ratio: a suppressis hæmorrhoidibus ingens in intestinis crassis suborta est inflatio, quæ vasa iliaca & emulgentia simul comprimendo, tum pedum intumescentiæ tum calculorum in renibus concretionis materiam & occasionem præbuit largissimam. In curatione mali prudenter adoranda eo præcipue respiciendum duximus, ut liberior sanguinis per, intestina & vasa adjacentia compressa restitueretur circuitus; quo scopo non modo venam, ob pedes tumidos, in brachio tundendam, verum etiam reliqua commendavi medicamina.

## OBSERVATIO II.

Vir generosissimus, aliquot supra <sup>Carbi-</sup> quinquaginta annos natus, fluxum <sup>nia ab</sup> hæmorrhoidalem nunquam <sup>lucidi-</sup> expertus, in aula per plures annos strenui vini, non optimæ semper <sup>nata vi-</sup> noræ, interfuit computationibus <sup>te &</sup> corpusque subinde venando sub varia <sup>grav</sup> tempestatis mutatione multum <sup>morbo.</sup> fatigavit; sed nihilominus, admissa his anno venæ sectione, bene habuit. Ante annum vero tempus, quum

Pain-

Principis excideret clementia, animus mox torum morori dedit; unde appetitus sequuta est prostratio, cum anxio circa scrobiculum cordis dolore acriter saepius convellente. Jungebatur dein corporis macies & difficilis, praecipue sub ascensu scalarum, respiratio, molestia hypocondriorum inflationes cum virium insigni decremento, colore faciei lurido & aliquali pedum intumescencia. Pulsus diurno tempore ferebatur tardus ac debilis, nunquam tamen intermittens, & circa vesperam paulo celerior cum levioribus aestus interni indicis. Hinc ego consultus saasi, ut bis de die elixirum viscerale, liquori anodyno nuptum, & ante decubitum sal nostrum aperitivum & temperans adsumeretur. Loco potus Thez mane bibendum commendavi infusum theiforme; & quum pro potu decoctum ventriculus non ferre videretur, potum cerevisiae Loebeginensis permisi. Denique cataplasma ex floribus chamomill. roman. macis & caryophyllis aromaticis in vino coctis, regioni stomachi saepius tepide applicandum & pedes timidos fursuribus criticis calefactis crebrius immittendos jussi, tam salutaris effectu, ut intra trium mensium decursum convalescentiae spes apparet; siquidem pedes sub continuo dolore & larga muci crassi ac visci per urinam secessione sensim sensimque detumescabant, appetitus erat vegetior, respiratio faciliior, somnusque & pulsus magis naturalis. Ceterum circa hanc morbi historiam ptohe notari meretur, quod per praeteritam hiemem generosiss. aegrotus multis vexatus fuerit catarrhalibus ad pectus defluxionibus, suffocationem non raro minitantibus, praesertim quum Medicus ordinarius in tali paroxysmo venam in brachio secandam jussisset. Exspiravit tamen praefocationis metus a frequentiori clysterum in anum iniectione.

## EPICRISIS.

Viri hujus generosissimi aulici salde inordinatum vitae genus a longo inde tempore mihi perspectum, saepiusque aestimanti admirationi fuit, quod a morbosa afflictione libertamdiu permanferit; attamen quum ab ineunte fere aetate eidem adfuerit, consuetudo in alteram quasi naturam videtur conversa. Nota enim mihi sunt perplura ejusmodi exempla, ubi viri aulæ innutriti, sine notabili sanitatis detrimento diu vitam egerunt incolorem, donec tandem ob insectum fortunae casum diuturno morore vel graviiori animi perturbatione affecti, tota natura simul & semel cum omnibus functionibus succumbente, confestim in statum cachecticum vix ulla medicina reparabilem coniecti sunt: ut usque eo clare pateat, quantam animi pathemata habeant potentiam, cachymiam viriosam diu latentem in actum deducendi, & in pessimum valetudinis statum convertendi. Curationem quod attinet, quum in nostro aegrotō aetate non adeo multum proveccto propter continuam corporis excitationem nec durittem, vel firmiorem in visceribus obstructionem, nec polyposam in majoribus ramis concretionem suspicarer, ipsumque corpus non adeo pingue sed bene transpirabile deprehenderem, convalescentiae spem promissi, si modo vir generosiss. per aliquot menses strictam cum patientia & obedientia dietam servare accommodatisque uti vellet remediis. Nec conceptam spem seculit eventus; siquidem sub critica materiae viscidæ per urinam evacuatione, quæ in statu cachectico- hydropico semper boni est omnis, symptomata remiserunt, & aeger successu temporis integræ sanitati fuit restitutus.

## OBSERVATIO III.

*Cachexia de-  
sperata  
ab inordi-  
nata  
dieta.*

Vir in quadragesimo ætatis anno constitutus, temperamenti sanguineophlegmatici, texturæ firmioris, qui a primis juventutis annis commestrationibus & poculis diligenter interfuit, maximeque spiritum vini magna in copia hausit; vix ephebus factus copulam inuit conjugalem veneremque strenue exercuit, nihilominus præter ventriculi flatulentiam & febriles insultus incommoda valetudinis nulla unquam sensit. Ante aliquod vero tempus diuturniori afflictus morore subito incurrit difficilem respirationem cum magna virium jactura, pedumque sensim intumescens vacillatione. Succedit subhumidus habitus, faciei pallor, & æstus circa vesperam volaticus, cum insigni oris ariditate & siti stipatus. Præter hæc continui adsunt vomendi conatus ipseque vomitus, quibus tam esculenta, quam potulenta rejicere debet: alvus est aperta, sed flatibus distenta, urina sededit pauca & rubra, sedimentum deponens sat copiosum. Ego sub tam confuso rerum statu de recuperanda valetudine plane desperavi; ut tamen æger levamen quoddam acciperet & ad aliquod adhuc tempus vivus servetur, ab usu medicamentorum abstinere, aerem mutare, & moderata dieta cum animi tranquillitate uti commendavi.

## E P I C R I S I S.

Hanc morbi historiam eo potissimum sine hic inferere placet, ut dilucide appareat, qua ratione per inordinatum vitæ genus natura debilitari & ad graves morbos, qui non statim se exerunt, sed succedentibus demum annis, præsertim graviore animi affectu accedente emergunt, disponi posse. Deinceps sciendum, sub tali corrupto morbi statu tantæque naturæ imbecillitate vix ullam medicamentis, etiam præstantioribus, superesse lo-

cum, sed omne, quod medicus tentare & efficere potest, id temperatis & lenioribus dieteticis debere perfici, quippe quæ optimum ejusmodi ægrotantibus dant levamentum. Graviter itaque errant ii medici, qui adversus tam fonticem morbum multis & validioribus remediis pugnandum esse sibi persuadent.

## OBSERVATIO VI.

Vir generosus, quinquaginta & aliquot annorum, constitutionis sanguineophlegmaticæ animique tranquillioris, lucubrationibus cum vita sedentaria junctis admodum deditus *Cachexia a male curata quartana febribus* & inde a multis jam annis defluxionibus catarrhalibus & rheumatismis cum latente febricula obnoxius, incidit autumnali tempore in febrem quartanam, quæ post sex septemve accessiones electuario quodam ex china china confecto discussa, sed post aliquot tempus bis reversa eodem medicamento prompte debellata fuit. In hujus vero locum successit corporis totius languor, appetitus prostratio, ingens a sumtis cibis præcordiorum compressio, somnus paucus acturbulentus & insigne virium decrementum; quibus demum supervenit cum palpitatione cordis & pulsu intermittente dyspnœa, sub corporis motione & adscensu scalarum molestissima, nec non pedum intumescencia. Quum itaque uxor anxie meum efflagitaret auxilium, ego morbi causa, quam præcedentem quartanam esse augurabar, & ægrotantis naturam probe perspecta, difficilem mox curatum morbum judicavi; suasi tamen, ut præparato prius bene corpore fontes Egranos tepefactos cum congruis tam roborantibus visceralibus, quam laxantibus medicamentis biberet, ob aeris mutationem peregrinationem institueret, & quam rarius antea adhibuerat, sanguinis detractionem, singulis annis quadrantibus admitteret. Sed hisce minus rite observatis, quum alius medicus sine horum reme-  
diorum

diorum ope levamen promitteret, æger non multo post in pejorem statum coniectus, viribus decrefcentibus & lipothymis subinde intercurrentibus, demum succubuit.

## E P I C R I S I S.

Medicamenta febrifuga, quæ inter merito cortex Peruvianus primas tenet, si minus circumspecte sed intempestive, non attenta ægrotantis natura morbiq; causa, nec iusta temporis, ordinis ac doleos ratione habita propinquantur, in pessimum valetudinis statum, & juniores quidem in hypochondriacum, provectiores in cachecticum & hydropicum affectum facile posse conjicere, ego compluribus testari possum exemplis. Hæc quippe medicamina, quæ adstringendo potissimum vim suam exerunt, tegnioris naturæ subjectis, præsertim in quarana ante sufficientem causæ morbificæ correctionem oblata, minimos viscerum meatus, qui sanguinis & seri depurationi servantur, occludendo, visceribus non modo vitiosam inferunt labem, sed & naturalem humorum crasin penitus deturbant, ut subito inde, nisi cito succurratur remediis, irreparabilis status cachecticus in scenam prodeat. In hoc nostro casu suspecta mihi fuit cordis palpitatio, pulsuumque intermissio cum respirandi difficultate, sub paulo validiori corporis motu ingravescentis; quæ symptomata concretionis polyposæ indicium mihi sæpius dederunt certissimum; unde etiam prognosticon non adeo auspiciatum circa hunc affectum proferre potui.

## OBSERVATIO V.

Vir triginta annorum, laxioris & pinguioris corporis habitus, temperamenti sanguineo-phlegmatici, qui hætenus crudo victui largiorique cerevisiæ crassioris potui adsuetus vitam egit sedentariam; autumnali quondam

tempore, quum sub frigidiori aere nudo capite diutius stetisset, febre corripiebatur continua, in qua ob urgentem sitim & aquam & cerevisiam secundariam magna bibebat copia. Convalescebat quidem, sed post aliquot hebdomades afficiebatur profluvio sanguinis ex utraque nare valde immodico & per duodecim fere horas durante. Adhibebantur venæ sectio & alia hoc sine utilissima remedia, sed sine effectu; donec tandem, superveniente lipothymia fluxus sponte cessabat. At vero brevi post facies antea rubicunda & florida suffundebatur pallore, oculi apparebant concavi, pedes semper frigidi & subtamidi a tactu digitorum retinebant foveam, appetitus cum viribus mirum languebat & difficilis sub levi motu aderat respiratio; quæ mala æger expugnaturus meam requirebat opem.

## E P I C R I S I S C U M C U R A T I O N E.

Ex variis subinde causis statum enasci cachecticum, attenta observatione & experientia abunde satis intelligimus. Equidem principalis & proxima hujus mali causa in vigore & robore solidorum, quo circulantur & depurantur fluida, perperito consistit; attamen quæ huic principali progignendæ servantur mediata & occasionales causæ non unius ejusdemque sunt generis. In nostro casu vires solidarum partium destruxisse videtur tum potus in febre & extra ipsam immodice adsumtus, tum nimia sanguinis per effrenem hæmorrhagiam amissio. Non semel enim sed sæpius experiri mihi licuit, homines phlegmaticos & obesos, qui strenui sunt potatores, in hæmorrhagiis & quandoque etiam in paralyticos affectus longe incurere facilius, quam quidem eos, qui calidioris & siccioris sunt temperaturæ, vix aliam ob rationem, quam quod a nimia seri copia facile infarctus sunt viscerum sanguineorum, qui liberio-

Dispositio  
eato in  
abento a  
dupli  
cassa  
oberto.

beriores sanguinis circuitum interci-  
piendo, ejusmodi congectiones & me-  
tastases sanguineas efficiunt. Et inde  
quoque fieri observamus, ut procera  
ejusmodi subjecta a nimia ciborum &  
cerevisiæ ingurgitatione progressu  
temporis macie valde extenuentur &  
demum sub plenaria virium & adpeti-  
tus prostratione in atrophiam lethale-  
m incidant. Si curationem respici-  
mus, frustra omnis est medicina,  
nisi in tempore hi heluones sibi tem-  
perant. Optimam tamen locant ope-  
ram rhabarbarina & elixiria blanda  
stomachica, digestionem roborantia,  
quorum compositionem jam supra in  
ipso curativa methodo docuimus.

## OBSERVATIO VI.

*Chloro-  
sis a  
suppres-  
sione  
mensis.*

Duodeviginti annos nata virgo ge-  
nerosa, cui ante biennium exire pri-  
mum recto ordine coeperunt men-  
strua, sed non multo post, quum ite-  
rato fluxu panem butyraceum calidum  
lacque frigidum adsumsisset, subsi-  
sterunt, varias abhinc incurrit rectæ  
valetudinis lésiones; quales potissi-  
mum sunt, pedum gravitas, mo-  
vendi impotentia, dolor circa præcor-  
dia post sumtum cibum pressorius &  
constringens, tantaque spirandi diffi-  
cultas, ut vix per scalas ascendere  
valeret. Alvus præterea est adstri-  
ctior & flatibus, sinistrum præcipue  
latus distendentibus, turgida, facies  
pallida, pedes sunt tumidi & gelidissi-  
mi, pulsus arteriarum in manibus  
debiles, circa collum contra vehe-  
mentiores; conjunctis simul per in-  
tervallâ capitis doloribus atrocissimis.  
Ut igitur promoveretur, quæ usque  
huc suppressa fuerat mensium fluxio,  
adhibita quidem sunt, cum repetitis  
in pede venesectionibus, medicami-  
na varii generis euporista, sed nullum  
ab omnibus misera tulit levamen. Ne-  
que ferre poterat pediluvia, quamvis  
temperatiora; quippe quorum usum  
mox cordis palpitatio, & leviuscula  
animi defectio insequi videbatur. Qua-

re ut tandem a tantis liberetur malis,  
meum ægotantis mater imploravit  
auxilium, & ut curam vernalem præ-  
scriberem vehementer a me petiit.  
Ego itaque suavis fui, ut primo om-  
nium pedes ægra in perpetuo fervaret  
calore & præmissis eorundem cum  
panno asperiori frictionibus, e vena  
tusa sex minimum cruoris uncias emit-  
teret; post hæc vero per decem dies  
singulo mane hauriat nodulum, talis  
compositionis: Rec. rad. Zedoariæ,  
aristoloch. rotundæ, vincetoxici,  
ana unciam dimidiam, herb. melissæ  
manip. unum, flor. cheiripugill. qua-  
tuor, rhabarb. drachmas sex, folior.  
sennæ sine stipit. limat. martis, ana  
drachmas tres, cinnamomi, anisi  
Bellati ana drachmas duas, cremor.  
tartari unciam dimidiam, passular.  
minor. uncias tres. C. D. S. species pro  
una & dimidia vini mensura. Dein  
elixirium nostrum viscerales ad sexa-  
ginta guttas in prædio assumendum  
obtuli, & denique ut loco cerevisiæ  
secundariæ, cui hætenus adsueverat,  
cerevisiam bene coctam & lupulatam  
biberet, corpusque, quantum fieri  
posset, motu & labore sæpius exerce-  
ret, commendavi.

## EPICRISIS.

Non semel sed frequenter per id  
temporis longinquum spatium, quo  
morborum curationibus vacavi, an-  
notare mihi licuit, a solo pane ex sili-  
gine vel tritico cum vel sine butyro  
inter ipsum menstruum fluxum largiori  
in copia calide comesto pertinacem  
mensium suppressionem una cum do-  
loribus circa scrobiculum cordis pres-  
soriis aliisque pessimis symptomatibus  
fuisse inductam. Cujus quidem pecu-  
liaris effectus hæc videtur ratio, quod  
ob deficientem digestionem & dissolu-  
tionem multæ in prima regione vitio-  
sæ cruditates & inde spasticæ stricturæ  
fuerint concitatæ, quæ ad totum ex-  
cretionis salutiferæ negotium perva-  
rendum sunt validissimæ; ut adeo  
discere



discere liceat, quam caute & provide non modo circa cibos, sed & circa omnium rerum non naturalium usum feminæ, præsertim juniores & sensibiliores sub ipsa menstrua purgatione gerere se debeant. Deinceps & illud dignum est, quod ex præfata morbi historia observetur, pediluvia, alias plæe innoxia, & salutaris in ejusmodi casibus effectus nisi præmissa venæsectione & pedum, qui plerumque frigidi sunt, fomentatione aut frictione, neque calida, neque tepida esse admittenda: cutis enim strictionem augendo, majorem sanguinis ad præcordia reditum inferunt. Denique, ubi a propositis remediis fluxus non revertatur, rectum thermarum Carolinarum usum tam internum quam externum suasi, utpote quæ salutares aquæ ad menses in juvenculis subsistentes revocandos nunquam non deprehenduntur utilisimæ.

## OBSERVATIO VII.

*Chlorosis  
sive  
menstrui  
defectus*

Virgo nobilis, viginti quatuor annorum, sanguineo-cholericæ, a primis adolescentiæ annis valde inordinatum habuit menstruorum successum; siquidem mox per duos menses sanguis plane nullus, mox admodum parca prodit copia. Jam vero dimidia pars anni præterit, quum omnis fluxus expiravit: unde mille malorum origo. Incidit enim optima virgo in chlorosin, sive malum corporis habitum, ex pallido & sublivido faciei colore satis conspicuum, jam anhelose respirat, languore totius corporis, maximeque pedum gravativo afficitur, ciborum fastidio pressa, quæ adsumit alimenta, vomitu rejicit; totumque corpus, esolutis prope viribus, indies magis marcore consumitur. Hæc mala expugnaturus medicus, vomitoriis, laxantibus & calidis pellentibus: emmenagogis hæctenus morbum aggredi fategit, venamque brachii sinistri tuncdecim curavit,

sed tantum abfuit, ut levaminis quicquam attulerit, ut potius rebus in pejus ruentibus, nunc permolesta tussis ægram diu nocturne excruciet, & febriculosa intemperies cum frigore & insequenti æstu, insignem plantis pedum & volis manuum ardorem inducente, aliquoties de die, præsertim circa noctem, invadat. Anum præterea obident hæmorrhoides cœcæ & tumidæ, quæ tanto ardore ac dolore suriunt, ut somnum prope omnem eripiant. In tam misero rerum statu posita virgo generosa petiit a nie majorem in modum, ut ipsi consilio & auxilio succurrerem. Unde ego precibus annuens consilium dedi, ut præmissis per aliquot dies pediluvii, venam in pede secandam, & aliquot cruoris uncias detrahendas curet. Dein ad sanguinis circuitum æqualiorem reddendum tussimque demulcendam præscripti infusum theiforme, quo mane in lecto ad aliquot patellas epoto corpus ad lenem sudorem proliciendum disponere debuit. Post hæc ut ventriculi quoque digestio promoveatur, & cruditates acido-viscidæ corrigantur, elixirium obtuli stomachale balsamicum & loco potus ordinarii decoctum temperatum adsumendum. Ad calorem hecticum internum refrenandum propinavi pulvere leniter nitrosos, item sucum citri vel aurantiorum cum coralliis & matre perlarum infractum, circa tempus somni ex aquis sedativa virtute imbutis, ut cerasus, nigræ, melissæ, flor. tilis, primulæ veris, &c. addita spiritus nitri dulcis & syrupi balsamici portione, capiendum. Denique quum generosam virginem ad iræ adfectum valde proclivem deprehenderem, ab omnibus summo studio abstinere consului, quæ animi tranquillitatem ullo modo possent turbare. Et hæc sunt quæ in præsentis morbi statu accommodata duxi remedia. Quo tamen specialius prospiciatur saluberrimo mensium negotio, nisi aquis medicatis, hoc sine utilisimis utendi copia daretur, circa.

circa eam temporis periodum, quæ alias ferri consuevit menstrua per uterum purgatio, remedia, quæ specificæ quadam mensibus leniter ciendi virtute pollent, adhibenda putavi. E quorum numero præcipue eminent martialia cum aromaticis & balsamicis probe mixta. Ego itaque a longo abhinc tempore summo cum fructu alternis diebus adhibere solitus sum pilulas nostras polychrestas cum pulvere martiali tenuissimo remixtas, itemque tincturam succini probe alcoholisatam & minus spirituosam, frequentius potui inditam. Nec contemnendum pollicentur effectum frictions in partibus inferioribus. circa pubem, ilia, dorsum & pedes cum pannis calidis, præmissa harum partium cum unguento ex oleo liliorum alborum, vel æxungia humana, oleo lavendulæ & juniperi conftrato inunctione, instituit sæpiusque iteratæ.

### EPICRISIS.

Quæ ægram nostram excruciant symptomata, unice a critica illa & saluberissima sanguinis menstrui excretionis suppressæ sua ducunt incunabula. Deficiente enim vel profluxu intercepta talismodi consuetæ fluxione ingentem sanguinis & humorum massa contrahit dyscrasiam & impuritatem, ut nec nutritioni, nec partium corporis nostri functionibus vitalibus & animalibus præesse amplius possit. Quod si itaque a pessimis his malis afflictas feminas liberare debet medicus, opus natiæ omnium est, ut sanguinis utilissima excretio naturali restitutus integritati humorumque massa ab impuris sordibus liberetur; quod tamen non ita facile, ut primo quidem intuitu putatur, perficitur, sed magna adhibenda est cautio, ne imprudenti bonorum remediorum adplicatione malum deterius reddamus, gravioraque accessamus symptomata. Exemplo nobis luculento esse poterit perversa medici in præsentî casu curatio, utpo-

te qui ante quam obstructa & angustata uteri oscula referata humoresque fluxiles & ad excretionem apti facti fuerant ingentem fluidis per emetica, purgantia, venesectionem in brachio & emmenagoga, quæ ex myrrha, croco, aloë & baccis lauri confecta reperi, fluidis introduxit motum, ut adeo non mirum esse debeat, si omnibus in pejorem statum conversis, molestissima tussis cum spirandi angustia & hæctico calore juncta successerit.

### OBSERVATIO VIII.

Equidem non possum, quin candide hoc loco recensent publicæ juris faciam singularem plane & in libris medicorum haud facile obviam morbi cachectici, sive simplicis, sive cum incipiente hydropæ juncti & quacunque ex causa subortu curationem, quæ cum urina vaccarum recenter excepta & loco aquarum mineralium per mensē & ultra singulis diebus mane ad mensuram dimidiam vel unam pota, felici admodum successu instituitur. Viginti jam & quinque estuxere anni, quum mihi, ad valetudinem Potentissimi Regis Prussicæ tuendam, Berolini degenti primum de peculiari hæc cura constitit. Retulit quippe mihi virgo, quæ liberorum informationi vacabat, Gallica, esse ibi feminam itidem natione Gallam, quæ hac methodo vernali & æstivo tempore compures, maxime feminini sexus, ex mensium obstructione, & post puerperium chlorosi & cachexia laborantes, omnibus remediorum generibus nihil proficientibus, pristinæ restituisset sanitati, & ipsa, quæ hæc mihi narrabat, sancta fide adseverabat, se ante annum misere afflictam eadem curatione integram recuperasse sanitatem. Ego hinc paullo magis de nova hæc & profluxu mirabili mestendi methodo sollicitus veritatem percontando ertere diutius insinui. Adduxit itaque, me postulante, præfata virgo plures numero feminas, quæ narrato prius.

Raro  
observa-  
tio de  
morbo  
cachectico  
sive  
chlorosi  
in sa-  
nitate

prius morbo suo statu eodem constanter adhebant, semet ipsas, hausta mane extra urbem in pascua ultra mensis spatium vaccarum urina feliciter fuisse sanatas, & exferre hoc remedii genus suam tam per alvum, quam urinam operationem, qua ciborum adpetentia prae emortua cum viribus mirum resuscitaretur. Tum ego urinam insignem quantitatem mihi adportari iussi & cum ea, quae sequuntur, feci experimenta: bona ejus parte in vasis stanneis super carbones lento calore inspissata, post multos emissos vapores deprehendebam magna flavescens, quod gustu exploratum instar bilis amaricans erat & salsum; affundebam spiritum vini rectificatum, & eni! mox color extrahebatur flavescens; sal remanebat viscositati immixtum, quod medix erat naturae & in aqua solutum saporis terrae foliae tartari non absumilis. Unde collegi, praeclaram hujus remedii virtutem a sale essentiali herbarum, quibus aestivo tempore haec animantia vescuntur, esse deducendam; cujus ope non modo viscerum oppilationes referantur, sed & vitiorum humorum per urinam & alvum promoveretur excretio, ut ideo nihil dubii sit, quin adversus complures morbos medicina sit efficacissima. Posthac hujus remedii usum adhuc commendavi aliquibus, chronicis passionibus afflicti; attamen, quum scitidam hanc medicinam, inausa inde correpti, respuebant, plura circa ejus virtutes tentamina institueri non potui. Interim, quum sub tractanda hac materia rursus in mentem mihi venerit, curioso lectori reticere nolui, hoc tantum commonefaciens: nisi ob squalidum foetorem sola urina sine nausea in usum duci potest, melius fortasse poterit, quando sal ejus, facta evaporatione remanens & in aqua solutum offertur; quod vero, an eundem praestet effectum, aliis experiendum re linquo.

## OBSERVATIO IX.

Femina procera & gracilis, viginti & aliquot annorum semper largum & regularem habuit mensium successum. <sup>Carbo- nio ta- Femina,</sup> Accedit autem aliquando, ut, dum <sup>aguti- Laeth- Adien- sibus</sup> menstrua fluere, vehementi percelleretur terrore; unde mox salutaris haec excretio suppressa per longum <sup>sanatu;</sup> tempus remansit. Varia hinc ingruiebant valetudinis incommoda: lassitudo enim & gravitas membrorum cum lurido faciei adpectu subsequerebatur, parum cibi sumebatur, pedes intomefiebant, caput lancinante dolore satis vehementi quotidie fere afficiebatur, respiratio erat difficilior & febricula quaedam non continua sed erratica, quae nullam servabat periodum, cum magna siti per intervalla invadebat. Ego igitur in consilium adscitus, pulsum in manibus deprehendi valde languidum, qui contra satis vehemens & fortis erat circa collum & tempora; unde brachii venam secandam iussi & sanguinis valde fibrosi educebatur copia. Postea commendavi aquas Laethiadienses, una cum balneo tepido circa vesperam adhibendo, & elixirii nostri visceralis usu bibendas. Intergras tres septimanas durabat haec curatio, praemissa & interposita, ad sordes evacuandas, essentia rhabarbari cum tinctura tartari parata, vel etiam pulvere rhabarbarino cum cremore tartari confecto. Et optime res processerunt: melius enim aegra adpetebat, passilatiq; vires recipiebant, respiratio simul reddita faciliore. Redibant quoque menses circa statum tempus, sed tantum viscidus instar loturæ tarnis liquor parciore effluebat copia; qui tamen essentia succini, myrrhae & croci successu temporis desinebat & sanguis naturalis reddebatur.

## EPICRISIS.

Fontes Lauchstadiensis aquam vehunt puram & subtiliorem, sulphurei odoris, croco martis tenuissimo imbutam; quæ hinc etiam ab injectione gallarum mox purpureum & postea atrum induit colorem. Scripti olim de viribus & proprietatibus horum fontium, quorum ego inventor sum, integrum tractatum, & certa adseverare fide possum, iisdem loco balnei decenter adhibitis atrocissimos dolores, membrorumque contractiones, cum malo isehiadico fuisse sublatas. Interne pariter eximii sunt usus; siquidem cum debito regimine, & sufficienti corporis motu potatæ febres chronicas, asthma\* & sceminarum quoque chlorosin fugant felicissime. Equidem multi, etiam celebriores nostri temporis medici, ex Marte præparata remedia in morbis, ubi viscerum oppilationes & infarctus suspicendi sunt, propter vim majorem adstrictivam solent reformidare, & inter medicamina infida minusque turba referre, quum contra alii, iique non minoris eruditionis & famæ viri, illa ipsa non modo secura & innoxia celebrent, sed & instar panaceæ in hypochondriaco & cachectico malo summe commendent. Verum, ut meam interponam sententiam, nihil ex martialibus damni pertimescendum arbitror, dum modo cum vehiculo satis largo & diluto sumantur & corporis simul jungatur exercitatio. Multo vero minus periculi alunt ipsi fontes, qui tenuæ martialis principium reconduunt, & tenuissimum illud phlogiston elementum ex terræ sinibus imbibunt; quod quidem in dictis Lauchstadiensibus facile deprehenditur, quando hæc aquæ diutius in valis majoribus stagnant. Tum enim crocum deponunt flavum, qui cum æquali salis ammoniaci portione sublimatus flores dat instar croci subtilissimos, fortem & gratum odorem spirantes;

ex quibus cum spiritu vini rectificatissimo tinctura martis flavescens, magis usus, extrahitur pulcherrima.

Venæsectionem quod in brachio celebrandam suaserim, hæc me impulerunt causæ. Nascuntur præcipue hi morbi a nimia sanguinis abundantia, qua universus humorum circuitus & cum eo salutare excretiones retardantur. Quum itaque viderem, in hæc ægrota brachii venas sanguine esse turgidas & respirationem, ob sanguinem ad pectus congestum, difficiliorem, in superius partibus, quia inferiores id ipsum prohibebant, venam aperiri iussi; maxime quum meminerim, jam olim Hippocratem in statu cachectico & hydropico venæsectionem libere dixit acutor. his verbis commendasse. *Si difficulter spiraveris hydropicus (anasarcoideus) & tempus verum fuerit, & simul atas viguerit, & virium robur adsit, de brachio sanguinem detrabere oportet.*

## OBSERVATIO X.

Dum hæc scribo, incidit in manus *statum* peculiaris de tumore pedis *oedemato-* *cach-* *etiam* *perpetua* *et afflu-* *tus.* retro pulso casus, quem cum benevolo lectore communicare operæ existimo pretium. Est scilicet virgo generosa, viginti annos nata, habitu corporis laxiori animoque sensibiliiori prædita, quæ ante annum pedum laboravit oedemate; ad quod abigendum quum ex medici consilio cerussam exterius applicasset & pediluvia quoque cum thermis Hirschbergenfis per sex hebdomades adhibuisset, evanuit quidem tumor, sed in ejus locum circa instans mensium tempus atrocissimi capitis & dorsi dolores cordisque anxietates cum insigni pedum frigore corporisque universi languore junctæ successerunt: quæ pessima symptomata redeunt menstrua periodo ita ingravescabant, ut ægra motibus spasmodicis agitari & præ nimia pectoris constrictione asthma convulsivo affligi videretur. Advocatus medi-

medicus venæsectionem commendabat, quæ tamen ob nimiam vasorum exilitatem & constrictionem in pede celebrari minus poterat, sed in pollice ejus institui debebat; unde sanguinis valde spissi & sere congrumati larga exprimebatur potius, quam effluebat copia. Tum quidem per tempus mitiores videbantur accessiones, sed non multo post, prævia levi iracundia, malum redibat ferocius & nunc instat febris, aliquot de die recurrendo, certos format paroxysmos, qui visu sunt horrendi: namque generosa insomniis quasi perterrita vehementer expavescit, oculi clauduntur, loquendi potentia perit, brachia manusque attolluntur, jactantur, variisque modis diltrahuntur, dentibus stridet, spiritum instar morientium frigidum emittit, pedes refrigescunt, labia rigore concussa tremunt & colore livido adparent, totumque corpus hinc inde agitur & mox antrorsum, mox retrorsum movetur. Tandem elapso horæ spatio hæc omnia remittunt, remanentibus præcordiorum angore, cephalalgia, inquietudine & lassitudine. Ceterum notandum, alvum plerumque esse pigram & vix semel intra tres quatuorve dies deponi, mensiumque negotium consueto tempore rite succedere. Medicus ordinarius latentem purpuram tantorum malorum causam reputans hætenus pulveres solares & sic dictos nigros Hallenses cum essentia dulci concentrata magna in copia obtulit, sed sine omni effectu. Alius igitur arcessit medicinz peritus, qui liquorem anodynum interne dedit & externe membra balsamo vitæ inungi jussit cum insigni mali levamine. Sed quum prior his sepositis medicamina solaria denuo adhiberet, mox pristina ingruebant symptomata.

# EPICRISIS CUM CONSILIO.

\* Præfata morbi historia licet strictius sumta ad præsentem tractationem minus pertinere videatur, seracissima tamen est cautionum utilissimarum, quæ optime nos admonent, quam caute tumor cachecticus externis remediis debeat tractari, nisi ægrotantes in grave præcipitare periculum velimus. Dignum autem inprimis est, quod probe animadvertatur, imprudenti balneorum, maxime nimis calidorum usu tumorem pedum evanuisse longeque pejora accessisse symptomata; quod mihi quidem sæpissime in praxi annotare licuit. Etenim serum illud acre & impurum, quod in pedibus stagnat, ubi inducta ipsis structura, a venis resorptum ad partes nobiliores pellitur, has ipsas præter naturam afficiendo, ad spasmodicas sollicitat agitationes, quæ in nostra ægrotamiras luserunt tragedias.

Quam curandi scopo medicus adhibuit venæsectionem præservationis loco debuisset administrare. Interim plenius exinde de summa infernarum partium constrictione convincimur, quæ tanta fuit, ut phlebotomo locum vix reliquerit. Quod porro attinet curationem per concentratiora medicamina, quæ in parcissima dosi data magnam edunt efficaciam, ut sere sunt pulveres solares & ejusdem farinae alia remedia, hæc jure meritoque videtur taxanda. Nihil enim est deterius, quam cutis spiraculis occlusis alvoque obstructa, calidioribus maffamque humorum exagitantibus medicamentis uti, & quod noxium in corpore hæret, ad ejus peripheriam cum impetu propellere velle. Quæ perversa methodo nihil profecto aliud efficitur, quam ut anxietates augeantur singulaque exacerbentur symptomata. Multo magis tum eam oportet esse medentis intentionem, ut in paroxysmo violentos motus sopiat

P &

& quæ huic extra paroxysmum occasionem præbent causas apte præcindat. Quo scopo præter clysteres emollientes & oleosos, pulveres leniter antispasmodici nitrosi & cinabarini, nec non liquor noster anodynus cum essentia castorei maritatus, qui specifica quadam effrenet motus compescendi efficacia pollet, summam merentur commendationem. Neque sua laude carent remedia externa, quæ inter emioent olea nervina rutæ, lavendulæ, majoranæ, nueistæ &c. admixtione axungiarum temperata & in linimenti formam redacta spinæque dorsii, nuclæ & pectori inuncta. Quo etiam pertinent frictiones pedum, ad spasmos eorum relaxandos frigidique debellandum.

Plures casus legantur in Responsis & Consultat. nostris medicis. Tom. II. Sect. III. Caf. LXI. usque ad LXV. item Sect. IV. Caf. CLXXXII.

## ·CAPUT XIV.

### DE HYDROPE.

#### THÈSES PATHOLOGICÆ.

##### §. I.

Triest  
piom  
hyd-  
pu est  
caus-  
ula.

**C**achexiam proximum esse ad hydropem gradum, constans antiquiorum medicorum fuit assertio, qui inde in suis de re medica monumentis post cachexiam statim de hydropo agere consueverunt. Nullus autem ex omnibus utriusque affectus consensum rectius agnovit, ipso ARETÆO, qui lib. IV. cap. I. hæc egregia proferit: *hydrops in viscere primario delitescens totum corpus in malum habitum convertit, nullaque est pars noxa carent.* Neque enim in inferiore ventre fluctuans humidum hydropem nuncupamus; quandoquidem neque ibi vitium est, sed quum morbum consequitur tumor, inflatio, coloris sadi-

tas, iste in aquam colliguans habitus hydrops est & appellatur. Nam tametsi nonnunquam foras sponte aqua prorumpit, aut aliquis præcordia rescindens effundit, adhuc in sede sua permanet hydrops. Princeps itaque causa malus habitus est, sive cachexia. Quibus verbis optimus hic ex antiquissimis auctor clarissime innuit, morbum primarium esse malum corporis habitum, cuius symptoma potius & effectus sit tumor aquosus; eo quod hoc cessante morbus nihilominus permaneret. Et in sequentibus ita pergit: *Anasarca laborantes colore ex atro viridique permixto infecti sunt, obscurasque & nigras venas habent.* Quæ signa admodum etiam communia sunt cachexia adfectis. Accedit deinceps & hoc, quod ab iisdem causis, quæ malum ingenerant cachexicum, quas ex CÆLIO AURELIANO in superiori capite descripsimus, hydrops quoque originem ducat, id quod auctores confirmant, ipsaque experientia, optima rerum magistra, abunde satis corroborat.

##### §. II.

Quum itaque cachexia morbus cum hydropo tam ærtam habeat affinitatem, ut iste hujus causa ac fundamentum recte dici possit ac debeat, non possumus, quin omnibus rite comparatis, in speciali hydropis notione suppedianda, ipsum valde depravatam corporis, quoad omnes partes & functiones suas, habitum dicamus, cum insigni & præternaturali humoris serosi, aut in toto corpore, aut in certis ejusdem cavitatibus, stagnatione & collectione conjunctum.

##### §. III.

Functiones nostri corporis tam vitales, quam naturales & animales in hydropo valde esse vitatas atque læsas, signa, quibus sese prodit truculentus hic morbus, & quæ optime collegit ARETÆUS loc. cit. testatam faciunt luculentissime: *Omnibus, inquit, inest pallor, spirationis difficul-*

tas,

tas, suffis; diverſis temporibus ſegnes ſunt, pigritia multa, a cibo abalienatio: & ſi aliquid adſumant, quamvis medicum & ſanum carens, nihilominus valde inflantur, diſtentiones patiuntur, citra madorem eorum corpus eſt, ideoque neque in balneis ſudore mafeſcunt. Præterea albi ſunt & effæminati; ſomni ſunt graves, torpentes, breves, animi deliquium, circa minima quæque ſollicitudo, vivendi cupiditas.

## §. IV.

Equidem hydrops a primis fere artibus noſtræ rudimentis in tres ſpecies, anafarcam, aſcitem & tympanitidem diviſus atque anafarca dictus fuit, quando totum corpus tumore obſeſſum eſt, aſcites, ubi abdomen turget & intra ejus cavitatem ſtagnans lymphæ viſcera inundat, tympanites, ubi abdomen non molle, ut digitorum veſtigia imprimi poſſint, ſed valde inflatum ac durum comparet; ipſe tamen ARETÆUS quartam addit & inter anafarcam ac leucophlegmatiam aliquam conſtituit differentiam, exiſtens: in utraque hac hydropis ſpecie tumidam quidem faciem & brachia eſſe, & in leucophlegmatia, ubi pituita redundaret, non minus quam in anafarca omne corpus impleri, atque partes tam ſuperiores quam inferiores cum ipſis mammis intumefcere, quod in illis poſſimum contingeret, qui juvenes robuſti in ætatis proſpera fortuna conſiſterent: at in hydropo, anafarca dicto, carnem in ſucco ſanoſam quaſi colliqueſcere, qualis a membris graviter contuſis effunditur. Dein quoque leucophlegmatiam, majorem hydropis ſpeciem curatuque faciliorem habendam eſſe ſtatuit, quoniam variæ ejus tollendæ ſint proſperæ occaſiones, ut ſudoris, lotii excretionis, aut alvi nonnunquam copioſo effluvio; quum contra in reliquis ſpeciebus, præſertim ſi mixtæ ſint, medicus totum hominem permutare debeat, ſi ipſas curare velit. Qua peculiari & extremè in præxi medica ulus di-

ferentia illud maxime diſertiffimus hic auctor indicaffe videtur, in leucophlegmatia quidem periode ac in anafarca aquam copioſe inter cutem ſtagnare, ſed in hoc ſanguinem ſimul, quo carnes nutriuntur, valde eſſe corruptum, adeoque vitium longe ſubefſe gravius. Multo vero adhuc evidentius elegantem hanc diſtinctionem in eodem capite deſcribit hunc in modum: aqua inter cutem nonnunquam a copioſo frigido potu continuo provenit, quum præ nimia ſiti ad ſaturitatem quiſpiam multam aquam gelidam ingurgitaverit, poſtea humidum in peritonæum delatum ſit, atque inde in ventribus calor refrigeratus fuerit. Deinde in illa guſta effluunt, qua prius in ærem verſa per tranſpirationem diſſeuebantur. Id igitur ſi incidit, facilior eſt hujus morbi curatio, ante quam viſcus aliquod, aut totus homo adſectus ſit.

## §. V.

Quod ſi meam proſiteri licet ſententiam, ego rei veritate & experientia convictus non poſſum non ARETÆO adſentiri, quod leucophlegmatia levior ſit ſpecies, facilioremque recipiat ſanationem quam anafarca. Equidem illa communiter a noſtri ævi medicis cum hac ſolet confundi; quum tamen jam a CÆLIO AURELIANO ſapientiusque laudato ARETÆO aqua intercus vocetur, quoniam inter ipſas pinguedinis cellulas aqua collecta ſtagnat & hinc colorem pallidum inducit: quum e contrario in anafarca, ſive hypofarca, ob majorem ſanguinis quam in ipſa leucophlegmatia corruptionem, color carnis & cutis magis depravatus & ex atro virideſcens adpareat, manifeſto indicio, quæ ſanguificationi humorumque depurationi inſerviunt viſcera, ut ſunt pulmones, hepar & renes, nimis laxitatis vel inſarctus vitio laborare, & ad ſunctiones ſecundum naturam peragendas minus eſſe idoneas. Quando itaque leucophlegmatia cum anafarca juncta eſt, jam gravior hydropis ſpecies emergit, quum leucophlegmatia

Hydro-  
pit/spa-  
cies  
ſunt.

1) leu-  
cophleg-  
matia  
& anafar-  
ca.

De hiſce  
ſpecie-  
bus jam  
dictum.

initium, anasarca vero augmentum præbeat.

## §. VI.

*a.) scilicet.* Longe vero deterior & prope insanabilis ea hydropis species est, quæ ascites vocatur, cujus signa optime notavit ARETÆUS, dum loc. citat. *in ilibus*, inquit, *tumorem, in pedibus inflationem videre licet, facies, hyrachia, & reliqua exilia cernuntur: intumescunt testes, præputium & totus colis ob inequalitatem tumoris tortuosus est. In corporis ad alterutrum latus conversionibus humor in locum declivem & tumorem & fluctuationem facit, fluctuantisque liquoris sonitus exaudiri.* Ex quibus colligi licet, ingentem lymphæ ob vasa lymphatica vel hydatides disruptas esse extravasationem viscerum inundationem, quæ hæc ipsa temporis successu in plenariam abeunt corruptionem.

## §. VII.

*b.) tympanitis.* Quoad illam speciem, quæ tympanitis, itemque hydrops siccus appellari solet, ubi abdomen valde tensum & inflatum ad palmæ percussum instar tympani edit sonum, sciendum est, eam symptoma potius anasarcæ & ascitis, quam certam hydropis speciem esse dicendam. Hæc vero si jungitur, ut sæpe plerumque in ascite evenit, pessimum & incurabilem denotat statum, qui vel a flatibus intra intestina coercitis, vel a vapore, ex aqua in abdomine extravasata exhalato oriundus abdominis mufculos ita a tono suo dejecit, ut penitus elanguescant.

## §. VIII.

*in Anasarca morbi.* Ut autem plenius adhuc rectiusque de gravissimi nostri morbi natura indoleque pateat, operæ erit pretium, ejusdem initia pariter ac incrementa cum symptomatibus rite exponere, quæ ita se habent. Primo tumor occupat pedes, qui succedente tempore ad femora, inguina, nia, abdomen & ad scrobiculum usque cordis pertingit. Interdum venter aqua turgidus na preminet, ut pedes vix cerni queant & abdominis ruptura sit me-

tuennda. Progressu temporis aqua in scrotum quoque descendit, illudque sæpe ad capitis magnitudinem inflat. Neque scrotum solum, verum ipse etiam penis cum præputio ita intumesceat, ut intorquetur lotique excretioni injiciatur remora. Ubi manifestò deprehenditur, aquam, quæ penem distendit, ex vicina inguinis regione cutim inter & carnem penis sese insinuare; contra vero, quæ scrotum in tumorem elevat, plerumque ex abdomine per peritonæi processus delabi. Aliquando tamen etiam, maxime in leucophlegmatia & anasarca laborantibus evenit, ut aquosus humor in partibus circa inguina collectus sub communibus testiculorum integumentis se inferens tumoris in scroto causa existat, abdomine aqua prorsus vacuo. Neque tamen in omnibus hydropicis scrotum tumorem concipit, sed quosdam eorum sine omni ejus intumescencia demortuos novi. In feminis inguina similiter tumida fiunt, & ipsa uteri vagina ab aqua sæpe elongatur, ut procidat. Dein commune hydropicorum symptoma est dyspnœa quæ post vehementiorem corporis motum & noctu potissimum exacerbata, ob facilem aquæ abdominalis sub situ decliviori adscensum, suffocationis metum subinde minatur; unde, si liberius respirare miseri volunt, corpus mox elevare & in lecto potius erecti sedere, quam decumbere coguntur. Mirum quoque vexat tussis, sicca ut plurimum & nonnisi iane tussendi desiderium mentiens, dum acris fassaque lymphæ, in univervo corpore peccans laryngis præsertim & bronchiorum fibrillas membranaceas stimulat, irritat, convellit.

## §. IX.

Posthæc notabile est, in anasarca urinam mingi tenuem & albam, in ascite paucam & crassam, cum copioso sedimento rubro lateritio. Potius quoque urinæ quantitas inter initia hydropis ut plurimum respondet, alvus laxa est & corporum adpetentia bona; quæ

*Caustica  
Anasarca  
morbi  
in Anasarca.*



quæ tamen omnia ingravescente malo deficiunt. Urget præterea inexhausta & clamosa sitis, de qua recte cecinit Poeta: *quo plus sunt pota, plus sitiuntur aqua*. Jungitur autem hæc nimia potandi cupiditas ob hæc potissimum rationes: tum quod salivæ latex ob glandulas salivales obstructas deficiens fauces aridas irrorare amplius non potest, tum quod ea, quæ adfluit saliva viscida salsaque est, & ab æstu febrili mox exsiccat. Febris enim in peiori morbi statu nunquam fere non adiungitur lenta atque continua, ex pulsu, qui parvus fertur & crebrior, satius conspicua, quæ carnem supernarum partium una cum viribus sensim paulatimque depascens mortem denique procurat. Deinceps in anasarca æque ac ascite insignis sæpe pruritus in partibus pedum membranaceis percipitur & pedes quoque maculis lividis & vesiculis observantur obstiti, ex quibus apertis serum effluit sua acredine partes rodens, vel etiam inflammans, unde non raro prodeunt mali moris ulcera, quæ teste Hippocrate lib. VI. aph. VIII. difficulter sanescunt & consolidantur; utpote adfluxus acris seri major est ac copiosior, quam ut remediis lenientibus & exsiccantibus possit mitigari. Atque huic speciei hydropis præcipue adsociatur febris, quæ ab inflammatione intestinelorum, præsertim per drastica remedia inducta, originem trahit, cui horror demum & rigor superveniens sphacelosa & funestæ viscerum corruptionis præbet indicium.

## §. X.

*sectio  
anatomica  
hydropis  
demortuorum.*

His ita expositis progrediendum nunc erit ad ea, quæ sectio hydropis demortuorum nobis sistit perlustranda. Et primo quidem, quod hepatis viscus attinet, ex M. N. C. & BONE. TI *sepalchreto* aliisque anatomicorum libris constat, illud plerumque morbidum fuisse repertum, & nunc quidem pallidum & fere exsangue, nunc tumidum & atrum, tensum, scirrhum hydatidibusque repletum, cum

vesicula fellis, materiam aut aqueam & minus amaram, aut spissam & in calculos concretam continente. Speciatim vero hepar in junioribus in globum quasi contractum & induratum; ut sub cultri incisione strepitum ediderit, & in tympanitide aridum & instar corii corrugati torrefactum se annotasse referunt HORSTIUS lib. III. obs. 9. & TULPIUS lib. II. cap. 36. Licet contra varia apud RUYSCHIIUM in observat. & BONETUM in lib. cit. proferant exempla, ubi hoc viscus sine omni labe adparuit sanum: quod itidem RIVERIUS in observat. communis. IV. testari videtur, qui in hydro-pico quodam, hepate satis bene constituto, solum lienem reperit corruptum & totam fere ipsius substantiam bili atræ similem. Deinde, quoad reliqua viscera notandum occurrit, omentum in dissectis ascite defunctis ut plurimum inveniri corruptum & sphacelatam, vel plane extenuatum & absumptum, pancreas scirrhum, & mesenterium, ob vesicas, quibus interius obsideri solet, aqua repletas & glandulas ad fabæ magnitudinem tumefactas, in magnam molem excreta, quæ de re notabilis casus existat apud TULPIUM lib. IV. cap. 35. Neque intestina cum ventriculo relinquuntur immunia, sed ista observavi inflammata, siderata & corrosa. In tympanitide ipsa æque ac abdominis cavum multis statibus vidi turgida, quales observationes etiam commemorarunt Felix PLATERUSTIUS lib. III. prax. cap. III. obs. 50. & HERCULES SAXONIA in prælect. præf. part. II. cap. 27. De ventriculo autem notatu dignum est phænomenon, quod interior ejus tunica nodis globosis, parvas avellanas magnitudine adæquantibus tota sit obstita, qui nihil aliud esse videntur, quam exigui illi in statu naturali mihiæres vel annulares glandulæ, quæ alias tunicæ huic villosæ eo latere, quo nervæ adnexa est, interspersæ cernuntur.

## §. XI.

Cor-  
neque  
fistula  
hydropoe

Neque tantum imi ventris viscera male sunt adfecta, verum etiam observatione quam maxime dignum est, quod frequentissime in hydropoe, sive sit abdominis, sive pectoris, cor, præsertim quoad dextræ ventriculi capacitatem ingentis & plane mirificæ deprehendatur magnitudinis, ita ut ego in duobus subjectis illud instar bovini conspexerim. Qua de re consuli etiam possunt M.N.C. Dec. I. ann. V. obs. 64. item BARTHOLINUS Cent. II. hist. 66. Deinde si meam ipsius experientiam licet proferre, ego plena fide testari possum, omnes tere, quos secundos curavi hydropicos, præter viscera male constituta polypola in corde ejusque vasis habuisse concreta. Id quod etiam plures aliorum observationes confirmant, ex quibus memoratu digna est, quæ in M. N. C. Dec. II. ann. V. obs. 66. descripta legitur, ubi in anasarca demortuo intestina, omentum, pancreas, hepar, & lien sine omni vitio fuerant vili; in dextro autem cordis ventriculo polypus inventus, qualis etiam venam cavam & arteriam pulmonalem occupavit, ut ideo æger superstes de ruptura cordis in dextro latere conquerendi causam habuerit gravissimam. Et eadem Acta Cent. IX. obs. 50. referunt anomen hydropicæ, in cujus dextro cordis ventriculo polypus ad quadrantem ulnæ partem longus & in arteriam pulmonalem protensus fuit annotatus: ut silentio præteream complura alia, quæ de eadem re Cent. III. obser. 117. Cent. VIII. obser. 41. item Dec. II. ann. VI. obser. 73. leguntur exempla; hoc tantum adjiciens, ubi cordis vasa polypolis concretionibus sunt repleta, ibi plerumque ingentem feri in thoracis cavitate effusi observari copiam.

## §. XII.

Quod ad serum intra cavitates collectum attinet, hoc ratione copix, coloris & consistentiæ solet esse diversum. Interdum enim instar aquæ valde est dilutum, spissiusculum tamen

& igni impositum in gelatinam concrevit, interdum flavum & loturæ carnis non abimile. Quantitatem si dispicimus, hæc itidem pro corporis amplitudine morbiq; diuturnitate admodum est diversa; siquidem quandoque triginta, quandoque sexaginta, imo centum adæquat libras. Continetur autem hujus aquæ plurima pars in cavitate abdominis, vel intra peritonæum & musculos abdominis; nonnunquam tamen etiam in duplicatura peritonæi formato ibi sacco inclusam eam contineri fidem faciunt observationes, quas inter notabilis est Cl. LITRIS, quæ in *Memoire de l'Academie des sciences*. Paris ann. 1707. legitur.

## §. XIII.

Explicatis sic satis dilucide phænomenis, quæ in dissectis hydropoe de-  
*Ratio tumoris hydrophi.*  
mortuis solent observari, sequitur jam, ut dispiciamus, quænam sint præcipuæ & proximæ inundationis aquarum in gravissimo hoc morbo causæ. Equidem veteres, quibus naturalis machinæ nostræ constitutio hydraulica, inque primis circularis humorum progressus fuit incognitus, læsam in hepate male adfecto sanguificationem & sanguinis in aquam conversionem accusarunt; nostro autem tempore, quo structura corporis humani motuumque vitalium œconomia clarius fuit detecta, longe rectius hæc causæ possunt demonstrari. Vix autem melior tumoris hydropici causa, me iudice, poterit allegari, quam circularis sanguinis per venas motus & progressus valde difficilis, tardus & variis ex causis præpeditus. Quam quidem adserptionem experimentum a Clar. anatomico LOWERO primum, quod scio, institutum comprobatur clari-  
*Ratio tumoris hydrophi.*  
ssime. Hic enim in vivo animali venam aliquam majorem filo constrinxit idque vinculum per horam reliquit & protinus tumorem œdematosum in illa parte, qua rami ad venam excurrunt, animadvertit. Simile quid conspicitur, quando ad enormes hæmorrhagias sistendas instrumentum venas valde

valde comprimens, quod nomine Tournequet venit, adplicatur. Quod si enim diutius relinquatur, in tumorem successive pars attollitur. Huc quoque illud pertinet experimentum, quum in homine mortuo vena subclavia, v.g. manus dextræ, fortiter stringitur & postea cum siphone in venam manus apertam rubicundus, paulo spissior liquor injicitur. Namque tum brachium intumescit, eoque aperto observamus in cellulas pinguedinosas sub cute miram ejus penetrasse copiam, vix aliam ob causam, quam quod propter positum obstaculum liquor injectus venas, quæ per adiposum panniculum transeunt, nimium distenderit, atque tandem per earum poros extravasatus fuerit.

## §. XIV.

Enimvero nullus dubito, quin ex dictis experimentis abunde satis pateat, nimiam corporis in hydropo intumescere & separationis feri a sanguine ejusque intracavitates & interstitia stagnationis veram causam esse retardatum sanguinis, per venas maxime, transitum. Attamen longe adhuc clarius adferri hujus patebit veritas, si perpendere velimus, quam facile & expeditum sit, ut sanguis in suo per venarum systema circuitu silatur; idque potissimum has ob rationes. Nam primo sanguinis per venas regressus a partibus inferioribus ad superiores, ob situm perpendicularem, secundum naturæ ordinem multis modis est tardior, quam in arteriis; unde etiam sit, ut venæ non modo numerum, sed etiam diametrum arteriarum longe multumque superent. Deinde venarum tunica non tanta vi systolica & motrice elastica præditæ sunt quam arteriæ. Quibus demum accedit, quod venæ tenerioribus valdeque porosis instructæ sint tunicis, per quas tenue liquidum facile potest transire. Quod si itaque accidit, ut ob nimiam serosi humoris in corpore humano copiam tonus & robur vasorum, maximeque venarum propter

nimiam distensionem magis infringatur atque debilitetur; non potest non per univrsum corpus vitalis sanguinis circulus, qui omnibus functionibus præest, easque in integritate conservat, valde languescere atque immui; quod etiam ex pulsu, qui rarus, mollis ac debilis est, aperte cognoscitur. Ex hoc fundamento non modo præternaturalis intumescentiæ, sed reliquorum quoque cum hydropo complicatorum symptomatum, ut lassitudinis, gravitatis corporis, pigritiæ, nec non salutarium per cutim, renes, & alvum excretionum immixturarum vera deducenda venit ratio.

## §. XV.

At vero, præter hæc perpetuum <sup>Ratio</sup> fere omnis hydropis accidens est in- <sup>Symptom</sup> gens spirandi difficultas, suffocatio- <sup>malum</sup> nis metum subinde incutiens, quæ itidem vix aliam agnoscit causam, quam quod ob vim cordis & vasorum imminutam systolicam sanguis viscido ferro refertus per minimas & angustissimas arteriæ & venæ pulmonalis ramificationes non satis libere, nec sufficienter possit transmitti; unde in illis stagnat & facta ad cordis dextrum ventriculū regurgitatione miras parit anxietates. Et quum præcipua pulmonis functio in eo consistat, ut, si per minima & copiosissima vesiculorū ejus substantiæ vascula sanguis trajicitur, lymphæ & chylus cum ejus partibus intime misceantur aerisque subtiliori elastica imbuantur substantia, ut inde spirituosus, fluidus & ad conciliandas corpori vires idoneus evadat cruor vitalis; recte omnino colligitur, difficiliorem sanguinis per pulmones progressum gravium accidentium esse causam. Nam læditur exinde univrsū sanguificationis negotium & loco sanguinis floridi, fluidi ac temperati vasa copioso ferro repleantur & infarciuntur necesse est. Longe vero deterior status est, ubi jam polyporæ concretiones vasū pulmonum & cordis majoribus inhaerent. Hac enim ratione non modo sanguis per cordis &

quæ am-  
plius  
expedit.  
tur.

pulmonum meatus in cursu suo præpeditur, ibique stagnans varia parit incommoda, verum etiam in totius venæ cavæ systemate omnibusque partibus, ad quas hæc vena pertingit, subsistere incipit; unde ingens liquidi ferrosi contingit secessio. Quo difficilior autem est, ejusmodi altius corpori impactum repagulum artis ope tollere, eo facilius est judicatu, eam hydropis speciem, quæ tali fundamento nitur, pessimæ esse iudolis difficillimæque sanationis.

## §. XVI.

Hæc de leucophlegmatæ & anasarca generatione dicta sunt. Quod vero ad genesis ascitis attinet, ego confidenter adserere haud dubitaverim, hepar maxime in hac hydropis specie præter naturam esse affectum & male constitutum, utpote quum in nullo æque viscere ac in hoc ipso tam difficilis est sanguinis progressus ac circulatio. Et licet successoria hepatis a diaphragmate sub respirationis actu commotio, ipsumque robur tunicarum, quibus venam portæ instructam esse ex anatome novimus, sanguinis cursum haud leviter videatur adjuvare; nihilo tamen minus, quando cruor lentescens adpellitur, dicta vena portæ, & pulsu & valvulis destituta, eundem per innumeros venæ cavæ canaliculos difficulter transmittit; unde haud levis ad stagnationem & infarctum sit dispositio. Cui si accedit ob præciorum potum, vitam sedentariam, ingestaliberalius acidæ & vini spiritus abusus, aut propter hæmorrhagias vel febres per adstringentia præpositæ curatæ, sanguinis & lymphæ lentor ac redundantia, vel etiam ob multas animi ægritudines morbosque prægressos ipsius hepatis ejusque vasorum aconia; vasa utique cento certius infarciuntur & sublata. proportionem ad motum, sanguis segniter trajectus hinc inde in canalium alveis stagnat ejusque aquosa pars secreta lymphatica vasa, magna in copia ibi sua, implet. Porro etiam lentescens lymphæ præterna-

turalis spissitudo ejus per hepar circumtum modo leviores modo graviorem remoratur. Quodsi autem paullo spissior a sanguine secedens lymphæ in hepate obhærescit, & dissipata fluidiore parte, ad majorem orassitudinis gradum redigitur, tunica vitalis illius visceris crassescunt & indurantur tandemque in scirrhus abeunt, ita tamen, ut induratio magis intimiora occupet, scirrhus vero in exteriori parte membranacea valisque extimis obhærescat. Præcipuam itaque ascitis sedem esse hepar, cadaverum sectiones supra adductæ satis faciunt demonstratum.

## §. XVII.

Verum enim vero, præter hepar reliqua abdomini viscera non sunt ab omni labe remota. Lien enim sæpe abdominis extra ordinem magnus, atro sanguine refertus & scirrhusa membrana obductus, RIVERIO, SCHENCKIO, FORESTO & autopsia teste invenitur. Pancreas, secundum RONDELETIUM atque PEJERUM in observ. anat. in omnibus fere hydropicis diffectis durum & scirrhusum, quin interdum totum absuntum deprehenditur. Omentum putridum & emaciatum, glandulæ mesenterii, intestinorum, duodeni & ventriculi præter naturam constitutæ, tumidæ & induratæ conspiciuntur. Quodsi igitur meam de hisce phænomenis sententiam proferre licet, ego quidem arbitror, hæc abdominis jam relata viscera labem suam ac vitium simili modo a præternaturali hepatis constitutione & impedito sanguinis per ejus vasa circuitu unice contrahere; idque potissimum propter intimiorem horum vasorum consensum & communionem. Etenim notum ex anatomis est, omnem sanguinem, qui ex ventriculo, fistula intestinali, mesenterio, pancreate, omento & liene regreditur, in venam portæ abire & hac mediantem per mere vasculosum hepatis viscus ad venam cavam ipsiisque cor transmitti, debere. Quodsi itaque ibi præ-

Etiam  
quorum  
abdomi-  
nalis  
scirrhus  
labo.

præ-

progressivus & orbicularis motus sistitur, necesse omnino est, ut sanguis ad dicta abdominis viscera regurgitans ibi stagnationem, infarctum, scirrhecentiam & corruptionem causetur.

## §. XVIII.

Hydropis  
plurimorum  
generum  
signa.

Quoniam per uteri, maximeque spermaticae vasa, quæ in varios cincinnos, pampinos vitium æmulantes, contortos implicatosque divaricantur, difficilior & valde tardus est sanguinis regressus, adeoque longissimum ad vitalem cordis fontem iter, fit omnino, ut in utero & connexis ipsi partibus, tubis nempe & ovariis, copiosæ interdum feri inundationes & tumores aquosioresiantur. Nunquam enim citius & promptius fluida & aquosa pars a sanguine secedit, quam ubi lentior minulque expeditus ejus per viscera transitus est, quemadmodum id clare patet in hepate; & ob hanc etiam causam non facile numerosiora, quam in hepatis ac uteri substantia & adjacentibus ei partibus vasa reperies lymphatica, quæ a largiori decubitu & adfluxu lymphæ distenta, magnas in vesicas, quæ hydatides Græcis dicuntur, explicantur, quibus demum disruptis nonnunquam subito hydrops gignitur & mira feri quantitas effusa cavitatem abdominis occupat. Ita permultas hydatides in uteri confiniis post partum difficilem reperit SALMUTHUS *cent. I. obser. 38.* & in hysterica femina gravida dissecta PECHLINUS *obser. 19.* In cornubus ac tubis uteri ingentem aquæ copiam nonnunquam colligi, fidem facit TULPIUS *obser. k. IV. obser. 45.* exemplo femine, quæ in utroque uteri cornu novem circiter aquæ purisque libras inclusas innumeris vesicis gestavit. Plura ejusmodi exempla vide apud SCHENCKIUM *I. III. obser. 6. 7.* & ROLFINKIUM *de organ. genital. cap. 20.* nec non SYDENHAM *de hydropse.* Eandem quoque in rem apprimè facit HARDERI observatio, perhibentis: in femina rustica

reperit esse non solum ovarium sinistrum aquæ subsalsæ & scærentis libris duabus oppletum, sed letiam annexam eidem tubam Fallopiam notabili hydatide obfessam. Et nosmet ipsi ante viginti annos ex gravi in hypogastrica regionem lapsu annotavimus in quadragenaria subortam ibi intumescientiam cum dolore tensivo, quam aquæ limpide largum profluvium cum sanguine menses primo prodirens excepit, quod postea etiam cessante sanguinis stillicidio per anni dimidium continuavit, ita, ut quotidie minimum libra una efflueret, donec ægra, incassum adhibitis variis medicamentum generibus, tabe lentaque febre penitus confecta obdormisceret.

## §. XIX.

Neque etiam adeo insolens sed aliquoties a me observatum est, sub gravidatione simul occurrere hydropem; & hinc fit, ut sæpius medicis in dijudicanda graviditate fallantur. Vidimus vero ejusmodi feminas gravidas hydropse simul laborantes post partum copiosioris effluxu servatas; alias autem interiisse, humore scilicet in cavum abdominis jam effuso. Inprimis memoratu dignum est, quod PLATERUS *lib. III. obser. p. 620.* prodidit de muliere quadam, quæ, quoties uterum gessit, toties detenta fuit ascite. Et hanc ob causam quoque in ea versamur sententia; hydropicos tumores in feminis plus ex uteri, quam hepatis & viscerum, quæ cum hepate habent connexionem, vitio subnasci; & facilius quoque perlanari, quam ubi hepar primario adfectum est, eo quod liberior & apertus sero stagnanti per uteri ostia patet exitus.

## §. XX.

Quod attinet ad causas procreandi, animadvertimus, hydropicæ adfectioni, tam pectoris quam abdominis, præ omnibus maxime esse obnoxios homines procreæ staturæ. In his enim

Hydro-  
plurimorum  
generum  
signa.

Causæ  
procre-  
andi  
staturæ  
sunt  
obnoxios  
homines  
procreæ  
staturæ.

enim sicut ob longius sanguinis a pedibus ad cor iter & situm perpendiculari ordinario valde tardus & lentus sanguinis est progressus; ita ille ob causas accedentes per facile redditur difficilior; unde etiam fit, ut polyposa concreta cum hydropse pectoris & anasarca in proceris ejusmodi corporibus, his morbis demortuis crebrius reperiantur. Præterea quoque nostro malo admodum sunt subiecti habitu corporis molli, spongioso, minusque firmis instructo fibris præditi, in quibus aquea eminet substantia & quos phlegmaticos vocamus, vel sanguineo-phlegmaticos. Huc dein & illi spectant, qui corporis sunt obesi, & in tenera juventute catarrhosis defluxionibus sæpius fuerunt affecti, nec non qui tumoribus œdematosis frequentius solent corripri. Ratione ætatis senes, in quibus ob elaterem vasorum defectum excretiones non rite succedunt, & lymphæ majorem contrahit lentorem ac spissitudinem, hydropicis tumoribus frequenter subjiciuntur. Respectu vitæ generis, ob vitam sedentariam, factores, sutores, textores, & ob aerem, qui fibrarum vigorem imminuit, vaporosum, balneatores, piscatores, fullores & lotrices in hydropem præ aliis sunt proclives. Regiones quoque & loca, quibus inhabitamus, merito huc debent referri; qua de causa in locis palustribus & maritimis plures reperiuntur hydropici, quam in locis mediterraneis, uti quidem in Hollandia, vitio tum aeris tum aque, fieri animadvertimus.

## §. XXI.

*Inter-  
quales  
ribus  
potus.*

Ut autem locus aliquis, qui antea talis non fuit, dein ad hydropem ingignendum aptior fiat, ex accidenti contingere potest, mutata scilicet vitæ ratione, quod de Anglia egregie ostendit LISTERUS de hydropse. Cibus enim & potus inconueniens ad hydropis genesis multum omnino conferunt. Ex cibis autem crassi, crudi, visceri & dulces, vel sola nimia vora-

cas, in iis potissimum, qui parum se movent, viam ad hunc morbum pandunt paratissimam. Frequentius tamen a potu, si quantitate vel qualitate peccat, hydropis malum suboritur; unde eos, qui potulenta, in quibus modice adsumtis nihil alias noxæ inest, magno in copia ingerunt, non raro annorum decursu, nisi naturæ robur viscerumque integritas id prohibet, hydropicos fieri conspiciamus; id quod copiosius haustu cerevisiæ non satis defæcatæ, recentes, maxime quæ ex tritico fiunt & vulgo Brephahn dicuntur, abunde satis confirmant. Nullum autem potus genus, consentiente quotidiana experientia, tam nocivum est, quam spiritus vini, & illius æmulus ex frumento paratus. Hinc ego non possum, quin ex eo confectas & aromatibus acuatæ aquas vitæ vulgo dictas, præsertim si jejuno ingurgitantur ventriculo, aquas mortis jure meritoque censeam. Denique nihil tam subito & intra paucos dies nostrum ingenerare morbum valet, quam potus frigidus post insignem corporis incallescens in copia haustus, ut usque eo ARETÆUS lib. IV. de signis & causis diuturni morborum. recte prodiderit: aqua inter cutem non nunquam a copioso frigida potu provenit, quum præ nimia siti quispiam multam aquam gelidam ingurgitaverit. Et hinc quoque est, quod SYLVIVS in tract. de morbo epidem. annotaverit, in ardore ac siti febrili a potu copiosius ingurgitato intra duos tresve dies hydropem fuisse excitatum. Longe vero gravior noxa pertimescenda est ab aquis palustribus stagnantibus, pro potu adsumtis, quas jam tum HIPPOCRATES inter causas hydropis retulit. Et exinde simul petenda venit ratio, quare, uti supra diximus, in locis paludosis & maritimis frequentior hydropis sit proventus. Neque vero hic excludendus est intemperivus aquarum mineralium tam calidarum quam frigidarum sine convenienti regimine usus, de quo mihi permulta

ta eaque tragica exempla in praxi observare licuit.

## §. XXII.

*Animi  
pathema.*

Ex omnibus vero iis, quæ sicut ad alias chronicas passiones, ita etiam maxime ad hydropem conferre solent, principem fere locum obtinent animi pathemata, præsertim vero diuturnus animi moror & angor, cui tanta inest vis atque potentia, ut, visceribus fibrisque motricibus omnem vigorem, tonum ac robur subtrahendo, languidum sanguinis circulum & excretionum suppressionem producat. Nec minor est efficacia vehementis iræ, maxime si cibus, vel potus copiosus frigidus desuper ingeratur. Sequitur enim pressio, ut ajunt, pede ingens præcordiorum restrictio & anxietas, color cachecticus, ciborum inappetentia, spirandi difficultas & successu temporis ipse hydrops, quem plus vice simplici successisse novimus. Causa tantorum malorum hæc esse videtur: vehementiori hac animi commotione ventriculus cum duodeno & adnexis biliaris ductibus valide & spasmode constringitur; unde non modo succi biliiosi & pancreatici ad bonam digestionem promovendam secretio impeditur, verum etiam copiosiori cibo ac potu adsumto multi ingenerantur status, qui alvinam excretionem sistunt totumque sanguinis circulum inæqualem reddunt.

## §. XXIII.

*Excretionis  
suppressionis  
similis.*

Nihil insuper magis ad genesin hydropis contribuit, quam consuetæ & criticæ evacuationis, ut in feminis per menses, per lochia, in viris per hæmorrhoides suppressio. Vid. HIPPOCRATES Sect. VI. aph. 12. Ita Trajanus imperator, ex retentione hæmorrhoidum asciticus factus & curatus, sed recidivam passus mortuus legitur apud DIOCASSUM. Pari quoque ratione, enormes sanguinis five per vulnera, five per nares, iterum, aut venas sedis profusiones ad hoc malum valde disponere, quotidiana fere experientia comperimus. Nam in san-

guine incomparabilis latitat vitæ thesaurus: quo nimium detracto minima & secretoria & excretoria vasa conviunt & angustantur; hinc nec bonus generatur sanguis, nec utilissimum leccernitur liquidum cerebri & nervorum, unde solidarum partium imbecillitas; neque inutile & impurum, quod in corpore est, foras ejicitur, unde magna impurorum coacervatur colluvies. Minime tamen ita simpliciter statuendum volo, ac si omnis largior sanguinis evacuatio hydropicum adfectum producat, sed ubi in corporibus aliæ adhuc causæ accedunt, facile eum oriri arbitror. Ita quosdam ab obstructione viscerum teorbuta & cachexia laborantes valdeque acri & impuro sanguine fartos post frequentes & enormes hæmorrhagias in aquosum hunc morbum incidisse novi; certe non ob solam illam hæmorrhagiam, sed ob malam corporis propter obstructions dispositionem atque humorum dyscrasiam. Immodica quoque in dysenteria excretio sæpius hydropis sæcunda mater est, quare HIPPOCRATES Sect. VI. aph. 43. adserit: *quicumque difficultate intestinorum corripiuntur, eos superveniente longa dysenteria aqua interius excipit & moriuntur.*

## §. XXIV.

Imperitiores quoque medici præposita morborum curatione causæ humoresque mali non raro evadunt; quando videlicet immodicas sanguinis, vel aliorum humorum excretiones desubito adstringentibus, opiatibus, vel narcoticis sistunt ac reprimunt. Idem malum incidit, si intermittentes febres, præsertim quartanas, quæ pleurumque fixam suam in hepate obtinent sedem, ante sublatam obstructionem vel decentem causæ febrilis correctionem, nimis cito & intempestive specificis suis, ad quæ etiam cortex chinæ pertinet, reprimunt. Facile enim hi morbi in cachexiam & hydropem desinunt; quod jam tum HIPPOCRATES & GALENUS indigita-

gitarunt. In his vero septentrionalibus locis id mali, experientia teste, frequentius contingit: quod etiam post febres epidemicas in nostra urbe & circumjacentibus locis grassantes sæpiissime ortum observavi, maxime in plebeis, qui convenientibus remediis & medicis fuerunt destituti. Idem quandoque in iis evenit, qui in acutis febribus, ad reslinguendum æstum & sitim, nimium potum ingurgitarunt, nec per diuresin vel diaphoresin satis reddiderunt. Ex mercuriali porro facilitatione imprudenter tractata sanguinem in serum collinescere & ossa partium motricium deperditos tumores succedere hydropicos, non rarum est. Nec denique ex censu causarum excludenda puto fortiora purgantia, quibus non modo viscerum tonus destruitur, sed vires quoque nimia feri per triginta vel plures in uno die dejectiones amissionem mirum labascunt & loco sanguinis probe temperati nonnisi humores crudi in venis progignuntur.

## §. XXV.

Neque silentio prætereundum est, scabie, arthritide, vel podagra retrocedente, aut incongruis medicamentis retropulsa, nec non ab anti-  
*Scabie, a*  
*arthritis,*  
*elo, po-*  
*dagra*  
*et pod-*  
*agra,*  
*na,*  
*pulsa.*  
 quis ulceribus & fomiculis subito consolidatis hydropem tum pectoris tum ascitem sæpius prognosci. Quid? quod a tumore pedum oedematoso, quacunque de causa intra corpus represso, præcedente gravi pectoris oppressione & anxietate id mali inductum observavimus. Idemque serum illud spissum & vappidum, quod in pedibus stagnavit, dum inducta ipsis strictura sursum repellitur, a venis sanguiferis receptum ad præcordia fertur. Ibi ex dextro cordis ventriculo cum reliqua humorum massa in arteriam pulmonalem ejusque ramulos pulsus hos tanta copia replet, quæ, comprimendo simul vesiculas pulmonales, irruenti acri resistit, ejusque ingressum, ad propellendum per venas sanguinem sufficientem remoratur. Ergo regur-

gitat sanguis ad dextrum corporis ventriculum eumque diluendo summam cum spirandi difficultate parit anxietatem. Quum itaque hac ratione sanguinis per pulmones cursus valde sit tardus ac impeditus, non modo serum per poros in cavitate pectoris & per vasa lymphatica, quæ in pulmonibus abundantissima sunt, secedit & extravasatur, verum etiam in je sanguinis progressus in toto vena cavæ systemate quadantenus sistitur ac retardatur, ut ideo non mirum esse debeat, quare in inferioribus quoque partibus ingentes feri contingant stagnationes & extravasationes.

## §. XXVI.

Hæc quoad ætiologiam accuratius paullo consideratis atque perspectis, ordine jam sequitur, ut, ad redole inquisitionem curationem, hydropem ab aliis tumoribus aquosis probe discernamus. Primum itaque hydrops non debet confundi cum tumoribus  
*Differt,*  
*ita hy-*  
*drope*  
*a reli-*  
*quis tu-*  
*moribus*  
*oedematosis.*  
 pedum oedematosis, utpote qui in sanis etiam, molliori & spongiosiori carne instructis vitæque sedentariæ deditis sine omni periculo contingunt. Ejusmodi tumores oedematosis feminis etiam, dum utero gerunt, valde sunt familiares, sed cum sætus exclusione sponte cessant, neque ullam medicinam expectant. Fiant videlicet ob insigniter dilatatum uterum, qui venam cavam inter lumborum vertebrae collocatam comprimit, ut sanguis consueta libertate adfurgere nequeat. Neque insolitum est, a solis flatibus, intestina valde distendentibus ob compressionem vasorum iliacorum tumores in partibus infernis prognosci, qui restituti intestinorum robore & flatibus expulsi ex facili remittunt. Videmus quoque, a nimis diuturna & tensoria sub longiori equitatione femorum compressione, ob interceptum liberum sanguinis circuitum, pedum tumores interdum suboriri.

## §. XXVII.

Dein quoque probe observandum est, ne alcitæ mulieres cum gravidis  
*Agravidis*  
*oedematosis,*  
*con-*  
*gestis,*



confundantur. Discerni vero ab invicem facile possunt: namque in gravidis color faciei vividus est, abdominisque tumor inæqualis & sursum ad præcordia vergens. In hydropicis autem inferior pars abdominis intumescit, tumor æqualis est, mammaeque detumescunt. In hisce porro sitis iuncta est, ingestione vero minus. Denique in asciticis fluctuatio sentitur in abdomine &, quo se vertunt, ægri, eo aqua collabitur. Tandem motus infantis in utero, qui circa vigesimam septimam septimanam contingit, omnem tollit dubitationem. Neque vero inficiandum est, in gravidis quandoque simul oriri leucophlegmaticum tumorem, qui tum præsertim accedit, si gemellos gestant & nimium plethoricæ ab omni sanguinis detractioe abstinēt.

## §. XXVIII.

Ab hydropico  
polypo  
cordis  
juncto.

Postremo adhuc illud, quod meretur attendi, occurrit, cum cordis polypo interdum pedum & femorum tumores conjungi sine præsentē anasarca vel ascite. Id quod dignoscitur ex summa compressione pectoris, pulsu intermittente & inæquali atque intercurrente, præsertim post animi affectum aut vehementiorem motum, suffocationis metu. Interea non negandum est, concurrentibus aliis causis verum hydropem succedere.

## §. XXIX.

Differt.  
ita ut  
& spu-  
rit aspe-  
ctus.

Differentia quoque notabilis est, inter verum & spurium ascitem. Hic vocatur, ubi aqua in abdominis cavitate non continetur, sed in membranis, quasi in sacco peritonæi inclusa hæret; hinc etiam dicitur hydrops saccatus. Quæ de re vide M.N.C. Dec. II. ann. VIII. obs. 23. item Dom. LIT-TRIS loc. cit. Consuli quoque potest dissertatio sub præsidio Clar. D. ALBERTI habita de hydropē saccato, per lapsum in abdomen curato. Contra vero in ascite intra ipsam abdominis-pectorisque cavitatem aqua stagnat extravasata.

## §. XXX.

Quod attinet ad ipsam prognosin & morbi eventum, de hoc audiendus est ARETÆUS, qui lib. citat. adserit: omnes quidem species hydropis pravae, inter ipsas vero leucophlegmatia mitior, difficilis flatuosa, difficilior anasarca, ascites certe periculosissima, & quando ascites cum tympanide miscetur, magni etiam est periculi. Deinde in universum dicere possumus, ascitem, si invaluerit & ex morbis aliis, in quibus jam tum viscera sunt corrupta, aut corrumpuntur, prodierit, & ubi a valis lymphaticis vel hydatidibus disruptis extravasata est, atque superiora cum siti marcescunt urinæque paucae & valde rubrae cum sedimento minguntur, omnino esse incurabilem. Contra vero eum hydropem cum HIPPOCRATE sanabilem asserimus, in quo viscera quidem infarcta, sed non scirrhusa, nec corrupta sunt & æger appetit, nec male respirat, urinas mingit tenues, sique ætas est juvenilis. Quando etiam hydrops, præsertim leucophlegmatia & anasarca, in plethoricis ex asthma subnasceatur, vel a nimio potu in febribus & a largiori ciborum adpetentia post ipsas exantlatas, vel etiam post enormes hæmorrhagias suboritur, spes omnino sanationis superest, si tempestive convenientibus succurramus remediis.

## §. XXXI.

Tussis quando asciti supervenit, nihil boni portendit, quod suo jam tempore HIPPOCRATES recte notavit Scit. VI. aph. 35. & VII. aph. 47. Non tamen de tussi illa leviori, quæ etiam inter initia plerumque adparet, hoc intellectum volumus. Malum itidem signum est, si cibi adpetitus cum viribus plane perit, sitis augeatur, multum liquidi adsuntur & parum per urinam redditur: neque boni sunt omnis horrores febriles cum ardore interno in asciticis supervenientes, sed plerumque funestum prænunciant exitum. Pessimum quoque,

que, imo mortis indicium habendum est, si erysipelas cum febre in cruribus erumpit, cui HIPPOCRATES etiam *lib. VII. epidem.* adsentitur. Qui præterea recidivat hydrops ascites, diffi- culter admodum, & secunda vice vix unquam curatur: quod tamen aliter prorsus se habet cum anasarca, qui si periodicus est, non tantum periculi portendit, quam statarius. Ceterum vero notari meretur, ex nostro morbo non facile quenquam mori, nisi qui in corde gerit polypos, vel in hepate scirrhum, vel glandulas in mesenterio tumefactas, vel etiam, si feminas respicimus, uterum scirrhum atque corruptum.

## §. XXXII.

Hydro-  
pis fu-  
lens.

Solvitur interdum citra artem so- lius naturæ beneficio hydrops, dum aqua sibi viam & exitum per pedes pandit, vel etiam per ruptum umbilicum aut alibi apertum abdomen. Ab HIPPOCRATE in *Coac.* annotatum legimus, diarrhoeam in hydropo incipiente esse salutarem. Et mihi quoque nota sunt ejusmodi exempla, ubi per longiorem diarrhoeam, ef- fluente pura ex alvo aqua morbus seli- citer fuit solutus. Contra vero, si in consummato & inveterato hydropo, visceribusque jam corruptis supervenit diarrhoea, spes in angusto posita est. Denique adhuc notabile est, quod FERNELIUS *Patholog. lib. VI.* de muliere habet, cui instante menstrua purgatione humor sub abdomine con- gestus per uterum sponte fuit profusus, ut omnis moles biduo sublitteret, & quum proximo mense denuo succre- rit, statim tempore totus iterum ef- fluxit.

## THESES THERAPEUTICÆ.

## §. I.

Indi-  
catus  
curatio-  
nis.

PRIUS quam truculento hydropis morbo manus adhibet auxiliatri- ces medicus, probe debet respicere, an curationem adhuc recipiat, an pla-

ne sit insanabilis. Hoc si animadver- tit, consultum erit, a tali cura se re- trahere, quam famam periclitari, aut minime hanc ipsam provido pro- gnostico firmare atque munire. Ipsa autem genuina medendi ratio in eo consistit, ut primo aquam, quæ intra cutim & cavitates collecta stagnat, evacuemus, & dein causam, ob quam accumulata est & adhuc quoti- die accumulatur, perite tollamus. Equidem aquarum evacuatio parum admodum ad curationem videtur con- ferre, nisi causa, cujus effectus est aquarum extravasatio, removeatur: illa enim nondum sublata nova subin- de moles aquarum brevi tempore re- nascitur. Verum enim vero, quo- niam medicamentorum, abigendæ huic causæ idoneorum vis atque en- ergia ab aquarum copia mirum quantum infringitur & viscera quoque ac partes, ubi stagnat, temporis successu valde læduntur & corrumpuntur; eo omni- no ad laborandum est, ut a nimia col- luvie corpus liberemus.

## §. II.

Ad quem scopum obtinendum, ni- si ipsa natura, vel per largam diar- <sup>tho-  
is  
asili-  
to ad-  
cenda</sup> rhoeam, vel per humoris ex pedibus effluxum id præster, deliberandum est, num arte chirurgica per paracen- tefin commode & sine periculo id fieri possit. Qua de re egregius existat locus apud CELSUM *lib. III. cap. 21.* qui ita se habet: *Erasistrato*, inquit, *dis-  
plicuit per paracentesin curandi via, quia frustra aqua emittitur, qua vitiatu he-  
pate subinde nascitur. Sed primo non unius visceris hoc vitium est. Nam & splene affecto, & in totius corporis ma-  
lo habitu fit: deinde, ut inde coperis, tamen aqua nisi emittitur, qua contra naturam subsistit, & jecurati, & ce-  
teris interioribus partibus nocet. Con-  
venitque corpus nihilominus esse curan-  
dum. Neque enim sanat emissus hu-  
mor, sed medicina locum facit, quam intus inclusus humor impedit. Ac ne illud quidem in controversiam venis-  
sin, quin non omnes in hoc morbo sic curati possint.*

possint, sed iuvenes robusti, qui vel ex toto carent febre, vel certe satis liberales intermissiones habent. Nam quorum stomachus corruptus est, quique ex atra bile huc deciderunt, quique malum corporis habitum habent, idonei huic curationi non sunt.

## §. III.

De his operat. Nostre de paracentesi hæc esto sententia: Quum in principio morbi viscerum adhuc sunt bene constituta & excellentia aquarum mole totum abdomen turget, ut sæpe fit in leucophlegmatia cum & sine anasarca juncta, nec sine periculo aqua purgante potest educi, tum eam, si modo æger ferre velit, institui posse arbitror, si modo provide & eum certis cautelis, quas B. BRUNNERUS in M. N. C. Dec. II. ann. VIII. tradidit, administratur. Hic enim clarissimi nominis Medicus loc. cit. ad putredinem feri in abdomine contenti avertendam, quæ ab aere admisso post paracentesin facile contingit, injectionem tincturæ ex myrrha & aloë cum spiritu vini camphorato suadet. Nec est, inquit, quod hanc reformidemus in abdomine: temperatur enim aqua intus contenta, tolerans hanc tendinem atque nervi, nam in cane spiritum terebinthinæ, ardentioris adhuc, intestinis inflammatis felici cum successu adhibuit. Nec dubito, quin, si ulla arte aut ingenio hæc lymphæ fermentatio in abdomine & inflammatio impediri posset, paracentesis in maiorem dignitatem adfereveretur, eaque præstari posset, quæ aliis impossibilia visa fuerunt. Exanilata enim abdominis palude, vasa lymphatica vel rupta, vel exesa facilius persanantur. In hydropo peritonæi sine omni periculo administratur, & fere absolute necessaria est hæc operatio. In ascite etiam desperato & incurabili eandem non ad curationem, sed ad suffocationis periculum abigendum, ut æger in vita adhuc conservetur, institutam novi.

## §. IV.

At vero, ubi in anasarca vel leucophlegmatia copia aquarum per medicamenta cum euphoria est educenda, id omnium maxime per purgantia paullo fortiora, in principio morbi sufficienti dosi & debito cum regimine exhibita debet præstari. Dispicimus igitur, quænam hoc sine medicis usui hæctenus fuerint. Primo autem loco occurrit elaterium, quod a veteribus æque ac recentioribus, ad educendas aquas, mirifice laudatur. Ita DIOSCORIDES lib. IV. c. 151. de eodem tale fert iudicium: elaterium confert hydropicis, extrahendo aquosissimam mirabiliter sine nocimento, & non est stomacho nocivum. Cui adsentitur AVICENNA, CELSUS, Alexander MASSARIAS & postea quoque JACOBUS BONTIUS, HERCULES SAXON, JOHANNES HEURNIUS, GABRIEL FALLOPIUS de medicinali, aquis pag. 55. REISNERUS ubi, medic. pag. 167. & HENRICUS ab HEER, qui invicem hoc remedii genus mirifice extollunt. Ex Anglis pariter LISTERUS & SYDENHAM in tractat. de hydropo idem omnibus aliis purgantibus longe præferunt & hic ita scribit: elaterium, sive sæcula cucumeris agrestis potenter, in permixta quantitate, vires suas exferis in conturbanda alvo & facibus tum ferofis & aquosis humoribus copiose egerendis. Post elaterium gummi guttæ seu de Peru ab uno circiter sceulo, si ad aquam ejiciendam ad scrupulum dimidium, vel grana XII. propinetur, valde cœpit celebrari. Extractum esulae maxime estimatur a RULANDO & succus iridis nostratis, nec non corticis medii sambuci inter polychresta & magnæ efficaciz hydragoga non modo a medicis, sed etiam a vulgo cum laude refertur.

## §. V.

Quod ad ipsam operationem horum medicamentorum attinet, sciendum est, quod acri, volatili caustico principio, nervosas ventriculi partes vellican-

licando, agant & hinc vomitum in sanis vehementer ciant. In hydropicis autem neque ac emetica ex antimonio parata per alvum magis quam per vomitum operantur, forte quod nervosæ ventriculi & intestinorum tunicæ ab aqua stagnante nimis sunt flaccidæ & relaxatæ. Unde simul luculenter adparet, ad ingentem aquarum molem ex univerto corpore, per alvum exturbandam leniora & mitiora prorsus non sufficere, sed talia omnino requiri, quæ subtili quodam & penetrante sale suo nervolarum & muscufolarum partium systema, maximeque ventriculorum & intestina stimulando insignem aquæ copiam eliminandi vim possident; quæ inter purgantia modo allata ipsaque vomitoria primas tenent, si pro diversitate naturæ corporis, plus minus sensibilis, convenienti dosi exhibentur. Nam certe non pauca dantur exempla eorum, qui post triginta & plures dejectiones excessiva hydragogi doli integre convalescerunt.

## §. VI.

*Forma  
in pur-  
gantibus.*

Possunt vero et fortioribus hisce purgantibus, vel etiam emeticis variæ concinnari formulæ, quibus ipse hætenus in praxi usus sum insigni cum fructu e.g. Rec. elaterii, extract. heliobori nigri, absynthii, cent. min. mercurii dulc. singulorum drachmam unam, extract. croci grana duodecim. M. fiant cum balsamo Peruv. pilulæ ex drachma dimidia no. XX. mane sumendæ. Vel etiam infusum potest parari purgans in hunc modum: Rec. corticis medii sambuci, rad. bryon. iridis nostrat. fibrar. hellebor. nigri rhabarb. Alexandr. rad. gentian. rubræ, vincetox. levislici, cortic. aurantiorum recent. ana unciam semis, summitat. centaur. minor. pugill. quatuor, caryophyll. drachmas tres, tartari tartarisati unciam unam. Fiant species cum duabus menfuris vini infundendæ & ad sextam partem pro dosi bis in septimana bibendæ.

## §. VII.

Præter purgantia ore adsumta, *Emetica* clysmata quoque ad educendas aquas mirabilem obtinent efficaciam, quæ ex radice alari, cort. medio sambuci, rad. irid. nostr. summitat. centaurii min. flor. sambuci, seminibus IV. carminativis cum vino & aqua, addito oleo chamomill. vulgaris & drachmis duabus salis Epsomienis possunt parari. Neque in omnibus hydropicis omni-que tempore opus est, drastice remediis aquarum evacuationem moliri, sed mitiora interdum ac leniora in majori paullo dosi exhibere consultum est, quæ eundem sæpe longèque tutiorem præstant effectum. Etenim non semel sed aliquoties tribus uncias manæ electæ cum duabus folior. fennæ & cremoris tartari drachmis in aqua fontana leniter solutis & intra quididum horæ epotis, plus quam decem libras aquarum cum euphorbia exturbatas vid. Pulvis quoque mechoacanæ albæ ad drachmam unam vel duas cum vel sine cremore tartari inter securiora hydragoga jure debet referri. Neque minorem promeretur laudem rhabarbarum sive in substantia datum, sive in essentiam cum terra foliata tartari redactum. Quam in rem notabilis est historia, quam ex observatione MONTANI *Adolphus OTTO in epistola SCHULZII* posteritati reliquit. Meminit scilicet viri cujusdam, qui quum ventre, pedibus toroque corpore insperate intumisset, rhabarbari continuo usu a drachmis ad uncias usque, subducto sero plene convalescit.

## §. VIII.

Post sufficientem per alvum evacuationem diuretica, quæ simul virtute attenuante & viscidis humoribus dissolvente gaudente, in usum sunt vocanda. Splendent hæc virtute præcipue salia aquarum medicinalium, Egranarum, Carolinarum & Sedlicenium in Bohemia, quæ in liberaliori paullo dosi oblata non modo egregiam aquas stagnantes evacuantem, sed simul etiam aperientem & diureticam possident.

*Diuretica  
aquarum  
medicinalium.*

dent efficaciam. Quo nomine pariter laudanda veniunt salia neutra, ut tartarus tartarificatus & vitriolatus, terra foliata tartari, sal polychrestum, nitrum antimoniatum, solutio ocul. cancer. quæ cum cremore tartari sit, sal succini volatile cum oleo tartari per deliquium in sal medium redactum; ante omnia vero nitrum ipsum purificatum, vel quod majoris adhuc efficacitæ est, nitrum ex miscela spiritus nitri & olei tartari per deliquium regeneratum; quæ omnia ob eximiam, qua pollent, in obstructionibus viscerum dissolvendis & tubulis renum urinosis referendis virtutem insigniter merentur commendari.

## §. IX.

Præter hæc vero in diuresi movenda *Quæ amplius profuit diuresi.* non minorem pollicentur fructum salia herbarum per incinerationem parata, ut absinthii, cardui benedicti, vel solum sal tartari probe calcinatum, liquor nitri fixi atque silicium Glauberi &c. quæ paullo largiori dosi sumta in tumoribus oedematosis expugnantis mirabilem sæpius effectum præstitisse novi. Spectant huc quoque liquor nitri dulcis, liquor noster anodynus mineralis, clystus antimonii, spiritus tartari & tinctura antimonii acris; quæ liquida medicamina vel sola, vel etiam cum dictis salibus pro circumstantiarum ratione mixta dari possunt utilissime.

## §. X.

*Quorum vehiculum utatur in dictis remediis adsumendis.* Plurimum tamen refert, quo quis longe præstantiorem edunt effectum, si magis cum aqua petroselinii, fragorum, vel etiam vino Rhenano, quam cum alio potus genere sumuntur. Ego quoque non sine insigni ægrotaantium levamine decoctum ex radicibus quinque aperientibus, rad. eryngii, ononidis, semine dauci, sellerie, baccis juniperi & alkekengi præscribere hæcenus consuevi, quod simul potus ordinario potuit substitui.

## §. XI.

Sudorifera ubi corpus totum colluvie aquarum scaturit & subcutaneum emunctorium clausum & constrictum est, parum merentur laudis. Nam hydropici difficulter ad sudorem disponuntur; & si regimine externo nimis calido vel volatilibus sudoriferis cogantur, metus est, ne inflammatio cum febre, vel etiam metastasis seri ad ipsum cor vel cerebrum, ut suffocatio aut adfectus soporosis & apoplecticus sequatur, procuretur: quæ observatio circa balnea etiam laconica, quæ cum spiritu vini sunt, probe meretur attendi. Quodsi vero ab ingenti humorum copia tam per purgantia, quam diuretica corpus fuerit liberatum ipsaque natura ad liberiores transpirationem ac sudorem vergit, tum quidem non validiora, sed temperatiora diaphoretica, qualia sunt mixtura simplex, liquor mineralis cum refracta dosi spiritus bezoard. Bussii mixtus, tinctura antimonii selectior, vel pulveres ex cerussa antimonii, sale cardui bened. nigro purif. sive per se, sive cum rob. sambuci vel ebulli mixti laudabili effectu minime destituuntur, maxime si horum usum cum prudentia crebrius repetamus.

## §. XII.

Laudatis itaque externis evacuantibus ad auspiciatorem effectum consequendum externa debent conjungi, quæ in nostro adfectu, si nunquam in alio operam præstant landatissimam. Etenim quum in habitu corporis extimo sub cute, ubi copiosi & efferti humores subsistunt, parriumque solidarum tonum & robur profus evenerant, mali fomes latitet, ipsa sana distitit ratio, extrinsecus sub varia forma admotæ remedia, quæ vi sua roborante, balsamica & resolvente humores stagnantes non modo attenuant &, ut in vasorum poros recipi possint, aptos reddunt, sed & putredini resistunt, tonumque & robur relaxatis partibus restituant, ad hosce humores per congrua emunctoria & corpore *Remedium diuresi.* *exterior.*

exterminandos plurimum omnino conferre. Et si meam adponere experientiam licet, ego accommodatis ejusmodi subsidiiis externis effectum sæpe longe præfentorem facilioremque, quam ab ipsis internis vidi consequutum. Quæ vero huic scopo & indicationi egregie inserviunt, sunt: radices levistici, iridis, squillæ, ciclamini, folia ebuli, herba scordii, cardui bened. absynthii, flores utriusque chamomillæ, sambuci, bæcæ lauri, juniperi, semina carvi, cumini &c. ex quibus sacculi vel epithemata possunt parari & ex vino, aceto vini & aqua calcis vivæ cocta abdomini, pedibus, & scroto calice imponi, si quæ refrixerint, reiterari. Atque talismodi epithemata aliis sub alia forma adhibitis externis, ut emplastris & unguentis, me quidem arbitro, longe multumque sunt præferenda.

## §. XIII.

Equidem recensita jam remedia tam interna quam externa ad subigendum rebellem hydropis morbum omnino sunt præstantissima; attamen sola omne curationis negotium nondum absolvent, sed ad causas hydropis radicatas tollendas adhuc ea requiruntur præsidia, quæ, ne aqua facile regeneretur, & recidiva fiat, prohibent. Hisce itaque generosis evacuantibus subungere oportet roborantia; quandoquidem & viscerum, & valorum partiumque fibrosarum vis tonica systaltica dejecta principalis circuitus sanguinis & lymphæ per vasa impediti & hinc stagnationis causa & ratio existit. Quare hæc remedia, si ulla alia, ad graves ejusmodi passionem earumque recidivas avertendas virtute pollent eximia. Quo nomine commendamus ex materia medica radices pimpinellæ, vincetoxicæ, ari, Zedoaræ, extract. absynth. gentian. rubr. cardui bened. scordii, centaur. min. cort. cascarillæ, cappazum, myrrham, succinum, cinnamomum, quando ex hisce cum menstruo tenui & vino Hungarico essentia vel elixirum para-

tur, quod pro re nata etiam cum liquore martiali, ut tinctura mart. Zwolfferi potest misceri & continuato usu convenientique dosi propinari; utpote hoc medicamentum non modo ventriculæ & intestina, sed & hepatis, pulmones & lien, quæ tum chylificationi tum sanguificationi inserviunt, corroborat, atque salubres excretiones, si impeditæ, vel retardatæ fuerint, promoveret utilissime.

## CAUTELÆ.

## §. I.

Quæstio est non minoris momenti, num venæsectio etiam in tumoribus hydropicis locum habere possit? Dubium videtur, quia corpus plus ingenti feri, quam sanguinis copia est repletum, partesque solidæ omni vigore ac robore sunt destitutæ, atque præterea apud auctores, præsertim recentiores, vix legitur; venæsectionem in ipsa curatione profuisse; nihilotamen minus apud antiquissimos medicinarum parentes, ipsumque HIPPOCRATEM multa existant loca, ubi summa cum laude mentio sit venæsectionis in cura hydropis administrandæ. Ita HIPPOCRATES de diata acutar. hæc habet: Si hydropicus difficulter spiraverit, & tempus verum fuerit, & simul asas viguerit & virium robur adsit, de brachio sanguinem detrabere oportet. Et eruditissimus Jacob SPONIUS valde notabilem in aphorismis novis Sect. V. §. 87. observationem subiungit: Vidimus, inquit, hydropem viginti annorum venæsectionibus, qui ab exhibitis hydragogis & diureticis, ejusvis generis, magis ac magis immunes. Et ALEXANDER TRALLIANUS pluribus verbis de ea ita differit: hydropem anasarca per venæsectionem curare quandoque opus est. Si non solum, sed & lien ac ventriculus tumorem ac duritiem habeat, confidenter educat per exiguas missiones sanguinem, tantoque

Robor.  
ria, quæ  
ad robor.  
dnam  
p. acco-  
modam  
est. f. s.  
sunt.

Non  
venæsectio  
hic loci  
hydropis  
profi?

id magis, si vires non prohibeant, & copia sanguinis in venis manifesta, & agrotus in flore aetatis constitutus sit, nec tempus annimagnus frigus afferat. Paulus vero AEGINETA lib. III. cap. 48. de curatione hydropis agens paullo clarius, sed cum data conditione id confirmat, dum ait: curantes initium facimus in anasarca ab evacuatione per venasectionem, maxime si ob hemorrhoidum, aut menstrua purgationis suppressionem conflata fuerit affectio. Atque nos etiam, multiplici edocti experientia, in hisce omnino consensum addimus: in leucophlegmatia & anasarca, si status adsit plethoricus, atque ab asthmate sanguineo hæc mala præcipuam duxerint originem, venesectionem magnum ad curationem momentum asserre. Negamus vero, in ascite hydropse & tympanite id sine periculo fieri posse, dum etiam ipse TRALLIANUS in loco allegato sub finem addit, phlebotomiam in ascite & tympanitide penitus esse excludendam.

## §. II.

Quemadmodum in leucophlegmatia & anasarca, ad colluviem feri copiosi exturbandam, validiore medicina purgante, majori etiam sub dosi administrata interdum uti necesse est; ita in ascite nihil drasticis periculosius est. utpote quibus, quod per crebriorem experientiam mihi compertum est, desubito inflammatio intestinorum (phacelosa & mortifera, quam anatome detexit, excitatur. Id vero circa fortiorum purgantium usum serio monendum existimo, quod in principio quidem locum invenient, dum vires adhuc constant, sed quod non crebrius, & nisi interjectis sex septemve diebus sint repetenda, atque interea vires medicamentis & cibis, laudabilem succum præbentibus roborandæ. Præstat tamen a drasticis illis remediis ut gummi guttæ, elaterio, colocynthide, &c. quæ colliquativam quandam viribusque adversam facultatem, quam natura debilis &

sensibilior stomachus ferre minus potest, recondunt, interdum plane abstinere & potius in eorum locum purgantia cum emeticis lenioribus mixta propinare, quæ vel in forma pilulari, vel infusi exhibitæ similem laudabilem, longeque tutiorem exserunt effectum.

## §. III.

Quum scorbutica humorum dyscrasia adfecti per facile in tumorem incidunt hydropicum, tum medicamentis, quæ etiam specifica adversus hydropem virtute prædita esse creduntur, sic dicta antiscorbutica, ut radix armoracæ, raphani rusticani, nasturtii aquatici & hortensis, nec non cochleariæ succus multum sunt præponenda, maxime quando cum sero lactis, vel decocto betæ rubræ, liberaliori paullo & repetita dosi adfuerint. Vidi enim simplicibus hisce remediis sapissime plebeios a tumoribus hydropicis integre sanatos, mirifica quotidie per vias urinarias copiosi seri educta quantitate.

## §. IV.

Pulvis squillæ & ejus acetum a veteribus, GALENO, CÆLIO AURELIANO, CELSO & aliis maxime semper in hoc morbo fuit æstimatum, præsertim ubi asthma ad suffocationis fere metum concurret. Et secundum meam quoque experientiam bona restari fide possum, per plures misere adfectos inopinatum inde & vix sperandum accepisse levamen. Namque hæc radix sale suo penetrante acerrimo instructa stomacho & aliarum nervosorum partium tunicis sese insinuans motum ipsis ac vigorem, stimulando, restituit, humorumque circulum retardatum insigniter adjuvat. Quod dosin attinet, potest ad grana sex vel octo cum eadem quantitate radicis pimpinellæ vel ari misceri & additis aliquot nitri granis, cum vehiculo calido exhiberi.

## §. V.

In tympanitide magis & summe proficius est usus clysterum, ex speciebus

ciebus carminativis confectorum. Ob-  
servavimus quoque in hac passione pi-  
lulas purgantes cum anodynis marita-  
tas, ut sunt massæ pilularum Scarckii,  
Wildegansii & quæ ex extracto helle-  
bori nigri, mercurio dulci, sagapeno,  
opponace, asa foetida &c. concinna-  
tæ sunt, insignem attulisse fructum.  
Præter hæc verò extensius in hoc ad-  
fectu inunctio totius ventris cum oleo  
philosophorum, vel oleo camphoræ  
cum oleo amygdalarum dulcium para-  
to instituta, & per aliquot dies con-  
tinuata summo foret auxilio.

## §. VI.

*Asple-  
despe-  
satis  
quomo-  
do tra-  
bandus.*

In malo ascitico, ubi viscera valde  
sunt affecta & spes sanitatis recupe-  
randæ penitus ostenditur, leniori-  
bus laxantibus & corroborantibus unice  
agendum est. Cui usus inserviunt pi-  
lulæ polychrestæ ad mentem Beccheri  
paratæ, & interposita semper salis  
aperitivi dosi propinatæ. Quæ metho-  
do, nisi res omnino conclamata est,  
miseri vel curantur, vel ætæ diutius  
conservantur.

## §. VII.

*Cura  
altri fi-  
brandi  
humori-  
thoracis.*

Incidit interdum, ut hydropici per  
hæmorrhoides, vel per nares vel etiam  
femine per menses ingentem sangui-  
nis profusionem, non sine virium no-  
tabili decremento & periculo pariam-  
tur; quo casu nihil absurdius & inepti-  
us est, quam narcoticis, ut massa  
pilularum de cynoglossa, vel alius stypticis  
ad eam comprimendam vei. Nam  
augentur inde viscerum obstructions,  
quæ has fluxiones immodicas prog-  
nunt, & virium major sit dele-  
ctio.

## §. VIII.

*Cura  
altri fi-  
brandi  
humori-  
thoracis.*

Oritur interdum post perperam  
institutam salivationem hydropica-  
labes, atque tum decoctis, quæ li-  
gnum guajacum, cassias, radicem  
lepathi aceti, lignum quernum, ar-  
gentum vivum & antimonium, in  
peria ligatuna ingrediuntur, debet  
expugnari.

## §. IX.

Quando scrotum vel ex hydrocele  
vel ex delapsu aquarum ex abdomine  
magna humorum copia turget, adeo  
ut valde situm in lecto & movendi po-  
tentiam impedit, paracentesim mul-  
ti commendant, quæ tamen parum  
juvat, ut potius nunquam plus in-  
commodi creet nec sine periculo su-  
pervenientis sphaceli suscipiatur. Es  
quia humor intra membranas testium  
latis viscidus hæret, ejus effluxus ple-  
rumque parcius esse solet. Præstat in  
tali casu externis cataplasmatibus di-  
scutientibus, quorum catalogum su-  
pra recensuimus, inhzere & curam  
moliri.

## §. X.

Quando ipsa natura, optima medi-  
catrix, sponte suas sibi querens vias  
cutis poros vel in pede, vel in abdo-  
mine aperit, per quos non sine nota-  
bili tumoris subsidentia dies noctesque  
multum feri profunditur; cavendum  
maximopere est, ne corruptio acci-  
dat, quam per epithemata, quæ su-  
periori loco præscripsimus, frequen-  
tius adhibita debemus prohibere. In-  
terne verò tum temporis cum elixiris  
corroborantibus balsamicis natura juvan-  
da, corruptio intermarum partiura  
avertenda, viresque conservandæ sunt.

## §. XI.

HIPPOCRATES lib. VI. epidem. Metho-  
dum hanc curam hydropicis proponit: Hy-  
drops laborantem convenit exercitatio-  
nem desatigari, sudare, panem ede-  
re, parum bibere, vino albo, multo  
summo uni, & purgantia adsu-  
mere, quibus aqua & phlegma vacue-  
tur. Utilissima hæc curandi metho-  
dus potissimum de prima hydropis  
specie, leucophlegma, intelligenda  
venit, in quam persicilicet ii, qui  
morbos longos & immodicas hæmor-  
rhagias perpelli corpus nimio cibo vel  
potu replent, incurrunt. Hisce com-  
mendat exercitia, quibus corpus evadit  
magis transpirabile; deinde sudorem,  
quo pars copiosi feri avolat, tum panem,  
qui non solum sed laudabilem chylum  
gignit.



gignit : prodeſt etiam potus abſtinentia, tum quia *creſcit indulgentia ſibi diſtus hydropis, neceſſitatem pellit, niſi cauſa morbi ſuperſit venis*, tum quia aucto per ſitum calore ſuperfluz humiditates diſſipantur. Neque infrequentes ſunt hiſtoriz hydropicorum, qui ſola potus abſtinentia per annum integrum convalere omnino. Vinum album urinas movet, ſomnus humiditates augget ; hydragoga vero medicamenta ſacra hujus morbi anchora ſunt, quia nimium humidum auferunt.

## §. XII.

*Curatio  
melli a  
ſtunten-  
tia arti.*

Quum ex flatulentia primarum viarum, præſertim in hypochondriaciis, tumores cedematofi, qui initium hydropis conſtituunt, facile gignantur, expedit tunc non purgantibus, ſed emmatibus ſedulo uti, quæ ex ſpeciebus carminativis & roborantibus, ut bacis lauri, juniperi, herba rutæ, majoranæ, ſoliis ebulli, flor. chamomill. vulg. & rom. & ſeminibus quatuor carminativis, ex aqua vel lacte coctis cum decenti olei anethi & chamomill. cocti quantitate optime conſciuntur. Eadem methodo ſcilicet sæpe uſi ſumus, ubi ex retropulſa, vel ſaxus retenta materia podagrica ſpaſmi & ſtatus in inteſtinalis initium tumoris hydropici machinantur.

## §. XIII.

*Curatio  
melli a  
ſuppreſ-  
ſis em-  
erthri-  
cibus  
ſanguis-  
nolis.*

Sequior ſexu longe ſere magis quam virilis tumoribus hydropicis eſt obnoxius, ſi deficit vel ſuppreſſa ad tempus remanet, vel ante quinquageſimum annum plane ceſſat menſtrua per uterum purgatio : quod iis potiſſimum evenit ſeminis, quæ otio, ſomno & vitæ ſedentariæ nimium indulgent, vel ſollicitudine & moeſtu diutius afficiuntur. Juvat tali in caſu tum ad præſervationem, tum ad curationem ſanguinem mittere, corpus movere, peregrinari & locum mutare. Quæ ſi nihil proficiunt, aquis mineralibus tam interne quam externe uti convenit, quæ etiam in ſuppreſſis hæmorrhoidibus in viris, ad eas revocandas, magno ſunt præſidio & auxilio.

Tom. IV. Part IV.

## §. XIV.

Quod ad curationem cedematum in pedibus attinet, ea provide eſt adornanda. Permulta enim eaque triſtia novimus exempla, quæ eam perverſo modo inſtitutam peſſime ceſſiſſe ſtantur. Nam ſi adſtringentibus, ſive cataplaſmatibus tractantur ejuſmodi tumores, detumeſcunt quidem pedes, ſed intus ſeroſus latex per metaſtaſin repellitur & ad pulmones delatus catarrhum efficit ſuffocativam funeſtum. Longe ſecurius eſt pannis calidis, vel ſaccis arena aut furfuribus calidis repletis eos fovere, ut in perpetua ſerventur tranſpiratione. Neque inutile eſt, ſaſcia latiori moderate adſtriſta partes tumentes ſonvolvere, ita ut ab extremo partis incipiat & uſque ad tumoris finem inducatur. Sunt nonnulli, qui ſcarificationem, vel etiam profundiorē incisionem cum CELSO ſuadent, qui eam his verbis præcipit : *incidendum quoque ſuper talum, quatuor ſere digitiis, ex parte interiore eſt : quo per aliquot dies frequens humor ſeratur : atque ipſos tumores incidere aliis plagis oportet*. At vero, me quidem iudice, tale quid provide & prævia prudenti deliberatione debet fieri ; nunquam vero in aſcite, vel ſcorbutica humorum dyſcrasia laborantibus moliri. Facile enim ſupervenerit ſphacelus & propter nimis laxam carnem & aquoſum aſſluxum diſſiculter ejuſmodi vulnera conſolidantur.

## §. XV.

Ultimo loco, ut de evento mali certiores ſiamus, juvabit omnino tenere auream regulam CELSI, quæ ſuis verbis comprehenditur : *Commendum eſt, lino quotidie ventrem metiri, & qua comprehendit alvum, notam imponere : poſtero quoque die videre, plenius corpus ſit, an extenuetur. Id enim quod extenuatur, medicinam ſentit. Neque alienum eſt, metiri & portionem ejus, & urinam. Nam ſi plus humoris excernitur, quam aſſumitur, ita demum ſecunda valetudinis ſpes eſt.*

*Curatio  
adem  
tam  
to  
pedibus.*

*Regula  
Celsi de  
eventu  
melli  
no-  
ſiſſe.*

Q 3

ENAR.

ENARRATIONES  
MORBORUM.

## OBSERVATIO I.

*Hydrops anasarca cum tympanide junctus, enormi hæmorrhagia & multis poly-  
sanatus*  
Femina triginta annorum, sanguinea habitu corporis spongioso & succulento prædita, quæ semper largiora habuit menstrua & aliquot cum junctis, enormi hæmorrhagia & multis poly-  
sanatus polis concrementis ejectis perpeffa est abortus; imminenti quondam mensium fluxu vehementi corripitur terrore; unde ille mox suppressus varia attulit incommoda. Siquidem nunc optima femina de ingenti corporis lassitudine, inappetentia, præcordiorum anxietate cum languida pulsuum celeritate pedumque inumescentia cœpit conqueri. His demum malis jungebatur valde difficilis & anhelosa respiratio, ipse tumor ad femora usque ipsumque abdomen, quod tactu durum & tensum erat, ascendebat, cibi adsumti in status resoluti multas creabant anxietates, sitis intendebatur, & in-  
crefcente spirandi difficultate, ægra in lecto erecta sedere & ob suffocationis metum liberam captare aëram per fenestras debebat. Varia hinc inde remedia tam emmenagoga, quam purgantia & diuretica nihil ferebant opis. Tandem vero ex pedibus sponte apertis quotidie larga aquæ effluebat copia, unde abdominis tumor mirum subinde decrefcebat. Ego hinc ad putredinem arcendam pedibus exterius adplicare jussi sacculos semine milii, anethi, carvi, bacis lauri & juniperi, herba abstinthii, scorodii, flor. chamomill. repletos & in vino rubro coctos. Interne singulis IV. diebus obtuli decoctum mannatum cum tartaro emetico acutum sub tali formula: Rec. Mann. el. uncias duas, aquæ flor. acaciæ uncias V. terræ foliat. tartari drachmam unam. Coque & solve leni calore. Adde tartari emetici grana tria solut. ol. de cedro gutt. IV. essentiz cortic. aurant. gentian. rubræ ana guttas XL. M.

quo medicamento mira aquarum quantitas summa cum euphoria, sine torminibus & virium prostratione fuit edueta. Præterea elixir nostrum balsamicum cum vino Hungarico ter de die sumendum suasi. Et hac ratione post aliquot hebdomades, tumore & duritie lucescive evanescentibus, appetentia cum viribus rediit, pulsus simul factus est naturalis facieque sedata coloratior. Denique circa illud tempus, quo menses ex utero ferri consueverunt, venam in pede secandam curavi, & en! altero die post ipsi menses prodierunt & tam misere afflicta femina exoptatissimam recuperavit sanitatem.

## EPICRISIS.

Sistit hic casus exemplum hydrops, qui ex mensium, vel in viris ex hæmorrhoidum fluxu cohibito, salvis adhuc & sine induratione, obstructione vel scirrhescentia visceribus, subito solet enasci. Subortus autem a talismodis causis hydrops facillius; quam quidem aliis potest sanari; si metuenda viscerum, ob diuturnam humorum extravasatorum stasim, corruptioni aptis occurrere remediis festinamus. Longe autem felicius succedit sanationis negotium, si sponte a natura in pedibus sit apertio. Nam copia humorum extravasatorum sublata relicta adhuc in corpore aquæ facili negotio a medicamentis digerentibus & evacuantibus vinci possunt & externi. Ego vero, si minoribus res peragenda est, ad sufficientem & tutam humorum evacuationem vix convenientius & efficacius reperi medicamentum, quam quod ex majori mannæ portione & aliquot tartari emetici granis concinnatur. Dicit enim vix potest, quantam hoc remedium edocet aquæ quantitatem, sine omni turba & vomitu, qui rarius in hydropicis per emetica solet cieri. Præter hæc notabile in hoc casu occurrit, quod frustra tentetur mensium repente suppressorum revocatio

catio in iis corporibus, quæ a diuturniori animi affectu & nimia humorum viscosorum stagnatione omne partium robur perdidit. Multo magis eo respicere debet medicus, ut prius effectus morbosos removeat, & viribus quodammodo resumptis ciborumque adpetentia restituta, circa illud tempus, quo menses fluere sueverunt, vel sanguinis missione in pede, vel pilulis balsamicis refracta dosi aloeticis & crocatis naturam ad mensium negotium leniter stimulet.

## OBSERVATIO II.

*Leno-  
phleg-  
matica;  
a febre  
quarta-  
na mole-  
stissima.*

Militiæ præfectus, quinquagenarius, corpore valde robustus, ob varios in victu & potu excessus autumnali tempore in febrim incidit quartanam, quæ quum per mensem & ultra laboraverat, hujus molestiæ pertæsus per quatuor dies larga in quantitate decoctum adsumit valde chinatum; unde febris quidem evanuit, sed non multo post, prægressa corporis refrigeratione ciborumque concoctu difficultum intemperantia, pedes cum abdomine ceperunt intumescere, vires imminui & respiratio valde difficilis reddi. Ego consultus curam hoc modo institui: Primo sal quoddam aperitivum, quod sal tartari & Carolinarum, nitrumque purificatum habebat, ad drachmam unam in aliquot unciiis aquæ & vini solutum bis de die, ut mane & hora quarta pomeridiana, sumendum obtuli. Dein in prandio elixir nostrum viscerale, & ante decubitus undecim pilulas balsamicas deglutientes dedi. Denique pro potu ordinario decoctum farsaparill. cum tertia vini Mosellani parte remixtum præscripsi. tam felici eventu, ut intra mensis spatium integre miser convaluerit.

## EPICRISIS.

A nullo morbo præcedente crebrius hydrops nascitur, quam ex febre quar-

tana perperam curata: quod suo jam tempore GALENUS lib. III. de locis affect. & disertissimus CELSUS sat luculenter prodiderunt. Etenim, quum sedes tum quartanæ tum hydropis in ipso hepate, ut jam veterum tulit opinio, præcipue debeat collocari, evidenter adparet, quando hæc febris nimis præcipitanter & antequam obstructio in hepate vel per ipsam febrem, quæ optima est medicina, vel per congrua remedia naturam adjuvantia, satis expedita fuit, cohibetur, persacile recidivam febris, aut alium longe graviorem morbum, qualis hydrops est, succedere. Idque eo magis evenit, si forte ob nimiam ciborum adpetentiam, corpore adhuc debili, multi crudi spissique generantur humores, qui ad hepatis infarctum denuo augendum mirum quantum conferunt. Equidem in longinquo artis exercitio complures ejusmodi casus, ubi ex quartana imprudenter suppressa vel novi insultus febriles vel anasarca hydrops prodierunt, adnotavi, sed nulla alia quam supra proposita methodo, quæ unice ad obstructions viscerum tollendas & excretiones restituendas directa est, curam institui & benedicente Numine feliciter perfeci.

## OBSERVATIO III.

Femina generosa, triginta annos nata, succulenti & formosi habitus, tertio mense gravida abortiendo incredibilem sanguinis in magna frustra coactam, quem moham dicunt obstetrices, eiecit copiam; unde mirum in modum debilitata, vires quidem ex parte resumit, sed quum crescente sit nimia erat in potu, exactis binis mensibus ad faciem usque a pedibus valde intumuit, anxie spiravit & de summa totius corporis gravitate lotique retentione conquecta fuit. Conlulit itaque medicum, qui grana decem elaterii in forma pilularum præscripsit, unde mira colluviei serosæ per quindecim fere sedes educta fuit.

Q 4 quatuor-

*Leno-  
phleg-  
matica  
ab abort.  
in loco.  
ita*

quantitas cum insigni tumoris decremento. Interpositis postea per sex circiter dies medicamentis stomachicis, quæ ex extracto absinthii & cent. minor. spiritu nitri dulci, tartari, & essentia cortic. aurant. & calcarillæ constabant, eadem dosi prillinum subjugebatur purgans; quo iterum magna feri exurabatur copia. Tum vero ter singulis diebus robebuli ad uociam dimidium fuit oblatum, & pro potu ordinario vinum Mosellanum cum fontibus Doonsteinensibus adsumtum, & sic brevi post urinæ secedebat liberior, totumque corpus, quod antea hecūm erat, leni suffundebatur madore: ita ut intra sex hebdomandum decursum ægra prillinx redderetur integritati.

### E P I C R I S I S.

A nimis hæmorrhagiis per causam tam internam quam externam indutis, vel a sola crebriori sanguinis e vena secta detractioe tumorem concitari hydropicum, plane non oovum, sed in experientia satis obvium est. Sanguine enim notabiliter imminuto vasa minima tam secretoria quam excretoria collabuntur, & nec utiles ad motum sustinendum humores, ut cerebri fluidum, secretantur, nec inutiles per organa excretoria rite separantur. Unde residua sanguinis portio non modo crassi sua valde immutatur, sed & io motu ac cursu suo impeditur; ut inde per facile feri contingat secessio. Quod vero si incidit, non statim hydrops emergit anasæra & ascites, sed in principio solum leucophlegmatia corpus solet occupare, quæ ex abundantia feri inter panniculum adiposum, ob motuum vidualium imbecillitatem, stagnante suam ducit originem. Et hæc hydropsis species ex facili potest curari, si modo medicamentis, sale quodam subtili volatili vim suam exerentibus mature succurramus. Hæc quippe dum non modo in tuicis vasorum motrices agendo, tonum ac robur ipsis resili-

tuunt, sed & glandulosas intestinorum partes stimulo, stagooris feri coluvium per alvum ejiciunt utilissime. Qua virtute præ cæteris pollet elaterium, a medico cum bonis ægrotae rebus oblatum; in cuius laudes, jam supra satis expositas, redire nolo.

### OBSERVATIO IV.

Illustris scœmia XL. ænonum, suc- F. m. ga  
c. h. m. ga  
c. h. m. ga  
c. h. m. ga  
c. h. m. ga  
ci sanguinisque plena, & semper lar-  
giorem mensium fluxum experta,  
quiquennio abhinc autumno incidit  
in dysenteriam, tunc temporis epide-  
mice grassantem, sub qua cum sævis  
ventris torminibus cruentas habuit de-  
jectiones. Per mensem & ultra hoc  
malo conflictata convaleuit quidem, sed  
abhinc vires recipere vix potuit; appe-  
tentia ciborum erat sere nulla, potus-  
lentorum oimæ, abdomen statibus  
valde turgidum, alvus, quæ antea rite  
respondebat, nunc restrictior, cum  
languida pulsuum celeritate. Inter  
hæc quum adhuc id haberet infortunii,  
ut ob inopinatum trium filiorum obi-  
tum magno adficeretur mœrore, ac-  
cidit, ut crescente virium defectione  
& coloris pallidi in lividum conversio-  
ne, universum corpus, maximeque  
pedes & hypogastrica regio valde in-  
tumesceret. Ad hunc tumorem acce-  
debant summa spiræodi difficultas &  
ad leviozem motum cordis palpitatio-  
nes, mensium copiosus & aquosus fluxus,  
uriorque tenuis secessio. Consul-  
ti sunt plures medici, qui per acro-  
ra purgantia, martialia & calidiora  
diuretica curationem reorant, sed  
irrita omni opera ægram hydropæ pe-  
ctoris lethali laborantem exsiliantes  
derelictam habuerunt. Tandem & ego  
consultus hanc inii methodum. Primo  
singulis diebus ante decubitum decem  
pilularum balsamicarum & alternis  
diebus mane drachmam unam salis di-  
gestivi, quod terræ foliat. tartari, ocu-  
lor. cancr. arcani duplicati æquale pon-  
dus cum dimidia nitri purificati por-  
tione habebat, ex aqua & vino lumere  
&

& infusum theiforme superbibere jussi. His ita per decem dies adhibitis radiceem mechoacan. alb. ad drachm. unam cum rad. ipecacuanne grani XV. & nitri purificat. gran. X. subjunxi; quo medicamine mira aquosi liquoris, sanguine parum tincti quantitas per uterum excreta & alvus simul ad decem sedes stimula fuit. Elapsis quatuordecim diebus idem remedium iteravi, interponendo elixirium meum viscera. le balsamicum, bis de die ex aqua scœniculi & melissi, citratæ vinof. capiendum. Et sic convalescentiæ spes adparebat exoptatissima; siquidem abdomen non modo detumefcebat, sed & respiratio erat liberior, facies vividior & appetitus cum viribus vegetior; unde ego medicamenti balsamicis continuandum ratus, elixirium præscripsi ex tinctura tartari, essent. gentian. rubræ, succini, & additis aliquot olei carminativi guttulis compositum; circa instans vero mensium tempus pilulas nostras balsamicas dedi, quibus ingens aquæ & viscidum humoris copia fuit expurgata. Adpropinquante vere loco acidularum & thermarum per mensis spatium in villa rurali mane adsumpta fuit tinctura martis pomata, de super bibendo mensuram fere unam brodii medicinalis, in quo herba nascitur aquat. rad. asparagi, scœniculi, petroselinii, apii, addita cremoris tartari portione, erant decocta. Absoluta hac cura elixirium nostrum balsamicum & interdum ex rhabbarbo & passul. cum cremore tartari laxas ægra adhibuit, & sic intra biennium restituta jam integerrime vivit.

### EPICRISIS.

Varia fuit in præfata morbi historia, quæ probe merentur adnotari, quorum potissima sunt:

1.) quod malum dysentericum, nisi finito morbo tonus & motus ventriculi ac intestinorum peristalticus convenienti medicina roboretur, per facile graviores, ut hypochondriacum &

cachectico-hydopicum excitare adfectum possit. Tono quippe & robore harum partium destructo, non modo ciborum digestio & chyli boni generatio, sed & sordium per alvum excernendarum secessio multum vacillat, adeoque ad spasmos & flatulentias, gravium symptomatum generatrices, intestinorum canalis disponitur.

2.) quod hydropicum malum longe facilius in feminis ob uterum & mensium negotium, quam in nobiliori sexu producat. Nam propter difficultatem sanguinis per uteri venas, in semet ipsas valde implicatas regressum non modo vasa uterina sanguine facile infarciuntur multumque serositatis ibi deponitur, sed & in toto corpore humorum circuitus languescit & retardatur, adeoque ad cachexiam hydropicam fit transitus. Qui tali vero fundamento nititur hydrops curata est facilius, quam ex hepatis vizio enatus. Longe enim expeditius est, obstructa uteri vasa referare, sanguinique impeditum motum promovere, & collectas ibi serositates expurgare, quam hepar obstructum & induratum emolliere, & sanguinis per ejus vasa circuitum in ordinem redigere. Cujus rei luculento esse testimonio potest felicissima collectæ humiditatis in nostra ægrotæ per uterum evacuatio, a medicamentis digestivis leniterque stimulantibus adjuva, quam ego non semel sed sæpius in feminis cachecticis & leucophlegmatia laborantibus observandi occasionem habui.

3.) probe notandus est saluberrimus tincturæ martis pomatæ cum brodio carnalis medicinali usus. In genere tamen notari velim, martialia in forma liquida & temperato acidulo menstruo parata majori cachecticis feminis quam viris esse præsidio. Hæ enim ob laxiorem & spongiosorem, quo præ nobiliori sexu gaudent, texturam ejusmodi roborans & subadstringens medicamentum optime ferunt.

## OBSERVATIO V.

*Hydrops  
ascreti  
frigido  
per la-  
cubatu-  
m.*

Juvenis viginti annorum generosus, habitu corporis spongioso præditus vitæque sedentariæ addictus a prima statim infantia ex scabie retropulsa insigni pedum abdominisque intumescencia cum lividis maculis in eute hinc inde efflorescentibus laboravit. Academiam ingresso valetudinis emendandæ causâ exercitium commendabatur pugillatorium, a quo vehementer aliquando calefactus quum largiorem frigidæ cerevisiæ haustum infunderet, mox pessime habebat. Languor enim universi corporis cum tussi valida & respirandi angustia sequebatur, aquosus pedum tumor crescebat, tantaque subinde capiebat incrementa, ut non modo scrotum, sed totum quoque abdomen occuparet & ad ruptionis usque metum distenderet. Præterea, quod notabile erat, a nimia scroti inflatione retrahebatur mentum; & præputium instar vesicæ inflatum urinae excretionem, quæ communiter in hydropo parcius esse solet, retardabat, pedes frigidissimi nec ignitis tegulis ad calorem naturalem poterant reduci; appetitus tamen adhuc modice constabat. Præter varii generis medicamenta consilium inhibent medicum de scroto aperiendo, ex quo cum lancetta aperto ingens aquæ profluebat copia, unde scrotum quidem cum abdomine diminutum, somnus quietior & vires quodammodo restitæ videbantur, pedum vero tumor æque ac molestem tussendi conamen perseverabat. Sanato hoc ulcere pristina ludebatur tragœdia: namque abdomen cum scroto denuo in magnam crescebat molem. Rursus itaque cutis in membro virili incidebatur & plus quam X. feri educebantur libæ. Hoc pariter vulnere consolidato vires iterum cum appetitu vigere ventrisque tumor remittere videbatur. At vero quum patiens, ob summum domum revertendi desiderium, in-

genti angeretur morore, accidebat; ut prævio horrore & succedente æstu erysipelas in pede erumperet, cui depellendo vix ulla par erat medicina. Dolor enim & tumor inflammatorius mox totum corripiebat pedem & circa quintum diem lividæ, eum interpersis magnis vesiculis, emergebant maculae, pulsus ferebatur debilis & celer, sitis urgebat fere inexhausta, noctes erant insomnes, alvus præter modum fluida, urina alba & clara, tandemque viribus consumtis æger placide exspirabat. Corpore post mortem dissecto intra abdominis musculos & plauguedinem magna observabatur aquæ quantitas; in cavo vere abdominis mensuræ quatuor, in thoracæ mensura dimidia, in pericardio quatuor circiter uncia fluidebant aquæ limpidissimæ. Hepar & lien, insolite magnitudinis & coloris pallido-albicantis, reperiuntur durissima, sanguine præne omni destituta, qui tamen supererat in hepate sanguis ex globulis instar milii solis duris videbatur compositus. Bilis erat pauca & instar glutinis compacta, bruni coloris. Vasa venosa valde extensa parum continebant sanguinis, loturæ carnis non abissimilis. Duplicatum peritonæi, quæ urethères & vasa spermatica, ipsamque vesicam continet, copiosis hydatidibus erat obfessa, ex quibus discissis magna aquæ profluebat copia. Pulmones denique erant fere exsangues & candidi, in corde vasa coronaria valde inflata. Dissectis pedibus membrana, sub qua adeps reconditur, aqua turgescibat, & quum perventum erat ad membranam, quæ musculis supersternitur, ea instar vesicæ aquæ repletæ adparebat, factaque dissectione aquæ instar rivi effundebantur & glutinosa materia tragacantham referens conspiciebatur.

## E P I C R I S I S.

Ex hac memorabili morbi historia plura notata digna in usum medicum possunt elici;

1.) extraordinaria vasorum venosorum magnitudo sanguinis circuitum per venas indicat impeditiorem & valde retardatum, a quo etiam derivandum est, ut vasa lymphatica, ob lymphæ a sanguine secessionem ampliata tandem disrupta fuerint.

2.) induratio illa viscerum malum ostendit incurabile, quam dudum jam optimus juvenis intus absconditam recondidisse videtur. Quare non mirum est, a pluribus abhinc annis eum cachexia laborasse, quam tumores pedum œdematosi & maculæ in cute flavæ & lividæ commonstrant luculentissime.

3.) peculiarem meretur animadversionem, quod exigua sanguinis in vasis & visceribus reperta fuerit quantitas, maximeque hepar, lien & renes omni fere rubedine adparuerint exuta: cujus rei ratio exinde venit deducenda. In tali statu cachectico-hydopico, ob segniorem sanguinis progressum, sanguificationis actio, seu chyli in sanguinem conversio mirum quantum laxa est ac depravata; hinc omnes, qui ingeruntur cibi in serum potius, quam sanguinem solent transmutari. Et inde quoque fit, ut sanguis hydropicorum e vena emissus nunquam non copioso sero sit reffertus.

## OBSERVATIO VII

*Hydrope  
sympt.  
mutant.* Vir quinquaginta annorum, laetiori diæte vitæque sedentariæ additus & lactinia cum fructibus acidis horarum in deliciis habens, prægresso diuturniori mœnore incidit in cachecticum corporis habitum, ex colore faciei lurido, sublivido & ad flavedinem inclinante satis conspicuum; unde ciborum appetentia, satis antea

vegeta una cum viribus valde concidebat, status & borborygmi in abdomine, ob segniorem alvum, miras creabant molestias, respiratio cum præcordiorum anxietate reddebatur difficillima, ut per intervalla morti proximus æger haberetur, & quod maximum erat, pulsus micabat debilis, nonnunquam intermittens, pleurumque inæqualis. Histandem malis jungebatur icteritius faciei color cum majori pectoris angustia pedumque intumescencia, quæ altius subinde ascendendo ipsa demum femora & scrotum obfidebat. Multa a variis medicis adhibita medicamina nihil afferbant levaminis. In consilium itaque adficebatur alius cura hydropis famigeratus medicus, qui extractum claterii & enulæ ad drachmam unam cum jusculo calido aliquoties propinabat; unde *et* *et* *et* fortiter expurgabatur ingens viscidæ copia, & crescente pedum abdominique tumore læta convalescentiæ spes affulgebat. Nihilo tamen minus quam anxia præcordiorum oppressio aucta potius quam diminuta & vires cum adpetitu magis inde prostratæ viderentur, ego cum aliis adstantibus medicis validius illud catharticum seponere & nonnisi temperata balsamica & roborantia adsumere fuisti, donec omnibus in pejus ruentibus æger diem obiret supremum. Cadavere aperto in abdomine pariter ac thorace magna seri extravasati conspiciebatur copia. In cordis & pulmonum vasis delitescabant concretamenta polyposa, ex dextro cordis ventriculo per arteriæ pulmonalis ramos dispersa. Fellea cystis calculo, tres minimum drachmas adæquante multisque minoribus lapillis erat refferta. Totum vero hepar cum Mene atro sanguine inveniebatur infarctum valdeque flaccidum & reliqua vasa venosa omni fere sanguine privata.

## E P I C R I S I S.

Docet imprimis hic casus, quomodo  
cx

ex præcedentibus & ad unam quali conspirantibus causis hydropis fiat generatio. Siquidem habitus corporis spongiosus, acidorum & lactis abusus, animi mæror & vita laboris expers ejus sunt naturæ ac indolis, ut spiritusascentiam sanguinis imminuendo, humores valde glutinosos ingenerent, quia vasculorum obstructions, concretionisque polypolas & calculosas materiam subministrant largissimam. Videtur autem hydrops in præsentī casu magis symptomatīcus, qui obstructionem hepatis & spasmos præcordiales, ob calculum in cystide fellea & polypum in corde atque pulmonibus contentum, inductos excepit. Anxietates enim & spasticæ præcordiorum stricturæ, multo magis vero concreta ista fibrosa, pulmonum vasa replentia liberiore sanguinis circuitum non modo in pectoris regione, ubi sedem fixam habent, sed per reliquas quoque remotiores partes impediunt; unde ob tardiorē ejus circuitum serum in vasa lymphatica secedit, & in porosum habitum effunditur. Quodsi vero polyposa ejusmodi repagula hydropicorum tumorum causæ existunt, facile est judicatu, cum hæc ipsa nulla ex pugnari arte queant, morbum fieri insanabilem. Videmus hinc purgantium, præsertim validiorum usum postis hinc circumstantiis magis esse noxium quam proficuum: quandoquidem hæc, validissime in genus nervosum agendo, anxietates & spasmos in præcordiis sævientes adaugent, ut inde non possint non vires cum appetitu magis prosternei. Nos in genere ita judicamus, longe consultius esse, hos morbos tempestive avertere, quam, ubi increverunt, iis curandis multam operam impendere frustraneam.

## OBSERVATIO VII.

*Hydrops* Vir triginta annorum, complexio-  
*peccans* nis sanguineæ, qui adolescentiæ annos  
*testiculi* inordinato vitæ genere transsegit ma-

ximeque spirituosos potus magna in copia ingurgitavit, militiæ deditus corpus quondam vehementi exponebat frigori, quod quum pectus potissimum occuparet, brevi post de stabili & fixo sinistri lateris dolore, spirandique difficultate conquerebatur. Mutato vitæ genere, quum a vita valde laboriosa ad quietam transiret, non modo dolores & præcordiorum anxietates, sed tussis quoque & spirandi angustia tanta cum vehementia ingravescerant, ut per fenestras nonnunquam liberiores anhelare aerem debuerit. Accedebat dein pedis & femoris sinistri intumescencia, quæ serotum simul valde distendebat, alvus & appetitus satis bene constabant, & urina mingebatur flavescens coloris tenuis. Tandem cum data occasione in omnium effusus risum pectus vehementius commoveret, mox de summa spirationis angustia conquerens in horas suffocari videbatur & sub debili & inæquali arteriarum pulsatione per validam tussim eliciebat: sputum sanguine leviter tinctum; & demum viribus penitus dejectus tertio die post animam efflabat. In sectione cadaveris totum abdomen conspiciebatur integrum, in thoracis autem cavitate in sinistro latere mira aquarum fluctuabat quantitas, quæ ad septem propemodum libras accedebat. Cordis vasa concreta alba instar calami scipitorii continebant, pulmones erant depressi ac collapsi, & arteria pulmonalis, polypo intus repleta, visui se offerebat nigra & sphacelata, fetidum spirans odorem. Penitus deinceps inspecta thoracis cavitate in dorso variæ se objiciebant membranæ & cuticulæ dilaceratæ, a vertebra & costis thoracis separatæ, quæ non obscure indicabant, magnum hic delituisse sacculum membranaceum aqua repletum, qui disruptus tantam aquæ copiam in thoracem effuderit, ipsamque mortem acceleraverit.



## EPICRISIS.

Mortuus est hic æger hydropse thoracis, quo orthopnoea vexati; ut recte monet BAGLIVUS, quin non nisi erecta cervice spirare, nec in lecto, obfuffocationis metum stabilem invenire locum possunt, plerumque laborant. Sed memorabile in nostro casu videtur, quod hydrops fuerit factus, & aqua extravasata sacco membranaceo ex pleura a costis separata producto inclusa, quæ dolorem fixum peperit, liberamque pulmonum expansionem, præsertim sub diaphragmatis a ventriculo inflato compressione, impedivit. Postquam vero, tumore per risum rupto, serum in tanta copia effluxit, ut pulmones inundaverit, non potuit fieri, quin denegata horum expansione, sanguinis circuitus plane fuerit interceptus, & strangulatione quasi æger interemptus. Quod vero ex aspera arteria serum sanguinolentum tussis fuerit rejectum, hæc videtur ratio, quia sanguis per arteriam pulmonalem in pulmones reductus, & regressu suo impeditus, cum impetu ad tunicam asperæ arteriæ glandulosam confluit, ibique inflammationem excitavit. Quod dein pedum intumesceniam attinet, sciendum est, hanc fere inseparabile hydropis pectoris esse symptoma. Si denique curationem trunculenti huius mali attendere velimus, nihil dubit est, quin in ejusmodi casu paracentesis cum fructu possit institui; si modo ægrotus hancce admittere operationem non recuset: præsertim quum jam olim HIPPOCRATES eandem in hydropse pectoris commendaverit.

## OBSERVATIO VIII.

*Hydrops* Annus est, & quod excurrit, quum  
*pectoris* vir in summa dignitate constitutus,  
*asthmatis* Asthmatico-hydropsicus, sexagesimum

ætatis annum supergressus, meum consularet judicium de transmissa totius morbi historia, quæ hæc continebat momenta. In adolescentia vir generosus multum sæpe cruoris & natis fundere suevit, & cum academicam ingressus vitam, litterarum studii & lucubrationibus in multam noctem productis, neglecto corporis motu plus jussu indulisset; affectionem incidit hypochondriacam cum hæmorrhoidibus cæcis junctam; ad quam mitigandam aquas Wildungenses & Schwalbacenses aliquoties cum fructu potavit. Ante duodecim vero annos medicus fontes Pyrmontanos bibere jussit; enim vero ab horum usu mox redierunt hæmorrhoides cæcæ valde furentes, quæ tandem applicatio hirudinum in ulcus fistulosum transierunt. Post hæc per aliquot annos anxietatibus cardiacis, & asthmaticis pectoris oppressionibus per intervalla fuit obnoxius, quibus duobus abhinc annis dolores podagrici & nephritici cum pertinaci ischuria stipati accesserunt. Nunc dimidium effluxit anni, ex quo prævia iracundia adfectus asthmaticum cum summa præcordiorum anxietate graviter invasit, & pedum primo, mox femorum & scroti, totiusque abdominis tumor successit. Consuluit itaque medicum, qui infusum purgans exhibuit per sex dies bibendum; unde, magna seri colliuvie excreta, inferiores quidem partes detumescere coeperunt, sed remanente asthmate, licet remissiori non multo post in sinistro thoracis latere dolor obortus est cum sputo cruento puncto-rius, ipseque tumor recrudescens pristina loca repetiit; unde urina fecessit parcior, & spirandi difficultas cum torano paucis & perpetuo pleuritico dolore denuo increbuit. Hæc morbi fuit historia, quæ attente perlecta singulisque probe pensatis responsum dedi: quod asthma, hæmoptoe, pleuritis, & ipse tumor hydropicus pulmone male adfecto, & vel obstructo, vel polypis obfesso suam debeat.

debeat originem. Quodsi enim sanguis ex uno cordis ventriculo ad alteram minus liberum habet transitum, aliter fieri non potest, quam ut in dextro ventriculo & toto venæ cavæ systemate ejus cursus sistatur ac retardetur; hinc stagnat & serum secedens substantiam porosam & cavitates intrat. Pulmones vero, me iudice, viz aliunde suam contraxerunt labem, quam a sanguine per spasmos & status intestinorum, qui hypochondriacis, podagricis & nephriticis valde familiares sunt, ad pectus nimium congesto. Neque de nihilo est, polyposam in pulmonibus concretionem suspicari, utut de pulsu, qui in tali casu plerumque intermittens & inæqualis est, nihil relatum mihi fuerit. Sæpius enim iterumque in asthma cum dolore pectoris & sputo cruento juncto polypos in thorace adnotavi. Et hac ratione ductus mox tristem morbi eventum judicavi, qui etiam inopinato post venam in brachio sectam sequutus est.

### EPICRISIS.

Hypochondriaci, maxime hæmorrhoidarii, nisi se precipitare in graviores & funestas adfectiones velint, exquisitè præcepta servare diætetica & potissimum a vehementibus animi moribus abstinere, atque paucis, sed fidis uti remediis debent. Id quod tanto magis necessarium est, si forte doloribus nephriticis, arthriticis & podagricis constanter, ne materia morbofa, ad superficiem corporis salutari motu propulsa ad interiora reprimatur. Perfacile enim hac ratione asthma succedit hydropicum lethale, atque tum asthma ut plurimum primarium est adfectus, cui hydrops ut symptoma adsociatur: unde præcipua medentis cura ad causam asthmatis removendam dirigi debet. Multum itaque peccant ii, qui solam curandi intentionem ad tumorem abigendum dirigentes hydragogis fortioribus

aquas educere moliantur: qua perversa methodo inflammationes intestinorum lethales possunt arcescere, præsertim si hæc ipsa cardialgia & spasmi, a materia podagrica repulsa jam fuerint adfecti. Tali in casu antispasmodica cum diaphoreticis mixta, vel etiam V.Sio, aut clysteres perniciosis ejusmodi symptomatibus avertendis valde sunt idonea. Denique id probe tenendum est, ne facile in asthmaticis, si polyposi quidpiam subest, ut ex variis signis judicare licet, vena in brachio secetur, multo minus si largiori quantitate nec interrupto fluxu sanguis mittatur. Cor enim coagulatum jam infarctum sanguinis affluxu sufficiente destitutum quam facile ex toto systolen amittit, ut syncope lethalis inde emergat, qualia exempla non paucæ in recenti memoria teneo.

### OBSERVATIO IX.

Vir Illustrissimus, quadraginta & *Asthma* aliquot annos natus, mediz statuz, *non hy-* habituque corporis spongiosiori & *drop-* temperamento sanguine præditus, *ausar-* qui a prima adolescentia integro vi- *ssim.* rium & appetitus vigore gavisus, in militaribus exercitiis cum defatigantibus corporis motionibus junctis quotidie fere summam quæsit voluptatem; ante quinque vel sex annos ob lautiores diætæ vinique spirituosioris & cerevisiæ triticæ valde nutrientem potum præter modum coepit pinguescere, terque quaterve in anno leviori rheumatismo, mor manus, mox pedes pererrante tum maxime temporis corripere, quum frigida & humida regnabat aeris intemperies. Hinc dein superveniebant adhuc alia, eaque longe graviora mala. Nam pedes occupabat tumor, & in pectore spirationis difficultas per intervalla pessime affligebat; quæ non parum capiebant incrementum, quum a nimia ciborum variorum adpetentia abdomen statibus distentum liberiores diaphragmatis descensum sæpe impediret, ita prorsus,

ut illustrissimus ægrotans in lecto non decumbere, sed erecto potius corpore somnum capere per aliquot annos debuerit. Supor quoque interdum non raro per horæ dimidium & ultra invadebat inopinatus atque tam gravis, ut excitari vix posset. Præterea nullam in omni vita toleraverat sanguinis per nares vel fedales venas fluxionem, quam deficientem ex parte compensare medicus studebat venæsectione bis in anno instituta, quæ vero quum in pedibus, qui tumore continuo erant obstiti, administraretur, parumque inde sanguinis efflueret, nihil hac methodo proficiebatur. Nam vanus erat timor, ob quem medicus, ne forsan periculi plenam suffocationem arcesceret, venam in brachio secare dubitabat. Multo magis iusta metuendi erat ratio, ne tumor aquosus in corpore adeo plethorico, & faciei colore ad nigredinem vergente, magis ac magis cresceret; quod etiam brevi post insequabatur. Etenim mox totum corpus æqualiter intumescerebat, & quod pessimum erat, consueti manuum & pedum dolores rheumatici nunc sub tempestate frigidiori vel plane non adparebant, vel mox remittebant. Quum is esset depravatus valetudinis status, & indices pejora ingruerent symptomata, ego pariter in consilium vocatus, hunc morbum asthma cum hydropo anasarca junctum, & nimiam sanguinis abundantiam, quæ cor cum pulmonibus pene oppressum erat, inductum judicabam. Quam Medicus ordinarius ante meum accessum in brachio admiserat venæsectionem & laudabam & approbavam, consultum fore ratus, ut aliquoties pro re nata iteretur; & iterabatur quoque cum insigni spirandi levamine polsumque augmento. Accuratori instituto examine, cui intererant adhuc alii peritissimi medici, ex certis & evidentioribus signis viscera nec obstructa, nec scirrhusa, sed integra, nec intra peritonæi abdominisque cavitatem serum extravasatum, nec pulmones polypis

obfessi deprehendebantur: & quum sub modica ciborum adpetentia alvus satis bene responderet, abstinentius ab omnibus fortioribus hydragogis & diureticis, & potius injuncto accuratiori vitæ regimine medicamenta dedimus balsamica amara, stomachica & carminativa, interpositis subinde salibus deterlivis & aperientibus. Potui præscripsimus cerevisiam insigniter diureticam, & ad discutiendos flatuos ano clysteres carminativos frequentius injiciendos curavimus. Hæc inter uno vel altero mense transacta natura, optima gravissimorum morborum medicatrix, sponte sibi exitum parans copiosas in pedibus excitabat vesiculas, e quibus cum febrili quodam motu & redeunte podagrico insultu ingens aquæ expellebatur copia. Et sic tandem Illustrissimus æger melius respirare, quietiorem somnum capere, urinam, quæ antea parcius fluebat, magis reddere, & resumtis viribus penitus convalescere incipiebat, ut nunc, quæ Dei gratia est, ab omni malo immunis sanus degat.

## E P I C R I S I S.

1.) Permultum interest, ut medicus in cura gravioris & fontiori morbi prudenter adornanda veram causam primamque scrutetur originem, quæ in hoc nostro casu nimia fuit sanguinis abundantia, & exinde ortæ in visceribus nobilioribus & extimis partibus stagnationes; unde simul asthma & ex hoc hydrops fuit enatus, qui facile potuisset averti, si e vena brachii tula tempestive conveniens sanguinis detracta fuisset quantitas. Minime enim a tali venæsectione, in brachio instituta metuenda est major sanguinis ad superiores partes attractio, & ex hac oriunda suffocatio; ut hæc ipsa potius certo avertatur, si nimia, quæ jam adest, plethora imminuitur; quod suo jam tempore optime præcepit HIPPOCRATES, eo loco, quem in cautelis §. I. allegavimus.

2.) Lu-

2.) Luculenter edocemur, in maximis morbis vincendis lenissima & fere simplicissima remedia optimum ferre levamen, si modo satis diu continuantur. Quodsi enim in nostro casu, ad educendam corpore aquas fortiora purgantia & diuretica adhibuissetus, facile pernicialis induci potuisset intestinorum inflammatio, quam ego quidem non raro in anasarca & ascite laborantibus vidi. Longe itaque consultius fuit præter iustam & sufficientem sanguinis missionem ejusmodi remedia, quæ discutiendis flatibus & tono intestinorum roborando idonea sunt, in usum vocare. Etenim, cum primarius morbus fuit asthma, cujus effectus seu symptoma hydrops debet haberi, & quoniam illud a nimia sanguinis abundantia & congestionem ad thoracem partemque superiores, neque minus a flatibus ex primarum viarum cruditatibus originem traxit, facile intelligitur, quare adhibita remedia omne in curatione absolverint punctum.

Plura de hydropse exempla reperire licet in responsis & consultat. medicinali. Sect. III. casu LVL & LXVII. usque LXXI.

## CAPUT XV.

### DE FLATULENTIA VENTRICULI ET INTESTINORUM, ET AFFECTIONE TYMPANITICA.

#### THESES PATHOLOGICÆ.

##### §. I.

*Flatulentia quid sit*  
**I**N nulla corporis humani parte tantas molestias creant status, (qui sunt, nisi vapores halituoosi, expansiva elastica vi præditi,) quam in ventriculi & intestinorum cavitate, ubi velut in carcere inclusi, hosce canales ex tunicis mere musculosis &

nerveis, quæ motu & sensu gaudent, constatos, remittente ipsarum tono; non sine dolore & anxietate vehementer distendunt, &c., ut multum inde omnis generis functiones lædantur, efficiunt.

##### §. II.

Si speciatim ventriculus a flatibus *Sympt.* incarceratis supra modum expanditur, *mor.* gravissima subinde oriuntur sympto- *qua est.* mata, qualia sunt summæ circa præcordia anxietates cum valde difficili & ægra spiratione, pectoris oppressione, inquietudine extremorumque frigore & ingenti virium collapsu. Inter hæc facies cum aspectu lurido contracta est, & interdum cum difficili deglutitione faucium urgent constrictione, cordis palpitatio, phlogoses, scotomia, vertigo & hujus generis alia. Cognoscitur autem flatulenta hæc affectio ex intumescencia, quæ circa cordis scrobiculum versus latus dextrum satis sæpe ad tactum manifesta est, nec non ex crebra & vehementiori eructatione, quæ notabiliter symptomata mitescunt.

##### §. III.

Quod vero vehementem ventriculi *Ratio* intumescencia tam læva excipiant sym- *horum*ptomata, hæc sunt præcipue causæ *sympt.* *matum.* Notum quippe ex anatomicis est, quod ventriculus pars in valde nervosa, & quod octavi & paris intercostalis rami inter tunicam ipsius nerveam copiose dispergantur, qui quum ad omnes corporis nervosas sensuque & motu præditas partes excurrant; non mirum esse debet, si propter eximiam hanc, quæ partes invicem intercedit, communionem, in omnibus fere reliquis corporis partibus sensibilibus tam diræ oriuntur afflictiones. Quæ dein comitatur difficilis & anxiosa spiratio itidem a ventriculi expansione inducitur, quæ diaphragmatis alterius expansioris & restrictioris motus, a quo iater alia respirationis pendet negotium, impeditur: & quum hac ratione cavius thoracis simul coarctetur, pulmones non rite possunt expli.

explicari; unde liberior sanguinis ex uno cordis ventriculo in alterum transit remoratur.

## §. IV.

*Spasmi  
Stomachi  
et intesti-  
ni.* Flatulentia ejusmodi distentioni præter ventriculum, tota intestinalis fistula, quæ ex ejusdem generis tunicis, nervorumque & sanguineorum vasorum ramificationibus, ut ipse ventriculus constat, obnoxia est. Quodsi vero totus intestinelorum tam crassorum quam tenuium canalus a flatibus violententer expanditur, non tantum tumor totius abdominis, sed dolor quoque, maxime circa umbilicum, ubi tenuium sedes est, sat gravis cum pertinaci alvi strictione, inquietudine, anxietate, extremorumque refrigeratione, & virium lapsu conjunctus oboritur, atque tum adfectus dicitur colica flatulenta. Quando hæc flatulentia non est transitoria, sed in longum tempus, menses, vel annos protrahitur, tumor abdominis durus instar tympani sonum edens tympanites vocatur & malum portendit vix ulla medicina sanabile, præsertim si ascitem, superiorumque partium macorem habet comitem.

## §. V.

*Causa  
motus  
visalis.* Quod attinet ad causam morboſæ ejusmodi flatulentia proxima, hæc utique duplicis esse generis recte statuitur. Altera materialis, quæ in flatuum facili & copioso proventu residet, debetur ingestis, quæ præ aliis tenacis, mucidæ & pronz ad inducendos flatus consistentia sunt; quæ inter merito oleracea, raphanacea, legumina, pisa, fabas, pisces marinos exsiccatos & fructus horaeos, omniaque fermentescibilia, dulcia, mellita, cerevisias triticeas & farinacea quoque triticea, pulticulas, præsertim e milio paratas, pinguis ovilla & vervocina, maxime si his frigidus superingeritur potus, referimus. Scire tamen licet incongrua ejusmodi ingesta tam sicca quam fluida longe majorem inferre noxam, si in magna quantitate adsumentur.

## §. VI.

*Causa  
fermentati-  
va.* Altera, quæ formalis dicitur, perniciosa flatulentia causa in inordinato motu peristaltici debiliata, quæ ab impedito liquidi nervi & sanguinis arteriosi in intestinum influxu dependet, querenda est. Quemadmodum enim ille motus, si recte & secundum naturæ ordinem se habet, non modo vaporibus, qui semper ob humidum in intestinis contentum præsto sunt, resistit, sed eos ipsos etiam per totum tractum sine omni molestia propellit; ita e conterario, si propter nimiam roboris ac toni intestinelorum remissionem, & membranarum inde ortam flacciditatem vacillat, huic muneri vix amplius præest. Præter hæc quoque ingesta, antequam ad intestina serantur, diutius in ventriculo subsistunt, & in vapores resolvuntur; unde in vicino duodeno & jejunio ob acrimoniam particularis oboritur spasmus, qui dextrum ventriculi orificium sive pylorum, & per consensum etiam sinistram constringit, ut inde vapores non habeant exitum, sed inclusi vim suam elasticam in nervosas ventriculi tunicas vehementer exerceant. Cui distentioni quando natura majori liquidi nervi adfluxu occurrit, resistita ad tempus vi tonica renitente, flatus magno cum impetu per superiora erumpunt.

## §. VII.

*Causa  
remota  
sunt  
tempo-  
rales  
causæ.* Quæ cum ita sint, judicatu est facile, quicquid ad motus peristaltici depravationem contribuit, illud pariter ad flatulentiam producendam esse aptissimum; unde evidenter patet ratio, quare homines, qui habitus corporis sunt laxioris, & spongiosioris, ut fere phlegmatici, sexu feminæ & ætate senes atque infirmes esse solent, ad inflationis malum valde sint proclives. Et quoniam liberior vaporum, qui continuo in intestinis progignuntur, transpiratio sub inordinato intestinelorum motu contristatorio & dilatatorio valde impeditur, multumque inde incommodi infertur;

R facile

facile poterit intelligi, quare ab insolita & nuda abdominis artuumque refrigeratione, vel pedum super frigido pavimento incessu, manuumque in aquam frigidam immersione, vel etiam a potu gelido, ætivo tempore eorumpi sudanti ingurgitato, tam frequens colicæ flatulentæ & torminum imi ventris sit proventus. Siquidem hæc omnia ita sunt comparata, ut eximiam intestinorum tonum debilitandi potentiam obtineant.

## §. VIII.

*Morbi p. g. g. of p.* Sunt vero adhuc alia, majoris momenti causæ, quæ robur nobilissimarum illarum partium destruendo, nostrum morbum produciunt. Attenta enim observatione discimus, periculosas abdominis inflationes iis quam maxime contingere, qui a præcedente morbo, v.g. dysenteria, febre acuta & variolosa, aut diuturna intermitteente, vel etiam ob nimiam sanguinis profusiones, sive per vulnerationes, ac hæmorrhoides, sive in feminis per abortum, per partum, aut extra ipsum per lochia & menses ingentem visum lapsum liquidique nervorum spirituosos elastici & sanguinis depauperationem passi sunt; idque eo magis si, posthabita virium ratione, plus ciborum ingerunt. Et inde perspicue poterit colligi, quid statuendum sit, si, ut sæpius in morbis periculosis & acutis evenit, circa tempora critica molestæ præcordiorum distensiones cum borborygmis & flatuum in imo ventre fluctuatione percipiuntur. Usurpimum enim mortis indicium præbent, tum quod extremum virium lapsum indicant, tum vero maxime, quod ad penitus sufflaminandam respirationem multum omnium valeant: quæ abdominis inflationes post mortem, ob plenariam roboris destructionem ab internis tam potentibus quam medicamentis semper sere auctiores evadunt, ut, ne rumpatur abdomen, pondere rerum incumbentium comprimendum sit.

## §. IX.

*Spasmi primarii & secundarii.* Simili quoque ratione per attentam experientiam innotescit, atroces diutiusque perseverantes in primis visus spasmos intestinorum atoniam & flacciditatem motusque peristaltici imbecillitatem, & ex hac demum vehementes inflationes subsequi. Hinc colicam spasmodicam frequenter excipit flatulenta; quæ, nisi rite tractetur sed ad dolores mitigandos potiones anodynæ offerantur, perfacile in paralytin transit. In cupis rei illustrationem notatu digna celeberr. WEPFERI experimenta, quæ in tractatu de cicuta aquatica ad effectus venenorum demonstrandos attulit, multum conferre arbitror. Etenim ab arsenico canibus ingesto gravissimæ vomitiones & spæthicas ventriculi contractions, post has vero, flaccescente ventriculo vehementes ejus distensiones flatulentas observavit. Id quod etiam clarissime in oculos incurrit, quem a sumto veneno corrosivo, quod atrocibus spæthicis operator, demortui totum intestinum volumen, sectione abdominis facta, propter flatum impetuose erumpit, ut vix in locum suum reduci possit. Ex quibus probe consideratis clarius nunc poterit intelligi, acriora purgantia & emetica, dysenterias, nec non colicas spasmodicas & hæmorrhoidales ordinario ingentem primarum viarum imbecillitatem relinquere, quæ molestæ abdominis inflationi causam præbet aptissimam.

## §. X.

*Spasmi & flatus.* Verum enim vero, non raro evenit, ut spasmi & flatus simul intestinorum canalem obideant, quorum illi tunicas constringunt, hi vero in intestinorum cavitate contenti vehementem & contrariam expansionem moliantur. Id quod potissimum fieri solet, quando materiam flatulentam acrimoniam quandam biliosa imbuta est, quale quid animadvertere licet in infantibus lactantibus, qui horrendis torminibus & borborygmis, extrorsum etiam per violentas explosiones se mani-

manifestantibus, valde cruciantur & faeces deponunt ab acido arrodente admixto virides, quæ lineæ tenuiora instar aquæ fortis exedunt. Idem observamus, ubi materia tenax, mucida cum viscidilla bile, vulgo dicunt Eier gehadtes, commixta ejectione. Sæpe etiam lentiores mucidi, quos infantes et tussi humida mucilaginosi solum propulsos deglutienti ventriculo & intestinis obtrudunt, in culpam veniunt, e quibus status copiosiores cum terminibus excitantur.

§. XI.

De flatulentis, quæ totum intestinum tractum æquali nisu distendunt, hætenus diximus, sequitur jam, ut de particularibus istis inflationibus & spasmis, qui certam tantummodi intestini partem occupant, quædam, quæ in attentiori praxi consideratione digna sunt, proferamus. Scire autem licet morbosos ejusmodi effectus in hypochondriaciis vel feminis hystericiis potissimum contingere, ubi e. g. ventriculus sine intestinorum expansione inflatus est: quod plerumque fit, cum spasmus in duodeno vel principio jejuni existit. Intestinum quoque ileon citra inflationem ventriculi aut crassorum intestinarum in verminosis infantibus, vel hætnosis cum exquisitis doloribus juxta umbilicum sæpe valde expansum deprehenditur, & in hypochondriaciis hæmorrhoidariis, ubi intestinum rectum & inferior pars coli ob sanguinem stagnantem, ejusque denegatum per venas sedis effluxum a spasmis violenter angustatur atque constringitur, superior pars intestini coli, maximeque ejus inflexura in hypochondrio sinistro & circa regionem lumbarem vehementer expanditur; unde dolorem emergit pressorius, quem lieni vulgo, sed perperam adscribunt. Fit quoque interdum, ut inflexura coli in dextra hypochondrio circa hepatis & ventriculi regionem valde elevetur, multumque crecet molestia; cujus causa, ut ego arbitror, in principio coli, quod

circa confinia ossis ilei, valvulæ coli & intestini cæci situm est, residet; eo quod convenienti tono ac robore systaltico, quo sursum pelluntur excrementa, destitutum eorum copia infarcitur, quæ ingentem statuum materiam suppeditat. Neque tantum spastica strictura & subsequens inflatio, quæ transitoria est, certam intestini portionem occupat, gravissimumque symptomatum causa existit, verum etiam præternaturalis quædam angustia, durities, aut ocellascentia ex variis causis contracta, certam intestini partem obsidet, & totum intestinum motum peristalticum perturbando sævissimis symptomatibus causam subministrat, quæ nonnisi per anatomem defunctorum in conspectum venit. De quo singulari & in praxi utilissimo argumento celeberr. Lipsiæ Professor WALTHERUS eruditam de intestinarum angustia edidit dissertationem.

§. XII.

Accedimus jam ad disquisitionem illius adfectus flatulenti, in quo totius abdominis inflatio solem transitoria, sed stataria & continua est, quæ tympanitidis nomine venit, quem CELSEUS lib. III. cap. 21. ita describit, quod sit tumor ventris vehementer intensus cum crebro ex motu flatuum sono. Hic motus hisce se phenomenis & signis manifestat: Plerumque post dolorem & tensionem circa regionem lumbarem sinistram, alvique constipationem venter vehementer distenditur, flatus ac ructus per superiora violenter per vices extruduntur, pulsus est inæqualis & appetitus dejectus, sed sitis increfcit, circa præcordia & umbilicum tensivus dolor, rodens & punctorius cum æstu quodam observatur. Sæpe etiam urinæ adest cum compressione stillicidium. Tumor etiam, si æger supinus jacet, nunquam subsidet atque in neutrum latus æger potest decumbere.

## §. XIII.

Ampla  
provi-  
na.

Hujus continuæ, valde molestæ & periculosæ ventriculi ac intestinorum inflationis causam non sine ratione WILLISIVS, BAGLIVVS, alique recentiores in spastica tonicarum intestinalium strictura reposuerunt, utpote quæ diutius in hærente pori & meatus intestinarum, per quos vapores transpirant, angustantur & obstruuntur, ut postea intus retenti vi sua elastica propter admixtum aerem expansiva tam violentam intestinarum distensionem efficiant. Et quod genioia hujus mali causa in talè strictura spasmódica juro querenda sit, non obscure HIPPOCRATES lib. IV. aph. 1. his verbis suadere videtur: quibus tormina adsunt, & circa umbilicum cruciatus & lumborum dolor, qui neque a medicamento, nec aliter solvitur, in tympanitem, sive hydropem secum firmatur.

## §. XIV.

Tympani-  
tis ad  
semper  
cum  
a/cite  
jugi-  
tar.

Hic adfectus communiter pro specie hydropis a veteribus æque ac recentioribus habetur, quia sæpe cum symptoma, præsertim alvini admisceatur, cum tamen morbus sit plane peculiaris & sine ulla aquæ extravasatione in abdomine contingat. Ita DOLÆUS in *Encycloped. lib. III. cap. IX. pag. 157.* refert, se in puellæ tympaniticæ novem annorum demortuæ abdomine ne guttulam quidem feri vel aquæ observasse. Atque in *M.N.C. Decur. I. ann. 2. obser. 85.* recenset anatomia pueri tympanite demortui, cujus ventriculus nimium distentus nihil præter statum, & aliquod viscidum humoris continuit, intestina autem omnia tam pellucida transpauerunt, ut etiam multis in locis compuncta statim concederint, ne guttula quidem aquæ in illis adparente. Pari ratione VALESIUS comment. in lib. IV. Hippocrat. de viscus. rat. in acut: & COLLADUS adversariorum lib. I. c. XL. ex aperto simili cadavere nihil notatu dignum aquæ exiisse, sed crasso expirante flatu totum repente ventrem detu-

muisse annotarunt. Notatu quoque digna sunt, quæ PLATERUS obs. 53. p. 646. de puero tympanitico mortuo refert, ubi intestina tantopere distenta apparuerunt, ut femoris crassitiem certis in locis adæquare viderentur, atque ex compressione disrupa stercus magno impetu profunderent. Aliis autem locis adeo fuerunt convoluta, contorta & inflexa, ut nec excrementis nec flatibus deorsum pateret via, & simul vermibus oblongisquam plurimis repleta.

## §. XV.

Hæc inflatio tympanitica sexuife-<sup>subje. affe.</sup> minino citra hydropem quam maxime est familiaris, præsertim post puerperium, quando lochiorum fluxus non rite successit, vel ipse ab admissio frigore animique adfectu cohibitus omnino fuit. Idem contingit, quando non rite deligato & compresso post partum abdomine error in dieta fuerit commissus, nec prima regio tempore puerperii a sordibus sufficienter expurgata. Tumenim non raro mulieres durum & inflatum abdomen cum magna molestia, spirandi difficultate & anxietate, alvique pertinaci adstrictione satis diu gerere solent. Eadem symptomata post partum laboriosum, si secundinæ non ex toto secesserunt, sed pars quædam remansit, aut si ab earum imprudenti extractione utero inducta fuit læsio, non semel sed sæpius observavimus. Quandoque etiam post abortum, si imprudens accessit medicatio, ejusmodi tympaniticæ adfectiones eveniunt; quarum causam & originem in perverso & turbato per uterum, & dein per intestinorum tractum sanguinis circuitu reponendam esse existimamus. Quod si enim ob vitium utero in hærentis naturalis sanguinis cursus, vel ejus critica excretio non rite & libere succedat, ob subsequentem stagnationem per consensum etiam liber sanguinis per viscera abdominis, speciatim vero per intestina transitus impeditur, ubi portio vel sanguinis vel feri subsistens earum.



torum fibras teneriores & sensibiliores distorquet, constringit, easque duriores & teniores reddit, ut dein libera vaporum in intestinis contentorum respiratio minus recte fieri possit. Quod vero si incidit, flatuum proven- tus magis productum & effectus, quam tympanitidis esse solet.

§. XVI.

Quod ad  
vires  
capit.  
natur.

Ejusmodi tumores abdominis distensivos in infantibus & pueris, præsertim si vermibus laborant, item post variolarum vel morbillorum morbum frequentius observare licet: cui malo nisi in tempore accommodata succurrit medicina, partes superiores marcescunt & hæctico superveniente calore agri intereunt. Maxime vero propter addephagiam, ubi ventriculus & ejus tonus imbecillior existit, pueri & infantes in grandes ejusmodi tumores incidunt, quorum varix existunt causæ. Dum videlicet variolæ & morbilli, vel etiam continuam febrem, ob vires valde suppressas, liquidumque spirituosum nimis exhaustum, ingens motus peristaltici subsequitur imbecillitas, & ob insignem sanguinis & humorum a morbo contractam dyscrasiam tunica intestinarum & peritonæi a sero acri spastica vellicantur strictura, quæ flatuum exitum prohibet, perfacile evenit, ut hic morbus producat. Quandoque glandularum mesaraicarum & vasorum lacteorum est infarctus, qui succum chylosum non transmittens sordes in primis viis accumulatur, quæ ex parte in flatu resolvuntur, ex parte vero per alvum exturbantur.

§. XVII.

Tympanitidis  
aff.  
est  
sa  
pe  
ju-  
giter  
ob  
bilit  
ut  
stom.

At vero non tantum feminæ hystericae, & quiæ sunt pueri vel infantes ob vermium coluviem & exantlatos difficiles morbos, tympaniticæ huic passioni sunt obnoxii, sed & ii potissimum in eandem incurrunt, qui ad hydropem ascitem inelinant; cujus quidem rei hæc mihi videtur præcipua causa, quod in ejusmodi corporibus, ubi viscera abdominis, præsertim he-

Tom. IV. Pars IV.

par, minus rite suo funguntur munere, succus quoque biliolus nec in quantitate, nec in temperie recte sit constitutus, ideoque luis, quas in digestionis negotio exferere debet, viribus privatus. Repetendum enim hoc loco ex physiologicis esse, bilem genuinam atque naturalem esse medicinam præservatricem. Non enim solum propter principium, quo pollet, alcalino-sulphureum & saponiforme, quo intimiore alimentorum solutionem & digestionem promovet, insigniter prodest, verum etiam propter amaritatem temperate sulphuream atque balsamicam, blande stimulando & intestinarum tunicas roborando, motum peristalticum sartum rectumque servat: quo perverfo & vitioso tota motuum vitalium æconomia, una cum salutaribus excretionibus, ut sere videmus in hypochondriaciis, turbatur atque pervertitur.

§. XVIII.

In illustratione & confirmatione sig-  
nem hujus sententiæ non possum hic  
silencio præterire singularem & pro-  
fus raram observationem, quæ in  
Transact. philos. Societ. Reg. Lond.  
mensis ann. 1330. no. 414. legitur. Ac-  
ceperat nimirum miles vulnus, ex  
quo post varia symptomata septimo  
die mortuus est. In ejus cadavere nul-  
la penitus læsio ullius partis internæ,  
excepta sola vesica fellea, inventa fuit,  
utpote quæ in fundo leviter perforata,  
ob effusionem bilis omnimodam, col-  
lapsa & flaccida deprehensa est. Nul-  
lius visceris inflammatio vel levis-  
sima adparuit, canalis tamen intestinalis  
valde inflatus atque extensus, & colo-  
re flavo a bile effusa, abdomen inun-  
dante, tinctus observatus, vulnus  
etiam externum sicum, tumore va-  
cuum fuit, nec durante vita ullum  
maturationis signum habuit, ut sane  
mirum sit, quo pacto ex vulnere adeo  
levi, uti videtur, tam brevi temporis  
spatio, absque febris aliisque graviori-  
bus symptomatibus, sauciatus inter-  
ierit.

R 3 §. XIX.

## §. XLX.

Inter symptomata notatu digna in isto vulnerato annotata, primo omnium referri meretur inflatio abdominalis, quæ statim ab accepta plaga sequuta est, & talis absque notabili incremento & decremento permanens, & post mortem etiamnum adparuit, quæ homo scitici vel tympanitici faciem retulit. Nihil tamen minus, præsentē hac canalē alimentorum distensione, inflationis abdominalis causa, nullum ructum nec flatum per superiora aut inferiora reddere potuit. Quamvis etiam alimenta liquida ac potum in ultimum quietate adsumserit, alvus tamen officio suo per omnem morbidæ curationem nec semel satisfecit, nec fortissimis purgantibus ac clysteribus applicatis ullo pacto moveri potuit. Urinam paucam, flavam & quasi croco tinctam, omni sedimento destitutam reddidit. Nihil tamen calorē febrilis in toto ejus corpore observare licuit, sicut nec pulsus citatus fuit, sed potius æqualis ac fortis, usque ad vix diem penultimum, quo inæqualis redditus est, duravit. Lingua etiam non dura, scabra aut nigra, qualis in febribus, præcipue inflammatoriis quandoque conspicitur, arida tamen ob defectum salivæ fuit. Ut ut quoque idem per illud tempus, parum & saltem aliquando per semihorulam dormitaverit, neque etiam opii usu ad somnum disponi potuerit, tamen nullum in illo, vel minimum delirii indicium adparuit. Atque sic iste absque ullis gravioribus symptomatibus, si singultum levemque vomendi conatum, pridie ante obitum accedentem, excipias, exspiravit.

## §. XX.

Et hæc est peculiaris illius casus cum symptomatibus descriptio. Liceat jam nobis nonnulla, ad scopum nostrum utilissima, exinde elicere. Præcipue vero docemur, quantum non interrupta bilis laudabilis secretio ad sanitatem conservandam præstet utilitatis, & quid quantumve econtrario

ejus defectus aut vitia ad gravissimos morbos, maximeque tympanitidem, contribuant. Etenim in hoc nostro casu a nulla alia causa, quam ab effusione atque totali bilis defectu deducenda est, quæ vulnus exceptit, canalē alimentaris inflationi, quæ hic ipse ultra sphaeram elasticitatis extensus, tonum suum motumque peristalticum omnino amisit. Hoc autem deperditio non modo naturalis chyli per vasa lactea transitus impeditur, verum etiam reliquæ in aliis visceribus secretiones labefactatæ tandemque sufflaminatæ fuerunt omnino. Unde non potuit non ultimum omnium mors brevi post inlequi.

## §. XXI.

Quod attinet ad prognosin, merito tympanites valde periculosus habetur affectus, quo ægros sæpius mori, quam seervari videas. Hinc ingenue non minus quam vere fatetur doctissimus PUEKARIUS, se nullum unquam tympaniticum convalescentem vidisse. Vid. *addit. ad Bancrofti thesaur. med. tom. II. lib. VIII.* quia pertinacem meatuum constitutionem flatuumque incarcerationem vix dissolubilem, & gravem partium distensionem cum atonia significat. Quando morbo chronico, ut hydropi jungitur vel supervenit tympaniticus affectus, vix ullam admittit curationem, eo quod validâ intestinorum ac musculorum abdominalis distensio sanguinis per viscera progreßum, vasa venosa comprimendo, valde difficultem imbecilliorēque reddit, atque excretionē per alvum & sudorem magis sufflammat. Tympanites simplex si inveteravit, nec cuto curatur in senibus & infantibus, in molestissimum chronicum malum transiit & tandem ad interitum ducit.

## §. XXII.

Contra vero abdominalis distensio quæ colicæ flatulentæ pomen habet in se sua natura non multum alit periculi, atque faciliem admittit sanationem, quando tonus intestinorum de-

si- ga-  
loris in  
eodem  
aucto-  
re sym-  
ptoma-  
ta.

Conse-  
flatio  
intende  
de flatu.

Prognosis  
si, fa-  
usta.

ægros  
in se  
fortis.

perdi-

perditus per convenientia tam interna quam externa remedia restituitur. Quodsi vero spasmodica quidpiam ad status excitandos concurrerit, ut in feminis, quibus menses non rite fluunt, vel in iis, qui ex calculo in uretheribus, vel in ductibus biliaris hærente laborant, fieri solet, aut si pathemata spasmodica hæmorrhoidalibus moliminibus superveniunt, tunc utique paullo difficilior est curatio, quia tum remediumque vis & operatio partim spasmos sedandis, partim atoniæ tollendæ debet esse dicata, quæ tamen inter se contrariare videtur.

# THESES THERAPEUTICÆ.

## §. I.

*Clyster.* **I**N affectu ventriculi & intestinorum flatulento curando nil prius habere debet medicus, quam ut flatibus per inferiora promoveatur exitus, materiaque tenax viscida, quæ flatuum proventus velificatur, attenuetur & per alvum leniter educatur. Quo fine primo ænium in usum vocare decet enemata, quæ tam derivandi quam discutiendi & evacuandi prædita sunt efficacia; quæ ex genbris sunt; quæ ex herba hyssopi vel hormini, & fibribus chamomillæ vulg. & roman. summitat. millefolii, bacis juniperi & seminibus carminativis majoribus &c. cum jussulo carnis vitulinæ & decenti salis gemmæ, ammoniaci, aut Ebsonienis & olei chamomill. cocti portione optime possunt parari. Sed notari meretur, viam unum alterumve clysterem allevando malo sufficere, sed eorum usum crebrius esse repetendum.

## §. II.

*Quodsi confusum est laevissimum.* **H**isce dein interponenda & subjungenda sunt lavantia, virtute simul carminativa & quodammodo anodyna instructa. Quo nomine commendare licet pilulas balsamicas ad Beccheri, Stahlî & nostram methodum confectas, vel si natura paullo robustior & inflatio tympanitica fuerit,

duas partes extracti panchymagogi Grollii cum una parte massæ pilularum Wildeganfi, Starckii vel de Syrace ex aqua carminativa minus spirituosâ offerre solet.

## §. III.

*Robor. & laevissimum.* Post hæc ordine sequuntur medicamenta, quæ principio temperate balsamico & volatili oleoso aromatico constant & vulgo carminativæ dicuntur, quorum operandi ratio non ita debet explicari, ac si sale suo volatili subtili materiam flatuum tantum resolvant tenuioremque reddant, sed potius, quod tonum tonicarum intestinalium eorumque systolem vigorando prohibeant, ne status subsistant; sed e sede sua dimoti per tubum intestinale facilius exturbentur, aut ne novus subinde flatuum fiat proventus. Etenim, quoniam destructus ventriculi & intestinorum motus peristalticus principalis flatulentis causa existit, ea omnino, quæ extrinsece has partes roborandi efficacia possent remedia in nostro morbo sunt indicatissima. Splendent vero maxime ejusmodi virtute & obinsignem sæpiusque comprobatam utilitatem eminentiorem merentur laudem primo pulveres ex radicis ari, zedoar. pimpinell. albæ, salis digestivi Sylvii, vel tartari vitriolari, seminis cymini, summitat. centaurei, min. cort. aurant. exsiccat. ana drachma una, olei chamomill. veri, vel de cedro aut cort. aurant. guttis VI. compositi, quibus, si suspicio adsit aciditatis primis vis copiose stabulantis, commode adduntur oculi cancrorum.

## §. IV.

*la fœr. m. II. guida.* **H**uc quoque deinceps referenda sunt in forma liquida sequentia medicamenta, quorum prius sit mixtura ex essentia carminativis conflata, extrinsece usus: Recipe essent. cort. aurant. zedoar. carminativæ Wedelii, singulorum unciam dimidiam, spiritus natri dulcis vel liquoris nostri anodynî & spiritus de tribus ana drachmas duas M.D. ad XL. guttas. Alterum medicamentum constituit potio, cujus hæc

R 4 esto

est formula. Recipe aquæ carminativæ Dorncrellii, chamomillæ, vulgæ, ædoar. cum vino ana unciam unam, spiritus nitri dulc. drachmam unam, olei carvi puri guttas VIII. cum sacchari drachmis duabus subactas M. D. S. Potio quæ Löffel. voll.

## §. V.

<sup>gag pro-  
pne in-  
terna.</sup> Nec denique negligenda sunt externa remedia, quæ inter commendanda sunt linimenta toti epigastricæ regioni inungenda. Horum præcipua ingredientia sunt oleum chamomillæ & rotæ coctum, oleum nucis & balsamus Peruvianus, quibus admisceantur olea juniperi, carvi, anisi vel cymini. Instar omnium vero esse poterit balsamum nostrum liquidum, vitæ dictum, quod cum tribus partibus aquæ regię Hungariæ remixtum ventriculo inunctum summatè deprehendi efficaciter.

## CAUTELE ET OBSERVATIONES PRACTICÆ.

## §. I.

<sup>Cautela  
olea ca-  
lidiora  
medica  
modica.</sup> Si flatulenta abdominis distensio partim a spastica tunicarum intestinalium strictura diuturna, partim a præternaturali earundem tensione atque duritie proficiscitur, atque hæc ipsa a stagnatione humorum & acrimonia biliosa fovetur, cautissime cum carminativis calidioribus, aromaticis, volatilibus & sulphureis, qualia sunt olea destillata ætherea carvi, juniperi &c. mercandum est, siquidem flatuum elaterem & turgescantiam humorum augendo, tumorem reddunt contumaciorem, & symptomata longe sæpe periculosiora, ut æstus præternaturalis cum ingenti siti, anxietate & summa spirandi difficultate accedunt. Et hinc est, quod FIENUS *lib. de flatibus cap. 21.* mentionem fecerit mulierculæ, tympanite misere afflictæ, quæ usu electuarii admodum calidi, quod discussioni flatuum præscriperat medicus, in noxam tantumque incidit

tumorem, ut totum inde pectus mirum in modum fuerit distensum & paullo post misera supremum diem obierit. Quam in rem etiam egregia sunt verba HELMONTII, quæ *lib. de flatibus* continentur. Si ventositates, inquit, in nobis sunt vapores aut exhalationes, certe major dolorum atque flatuum excitatio & distensio partium sequetur, adhibitis calidis, eo quod vapores augeri est necesse & cruciatus ac distensiones multiplicari.

## §. II.

<sup>Causa  
pne-  
matica.</sup> Purgantia omnia, non exclusis etiam sennatis & valde aloeticis omnimodo fugienda esse suadeo, quia magis intestina exsiccant, & fibras tensas, contractas durioresque reddunt. Multo vero majorem noxam non sine periculo adferunt, si quæ repetita eorum dosi remotionem flatuum promovere velit. Commendanda potius sunt manna cum cremore tartari in sero lactis, vel fonte Sedlicensi soluta, non omisissis enematis emollientibus & blande discutientibus.

## §. III.

<sup>gag pro-  
pne in-  
terna.</sup> Ubi spasmi flatuum secunde generis sunt, quod sæpe fit in statu plethorico hæmorrhoidali in juvenili & virili ætate, nitrosa cum salibus deterius & refrigerantibus juncta securissima sunt. Profunt quoque spiritus nitri dulcis, liquor noster mineralis, succus citri cum sale absinthii, oleum amygdalarum dulc. emulsionem ex seminibus IV. frigidis, massæ pilular. Sylvii & Starckii, quandoque etiam confert venæsectio. Hinc Carol. de la FONT Academiæ Avenionensis. Professor in *differt. de hydropo tympanite* exemplum addert curati a se tympanitici ope tincturæ rasarum, aliquot spiritus viatrioli guttulis imprægnatæ, & julepo ex aqua portulacæ, eichorei, nymphæ, syrupo de nymphæ, de papavere, sale prunellæ & spiritu sulphuris confecti, interposito subinde usu emulsionis temperantis, vel decocti hordei cum syrup. de limonia & sale prunellæ, ac opiatæ ex crystallis minerali,

rali, lapidibus cancrorum, vitrioloque martis cum conservâ rolarum compositæ. §. IV.

Cavatio  
mali cu  
utero  
vieto.

Ex uteri vitio post partum laboriosum, puerperium, aut abortum menbrumque irregularem fluxum, si ejusmodi graves & contumaces abdominis distensionis accident, certe pilulæ ad imitationem Becherii ex extractis amaris & gummatibus resinosis temperatioribus cum refracta aloes portione præparatæ convenientique ordine & dosi exhibitæ incomparabilem exserunt efficaciam. Idem valet etiam de elixiribus temperate balsamicis ex iisdem speciebus paratis, quippe quæ, dum blanda sua sulphurea balsamica virtute tonum & robur ventriculi & intestinorum deperditum restitueret, mirum effectum, præsertim ubi bilis deficiens & biliosa est, præstant, modo non nimia dosi adhibeantur: nam matura iisdem adfuescit & successu temporis etiam in certis intestinorum partibus, & exsiccat tunicas intestinales, hinc inde præternaturales angustias pariunt, & funesta sæpe symptomata post se trahunt.

§. V.

Clister  
dysmen  
stræ.

Magnum certe clysteres præstant usum tam in accessione & præsentia mali, quam extra illud tempus, ad ejus incursum averendum. At vero si spasmus in intestinis tenuibus sevit, non sufficient clysteres, sed tunc suadenda sunt mannata, cassia, sal Anglicanum, Sedlicense, item serum lactis caprini cum cremore tartari vel tartaro vitriolato paratum. Theriacum quoque & acicularum providus usus in hypochondriacis non est spernendus, sed magnam potius promittit opem. §. VI.

Clister  
gastro.

Inter externa in vehementi abdominis inflatione fomenta sicca & maxime omnium arena in igne vel sole siccata cum magnum præsidium habuerunt antiquiores medici. Hinc varia erant loca, ubi eandem commendarunt. Vid. CELSUS lib. III. cap. XXI. & PLINIUS *bis* for. natural. Lib.

XXI. cap. VI. arena listorum maris, inquit, præcipue tenuis & sole candens in medicina est siccandis corporibus hydropicorum. Nec aliter sentit CALIUS AURELIANUS, qui lib. III. tardarum passumum cap. VIII. ex arena hitto-  
ris, sole igitur torrenda hydropicorum corpora statuit. Nostris temporibus ut multa alia, quibus veteres felici cum successu utebantur, arenatio in desuetudinem venit: neque tamen adeo negligenda videtur. Arena enim calida non modo compressione, quam mole sua efficit, intumescenciam cohibet, sed & calore sicco humores pravos inter cutem stagnantes attenuat, ut succis per vasa sua itus reditusque restituitur: imo cutis quoque spiracula aperiantur & transpiratio adjuvatur. Vulgare nostro tempore experimentum est, avenas calidas & exsiccatas in sacculo regioni ventriculi & umbilici imponere, eo quod vim habeant dissolvendi & discutendi utilissimam. Præter hæc vero emplastrum de sapone bene camphoratum & cum oleo hyosciami malaxatum in statuosa abdominis distensione non sine insigni levamine applicatum novi. Cui virtute parum cedit galbanetum ventri impostum.

ENARRATIONES  
MORBORUM.

OBSERVATIO I.

QUæ vigesimum ætatis annum su-  
pergressa est virgo generosa, tes-  
tioris texture & faciei admo-  
dum pallidæ, jam per biennium par-  
ciori & irregulari mensium fluxu ad-  
fecta graviter subinde de doloribus cir-  
ca umbilicum tensivis, abdominis in-  
flationibus, & præcordiorum anxietati-  
bus cum insigni lassitudine & adpetitus  
prostratione conquesta fuit. His brevi  
abbinde tempore jungebatur febricula  
vaga, circa vespæram maxime adflue-  
gens, urina instar feri lactis mingebatur  
turbida & pallida, atque virium tanta  
succo-

succedebat prostratio, ut lipothymiz  
 sæpius accederent. Qui consulebatur  
 medicus, ad menses solum respiciens  
 fortiora obtulit emmenagoga, sed  
 tantum aberat, ut levaminis quid-  
 quam sequeretur, ut potius insigne  
 symptomatum augmentum ægra per-  
 ciperet. Ego tandem in consilium ad-  
 habitus, ante anni circiter dimidium  
 aliquot ascarides per alvum exeretis  
 comperiebam; unde verminosam col-  
 luvem pro genuina causa habendam  
 ratus primo essentiam ordinabam ta-  
 naceti & santonici cum liquore anody-  
 no aquali portione remixtam, & fe-  
 rum lactis mane per aliquot hebdoma-  
 des bibendum. Tum vero præscribe-  
 bam pilulas ex gummi ammoniaco,  
 aloë rosata, rhabbarbaro, mercurio  
 dulci & croco, interpositis sabinde  
 pulveribus digestivis. Et sic, ingenti  
 putridæ & foetentis pituitæ copia cum  
 aliquot necatorum vermium frostis  
 exturbata, pessima ægrotantis sym-  
 ptomata sensim sensimque evanesce-  
 bant. Nihil tamen secius remanebat  
 magna ventris debilitas & ad flatus  
 generandos dispositio, ad quam de-  
 bellendam essentiam corticum aurant.  
 & carminativam Wedelii cum spiritu  
 nitri dulci inter prandium commen-  
 dabam, tam felici eventu, ut ægra  
 ab omnibus malis liberata nunc inte-  
 ger vivebat.

### EPICRISIS.

Docet inprimis hic casus, quantum  
 medici intersit, veram morbi causam  
 & originem probe nosse; qua ignora-  
 ta non modo remedia eidem removen-  
 dæ opposita nihil juvant, verum etiam,  
 quod pessimum est, plus noxæ  
 afferunt. Fuisse autem in nostro casu  
 vermes præcipue accusandos, testis est  
 ipse morbi eventus. Nec adeo difficile  
 est, ex hac causa rationalem sympto-  
 matum suppeditare æthiologiam. Etenim,  
 quum iniqui isti hospites in  
 intestino ileo potissimum sedem suam  
 habeant, facile ibi morsu dolores effi-

ciunt, passioni iliacæ non absumiles,  
 unde flatus exitu suo per inferiora præ-  
 clusi superiorum intestinorum tractus  
 occupant, eosque distendunt & ita  
 divellunt, ut continui quasi solutio-  
 nem moliantur. Et quum hac ratione  
 ingens his partibus inducatur atonia,  
 non mirum esse debet, cur materiali  
 etiam causa sublata remediis stoma-  
 chicis, non secus ac in iliacis sanatis,  
 per longum adhuc tempus, ad tonum  
 restituendum, insistere consultum  
 sit.

### OBSERVATIO II.

Femina triginta annorum, tempe-  
 ramenti sanguineo-cholericæ, a matre <sup>inflatio</sup> tympani-  
 progenita, quæ per viginti & plures <sup>colica</sup>  
 annos molesta laboravit flatulentia <sup>cum me-</sup>  
 jam per triennium sine omni dolore & <sup>stercis po-</sup>  
 incommodo, salvoque mensium fluxu <sup>ex utero</sup>  
 x, gravi abdominis distensione adf-  
 ecta fuit, quæ accedente vita deinde &  
 concurrentibus variis animi perturba-  
 tionibus septem abhinc mensibus mul-  
 tum increvit & vehementes ventris  
 dolores, spirandi angustiam, alvique  
 obstructionem cum mensium immix-  
 tæ fluxus comites habuit. Hæc contra  
 malæ medicus pognavit carminativis,  
 aperientibus & eximie virtutis robo-  
 rantibus, sed in eodem statu morbus  
 permansit, somnus tamen & adpeti-  
 tus bene semper constitit. Non multo  
 post, ob errorem in dicta commissum,  
 optima femina febrem incidit  
 tertianam per septem hebdomades du-  
 rantem, unde viribus cum somno &  
 adpetitu dejectis pedes intumuerunt  
 & inflatio abdominis adaugetur cum ali-  
 quali fluctuatione ad manus percussam  
 instar tympani sonum edidit. Elapso  
 mediis spatio materia grylæ purulen-  
 ta, omnis expertæ odoris, cum intermixtis  
 sanguinis stris, præcedente  
 levissculo horrore, per aliquot dies  
 in notabili tranquillitate per uterum ex-  
 cernebatur, quo facto levamen quid-  
 dem misera percipiebat in utroque hy-  
 pochondrio, sed non modo pedum  
 tumor

tumor perseverabat, sed abdominis quoque ita subinde inualecebat, ut in lecto decubitus impediter. Aberat tamen, quod bene sperare licebat, sitis, aberat febris & nimia virium depressio, aberat quoque, quod alias adesse solet, ciborum fastidium, sed modice potius appetitus constabat. Præterea urina mingebatur flava cum nubecula alba, fæces secedebant duræ, mensium plenaria erat suppressio, & insignis dolor cum tumore anum occupabat.

### EPICRISIS CUM CONSILIO.

Non omnis, præsertim in sequiori sexu, abdominis expansio pro inflatione intestinarum tympanitica habenda est, sed incidunt sæpe casus, ubi post puerperium aut laboriosum partum, mole pinguedinis aucta abdominisque musculis crassioribus redditus, abdomen valde tumidum observatur. Nam frequentior obvium est, per violentos & diu perseverantes spasmos in partu sanguinem ad partes molliores minisque resistentes, quid? quod ad ipsum collum & ejus glandulas copiosius delatum vasa ibi nimis dilatare & stagnationes efficere, ut strumæ quoque haud raro inde enascantur. Fit tamen nonnunquam, ut etiam inflatio intestinarum tympanitica, uti in præsentî casu diuturno abdominis tumori superveniat, quæ procul dubio propter crassam diutam vitamque sedentariam inducta, & dein retardato mensium fluxu post tertiam febrem ita adæucta fuit, ut ordinarius medicos verum ascitem hydroperem adesse judicaverit. Ego tamen potius morbi augmentum adscripsi antifebrilibus, quibus forsitan nimis cito febris fuit suppressa. Inerevit enim inde infarctus in utero, a quo demum abscessus ibi formatus & magna materiz gryxæ, nullius odoris, copia excreta fuit, quæ optatum symptomatum levamentum attulit. Quapropter

præcipua curationis fuit intentio, ordinarium sanguinis per hepar & uterum cursum restituere. Quo fine fontem Egranum tepesactum, interpolatis pilulis balsamicis, ad mentem Beecheri confectis, & elixiriis stomachicis, per aliquot hebdomades cum recto regimine bibere jussi. Et quoniam clysteres carminativos in ejusmodi casibus nunquam fere non utiles deprehenderim, crebriorem eorum usum summopere commendavi & cataplasmata ex herbis; floribus & feminibus carminativis, ex vino coctis regioni pubis imponenda suavi. Denique roborandi sine elixirium ex essentia succini, corticum aurant. zedoar. & liquore anodyno, æquali ad pondus omnium proportionem sumpto, præscripti & siccuram feliciter perfecti.

### OBSERVATIO III.

Virgo generosa, viginti & aliquot <sup>scilicet</sup> annos nata, constitutionis tenerioris, <sup>scilicet</sup> valis tamen sat amplis prædita, quæ <sup>scilicet</sup> mensium fluxum ultra annum sat largiter & supra naturæ modum expertagæ habitum obtinuit cachecticum & postea loco sanguinis sinceri & puri humorem per uterum ejecit valde aquosum & mucidum; ex imperiti junioris medici consilio per quatuordecim dies balneum Lauchstadiense, adjecta semper aluminis portione, adhibuit. Substitit quidem inde fluxus, sed non multo post incidit in satis grandem ventris tumorem cum sensibili duritie in dextro inguinis latere, summa anxietate, pectoris oppressionè rotisque corporis languore conjunctum. Circa tempus somni obtuli dosin salis nostri aperitivi, postero vero die manne pilularum balsamicarum, nostræ præparationis no. XIV. & circa prandium elixiræ nostri visceralis centum guttas, idque per quatuor continuos dies. Postea ordinavi balneum circa vesperam adhibendum, quod sequentes habuit species: recipe herbe majoranæ, salviæ, matricariæ, menthæ,

thæ, artemisæ, rosmarini, florum chamomill. rom. & simplicis singulorum manipulos duos, baccarum lauri, juniperi ana unciam unam. Includantur sacculo & in aqua leniter coquantur. Huic balneo insidat ægra per horam & sacculus imponatur ventri maximeque regioni inguinali. Consumtis iterum lavando quatuor diebus, pristina rursus methodo ægra per sequens quadriduum mane pilulas balsamicas & inter prandendum elixirium sumit viscerale, atque simul vespere balnei usum continuavit. Quorum remedium ope mira colluviei glutinosæ & viscidæ ex utero promanavit quantitas & remittentibus flatulentis symptomatibus exoptata rediit integritas.

### E P I C R I S I S.

A prapostero balneorum adstringentium usu pessimorum symptomatum productam fuisse syndromen, extra omnem quidem positum est controversiam; placet tamen in meliorem hujus rei confirmationem similem fere casum allegare GALENI, qui de *prægnis. ad posthum.* eleganter prodidit, uxori Boetibi, fluore albo laboranti ex adstringentium usu ventrem ita intumuisse, ut utero gerentis suspicionem subjerit. Plures ejusmodi memorabiles observationes existant in *M. N. C. ann. II. Dec. I. obs. XXVI. & ann. VI. obs. 103.* quæ dignæ sunt, ut probe annotentur. Subsistunt enim hac ratione non modò in utero, verum etiam in partium ipsi vicinarum vasculi humores excernendi atque mora viscidiores tenacioresque redditi, intercepti liberum sanguinis circulum variasque congestiones & impetuosos motus ad certas partes efficiendo, omnes corporis functiones valde turbant & symptomata accersunt gravissima. Omnis itaque opera & cura medentis in eo maxime est dirigenda, ut dissoluta fluxiorique redita tenaci obstruente materia, ejus

per uterum exitus promoveatur. Cui scopo obtinendo præscripta nostra methodo remedia egregie inservierunt.

### OBSERVATIO IV.

Juvenis viginti annorum, temperamentum phlegmaticum, crassiori digestioris sanguinis & sedentariæ vitæ addictus, vehementem dextri lateris dolorem ex imo abdomine ad superiora ascendentem, præsertim a cibis, quos in deliciis habebat, flatulentis, ultra anni spatium persequens, multaque ad eum compellendum adhibuit sine effectu remedia. Ego consultus, omnibus rite exploratis in regione inguinali dextri lateris circa os ilei tumorem annotavi sat magnum; unde consilium dedi, ut huic loco emplastrum imponeret ex terebinthina veneta, mastiche, cera & balsamo Peruviano confiatum, idque bis in hebdomade renovaret. Intra prandium dedi elixir meum viscerale balsamicum cum essentia Zedoariæ & liquo anodyno minerali remixtum & pilulas balsamicas bis intra septimanam sumendas suasi. Et hac ratione intra duos menses inflatio ista detumuit tandemque penitus æger convaleuit.

### E P I C R I S I S.

Nihil dubium est, quin in præsentia affectu intestinum colon in ea parte, ubi a cæco prodiens magnis vasculis, membranisque & nervis robustioribus eo sine instructum est, ut excrementis fursus pellendis capax sit, atonia laborasse, qua factum est, ut fæces retentæ diuturniori mora in statu se explicaverint, qui reliquam coli portionem, ad hepatis viscus anfractuoso ductu procedentem ita inflarunt, ut exterius quoque tumorem observare licuerit. Quod vero si incidit, ea omnino remedia adhibere consultum est, quæ flatus & accumulatas in intestinisordes blande evacuari & simul roborandi virtute pollent. Quo nomine pilulæ



pilulæ nostræ balsamicæ & ad eandem methodum paratæ aliæ cum elixiriis temperatis stomachicis insignem merentur commendationem. Sed interna hæc medicamina externis debent secundari, a quibus non exiguum felicitis curationis pendet momentum, ita prorsus, ut his sepositis supervacaneus sæpe sit omnium, etiam optimorum internorum usus.

# OBSERVATIO VI.

Colla-  
stilla-  
ta com-  
pulsiva  
siccæ  
sæpè &  
regula-  
re.

Judæus sexaginta & aliquot annorum, bene alias valens & robustus, perbiennium ob variis fortunæ infestis casus animo perturbatus male habuit. Nam subinde de statulenta abdominis & hypochondriorum distensione, alvo adstricta, somno inquieto, & languente appetitu conquerebatur, urinam per intervalla turbidam & sabulosam cum ardore mingens. Niccum caussam coram judice amitteret, gravi animi adfectu commotus, mox in brumali gelu iter conficiebat plurium miliarium, quo fiebat, ut domum reversus summis præcordiorum anxietate, pectoris oppressione, dolore circa cordis serobiculum tensivo, insigni totius corporis languore, nausea & subinde vomitionibus vehementer corriperebatur. Qui primo accersebatur medicus, auctoriter curam adgredebatur essentiis stomachicis & carminativis, sed mitum inde singula inerecebant symptomata. Quum itaque meum æger postulare consilium, ego causam horum malorum curatius inquirens, in primo intestino, quod duodenum vocatur, ipsoque pyloro vitium latitare exinde argumentabar, quia continuo æger querebatur, quod ingesta, præsertim solidioris consistentiæ, ob angustiam, quæ transitum impediret, difficulter descenderent, & inde ad superiora cum anxietate & vomendi comatu fieret regurgitatio. Præterea abdomen statibus valde erat turgidum, alvus adstricta, somnus paucus & inter-

ruptus, tantaque virium & corporis languescencia cum faucium ariditate aderat, ut non parum periculi in tam siccifico adfectu & ætate jam provectiori suspicarer. His ita constitutis ægrotanti potionibus analepticis, jusculis cum cancris fluviatilibus & radicibus aperientibus decoctis, pulveribusque leniter nitrosis prospiciebam, & clysteribus emollientibus ventrem apertum servare expediebam, eo quod solventia medicamina dejectæ vires non admitterebant. Et eni! non parum inde levaminis percipiebat. At vero, quum per quatuor menses hæc malis confictus nondum restitutum se penitus videret, alius vocabatur medicus, qui per medicamentum, quod & sudorem proliceret & spasmus susteret, certissimam promittebat opem. Erat autem ita compositum: recipe cinnabaris, animonii diaphoretici ana drachmas tres, salis volatilis cornu cervi, croci, castorei ana drachmam unam, misce dividatur in octo doses & singulis quatuor horis una sumatur. Sed a quatuor sumtis anxietates invalescebant, & largus subsequeretur salivæ fluxus. Inspectis faucibus filæ totæ aphthis ardentibus & dolentibus erant refertæ. Durabat hæc salivatio nullis remediis allèvanda usque ad mortem, quæ tertia septimana ab adsumto remedio accedebat.

# EPICRISIS.

Quod si veram hujus mali pessimorumque symptomatum originem scrutari velimus, certe vix aliam, quam vehementem iracundiæ adfectum corporisque refrigerationem deprehendere liceat. Tali enim ratione obortus in duodeno spasmus adnexusi pylorum vehementer constrinxit, & ita angustavit, ut nullus prope statibus & ventrisulo patuerit exitus, unde hic supra modum distensus ingenti præcordiorum anxietati, inquietudini & reliquis symptomatibus anam præbuit insignis.

Nec.

Nec dubitandum, quin intempestivus medicaminum calidiorum usus anxietates permultum adauxerit, utpote quæ oculis excretoriis viis semper magis obsunt, quam profunt. Cæterum dignus est, qui probe annotetur peculiaris plane pulveris oblari effectus, quem ego, pharmacopæi errorem accusandum ratus, vix credidissem, nisi facta inquisitione hunc omni culpa vacuum deprehendissem. Sat graves igitur erant rationes, quæ mihi fidem faciebant, tam largam salivationem in corpore vehementibus spasms ab effusa bile exagitato, sollicitinabari, in largiori dosi præscriptæ & per admixtum sal volatile cornu cervi ad maiorem activitatis gradum adactæ esse ascribendam, ut inde discere omnino liceat, quod sinistri sæpe effectus ab optimo alias medicamento præter spem ac opinionem nostram proveniant.

## OBSERVATIO. VII.

*7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.*  
Vir triginta annorum, sacerdotali munere fungens tribus abhinc annis, quum in academia degens Belgica civis uteretur crassioribus & piscibus marinis, neglectoque potu & sufficienti corporis exercitatione, litterarum studiis cum profundis meditationibus junctis plus iusto incumberet, graves primum sensit ventriculi & intestinorum inflationes, murmura, flatuumque & aquarum in abdomine fluctuationes satis sonoras, quæ plerumque a prandio & adsumto Theæ vel cerevisiæ potu subvita motus experte augebantur. Idem observabat, quando profundioribus meditationibus mentem defatigabat, cum contra a suscepta exercitatione & ructuum per os explosione insigne mali perciperet levamentum. Præterea alvus plerumque bene respondebat, ciborum tamen adpetentia languebat, caput vertigine & aurium sursurum tentabatur, facies erat pallida, totumque corpus marcescens conficiebatur. His malis debellans

dis varia æger opposuerat remedia, sed omnibus nihil proficientibus, meam tandem implorabat opem. Consilium igitur dedi, ut primo omnium e vena pedis tusa sex minimum cruoris uncias detrahendas curet & aliquot diebus interjectis, ad primam regionem a cruditatibus viscidis, flatuum genetricibus repurgandam, per tres dies fontem Sedlicensem duarum librarum pondere pro dosi biberet. Paruit æger consilio & inde melius habere cœpit. Ad malum itaque penitus submovendum bis in septimana primam regionem a viscidis cruditatibus beneficio pilularum balsamicarum liberandam & elixir nostrum balsamicum per sat longum tempus fumentum suasi. Denique, quum ad curationem tam molesti affectus accuratum vitæ regimen plurimum conferat, frequentiore corporis exercitationem, & ut æger a nimis meditationibus, ac cibis, qui difficilioris sunt solutionis, infumatis, piscibus marinis, fructibus leguminosis, fermentationem facile subeuntibus, omnibusque lasciviniis se abstineret, commendavi.

## EPICRISIS.

Licet hæc flatulentia effectus magis & symptoma sit mali hy pochondriaci, quam primarius morbus, ideoque huc strictim non pertinere videatur, discernere tamen potest attentus medicus, quantum, si non omne, ad morbi flatulenti generationem contribuat motus intestinorum peristaltici imbecillitas, variis ex causis inducta, quas inter in præsentî ægroto præcipue referre decet intensiores mentis labores per multas noctes productos: ut potentia mentis fatigatio eximiam habet potentiam canalem istum, qui digestionî præest, nervum & valde sensibilem debilitandi, quod eo magis accidit, si vita motus expers & ciborum duriorum ac flatulentorum usus accesserit. Quoad curationem scire licet.

licet, quod fontes medicati tam thermales quam frigidi borborygmis & murmura ventris sæpe augeant, præsertim si non alvum sufficiens ducant, nec urinam moveant, ut sunt Wildungenses & Selterani &c. Tam enim ob languidiorem motum peristalticum facile flagrant, & atoniam augent. Consultus itaque duxi, fontem Sedlicensem, interpositis & subjunctis balsamicis stomachicis medicamentis, commendare.

## CAPUT XVI.

### DE CACHEXIA UTERINA, SIVE FLUORE ALBO.

#### THESES PATHOLOGICÆ.

##### §. I.

Fluor  
albus  
quid sit?

**Q**ui floris albi nomine in scholis medicorum venit adfectus feminasque summe molestat & cruciat, malum est cachecticum, quod in inordinato humoris impuri, mucidi, plerumque albi ex muliebribus effluxu cum magno incommodo functionumque naturalium læsione juncto consistit.

##### §. II.

Quæ  
subjecta  
præ-  
cipue in-  
vadat.

Huic fluxui quamvis ætas plerumque consistens sit obnoxia, minime tamen declivior est excludenda, id quod suo jam tempore optime annotavit HIPPOCRATES lib. II. de morbis mulierum. At vero dantur etiam observationes, utut rariores, quæ testantur, puellas teneriores vix sex septemve annos natas hunc florem fuisse perpeffas. Qua de re consulatur FERNELIUS lib. VI. Pathol. cap. XIV. RODERICUS a CASTRO lib. I. morb. mulier. cap. XIV. & Afla Hassnienf. Vol. I. obs. 83. Frequentius vero evenit & incipit hic fluxus circa annum decimum tertium vel quartum, quo tempore foeminis menstrua erum-

pere solent. Nec maritatae tam intra quam extra graviditatis statum abe-  
sunt immunes. Novimus enim gravi-  
das toto gestationis tempore eidem  
obnoxias. Quodsi denique habitum  
corporis respicimus, experientia tes-  
te, feminas & nervis & fibris minus  
solidis sed laxioribus & natura, ut  
ajunt, serosiori præditas præ aliis huic  
malo obervamus subjectas.

##### §. III.

Inordinatus dicitur fluxus, quia non certam servat temporis periodum; siquidem aliis continuus est & quoti-  
dianus, in aliis per intervalla repetens  
bis terve in mense accidit; licet sint  
exempla, ubi etiam periodice & statò  
quasi tempore venit. Dein in nonnul-  
lis menstruum fluxum modo præcedit,  
modo comitatur, modo sequitur,  
vel etiam intermedio tempore prodit;  
quinimo in graviore statu ipsorum  
mensium loco oritur & ne illis quide-  
m, quibus menstruorum tempus  
secundum naturæ ordinem præterit,  
ut vetulus parit.

##### §. IV.

Variat hic fluo quoad colorem & consistentiam, quod optime demon-  
stravit PLATERUS in prax. tom. III. p. 670. in hoc fluore, inquit, humor affertur  
interdum serosus copiose plerumque  
nunc limpidus sine morfu, nunc acris  
vel falsus, alias flavescens, viridescens,  
aut nigricans nonnihil, aliquando &  
saniosus, interdum inodorus, alias  
fetidus et copulatur. Huic pituitosus  
etiam miscetur aliquantum glutinosus,  
inodorus & frigidus pauciore, vel ead-  
em, aut etiam majore quam serum  
quantitate.

##### §. V.

Huic fluori, si moderate se habeat, nulla alia graviora superveniunt acci-  
dentia, atque tam mulieres quam vir-  
gines multis sæpe mensibus vel etiam  
annis sine noxa eundem perferre so-  
lent. Quodsi vero immoderata sit,  
tum malus corporis habitus seu cache-  
xia eum comitatur; unde non modo  
inignis oritur corporis languor & fun-  
ctio.

Et non imbecillitas, sed & pruritus, mordicatio & ardor in pudendo & circa illud divexant. Tum quoque in plerisque mulieribus permagnam, in aliquibus tamen nullam in conceptu sentitur impedimentum, atque si fecerit materia, turpitudine hæc non modo ipsis feminis molestiam, sed maritis quoque fastidium, ut ab ipsarum consortio abstinant, parit.

## §. VI.

*Quod noster adfectus multum cum cachexia aliat affinitatis, eleganter ostendit HIPPOCRATES lib. II. de morbo mulierum §. 9. fluore, inquit, albus fluit velut alba asini urina & in facie sunt tumores albi & partes ambæ sub oculis tument & hydropiformes ac non valde bona species prædit sunt oculi & color corporis albidus, & ventor imus humidus & in cruribus tumores laxi, & si pressis digito nota imprimuntur & stomachi morsus peregrinus, dum jejuna fuerint vel etiam vomuerint velut acidam aquam & si accubum locum procedunt, anhelatio corporis, crurum refrigeratio, genuum impotentia, uterus præter rationem aperitur & ad osculum procidit gravis. Tales difficile est a morbo liberare. Minime hæc Hippocratis adserta de fluore albo, moderato, incipiente, sed potius de pertinaci chronico, qui primam causam & fontem suum in malo & tam quoad solidas quam fluidas partes depravato corporis habitu, præcipue omnium vero in magna ventriculi imbecillitate habet, sunt intelligenda. Nam quia fluidum illud chyliform & lymphaticum temperatum subtile, quod solidis partibus vires & robur conciliat, nimium simul per vias devias uteri decedit, fieri omnino non potest, quin virtus solida & systaltica cordis & arteriarum, atque peristaltica ventriculi & intestinorum immineatur; unde languor & magnavizum prostratio sequitur, & vi digestrice ventriculi deperdita, crudi & visceri succi in massam sanguinis delati atque accumulati nutritionem non*

modo & pulchritudinem faciei vitiant, sed & animi vigorem demunt, & tristitiam inducant.

## §. VII.

Sedes hujus mali omnino est uterus, *Sedes mali est uterus.* cæus anatomicam fabricam, & potissimum ejus vasorum structuram accuratiori paulo consideratione dignam existimo. Et primo quidem tenendum est, nullam in universo corpore partem tam numerosa vasorum copia instructam esse, quam ipsum uterum. Ex his enim primæ sunt arteriæ & venæ spermaticæ, quæ ovaria contingunt, ac in fundum uteri copiosissimas ramificationibus feruntur. Deinde rami arteriæ & venæ hypogastricæ ad partem mediam & inferiorem uteri, nec non vaginam excurrunt. Hæc largissime per uteri corpus disseminata sanguifera vasa, mirum tortuoso ac serpentino quasi flexu discurrunt. Id vero peculiare sibi servat exquisita vasorum uteri per anastomoses connectio, quod in plurimas cellulas mutuo communicantes diversæ magnitudinis canalium alvei designant, & cellulas ovalis figuræ forment, quæ substantiam ipsius uteri spongiosam & fungosam reddunt. Notandum insuper est, quod non modo hypogastricæ venæ, quæ sanguinem reveliunt, dimidio majorem capacitatem obtineant, quam arteriæ hypogastricæ, verum etiam, quod venæ sic dictæ spermaticæ non recto sed anfractuoso admodum & in orbem quasi recurvo ductu porrigantur, ita prorsus, ut si easdem extricare, earumque longitudinem supputare velimus, aliquot ulnas æquarent, arteriæque spermaticæ longe superarent.

## §. VIII.

Ex plane peculiari jam exposita vasorum uteri structura luculenter patet, *Ratio formæ.* tarde utique ac segnitè per venas has, præsertim valvulis destitutas, sanguinis cursum & circulum succedere, ut adeo ex hac theoria anatomica, seu fundamento, & mensium fluxus, & vitia omnia, quæ ex utero contingunt mulie-

mulieribus, commode possint explicari. Quæ propter nunc etiam ex hisce perspicua erit Ratio, quare virgines æque ac conjugatæ tam frequenti tamque diuturno & molestissimo feri, variaz consentiunt, varique coloris ex utero & ejus vagina profluvio divergentur. Nam quia tonus & motus uteri, qui æquabili fibrarum ejus contractione & remissione continetur, tam facile læditur, debilitatur & deficitur, prætereaque tardus admodum per circumflexa, & in serpentinos ductus porrecta uterina vasa sanguinis & humorum cursus, lentior quoque sanguinis per venas valvulis delituras regressus est; perspicue utique non solum infarctus & stagnationes sanguinis ac feri in matrice oboriuntur, sed ipse etiam serosus & lymphaticus humor, tegniori progressu lentescens, tandem exitum sibi parat, ac per passum in utero & vagina obvia orificia effunditur. Communis quidem plurimorum auctorum est sententia: ex lacunis GRAAFII, sive foveis circa urethram conspicuis, & parvis ibi consistentibus glandulis, humorem hunc excerni, ac in his lacunis, nullum quod setam admittat, foramen facile reperire licet, sed potius ad utrumque latius orificii, & per totam vaginæ substantiam lacunæ apparent plures, quæ quamfacile setæ ad digitum dimidium aditum concedunt, earumque ductus pressi liquorem, semini haud dissimilem plorant. Vid. Cel. HEISTERI *compend. anat. pag. 81. & 82.*

§. IX.

Verum enim vero, ut ut relaxatæ hæz glandulæ stillare possint humorem paulo copiosorem; neutiquam tamen hæz ipsæ unicam & genuinam fluoris albi sedem constituunt, sed longe plures dantur meatus, e quibus materia fluoris albi, nec non liquoris serosi impuri, in puerperis, cum & post loquiorum fluxum manantis, ortum trahit. Et licet RUYSCHIIUS glandulas in utero nunquam visas esse, aut demonstrari posse neget, nullum ta-

Tom. IV. Pars II.

men dubium est, quin ex istis ostioli quæ sub mensium fluxu sanguinera fundunt, serum etiam exitum moliri possit. Perquam enim notatu digna est Cel. FANTONI *anat. G. H. pag. 186.* observatio, quæ fidem facit, quod flatus per venas uteri in cavum matricis & vaginæ, ac vicissim ex hoc in venas adigi possit atque transmitti. Deinde etiam teste GRAAFIO & HORNIO pori & foramina in cervice uteri conspiciuntur. Neque prætereunda sunt quæ VERHEYEN in *Anat. C. H. cap. 33. c. f. tab. XVII. fig. 23.* prodidit, quod scilicet in utero, in aqua macerato, & per aliquod temporis spatium in blando calore decento, in interiori non modo vaginæ superficie, plurima corpuscula globosa, & alibi quidem racematis ipsi inhaerentia, alibi vero per eam disseminata, sed in inferiori quoque parte cavitatis uteri, similia corpuscula viderit, eademque pro glandulis, seroso-pituitosi humoris secretioni inservientibus non immerito habenda esse existimet.

§. X.

Nil itaque est dubii, quin per eadem vasa; vias & poros fluxus materiz mucidæ contingat, e quibus ipse menstruus sanguis fertur. Atque hujus adferri evidens argumentum est, quod menses suppressis fluor albus in quibusdam loco horum superveniens observetur. Quod autem revera loco sanguinis albus liquor, unde etiam nomen morbus obtinet, proveniat, ex de re elegantem observationem habet SEVERINUS PI-NÆUS *de nativ. virginitat. lib. I. problem. III.* qui in dissectis cadaveribus virginum & mulierum uteri profluvio albo, dum viverent, laborantium, licet ob alium morbum extinctarum, humorem limpidissimum in utero invenit, ex cavitare ejusdem guttatim in suum pudoris stillantem, in quo candorem, ut calcem aqua dissolutam dixisses, acquirerebat, forsitan ab aere frigido admissio particulis serolis se interponente, non excluso tamen

S acore,

Ex gultu  
huius vili  
in utero  
fluoris  
proveniens

Constat  
Morbus

acore, a glandulis uteri forsitan profecto.

## §. XI.

*Causa media-  
ta, qua  
morbus  
fluxui  
supponit.*

Quum igitur causa floris albi proxima recte in tono fibrarum & vasorum uteri destructo & circulatione sanguinis per ejus vasa impeditiori, qua serum a sanguine sequestratur, reponenda sit, sequitur jam, ut discipiamus, quanam ex causis mediatis remotioribus ad constituendam hanc proximam causam conspirent atque concurrant. Jam vero a nulla re magis, quam ab aere frigido & humido tonus fibrarum relaxatur; hinc facile pater ratio, quare tempore autumnali & in locis frigidis ac humidis, paludosis, humilioribus, vappidis, quæ aer purus & septentrionalis statu suo non satis purgare potest, hic morbus inter feminas præcipue dominetur, & teste SYLVIO in *praxi lib. III. cap. IV.* in Belgio longe frequentior sit quam alibi, maxime si error in cibo & potu accesserit. Nam omnes illi cibi, qui ob viscositatem minus resolvablem digestionem minus obsecundant, ut sunt leguminosa, lacticia, farinacea, nimis dulcia, item ex cibis marinis cochlear, ostrea, pisces palustres, neque minus fructus horæi in copia adsumti, omnia acida, acetaria, dum chylum progenerant glutinosum & crudum, qui ad assimilationem & nutritionem plane inidoneus est, huic fluxum multum fovent & augment. Idque eo magis accidit, si nimia voracitas in puellis vel etiam infantibus accedat. Deinde quoque experientia firma & fere quotidiana observamus, mulieres quæ otio, vitæ sedentariæ, & somno nimis indulgent, longe facilius sibi hæc incommoda accersere, quam illas, quæ labore & motu corpus firmant. Quamobrem etiam agrestes minus expolite sunt huic fluxui quam urbanae, quæ ob motum & laborem constantiori fruuntur sanitate.

## §. XII.

Ceterum quoque id sciendum est, eas mulieres, quibus per nares mucosæ destillationes frequentiores fuerunt, si supprimuntur, facta metastasi ad uterum, humoris albi ex utero emanationi valde esse obnoxias. Maxime omnium vero id evenit, quando fluxus mensruus recto ordine & decenti quantitate non succedit. Nam ab eo tempore confestim incipit vacillare sanitas, vasa impuris humoribus implentur & principium fit cachexiæ.

## §. XIII.

Exposuimus jam eas causas, quæ crudorum humorum abundantiam corpori ingenerant & materiam molestissimam huic fluxui suppediant. Nunc etiam ad eas considerandas progredimur, quæ ipsum uterum, ceu veram hujus mali sedem ad illum disponunt. Cujus generis præcipue ea sunt, quæ nimium relaxando vasa & fibras uteri, ipsum robur tonicum adimunt: quo vacillante & deficiente sanguinis & humorum massa per vasa tor copiosa & convoluta lentiori & impeditiori cursu feratur necesse est, unde quam facile sit feri viscidi per poros uteri secessio. Hinc etiam observamus, in maritatis partus laboriosos, a quibus magna viro conciliatur imbecillitas, frequentes abortiones, secundinarum improvidas & violentas post partum avulsiones sæpiissime primam huic malo originem & causam suppeditalse. Simili ratione observatum a nobis est, quod ex feminis, quæ immodicæ mensium fluxioni sæpius obnoxie sunt & quæ molas per abortum excernunt, eodem fluxu frequentius laborare. Namque hæc omnia nimiam indicant vasorum distensionem & relaxationem, quæ, nisi mature & tempelive convenientibus roborantibus remediis tollatur & vasorum tonus reparetur, procedente tempore difficili admodum negotio restituitur.

*Causa media-  
ta, qua  
morbus  
ad fluxum  
supponit.*

§. XIV.

Plurimum vero refert, tum ad eventum morbi recte dijudicandum, tum ad rite instituentiam ejus curationem, nostrum affectum ab aliis similibus uteri fluoribus, cum quibus quondam alie convenientiam, recte discernere. Primum itaque non confundi debet cum menibus decoloribus, quibus mulieres, præsertim juniores sæpe sunt obnoxie; & licet is sint vitiosus, exacte tamen suam servant periodum, quam contra fluor albus non modo substantia & colore sit diversus, sed & promissive & sine ordine feratur & cum inordinatis vel etiã nimium fluentibus menibus jungatur. Tum quoque multum interest, album fluorem a virulenta gonorrhœa, quæ ab impuro coitu contracta est, distinguere: quippe misera venereum non prostratas solum glandulas, verum etiam vaginam uteri cum insigni dolore & molestia exulcerat, & viros, qui coeunt, contagio inficit. Deinde copia fluxus veneris longe minor est, quam in fluore albo, tanto vero acrior quam intensio ardore & dolore juncta, & cum menses fluunt & urina fertur, permanet, quom fluor albus vel menses antecedit vel sequatur. Hinc clar. BAGLIVUS in *prax. medic. lib. II. cap. VIII. §. 3.* infallibile tales morbos ab invicem distinguendi dedit signum: *Pete, dicit, a muliere, an tempore mensium fluor ille albus materia adsit, si dicas quod sic, significato eadem, quod morbus; a qua dirigatur, sit gonorrhœa gallica; si vero durante menstruatione fluor albus evanescat & eadem finita iterum regrediatur, pro certo habeam; mulierum fluore albo uterino laborare.*

§. XV.

Neque vero omnis saniosa materia pro gonorrhœa virulenta & contagiosa habenda est. Nam interdum, inquantum varius, abscessus & ulcera in uterini sterilibus gignuntur, quæ sine contagio sunt. Potest hæc de re legi CLASIUS in *obs. medicis rarioribus*

*obs. IV. & V. de ulcere musculorum uteri vaginæ vicinorum & utero purulento.* Deinceps quoque non omnis erosio & exulceratio certum gonorrhœæ purulentæ præbet signum; siquidem in fluore albo, & magis adhuc in scorbuticis, feri vitium eo acrimoniæ provehi potest, ut vicinas partes exeat atque exulceret, sed hæc exulceratio magis est superficialis & cum insigni pruritu juncta, facilioremque admittit sanationem. Verum, ut omnis error in dijudicando evitetur, consultum duo per mulierculas, quæ omnes circumstantias accurate debent examinare, in veritatem inquirere.

§. XVI.

Denique ut etiam prognostica quædam subjiciamus, statuimus, fluorem album, si moderatus, si recens atque ex causa externa subortus sit, non adeo multum in recessu habere, atque in sanis alioquin sceminis, aut virginibus per plures menses sine symptomatum atrocita procedere. Nihilominus tamen tarditate sua sexui delicatiori & munditiei dedico valde est incommodus & tediosus, eo quod colorem faciei roseum cum tempore inde amittunt, nonnullæ valde inde tristantur & melancholicæ fiunt, quia maritis & sponis exosa evadunt. Alia vero est ratio fluoris albi, qui ex summa ventriculi imbecillitate & malo corporis habitu oriundus nimium invadit, aut alios graves morbos subsequitur, quippe qui, omnes partium functiones lædendo, ingentem in universo corpore mutationem inducit; oritur enim non raro summa macies cum lenta febre & sterilitas quoque inde emergit, uti jam dudum docuit HIPPOCRATES *sest. V. aph. XLII.* quæ præhumidos habent uteros, gravidari nequeunt; exstinguitur enim in ipsis genitalia. Ex *lib. de sterilitate*: si uteri lubrici fuerint, mulier non concipit, semen enim foras elabi sinunt. Deinceps ex fluore albo diutius laborantes facile & frequenter patiuntur abortum, quia laxato nimium uteri

teno conceptus non satis firmas radices agere potest, sed assidua illuvie contempitur & foras ejicitur. Sequitur quoque ex hoc malo non raro uteri precipitentia.

## CURATIO.

### §. I.

*Quamvis  
difficilis  
sit curatio  
aliqua.*

**Q**Uum valde pestifera sit, si re-  
dices egerit malum, & difficilis  
admodum curationis, ita pror-  
sus, ut inter medicorum scandala non  
improbitur referri debeas; non abs re  
sed opere eris pretium, tam difficilis  
sanationis causas paulo accuratius in-  
quirere. Ex quibus prima mihi vide-  
tur, quod medici proximam hujus  
morbi causam in sola tantum imputa-  
re & nimia feri colluvie constituant,  
quam tamen, potius ad uteri vitium,  
ubi mali sedes est, ejusque vasorum  
destructum, totum rescicere deberent,  
non omittis iis remediis, quæ lures  
expurgant. At certe præstantissimis  
roborantibus & magno negotio opus  
est, ad naturalem & valde deperdi-  
tum utero vigorem reparandum, id-  
que ob ingentem vasorum inten-  
se complicatorum copiam & hinc depen-  
dentem legniorem sanguinis per ipsa  
transitum, quo vasa & glandulæ ni-  
mis relaxatæ topo suo destituuntur.  
Dein inter causas difficilius sanatio-  
nis & illud referendum esse puto, quod  
medici plerumque vel prorsus non,  
vel saltem levi admodum cura ad pri-  
mam mali originem, quæ in summa  
ventriculi imbecillitate residet, respici-  
ant. Quod si enim digestio ciborum  
minus rite succedit, prævi accedunt  
succij ad sanguinem, & euepta, quæ  
que in biliolem vel pituitosam amur-  
cam convertuntur, quæ salidiosum  
vel pinguedinis rancidæ, vel dulcedi-  
nis quasi mellæ, vel acoris & nidoris  
scentum ingignunt. Nisi itaque in pri-  
ma statim regione vitium corrigatur,  
frustranea sunt, quæ ad sanguinem  
depurandum & humores vitiosos, ex-

terminandos adhibentur remedia. Nec  
denique ex causis ægræ sanationis  
omittendum est, quod per naturam  
suam mulieres ita fiat comparatæ, ut  
rarius dieteticis medicorum præceptis  
obediant, sed ad ingenium suum vi-  
ventes ut omnibus, quæ ad suum  
hunc proritandum facere possunt, uti  
sunt vita desat, fructum dulcium,  
acidorum, farinaceorum & insuæ quo-  
que Cœlee abusus, potio parior &  
somnus longior, ventris & inferiorum  
partium refrigeratio, sumus calidus  
ex ignitis carbonibus hiemali tempore  
in naturalia admixtus, nec non potus  
frigidus corpori æstuant ingurgitatus,  
&c. nimium indulgeant: utpote quæ  
omnia sanari sunt infesta; longe ta-  
men majorem noxam eo tempore ad-  
ferunt, quo jam uterus labem quan-  
dam, v. g. per partum, abortum vel  
alium gravioram morbum perpassum  
contraxit.

### §. II.

Quæ ad generales & curatorias ac-  
tinet indicationes, quæ ratione illarum  
sint expediendæ, paucis explicabo.  
Ante omnia prima regio, & univer-  
sum corpus a nimia feri colluvie per  
congrua evacuancia & solennia natu-  
ræ emunctoria est liberandum. Deinde  
tonus & robur uteri deperditum  
præstantissimis tam internis, quam  
externis remediis debet restitui, quo  
facilior & expeditior sanguinis & hu-  
morum per ejus vasa fiat progressus,  
& inde molestæ pravorum humorum  
stagnationes ac secessionis pororum  
que & glandularum relaxationes tol-  
lantur, ac ultoriosæ aventantur. Post  
hæc ventriculi habenda est ratio, quo  
boni succij ad sanguinem ferantur, qui  
vitiosos corrigant & bonos laudabiles  
que amissos restituant. Denique, si  
malum gravius est & simul cachecti-  
cum, opera danda est, ut tota sangui-  
nis & humorum massa in meliorem  
reducatur temperiem, excretiones  
naturales promoveantur, & visceribus  
pristinum suum robur & naturalis red-  
datur functio.

### §. III.



§. III.

Primo itaque studendum est, ut primæ viæ a sordibus excrementitiis repurgentur: quod tamen non per temedia valide commoventia ac purgantia, sed potius per benigna & miora; quæ repetita dosi data per epicalasin operantur, debet præstari. Atque in eo contentientis habeo peritiores artis nostræ antistites, e quorum numero vel unieunt allegasse sufficiat, doctissimum RIVERIUM, qui cent. III. obs. 87. testatur, se frustra tentatis aliis remediis, in pituitosa laxante certum ac fidum invenisse auxilium, eaque sola per mensem integrum usurpata mulierem diuturno fluore albo laborantem sanasse; quod medicamentum in præxi lib. XV. cap. IV. rursus valde commendat. Ex omnibus vero laxantibus in hoc morbo proficuis certe eminent rhabarbarina, do quod præter laxantem, etiam blande balsamicam & amaricantem reconducunt virtutem; quæ acidum vitiosum corrigat partesque simul dejectas egregie roborat. At vero ne feligatur rhabarbarum leve & cassiosum; sed, quod optimum est, solidum, sincere moneo. Potest hoc medicamentum cum aliis appropriatis commode remitteri & vel in forma pulveris, vel infusi & decocti, vel etiam in extractum & essentiam reductum exhiberi. Pulvis nam componitur: recipe rhabarbari optimi drachmam dimidiam, terre soliatæ tartari grana XII. M. detur pro quâ dosi. Infusum utilissimum hoc modo est præparandum: recipe rhabarbari opt. drachmas sex, radicis zedoariæ, aristoloch. rotundæ pimpinellæ, cort. atrantior. ana drachmas tres, seminis dauci, anisi stellati, salis tartari ana drachmam unam & dimidiam. M. F. species pro una vini mensura. Extractum optime ingreditur pilulas, quæ laxantem & roborantem exserunt virtutem, si ita conficiantur: Sumatur extracti rhabarbari, aloes rosatæ, gummi galbani, myrrhæ elect. gummi bende-

Tom. IV. Part IV.

re, sandaracæ, extracti aristoloch. rotundæ, succini portione anatica drachma una. Fiant cum essentia balsami Peruviani pilulæ ex scrupulo uno, no. XX.

§. IV.

Quando cachexia urget & ventriculi magna adest imbecillitas viscerum, quæ laxitas, nunquam non præstantissima deprehendi efficaciz, quæ sequuntur medicamina: Recipe trochisc. martis tenuissimi, sive antimonii martialis cathedlici, foetulæ ari, salis absynthii, solution. oculor. cancr. singulorum drachmam unam, corticis cascarillæ, succini, cinnabaris, ana drachmam dimidiam, olei ligni sassafras guttas VI. M. F. pulvis, qui ad drachmam unam cum aqua vino diluta mane potest exhiberi, cujus tamen operatio longe conspicietur erit; si infusum Theiforme, ex herba melissæ, menthæ, urticæ mortuæ, salviæ, semine dauci & aniso stellato paratum superbibatur. Post hæc ad robur uteri restituendum, neque minus ad amurcam dissolvendam & exturbandam longe utilissimum erit hoc oî remedium: recipe essentia succini, ligni aloes, tincturæ antimonii acris, liquoris nostri mineralis, spiritus cornu cervi ana unciam dimidiam, quod ad guttas L. pro re nata cum infuso Theiformi, vel vino diluto potest assumi.

§. V.

Hactenus dicta certe sunt pulcherrima & appropriata adversus nostrum malum medicamina, sed opus etiam est, ut externis eorum virtus secondeatur, quæ inter diuturno usu comprobata laudem merentur balnea, cum speciebus roborantibus, nervinis, sale oleoso volatili resectis, præparata, quarum censum subeant herba majoranæ, satureiæ, thymi, melissæ, calaminthæ, matricariæ, abrotani, origani, rorismarini, hyssopi, flores chamomillæ romanæ, bacæ lauri, juniperi, &c. quæ includi debent sacculo & per horæ dimidium in aqua Jenacæ

S 3 deco-

decogi. Talis facculus dein, dum ægra balneo infidet, regioni uterinæ est imponendus. Nec extra balneum intonsultum est, facculus ejusmodi tenuiores, in vino rubro leniter decoctos per noctem inguinali regioni applicare. Præterea quoque laudem externe merentur suffimigia, quæ ex acapahaca, malliche, succino, benzoe & thure confici & ad uterum admitti commode possunt.

## §. IV.

*Dieta.* Quod ad dietam attinet, sub hac cura paucis, tenui & eupepto cibo opus est, abstinendo ab omnibus carnibus, præsertim durioribus, pinguibus, infumatis, pilcibus marinis, neque minus a leguminosis, acidis & dulcibus, lacticiis, farinaceis, & assatæ carnes præferri debent elixis. Pro potu ordinatio commendamus decoctum ex radice chinæ, ligno saffras, fantalo rubro & flavo, ligno lentisco & cinamomo. Vinum etiam bonum Hungaricum moderate inter cibos sumtum coctionis ambeculitati succurrit utilissime.

## CAUTELE ET OBSERVATIONES CLINICÆ.

## §. I.

*Circa adfusa genita.* **I**N fluore albo, five simplici, five virulento, vel etiam in mensibus uccoloribus, adstringentibus tam internis quam externis nihil perniciosius est; siquidem inde materia serosa in utero ejusque valis retenta in massam sæpius valde tenacem concrevit, quam modo excretio hæc impeditur, sed ingens quoque & ad tactum durus tumor in regione pubis non raro subnascitur, qui, nisi cito succurratur, nunquam sere non gravia accersit accidentia. Vidimus enim exinde lentas febres cum atrophia, phthisin, purpuracea exanthemata, tumores tympanicos, & erodentes in faucibus defluxiones uvulam & amygdalas pessime adficietas, nec non uteri

scirrhos, apostemata & exulcerationes præ insaniabiles.

## §. II.

Pelli five elysmata uterina sicuti ab antiquitate ipsoque Hippocrate in mulierum adfectibus magno in pretio habita & in frequentiore usu tracta fuerunt; ita mirum videtur, nostro tempore eorum ulum penitus in praxi medica penitus evanuisse, cum tamen in certis casibus & maxime, ubi substantia uteri læsa est, non sine insigni fructu eadem usurpari experientia doceat. Vidimus enim in fluore albo inveterato, qui difficultat alias sanabilis est, necnon in abscessibus & exulcerationibus peculiarem plane effectum. Nam sicuti gonorrhœa tam benigna quam maligna in viris non facile, si inveteravit, sine injectionibus sanari potest; ita etiam in fluore albo necesse est, ut ad partem graviter adfectam & læsam medicamentis accommodati virtus proxime accedat. In genere vero illud notandum arbitror, quod tales injectiones non simul ac semel & magna in quantitate, sed crebrius & in retracta portione ad usum scilicet unam vel duas adhiberi debeant. Vitanda autem sunt omnia salsa, acris, nimis pinguis & lubricantia.

## §. III.

*Circa Thermae Carolinæ.* **T**hermae Carolinæ ut in cachecticis desideratissimam ferant opem, nihilo tamen secius ubi substantia uterini nimium læsa est, & nimia feri sit profusio, multo vero magis, si fluor est veneris & exulceratio præsens & cum urina multum glutinis, quod fundum peti, cum dolore secedit, caute cum ipsis, five interne five externe adhibeantur, merendum est. Utpote hæc aquæ propter calcariam subtiliorem, quæ pollent, terram, externe valde contriungunt, interne vero, si corruptio addit, relaxatæ & excelsis partibus ob nimiam copiam nocent. Melioris conditionis sunt fontes, martiali principio imbuti, ut Lauchstadenses & Freyenwaldenses, qui

qui cum herbis nervinis decocti, ad serum superfluum per transpirationem educendum, & adfluxum ab utero averrendum, efficaciz sunt præstantissimæ.

§. IV.

Circa  
menstruam  
fluxum.

Sæpius observavi a menstruo fluxu per duos tresve menses non ex gravitate, sed aliis causis retento ingentem sanguinis profusionem abortam fuisse, quam postea fluor albus excepit. Quare ad utrumque malum præcavendum venæ sectio, expensis prius omnibus circumstantiis, administrata est utilissima. Namque uteri vasa a nimia sanguinis copia distenta suum amittunt tonum ac robur, ut solennes ibi fiant stagnationes non tam facile removendæ.

§. V.

Circa  
balnea.

Balnea tam sicca quam humida ante convenientem corrigentium, corroborantium & evacuantium usum adhibita tantum non semper majori solent esse detrimento quam emolumento. Nam impuros humores; nimium commovendo, ex ignobiliori sede ad mobiliorem sæpe non sine ingenti periculo appellant. Balnea sicca sive iaconica, si a superfluo & excrementitio humido corpus prius probe liberatum fuerit, in feminis phlegmaticis usum omnino habent laudatissimum, dum externo calore, sudorem eliciendo, partibus ob excretam nimiam humiditatem relaxatis pristinum tonum ex voto restituant.

§. VI.

Per  
pro-  
prietatem  
sanguinis  
generatam  
causam  
causam  
causam.

Si ventriculus, ut sæpe incidit, ingentibus iteratis sentina scatet, cum fructu iteratis vicibus offeruntur blanda emetica; ex quibus radix ipecacuanæ, quæ leniter roborat, & perspirationem adjuvat, omnibus reliquis est præferenda. Nec suo fructu destituitur elixir nostrum viscerales cum essentia cascariillæ remixtum & inter cibos assumptum.

§. VII.

Circa  
fluxum  
sanguinis  
causam  
causam.

In inveterato fluore albo, si quid adhuc, cura finita, de fluido ex geni-

talibus exstillet, præter jam dicta externa & interna, suffusus ex olibano, tacamahaca, massiche & succino merentur laudari, quæ viæ ad uterum tendenti, commodo instrumento sunt applicanda: quodammodo enim relaxatas glandulas roborant.

§. VIII.

Quandocunque femina scorbuticæ, imo veneræ, vel quæ crebrius purpuram rubram patiuntur, hac fluxione perniciofa corripuntur, abstinent dum omnino est a calidioribus purgantibus & balneis, sed mirissime sunt primis temporibus tractandæ diaphoreticis fixioribus, & ejusmodi medicamentis, quæ corruptioni lymphæ maxime obstitunt. Ego igitur tali in casu cum fructu adhibui pulverem nostrum bezoardicum cum uno alterove sulphuris antimonii nostri grano maritatum, atque simul decoctum præscripsi, quod solet in lue veneræ ex lignis & radicibus sanguinem depurantibus, addito antimonio crudo, comparari. Et si corpus per mensem & ultra ita fuerit præparatum, interna pariter ac externa cum meliori fructu pro sanatione possunt adhiberi.

ENARRATIONES  
MORBORUM.

OBSERVATIO I.

Per venerunt haud ita pridem ad me doctissimæ celeberrimi Parisienses medici & Archiatri Regii litteræ, quæ accuratam morbi nostri cum mille aliis malis complicati exponebant historiam, quam non possum non integre huc transcribere. Nobilissima matrona annos XXXV. nata, partium omnium symmetria rite constituta, latoque satis pectore, sed a patre genita, qui phthisicus interit, ætatis anno XX. veneram luem a marito contraxit, unde, brevi interposito temporis spatio, hydrargyrosite administrata optime convalevit. Quinto vel sexto anno post ex peri-

pneumonia graviter aegrotavit, quæ in suppurationem versa est, & per anacatharsin feliciter expurgata. Inde tamen quinque circiter abhinc annis variis cepit morbosus symptomatis conficiari, quæ nunc sigillatim recensenda veniunt, sed paucis, nam ut vulgari fertur axiomate, *intelligenti pauca*.

I. Laborat ægrotans ventriculi imbecillitate tam varia & sibi jam parum constanter, ut modo rite appetat, & rite concoquat: modo appetat debilius, & ignavius quoque concoquat: plerumque appetat quidem satis bene, sed tam male concoquat, ut cibaria, etiam eupepra, in biliosam amurcam, vel in pituitolos mucus, quod ad maximam partem, convertantur. Ad usus aliquando satis libera, nigrior aliquando. Interdum, nulla anxietate premitur stomachus, sæpius vero aliquot post pastum horis inasuetopondere, quod ad cardialgiam proxime accedit, gravatur, & ægra fastidium vel pinguedinis rancidæ, vel dulcedinis quasi mellæ sensum experitur: numquam vero, vel rarissimo saltem, acorem nidoremve ullum empyreumaticum.

II. Interdum, sed maxime dum instant catamenia, laborat ægra dolore in ovario dextro, dextroque uteri latere, qui non raro ad muliebria usque extenditur, sed subobscuræ, & qui sævit præsertim si ægrotæ erecto corporis trunco. aliquamdiu pedibus insistat, maxime statim a pastu. Ceterum menstrua, & ea, quæ par est quantitate, & statim, quo debent, tempore solent ut plurimum profluere, quamquam contigerit non semel, ut tardius segniusque manaverint. Apparet interdum suor albus nec copia multus, nec colore aut acrimonia ullo modo vitiosus, qui menstruorum eruptionem antecedit vel subsequitur, sed quo nec erosionis, nec caloris ulius in muliebris sensus inducitur. Matrona de qua quæstio est, peperit ælim semel atque iterum ante contra-

ctam lucem ventrem, sed parturitus lausta, partusque vitales fuere, atque optima sanitate etiamnum fruuntur?

III. Quod nunc potissimum est, & de quo peritiam tuam poscimus, Vir illustr. en paucis accipe. Aegrotans ab eo tempore, quo ex peripneumonia graviter decubuit, solita erat intendum e pulmone & ex illo pulmonis loco, ubi peripneumonia sedem habuit, excreando manere emittere, ter aut quater in mense, sputum unum vel alterum, spissum, rotundum, cineritii coloris, aquæ præponderans, sed non graveolens. Jam vero circiter ab uno mense desepente & absque sensibili quavis causa, rursus sputa aliquot, ejecit sanguinea, seu potius pituitosa sanguine vivido & rutilante imbuta, vel strigatis interpersa, quæ largæ venæ sectione in brachio, bis intra horas sex repetita, celerrime & felicissime cohibita sunt. Eodem neque febre ulla, neque ullo spirandi labore, neque ulla omnino tussi ægra tentata sunt, sed jam ab aliquot diebus queritur se experiri quendam doloris obscuri sensum in superiore & dextra thoracis parte, e regione tertiz vel quartæ costarum superiorum, scilicet in eodem loco, ubi olim latuit abscessus, in quem peripneumonia degenerasse fuisse supra dictum est. Ab eo vero tempore matutinis horis, ubi primum expurgiscitur, unum alterumve sputum educit e pulmone, facillimo quidem nisu & sere sine ulla, sed quod plerumque cineritii, grisei, subulvi coloris est, aquæ præponderat, leve est & spissum, & ad puris concocti naturam videtur paullo nimis accedere, si revera purulentum non sit. Ceterum ægrotæ febre, tussi, dyspnoea omnino vacat, & in utrumque latus perinde jacet sine noxa, etiam in situ corporis plane horizontali, qui nobili matronæ connaturalis est. Notari autem velim ægrotam, ante brevem illam hæmoptoeam, quæ laboravit semel, ut modo dictum est, lacte vaccino per duos aut tres menses usam fuisse semel.

in die initio quidem solo; vel cum admixta aqua communi, sed minus feliciter, utpote quod ventriculo noxam inferebat: postea vero cum aqua Spadana ad medias partes addita, unde ventriculus melius quidem habuit, sed menstruorum fluxus tardior pariorque evasit, atque tussis quædam sicca & quasi convulsiva & hysterica per duos menses ægrotam pertinaciter cruciavit. Porro non omittendum cenfeo, tot tamque variis morboſis symptomatibus, insultus quosdam hyſtericos, sed leviores, quos *vapoſeſes* vocant, interdum superadici, maxime dum insunt cymenienia, aut a ſtata periodo paullo diſtius ceſſant, quo tempore ægrotæ de quadam pectoris angustia quaſi ſpaſmodica, de diſtractione mediæſtini & de continua ad tuſſiendum propenſione queri ſolet. Demum quamquam ægrotæ medicis præſcriptis obſequium non deneget, ſtomachus, ſive natura, ſive ex antiquo vivendi more, in concoquendis cibis ita variuſſi eſt atque mutabilis, ut qui uno die proficere viſi ſunt, noceant ſequente, unde evenit, ut hæcæ diæte ſeverioris interdum remittendæ ſint: ſiquidem experientia comperit eſſe, quod & ab Hippocrate dictum tenes, cibos ab ægroſante avidè expetitis ſeliciter promittis & minore tumultu conſici, utcunq; paulo magis diſſepti videantur, quam qui concoctu faciliores eſſe cenſentur, ſi eus ægrotæ palatum reſpuat. Eſt tamen modus indulgentiæ noſtræ, ſunt certi denique fines, intra quos ægrotæ, nec reſuſcians, ſeſe contineri facile patitur.

### RESPONSIO CONSULTATORIA.

Eſt omnino hæc adfectio inter graves, diuturnas, curatuque diſſiciliores & eventu anſipites referenda. Totus enim corporis habitus tam quoad ſolidas & fluidas partes, quam quoad functiones vitæſus videtur

Pulmones in dextro latere cavitate recondunt ulcerofam calloſitate obductam, quæ ex peripneumonia ante ſex annos contracta, temporifque ſueceſſu ita adaucta videtur, ut timor ſit, ne in maiorem corruptionem & febreſcent hæbicum calorem ex facili tranſſeat. In utero quoque dextra regione non exigua deliteſcit labes & obſtrictio, quæ ingraveſcens menſium pariter negotium in ordine rogit turbat, unde fluoris albi & pathematum ſpaſmodicorum, ſeu hyſterico-hypochoſtriæcorum origo, quæ, dum totum nervolarum partium ſyſtema in conſenſum rapiunt, quantas in æconomia motuum vitæſus excitent turbas, res artis perito non obſcura, ſed ſatis clara & evidens eſt. Fovetur autem & augmentur ſingula hæc mala, ut ego quidem arbitror, a vitioſa ventriculi & primarum viarum imbecillitate pravaque alimentorum digeſtione, quaſi ſolet, ut loco chyli probe temperati & ſubtilioriſ, qui materiam boni ſanguinis, lymphæ nutritivæ & tenuiſſimi cerebri atque nervorum fluidi ſupponat, ſucci crudi & lenti & viſci diſſi ad ſanguinem delati minima æmunctoriorum vaſcula, per quæ optimo fit chyli & ſanguinis depuratio, obſtruant; unde ortus mali cachectici, quo primario illuſtriſſima noſtra laborat. Quodſi itaque adhuc ſpes recuperandæ ſanitatæ, vel mitigandæ adverſæ valetudinis ſuper eſt, meo quidem iudicio, initium curationis moliri oportet a reſtituendo ventriculi & primarum viarum robore ciborumque digeſtione promovenda. Ad quem ſcopum obtinendum primo omnium exquiſita diæte vel accuratioris vitæ regiminis habenda erit ratio. Sicut enim apud feminas, quæ molliori & ſenſibiliiori præditæ conſtitutione deſiunt, ſomno variique generis edulibus & animi adfectibus indulgent, mali cachectici, hyſterici & hypochoſtriaci, faciliſ ſit proventus; ita etiam, niſi hæc omnia, quæ cauſam mor-

mor-

morbo dederunt antecedentem, rite submovcantur, supervacanea est omnis reliqua per medicamenta curatio. Quod ad ipsa remedia attinet, quæ nostræ ægrotanti existimem proficua, primo omnium suaderem, ut prima regio a sentina & illovis vitælorum humorum per lenem & benignum emeticum expurgeretur, exhibendo videlicet, prout ventriculus magis vel minus sensibilis est, scrupulum unum, vel grana XXIV. radices ipecacuannæ. Hæc quippe radix sine omni noxa ventriculi & duodeni cavitatem a sordibus inibi hærentibus, quæ instar fermenti chylum inficiunt & contaminant, liberat, perspirationem simul egregie adjuvat, æonumque & robur ipsis partibus consiliat, ideoque pro circumstantiarum ratione bis vel ter tertio die potest iterari. Subiungenda postea sunt temperata balsamica, quæ digestionis negotium promovendo tonum ventriculi corroborant. Quo sine in usum trahi potest elixirium, quod cort. aurantiorum recent. uncia dimidia, extracti absinthii, gentianæ rubræ, cascarill. myrrhæ elect. ana drachma una, salis tartari drachmis tribus cum aquæ menthæ uncis octo compositum, vel solum vel cum quarta parte spiritus nitri dulcis aut liquoris nostræ anodynæ remixtum ad LXXX. vel C. guttas intra prandium & quatuor horas post eum potu ordinario potest exhiberi. Hoc enim medicamentum valde temperatum stomacho, pectori & utero est amicum, nec ullam in sanguine excitat commotionem, sed ut ejus usus per longum tempus continuetur necesse est. Posthæc commendarem, ut alternis diebus circa lecti introitum numero decem offerantur pilulæ, hujus compositionis: Rec. extracti rhabarbari, zedoar. myrrhæ, succini ana drachmam unam, extracti castorei scrupulum unum. M. F. eum essentia bass. peruviani pilulæ ex scrupulo uno no. XX. Postero die mane drachma dimidia pulveris leniter ape-

rixi ex lap. cancer. irid. florent. ana drachmis duabus solution. ocul. caner. cum succo citri, salis polychrestii, nitri purif. ana drachma una conflati cum fructu erit sumenda, defuncto bibendo infusum Theiforme, quod ex herba veron. menthæ, pulmonat. maculof. & aniso stellato potest componi. Pro potu ordinario, cujus summa est in diuturnis adfectionibus sanandis efficacia, suaderem decoctum radices chinæ & sarsaparill. cum passulis, addita in fine coctionis cinnamomo portione acuatam & cum paucillo vinæ, inter cibos possimum remiscendum. Cæterum moderationem in sanguine mittendo plurimum commendo. Vidi ex relatione ad præcavendam hæmoptoen, intra sex horarum spatium bis largiter e ven. tusa sanguinem detractum; nollem tamen in nostris regionibus, ubi sanguis non adeo ebullit, id imitari. Nam in sanguine, nisi nimium exundet, virtum latet thesaurus, qui si supra modum subtrahitur, minima viscerum concidunt & angustantur; unde non modo utilium succorum secretio & inutilium excretio imminuitur, sed & vis digestrix & tonica ventriculi & intestinorum mirum labefactatur, ut periculum sit, ne status cachecticus inde plus increseat, quam decreseat. Idem sentiendum velim in hoc morbi statu de cura lactis, quæ licet, si præsertim cum aquis mineralibus instituat, in pectoris adfectionibus egregio sit solamen, in nostrâ tamen ægrota ventriculum magis debilitare, mensium negotium retardare, quam proficere videtur. Ex hæc sunt quæ circa Illustrissimæ personæ curationem vernalem proponere placuit.

## OBSERVATIO II.

Illustri loco nata femina, triginta annorum, constitutionis tenerioris, <sup>Fluor</sup> albus in loco degens mari vicino, vitæque <sup>albus</sup> mensil. sedentariæ & cibis duriorebus, ut pl. <sup>est m-</sup> scibus marinis, præsertim ostreis, <sup>stione</sup> adfecta,

adfueta, per annum sere, parcum & inordinatum mensem fluxum expecta, jam albo tentatur fluore molestissimo, facies incipit pallescere, corpus marcescit & animus quoque ad tristitiam & metum nunc longe magis, quam antea pronus horrenda sibi fingit pericula, maxime quando matris, eodem adfectu olim detentæ, subit recordatio. Ne itaque malum majora sumat incrementa, meam ægra imploravit opem.

### EPICRISIS CUM CONSILIO.

Ventriculi imbecillitati & prave ciborum digestionem ego præcipue omnium in hoc casu succurrendum ratus, primo blandiori emetico, radice videlicet ipecacuanne ad drachmam dimidiam cum decem tartari vitriolati granis bis in septimana exhibita primam regionem a vitiosorum humorum saburra expurgandam suasi. Dein singulis hebdomadibus pilulas nostras balsamicas cum extracto rhabarbari mixtas capiendas commendavi, intermedio vero tempore vinum stomachale, egregiæ virtutis ad tres quatuorve uncias mane hauriendum imperavi, cujus hæc erat compositio: recipe radicis zedoar. calami aromatici, enulz ana unciam semis, herbæ absinthii, rosmarini, marrubii albi, menthæ, salviæ, centaurei min. singulorum manip. unum, bacchar. juniperi unciam unam, Concisa contusa infundantur in vini Canariensis mensura una & dimidia, calidoque loco reponantur. Coletur usus tempore & per mensem hæc cura continuetur, addito monito, ut corpus moderato motu frequentius exerceatur & tibi capiantur cæpepi, abstinendo a victu duro & trassiori, cui oleacea, lacticia, farinacea & acida jure debent adnumerari. Et hæc medendi methodo ego affectum hunc recentem ex mala digestionem ortum, nisi jam in

cachexiam degeneraverit, in aliquot seminis sanavi felicissime.

### OBSERVATIO III.

Femina, triginta & aliquot annorum, macilentæ, post abortum tertii vice passum, per annum & ultra fluore albo correpta fuit satis molesto, mensibus inordinate & interdum largiter profluentibus. Ordinavi pilulas, quales in curatione præscripsimus, balsamicas, circa tempus decubitus per triduum devorandas, de super bibendo postero die mane vinum laxativum uterinum ad tres circiter uncias, lisdem diebus immittendam jussi ægram balneo aquæ dulcis cum herbis roborantibus, sacculo inclusæ decocta temporeque infusus sacculum hunc inguinali regioni imponendum. Interjecto trium dierum intervallo pristinam curam per totidem dies repetendam suasi; idque rursus tertii vice, hac tantum cautela, ut sub quavis cura novæ herbæ pro balneo sumantur. Denique uterum thure & mastiche & succino incensis commendavi suffumigandum, rectamque vitæ rationem per longum adhuc tempus continuandam injunxi. Quæ methodo, quum non modo per alvum, sed per uterum quoque ingens humorum sentina fuerit expurgata, optima hæc femina, sicut plures aliæ pertinaci & molestissimo hoc adfectu laborantes, pristinam recuperavit sanitatem.

### EPICRISIS.

Quando auspicio succedere tentatis est primam regionem & universum corpus a colluvie leri vitiosi liberare, sed omnium maxime uteri habenda est ratio, ut is ipse nimis laxatus & humorum viscidorum copia fartus roboretur, quod per balnea jam laudata, herbis nervinis & aromaticis efficacia reddita expediri potest.

Fluxus  
albus  
post abortum  
tertium

test commodissime. Et quoniam plerumque sterilitas vitiosam ejusmodi uteri fluxionem comitatur, eadem hac methodo hæc ipsa potest tolli & exoptata fecunditas reddi.

## OBSERVATIO IV.

*Pluribus annis* Illustris matrona viginti septem annorum, constitutionis valde teneræ, fluxu co. & temperamenti sanguineo-phlegmatici, ante novem circiter annos post puerperium, lochiis cessantibus, molesto albx viscidæque materiz ex genitalibus profluvio cœpit laborare: quod inter initia, cum parum exinde perceperit incommodi, non adeo multum æstimavit. At vero invalescente hoc malo, cum multa alia accederent symptomata, plures consuluit medicos peritos, quorum quidem ope se levatam paululum vidit, penitus tamen liberari nunquam potuit. Jam brevi abhinc tempore fluxus tanta, summis incrementa, ut non modo copiosior ex genitalibus feratur, sed & mensibus durantibus, non cesset: unde vires valde decrescunt, atque pedum tanta est imbecillitas, ut vix viginti passus sine ingenti virium defectione progredi ægra possit. His accedit summa cutis sensibilitas; siquidem sub quavis fere aeris mutatione subito gorripitur rheumatismo, cum cephalalgia, doloribus orontalgidis & faciei erysipelate. stipato. Hæc ita pridem, accepto tristi de subita propinqui morte nuncio, vis morbi ita invaluit, ut nec extra lectum esse, nec solum capere possit. Immo nunc quoque, per intervalla, quod pessimum est, frigus accedit, extremorumque tremor ac animi deliquium. Tam misere itaque afflicta egrotans, meum requisivit per doctissimum Medicum consilium.

## EPICRISIS CUM CONSILIO.

In præsentī hoc casu non tam ad fluxorem album, quam potius ad ejus effectum seu statum cachectico-atrophicum summamque virium prostrationem respiciendum existimavi. Quam difficile autem sit, in tam depravato temporisque diuturnitate confirmato adfectu convenienti medicina succurrere, abunde satis notum est. Si quatenus recuperandæ salutis spes supersit, ita curationem suscipiendam esse edixi. Primo omnium, juncto accuratiori vitæ regimine, usum elixirii nostri visceralis cum cibo bis de die ad LXXX. guttas commendavi. Dein curam præscripsi fontis Selterani cum tertia parte lactis asinini remixti, exhibendo, per mensis spatium singulis diebus mane mensuram dimidiam & ultra. Omni triduo, ad moderandum fluxorem uterinum circa, decubitus dari jussi mo. XI. pilularum balsamicarum; exteri vero succurrendum duai suffragio, & epithema ex aceto florum sambuci cum aqua reginæ Hungariæ æquali portione remixto, inguinali regioni applicandum suavi.

## OBSERVATIO V.

*Fluxu labora. labora. labora.* Femina viginti annos nata, constitutionis quoad corpus teneccioris, albus a quoad animum valde sensibilis, cibis dulcibus, fructibusque horæis & lactis. Eticiniis nimium indolens vitamque amans sedentariam, a primis adolescentiæ annis perpetuo fere viscidæ muci per nares stillicidio laboravit. In conjugio primum gravida partu sanctæ est admodum laborioso, idque propter paullo vehementiorem secundinarum extractionem, & inde obortum dolorem valde acutum. Neque dein lochiorum fluxus, ut debuit, successit, sed omnino fere subsistit & unde, schrem, incidit optima mulieris valde



valde acutam, a qua tamen brevi post convaluit. Retinuit vero ab infelici hoc puerperio magnam uteri atoniam, & perpetuum fere feri albicantis & putridi ex sinu ejus profluvium, quod post mensem effluxum semper infestat gravius. His accedunt adhuc aliz recte valetudinis læsiones: nam a frigore admissio, vel flatulento cibo adsumpto, aut a levi quadam animi commotione, dolore lumborum addicitur valde gravativo, macilenta in dies magis redditur, & vespera infestiores pedum partes tumide conspiciuntur. Durarunt singula hæc mala per integros sex menses, quare ne his pejora adhuc eveniant, meum maritus efflagitavit consilium.

### EPICRISIS.

Meretur attentionem in præmissis morbi historia, quod humoris serosi ex muliebribus profluxio violentum partum & vehementiorem secundinæ avulsionem exceperit, quale quid mihi in artis exercitio annotare licuit sæpissime. Namque tali ratione non exigua utero inducitur læsio & atonia, quæ plerumque majorem sanguinis affluxum & decubitum post se trahit, quo fit, ut serum per poros & meatus nimis patulos faciat, & copiose nonnunquam ex pudendis promanet. Augetur vero hic fluxus circa tempus mensium, quia tunc majori nisu & copia sanguis ad uterum confluit, a quo major ejus relaxatio sequatur necesse est. Dolores lumborum, qui fere individuis diuturnioris albi profluvii comes est, sanguinis stagnationi & distensionis vasorum tam spermaticorum quam hypogastricorum, quæ sanguinem ad uterum vehunt & revolvunt, debet assignari. Namque difficilius redditus sanguinis per uteri vas regressus, isaple in vasis adducen-  
tibus accumulatur, eademque nimium distendendo partes adjacentes nervosas comprimit, unde doloris sensus. Quod curationem atinet, con-

silium dedi, ut per tres continuos dies pilularum mearum balsamicarum no. XV. circa decubitum, postero die vero mane dosis pulveris salino-nitrosi sumatur, idque aliquoties, interpositis semper aliquot diebus, repetatur. Pro potu præscripti decoctum mastichinum cum paulillo cinnamomi acuaturn & inter cibos cum vino remixtum. Ad uterum reborandum exterius commendavi suffimigia ex sandaraca, mastiche, benzoe & cinabari vulgari confecta, sæpiusque inguinali regioni imponendos fusi sacculos herbis nervinis repletos & ex vino rubro costos; interne vero eodem sine balsamo nosterum vitæ cum tinctura tartari æquali portione remixtum cum infuso theiformi mane exhibere jussi. Quæ methodus, subjuncto simul accuratori vitæ regimine, opem attulit exoptatissimam.

### OBSERVATIO VI.

Generosa semina, viginti & aliquot annorum, temperamento prædicta cholerico-melancholico, cui a primis pubertatis annis menses fluxerunt parviores & decoloras, ante dimidium fere anni circa menstruum periodum sat copioso muco albi ex muliebribus vesatur profluvio; unde mille malorum circa id temporis origo. Nam subinde gravis capitis dolor affligit & exquisitum refrigerationis sensum, als menn ein Stud Eiss auf den Kopf lage, inducit. Flatus hypochondria molestè distendunt, alvus est adstricta, urina secedit pallida, transpiratio fere nulla est, & circa vesperam horror invadit febrilis: extrema frigant, appetitus languet, omnesque artus lassitudo & gravitas occupat. Ad expugnanda hæc mala varia ægrotaans adhibuit remedia, quæ tamen neglecto vitæ regimine, parum vel nihil attulerunt levaminis. Ego igitur consulto primo omnium accuratam dietam injunxi, & acutæ a cibis crassioribus

*Fluxus  
albus  
in incru-  
entis  
diuturnus  
et crassus  
et durus.*

erassioribus, quos in deliciis habebat, sedulo abstineat, iusculisque utatur tenuioribus cum radice cichorei, petroselinii, asparagi, graminis &c. decoctis; ad meliorem autem digestionem promovendam obuli elixirium nostrum viscerale inter cibos adsumendum. Dein ad primas vias a cruditatibus & sordibus repurgandas, statimque discutandos clysteres emollientes & carminativos crebrius adinjci, & pilulas balsamicas ad Becheri mentem confectas, ter in septimana circa decubitus adsumere jussi. Post harum usum sequenti die mane praescripti pulverem ex lapidibus cancror. nitro depurato, tartaro vitriolato, solutione oculorum cancri componendum, desuper bibenda vascula quaedam infusi theiformis ex melissa turcica & citri corticibus conflati. Potus loco ordinavi fontem Sclerianum cum tertia parte vini Rhenani remixtum, & circa instans mensium tempus pillulas balsamicas reiterare imperavi. Exteriori succurrendum duxi suffragiis, & sacculis roborantibus iuguinibus applicandis, nec non venesectione ter in anno celebranda.

### EPICRISIS.

Sistit hic casus fluxorem album cum affectu hypochondriaco — hysterico complicatum, de quo copiosus statum in abdomine praeventus; pertinaax alvi obstructio, ciborum fastidium; extremorum refrigeratio, totius corporis languor, crebriores capitis dolores cum horrore febrili abunde satis testantur. Originem suam singula haec mala mutuare videntur a mensium fluxu valde inordinato, & quoad colorem vitiatum, cui in ordinem redigendo omnis impendendus est medentis labor. Docemur praeterea ex hac morbi historia, quantum intersit, ut medicus convenienti virescensque regimen praescribat: ita prorsus, ut hoc neglecto, frustragen-

ae omnis reliqua vel pretiosissima medicina.

Plura hinc inde legantur in Consult. & responsis nostris medicinal.

### C A P U T XVII.

#### DE GONORRHOEA BENIGNA ET VIRULENTA.

#### THESES PATHOLOGICAE.

##### §. I.

**I**nter morbos ex atonia partium solidarum oriundos, referri adhuc jure meritoque debet gonorrhoea, quae nihil aliud est, nisi involuntarium seminis & liquoris femini analogi ex genitalibus stillicidium, a nimia vasorum semen adservantium partiumque adjasentium glandularum laxitate dependens.

##### §. II.

Differt gonorrhoea a pollutione in qua per intervalla vel breviora vel longiora modo seminis puri, modo cum sero chyloso mixti notabilis, ad unam vel duas drachmas accedens quantitas noctu cum insomniis venereis & volutate, interdum ex pulchritudine seminarum adpectu, vel post equitationem, ob nimiam vesicularum seminarum vel glandularum prostaticarum laxitatem lenemque irritationem simul & semetipsum.

##### §. III.

Gonorrhoea est vel benigna, vel minus talis. Haec dicitur, si cum ardore, colore vario & exultatione liquidum guttasim prodeat, & plerumque in cacoehymicis, scorbuticis, vel etiam calculosis cum emissionis urinae dolorifica, ob acrimoniam, est conjunctum. Illa vero, seu benigna adesse dicitur, quando sine dolore, ardore, aut excoitatione liquidi aequaliter tincti & albicantis sit profluxus, atque hinc species cum colore albo

Gonorrhoea  
differt  
a  
pollutione.

Differt  
a  
pollutione.

Species  
est  
vel  
benigna  
vel  
minus  
talis.

albo mulierum, magnam alit convenientiam, utpote qui itidem nihil aliud est, quam materiz chylosæ, ope glandulosæ substantiz uteri sequatur excretio. Quam in rem legimur MASSARIAS, qui lib. IV. p. 267. ego, inquit, sentio, medicus frequenter hallucinari, qui opinantur agrotos profusione seminis laborare, cum magis aliorum excrementorum fluxione laborent. Siquidem videmus plurimis agrotis hoc profusum multos annos perdurare, ex quo, profusente semine, necessarium foret, illos ad extremam maciem & corporis consumptionem deduci, sicut illis soles contingere, qui immoderato coitu utuntur, quod tamen non videmus illis evenire.

§. IV.

At vero, non modo ea gonorrhœæ species, de qua Massaria sermo est, diutius protrahitur, sed & de reliquis plura notatu digna existant exempla eorum, qui per multos annos utroque genitalium fluore laborarunt. Vid. BARTHOLINUS, historia XXXVI. centur. II. ubi de viro Bergonensi & Anat. lib. I. cap. XXIII. p. 234. de Bavino mentionem facit, quorum ille per decem, hic per triginta annos gonorrhœam sustinuerat, ille virulentam, hic incertam, an benignam vel malignam. Manserat uterque cætera sanus, nisi quod prior ossibus vix haberet.

§. V.

Datur etiam gonorrhœa virulenta, quæ a contagio venere suo repetit natales, eosque potissimum adficit, qui turpissima libidine incensi scorta sequuntur. Atque talis fluxus purulentæ varique coloris & consistentiæ materia, nec non summa virium imbecillitate se manifestat. Junguntur quoque, nisi cito occurratur, sat magni testium & glandularum inguinalium tumores, ulcera glandis & præputii inflammatoria, & membri dolorifica incrustatio; & urina mingitur multis referta filamentis, quæ quasi

vermiculos repræsentant. Si ingravescit malum vel inveteraverit, vel minus rite tractatum fuerit, miasmabit per vasa lymphatica ad sanguinem & fluidum requissimum sanguinis inquinat; unde veneræ luis prodeunt indicia, qualia sunt lancinantes capitis artuumque dolores noctu potissimum exacerbati, faucium ulcera, ossium nasi exelso, pustulæ in glandulis cæteri naturam æmulant, macies universi corporis cum faciei pallore, oculis concavis, tuphis quoque & hujus generis alijs.

§. VI.

Hæc sunt generalia, quæ malignum huic fluxum comitantur & excipiunt symptomata, accuratorem tamen ejus historiam sequentibus tradere juvabit. Statim aliquot horas post tam infelicem copium fluxus leviter incipit, & dein tertio, quarto & sequentibus diebus ingravescit. Glans semine tenuiori materiz profusientis est albicans, qui, si fluxus paulatim largior emanat, in flavum, & demum in viridem mutatur. Quando urina emittitur, primo, in glande tum in radice urethræ, demum per totum canalem dolor percipitur ardens & fere intolerabilis. Interdum continuus urget mingendi conatus, interdum mictio valde impeditur, & pene supprimitur, sine dubio ob molestissimam penis tensionem, quæ nocte ut plurimum cum magno cruciatu & duritie ingravescit, & tanta est, ut penis exinde incurvetur. Præterea insignis ad venerem est stimulus, ut vix a coitu sibi laborantes temperare possint, & ulcera quoque, ut supra dictum est, non raro in glande & præputio latitant scedissima.

§. VII.

Quod sedem adfectam attinet, audiamus, quid de ea sentiant, auctoritates. GRÆFIUS in tractatu de virorum organis generationi dictis, ipsam

Gonorrhœa virulenta symptoma.

lib. I. de curat. de scort. p. 10.

lib. I. de curat. de scort. p. 10.

in prostaticis collocandam existimat. **VESALIUS** lib. V. anat. cap. XXI. de suspenso quodam & Baravii dissecto, qui ante suspendium involuntario seminis fluxu laboraverat, refert, habuisse eum omnes meatus, atque eos potissimum, qui ex testibus in deferentis semen vasibus revolutiones pertingunt, apertos ac valde laxos, ideoque hos ipsos accusandos putat. Nos tamen sat gravibus induci rationibus statuimus, veram sedem in urethra tunica, copiosis glandulis, a **COUPERO** & **LITTRIO** detectis obstita, esse reponendam; licet non negandum sit, si profundius malum, ut in gonorrhœa virulenta, proserpit, prostaticas simul & vesiculas seminales contagio addici. Id quod abunde satis testantur anatomicæ sectiones eorum; qui per vitam suam tali fluxu diutius laborarunt. In his enim prostaticas callosas, scirrhosas & exulceratas nonnunquam fuisse observatas abunde constat.

## §. VIII.

*de masculinum* In feminis infectis ulcuscula proveniunt in glandoso corpore, sive in eo loco, ubi lacunæ circum & in meatu urinarii exitu collocantur, erumpunt. Testis est **GRÆFIUS** in tractatu de mulierum organis generationi dicentis, qui in cadavere mulieris hoc vitio inquinatæ dissecto, corpus glandosum, sive prostaticas urethra circumpositas, utero ejusque vagina innoxias, male adfectas ostendit. Et hinc patet ratio, quare feminæ, ut multa testantur exempla, sætum in utero gerere possint infontem & tali labe prorsus non infectum. Aliter tamen sentit **PALMARIUS**, qui in libro de lue venerea cap. IX. vesicæ collum adducit, ideo, quod ex ulcere cervicis vesicæ, a gonorrhœa curata residuo per totam vitam purulenta stillaverit materia, parum ab ea dissimilis, quæ in diuturna gonorrhœa a prostaticis ex urethra ferri solet. Cæterum notandum, in mulieribus hoc malum non ita sævire ac in viris, siquidem feminas

infectas diu vivere sinit, cum viros contra, nisi curetur, ad lethum ducat.

## §. IX.

Causa gonorrhœæ virulentæ utique *Consa* est miasma, ex imputo coitu cum fe- *gonorrhœa* *malig.*mina vel gonorrhœa maligna, vel *inducit a* lue venerea infecta ad viri genitalia, & *ex* *ejus* *sympt.* *malum.* postea per poros ad lympham vel liquorem feminalem translatum, cujus crassi mixtionemque naturalem plane destruit & dissolvit, partium causticam ac erodentem, partem putredinosam indolem inducendo, unde dolores, ardores, tumores, inflammationes & exulcerationes genitalium suam mutuuntur originem. Nam ita fere procedit hujus miasmatis multiplicatio, ut ab initio tantummodo glans inficiatur, dum contagium per poros apertos in tota se infundat, dein, nisi accommodata succurritur medicina, ad urethrae glandulas, tum ad prostaticas porosas, deum ad ipsas vesiculas proserpit seminales. Si lymphæ infecta per lymphatica vasa, quæ **COUPERUS** a præputio ad inguina aduentia demonstravit, glandulis communicatur inguinalibus, tum bubo sit venereus, sive tumor durus lentus sensumque indolens. Si vero gonorrhœa profundior est, & circa initium urethrae, ubi seminales vesiculæ semen effundere solent, inflammatio oritur, tum hæc vascula a tumore comprimuntur, & semen ad has vesiculas deduci nequit; unde testium tumor.

## §. X.

In causa gonorrhœæ benignæ adli- *Consa* gnanda, tum ipsius generalis liquidi, *gonorrhœa* *ben.* *signa.* tum vasorum seminalium toni, qui plerumque defectus est, habenda est ratio. Et primo quidem, quod semen attinet, attentioni observatione cogniturum perspectumque habemus, vel ob nimiam ejus abundantiam in subjectis plenis & in cohibitu laute viventibus, vel ob ejus acrimoniam in subjectis cacochymicis, scorbuticis & arthriticis hunc fluxum non raro con-

contingere. Deinceps, si ad labefactum organorum feminalium totum respicimus, hanc utique a nemine in dubium vocari arbitror; siquidem ea omnia, quae insignem hanc vasa debilitandi potentiam obtinent momenta, quorum potissima sunt nimis feminis, sive per pollutiones, sive per crebriores coitus, vel foedam masturbationem & gonorrhoeam virulentam praegressam profusiones, ad gonorrhoeam benignam etiam valde disponunt, idque eo magis in hominibus, qui temperamenti sunt phlegmatici & natura debiliores.

§. XI.

*Progrediendum nunc erit ad suppediandam gonorrhoeam tam virulentam quam benignae prognosin. Utraque, si convenientibus tractatur remediis, brevi tollitur; cum contra, si invalescit & gravioribus stipetur symptomatibus, difficilior sanetur, & non modo viros reddat steriles, sed & progressu temporis ad cachexiam & hecticam tabem laborantes ducat. Speciatim vero de virulenta ita scire licet: quo major est infectionis gradus, eo gravius quoque ista est & rebellior; raro tamen lues venerea post se trahit, nisi incongrue per medicamenta sudorifera & adstringentia vel externe vel interne adhibita fluxus cohibeatur. Hoc enim suppresso mox bubones, scroci & testiculorum tumores, carunculae urethram obfidentes, & alia pessima symptomata cum ipsa venerea lue superveniunt. Ipse fluxus quo facilius procedit, eo mitiora sunt symptomata: pessimum contra est, si parce nimis exsiliat, & urina cum summo calore mingitur flavescens & viridis. Denique inter cetera mitigata & in melius conversi mali signa referimus, si dolorifica remembris erectis copitrecto & exquisitissimus in urethra sub missione ardoris sensus minuitur, depressus antea vigor redire incipit, & ipsa faeces antea pallida vividior redditur. Curata vero gonorrhoea incertum est, si li-*

*visse e corpore expellatur. Dein, compressam a virulenta materia rheoza benigna vel ulcerata fuerint, se protrahitur, mixtando quam excelsit negotii; ita eo mundificentur, testit, si, ut sapissime & adeoque let, gonorrhoeam virulentam repperit. Differt tamen perinde ac homines differunt, quos invadit, ita e.g. eos longe diutius vexat, qui temperamento sunt phlegmatico, & catarrhalibus defluxionibus, alvique fluxibus in pueritia fuerunt obnoxii. Hi enim dum natura fibras obninent laxiores, iudicatu facillimum est, si qua parte atonia laborant, hanc longe esse graviozem, quam quidem in iis, qui fibris robustioribus sunt praediti.*

C U R A T I O.

§. I.

**Q**UAM gonorrhoea tam benigna quam virulenta ratione causarum valde inter se differant differentem quoque postulant medendi methodum. Utramque igitur seorsim expendimus, ordiendo a curatione benignae. Hanc autem admodum esse arduam & laboriosam, in prognosi jam ostendimus, neque aliam huius difficultatis causam agnoscimus; quam quod in hoc morbo ad partes adfectas nimis debilitatas & a tono suo dejectas, maxime in subiectis magna pravorum succorum coluvie scatentibus & dyscrasia scorbutica infectis, non secus quam ad fonticulum ex universo corpore humorum impurorum fiat adfluxus. Accedit adhuc, quod generationi inservientes partes, quae in nostro adfectu morbose adsignantur, ex meris fere nervis nervolisque tunicis sint constatae, ad quas remedium energia experientia teile, penetrat difficillime.

## §. II.

*Indicationes curatiles.* Absolvitur autem pertinacis huius curatio mali his fere indicationibus. Primo opus est, ut convulsivis laxantibus copia immitti feri, si in corpore abundat, evacuetur, & a parte adfectu derivetur. Dein ut partes nimis relaxatae & flaccidae accommodatis tum internis quam externis roborantibus medicamentis confortentur.

## §. III.

*Primum indicationem satisfaciunt,* quae perepicroasin operantur laxatoria: quo nomine comedari merentur pilulae balsamicae Becheri, & ad ejus mentem confectus Stahliani & nostrae, quae non modo alvum ducendi, sed & egregie roborandi possident efficaciam. Praeterea utilissimum saepe depretheodii infusum laxans, ex sequentibus speciebus compositum. Recipe rhabarbari Alex. unciam unam, radicis vincetoxici, pimpinellae, rasurae ligni sassafras ana unciam dimidiam, sol. fennae, agarici trochiscati, fibrarum hellebori nigri singulorum drachmas tres, cardamomi, cinnamomi, ana drachmas duas, passul. minor. uncias tres, tartari crudi unciam dimidiam. M. C. C. D. S. Species; cum duabus vini Rhenani meoforis infundeodur. Dosis sit quatta pars mensurae.

## §. IV.

*Qua secundam indicationem satisfaciunt.* Huic iofuso per octo dierum spatium mane adsumto, ad expleodam alteram indicationem, subjuogendus est pulvis hic utilissimus: recipe ossis sepae unciam unam, corall. rubr. succini, spec. de hyacintho, cort. chaccarill. ana drachmas duas M. F. pulvis, cuius dosis ad drachmam unam mane & circa noctem cum decocto cremoris hordei amygdalino sumi potest. Eodem quoque tempore exterius regioni pubis & perinaei, maxime per noctem adplicandum suadeo sequens epithema: recipe herbae melissae, menthae, basil. flor. rosar. rubr. balausti, ana manip.

unum, cort. granat. caryophyllorum, oucistae, cardamomi, mastichis ana unciam dimidiam. M. F. species, quae sacculo inclusae in vino Gallico rubro coquenda.

## §. V.

Cum his invicem conjungendum *Dieta* est accuratum regimen dieteticum, *ratio.* quod ita debet institui. Primo omnium abstineadum est ab omnibus cibis valde piperatis, aromaticis, salitis, leguminosis & insatiantibus, nec non ab immoderationi vini & cerevisiae potu. Evitetur quoque frequentior cum seminato sexu conversatio, evitetur veneris exercitium & fortior corporis motus, praesertim qui curru sit vel equo. E contrario vero inter cibos commendanda sunt jacula avoacea cum vitello ovi, amygdalis & pistaceis preparata & in emulsionem redacta, quorum magna est ad acrimoniam lymphae salsa demulcedam efficacia. Convent quoque pro potu adsumere decoctum ex radice corzonerae, chinæ, santalo rubro, rasura lign. sassafras, glycyrrhiza & passulis confiatum.

## §. VI.

Quodsi haec minime sufficiunt, ego *Balnea:* ad malum, praesertim inveteratum *sum.* tolleodum, post horum usum cum fructu hactenus commendare solitus sum balnea ex speciebus nervinis & roborantibus composita, quales sunt abrotaeum, majorana, mentha, hyssopus, origanum, serpillum, rosmarinum & hujus census alia. Post balneum aeger lecto se committat lenem expectando sudorem. Nec sine auspiciato successu aliquoties usus sum fontibus Lauchstadiensibus, balnei loco per aliquot septimanas adhibitis, utpote quae propter tenuissimum, quem in fine foecet, martis crocum insigera relaxatas partes roborandi possident virtutem.

## §. VII.

Eadem curandi methodus locum *Quae pro:* invenit aptissimum in largioribus & *per in* valde debilitantibus pollutionibus *pollu-* cohibenda. *tione.*

hibendis, modo hæc observetur cautio, quod purgantia rarius offerantur, liquidum, si alvum molientibus opus est, sola rhabarbarina & passulata sufficiunt. Præter allata vero remedia in tali casu externe regioni lumbari, seu potius spinæ dorsali circa lumbos adplicandum suadeo sequens emplastrum: recipe emplastri spermatis ranar. uncias duas, sacchari saturni, aluminis usti ana drachmas duas, camphoræ, olei lign. Rhodii ana drachmam dimidiam. M. D. Porro quoque singularem plane effectum in pertinaci hoc morbo annotavi a convenienti balnearum frigiderum usu, modo corpus probe prius fuerit præparatum, nec pleihora, cacochymia aut nimia virium dejectione adsit, quæ id prohibeat. Bis autem in die, mane & hora quarta vespertina, infellus fieri potest per horæ dimidium in aquam puram fluviatilem, vel, quod melius est, in Lauchstadiensem, quo peracto in lectum paulisper calefactum de recipere & aliquot intus theiformis vascula bibere juvabit. Et mirum profecto est, quomodo non modo totum corpus inde roboretur, sed & transpiratione interitum ad sudorem usque aucta, optime humorum a parte affecta fiat derivatio.

§. VIII.

Indicatio-  
stiones  
curatio-  
nis gon-  
orrhœæ  
virulæ.

Quod ad gonorrhœæ virulentæ medendi methodum attinet, hæc ipsa quidem in principio, si rite instituat, non adeo difficilis est. Quodsi vero malum, uti sæpissime evenit, ab empiricis chirurgis perversa methodo per adstringentia tractatum, curandum nobis traditur, magno labore multoque negotio opus est, ita prorsus, ut lumen universalem, quam calem fluxum radicibus extirpare facilius sit. Genuina autem gravem hunc adfectum sanandi ratio, me judicæ, ipso versatur, ut primo omnium foeculentum in genitalia virus venereum, quod partim acris causticæ, partim putredinose indolis est, celer-

rime e corpore expellatur. Dein, quando jam a virulenta materia relaxatæ, erosæ vel ulceratæ fuerint, semini tam conferendo quam excernendo dicatæ partes, mundificentur, consolidentur & roborentur, adeoque liberior humorum adfluxus præpediatur.

§. IX.

Quum itaque primum & præcipuum medentis negotium eo dirigi debeat, ut qua fieri potest, celeritate veneni intus suscepti expulsionem corpus ab effectibus perniciosis præservetur, consultum omnino arbitror, mox primis a suspecto & contagioso coitu diebus alexipharmacum cum sudorifero regimine exhibere, quo scopo commendari meretur essentia ex spiritus Cornu C. succin: & essent. bezoardicæ æquali portione constata, quæ singulis diebus mane ad sexaginta guttulas cum infuso scordii, scabiosæ & galegæ potest sumi, expectando postea per horam in lecto sudorem. Neque miorem pollicetur fructum pulvis diaphoreticus ita componendus, recipe pulveris bezoard: Anglicani vel nostrî drachmas duas, bezoard: mineral. regul. animonii medicinalis ana drachmam dimidiam, nitri grana XV. camphoræ grana IV. M. F. pulvis div: in VI. doses, quarum una circa somni tempus per tres quatuorve dies capiat. Exterior vero ad discutendum insidens genitalibus virus commendare soleo aquam d' arquebuse cum essentia succini & spiritu vini camphorato vigoratam in qua liquent maceratum tepide membro, regioni pubis ac perinæ, etiam sub ipsa diaphoresi potest applicari.

§. X.

Quodsi vero jam altius venenum radices egerit, sequæ intimius insinuan- <sup>Carotia</sup> nuando involuntarium seminis fluxum cum ardore, dolore & exolceratione effecerit, præcipuum esse debet labor, ut ejiciatur, corpusque per appropriata & iam materiz virulentæ correctioni, quam exspirationis di-

T a tata

cata remedia ab impuris sordibus liberetur. Atque horum remediorum censum recte subeunt, purgantia, quorum primum ingrediens esse debet mercurius dulcis, qui peculiari & specifica sua, qua pollet, virtute in acrimonia ulcerosa caustica temperanda, evacuanda & viscositate resolvenda, reliquis omnibus palmam reddit dubiam. Optime autem cum extracto rhabarbari, & in subjectis ferrosioribus cum extracto panchymagogi Crolii aequali portione remisceri atque in pilularem formam cum balsamo de Copaiva vel Peroviano potest redigi, dando pro dosi alternis diebus scrupulum unum vel drachmam dimidiam, donec ardor imminuatur, materiq; profluentis subflavus & viridescens color remittat. Eodem fine eximiam merentur laudem, quæ sequuntur pilulæ: recipe gummi ammoniaci depurati, sagapeni, extracti hellebori nigri, trochisc. albandal, mercurii dulcis, resinæ ligni quajaci, balsami de Copaiva, singulorum drachmam unam M. F. L. a. pilulæ ex scrupulo uno no. XX. quæ per tres dies mane, vel circa noctem possunt deglutiri. Tum per binos dies, maxime in subjectis phlegmaticis alexipharmaca superius memorata, ea, qua diximus, methodo exhibere, postea rursus per triduum pilulas adsumere & sudorem movere, idque ærtia vice repetere juvabit.

## §. XI.

Post sufficientem impurorum humorem a corpore evacuationem remedia subiungi debent, quæ blanda balsamica virtute exsiccant, consolidant, & nimis relaxatas seminales partes roborando, fluxum cohibent. Hæc inter iure suo ac merito referri merentur terebinthina cocta, mastix, succinum, myrrha, opoballamum, rhabarbarum, bolus armena, antimonium diaphoreticum, terra catechu, hæmatites, & antimonium martiale cachecticum, quæ invicem in formam pilularum secundum artis

præcepta possunt redigi. Instar autem omnium esse poterit hæc formula, qua ego hæcenus insigni cum fructu uti consuevi: recipe terebinthinae Ven. succini, masticis, extracti rhabarbari, cascariill, ana drachmas duas, balsami de Copaiva, resinæ ligni quajaci ana drachmam unam M. F. ex drachma diuidia pilulæ no. XX. quæ per decem pluresve dies circa noctem cum emulsione temperante sumendæ, superbibendo postero die mane insulum theiforme ex veronantha, melissa, millefolio & consolidâ saracenica conflatum, vel etiam decoctum, cujus ingredientia sint radix chinæ, sarsaparill. glycyrrhizæ, cichorei & antimonium crudum in petia ligatum. Nec excludenda hoc loco venit mixtura, quæ ad fluxum seminalemodorandum & compescendum præflansissimæ est virtutis, & ita componitur: recipe tincturæ antimonii acris, essent. lign. quajaci, succini, ligni aloes ana unciam unam, tinctur. hæmarit. seu liquoris martialis, qui ex capite mortuo florum salis ammoniac. martialis paratur, drachmam unam M. F. essentia, quæ pari ratione, alvo prius sufficienter expurgata, bis in die ad XL. guttas sumi potest.

## §. XII.

Verum enim vero, nisi usum remediorum internorum externis quoque secundemus, incassum laborabimus. Hæc ipsa vero pro symptomatum ratione longe differunt. Ita ad dolorem & ardorem in genitalibus temperandum, vel etiam bubonem, qui sæpe jungitur, suppurandum, præclarissimus est cataplasmata, quæ ex speciebus demulcentibus & emollientibus, ut radice liliorum alborum, althææ, flor. chamomillæ, sambuci, verbasci, semine scœni græci, cymini, anethi, hyoscyami &c. ex lacte vel decocto avenacæ coctis possunt parari calideque crebrius imponi. Ad exulceratas urethræ partes mundificandas & relaxatas roborandas sum

Externi  
utrum  
n/ro.

Pro bal.  
juncta  
subed.  
Ariog?  
ita.

ma



max utilitatis sunt injectiones ex mercurio dulci drachmis duabus in infusi theiformis saturati libra dimidia ad horæ quadrantem decoquenda. Quod si vero magna est erosio, hac cum melle despumato, addito decocto myrrhæ ex aqua, ope siphonis injicitur utilissime.

§. XIII.

Ultimo loco multum quoque interest, ut medicus rectam & accomodatam vivendi rationem præscribat, atque agros inprimis a cibis aromatizatis, duris & nimis nutritivis, nec non a cerevisiæ & vini potu, vehementiori corporis exercitatione, animi adfectibus & mulierum consortio abstinere jubet; alioquin malum adhuc præsens non modo difficulter evellitur, verum etiam, si curationem jam receperit, ex facili repullulat. Inter cibos itaque jussula tenuiora cum endivia, acetosa, lactuca & cichoreo alterata, & pro potu ordinario decoctum glycyrrhizæ cum hordeo, vel serum lactis commendare jubeat. Ne claudæ sue carent emulsionibus ex amygdalis dulcibus, semini-  
bus IV. frigidis majoribus, & papavere albo cum decocto Cornu C. chylato confecta & pro potu assumpta, quibus commodissime adduntur nitrum purif. nec non pulveres leniter diaphoretici ex Cornu C. usso, antimonio diaphoretico sive cerussa antimonii parandi. Hac enim ratione acrimonia humorum temperatur, partiumque genitalium ardor & dolor, si urget, consopitur efficacissime.

C A U T E L E ET  
O B S E R V A T I O N E S  
C L I N I C E .

§. I.

IN gonorrhœa benigna maxime omnium acriora purgantia & illa, quæ mercurialia ingrediuntur, cauti-  
us sunt adhibenda, quod itidem valet de balsamicis fortioribus & diure-

ticiis; siquidem humores magis commovendo & ad partes genitales debiliatas appellendo, effluxum materiz augent. Multo vero magis hæc singula exulcent in subjectis sanguineis & cholericis, quibus longe gravior nocent. Haud aliter sentendam est de adstringentibus, quæ nunquam sine præmissa sufficienti humorum correctione in usum debent vocari, nisi mali moris gonorrhœam, maxime in his, quæ magna humorum impuritate scatent, proritare velimus.

§. II.

Venefectio & cura per medium, quæ potu victuque tenui & exsiccante absolvitur, in plethoricis pinguis & spongiosi habitus lauteque viventibus inter morbi initia locum inveniunt apertissimum, cum contra, si fluxus diuturnitate corpus debilitatum nimis fuerit, omitti prorsus debeant; siquidem vires magis exhaustio saepe cachexiam, tabem dorsalem cum hætica febre vel impotentiam virilem inducunt.

§. III.

In curanda gonorrhœa maligna attendere maxime medicus debet ipsam ægotantis constitutionem. Plurimum namque refert, num laborans complexionis sit cholerica & sanguinea aut phlegmatica, & an naturæ sit robustioris vel imbecillior ac teneræ. Neque minus probe inquirere oportet, qualis humorum sit conditio. Hæc enim prout differt, variat quoque ratione symptomatum adfectio. Ita si corpus offendit caeco-chymicum & ex improba victus ratione vel ali-  
gliscente morbo scabie, purpura scorbutica, vel adfectu hypochondriaco detentum: tunc utique deteriora curaturoque difficiliora pertimescenda sunt symptomata.

§. IV.

Si calidiores sensibilibusque indolis homines pernitalis hæc fluxio corripit, ab omnibus calidioribus, purgantibus, sudoriferis, diureticis decoctis lignorum, urguajæ, actio-

nibus, essentiis balsami Peruviani & opobalsami, maxime in principio fluxus, abstinere debemus. Novi enim praeposito, & sine convenienti corporis praeparatione instituto illorum usu, vitiosum humorem retentum, fluxumque suppressum; sed hoc hujus bubones excitatos, & non modo circa genitalia, sed in facie quoque pustulas ulcerosas pessimi moris subortas.

## §. V.

*Circa  
curatio-  
nem  
phleg-  
marie  
rem.*

Qui segniores & phlegmatici obtinent temperaturam, in his, praemissa sufficienti corporis expurgatione, roborantibus & leniter spiritibus gonorrhoeam incipientem perfecte curatam & hostile virus expulsum memini. Atque hoc sine nonnunquam per aquam vitæ in parviori sed saepius repetita dosi exhibui potiri licuit, qualis ita paratur: recipe herbarum menthae magipulos tres, terebinthinæ veteræ unciam unam, balsami Peruviani unciam dimidiam, destillentur cum vini Rhenani mensuris tribus. Dosis sit uncia una ad duas. Cui etiam commode subditur hæc formula: recipe aquæ rosar. spiritus vini rectificatissimus ana mensuram dimidiam, julepi rosarum uncias duas, balsami nostri vitæ guttas 50. M.

## §. VI.

*Circa  
adstrin-  
gentia.*

Quamdiu materia profluens foetida est & subviridis, nunquam danda sunt adstringentia; nam ubi intempestive & nimis cito fluxus istiusd suppressum, aut decocta lignorum validiora cum regimine sudorifero offeruntur, vena cum transit in feminis & lymphæ massam, unde symptomata sui venæ propria resultant. At vero ex nullo prope adstringentis facultatis remedio major redundat noxa, quam a saccharo saturni interne, ut empiricorum mos est, sinistre oblato. Vidi enim colicam convulsivam, appetitus prostrationem, alvique pertinacissimam obliationem inde inductam. Idem quoque valet de injectionibus adstringentibus, quæ, nisi fluxu im-

puro correcto, nunquam debent adhiberi.

## §. VII.

Inter medicamenta urinae fluxum promoventia pessime, ut arbitror, & quibusdam referuntur cantharides, parata ex iis essentia, siquidem vis urinariis admodum sunt infensæ, facileque perniciosas renum & vesicæ inflammationes cum micæ cruento, nisi convenientibus succurramus remediis, citre valent.

## §. VIII.

Venæsectiones in curatione gonorrhoeæ virulentæ raro exiguntur, & in sensibilibus, quibus facile materiam sordidam contingit suppressio, magis obstant, quam prosunt; attamen si corpus sanguine turget & juvenile est, ad mitiganda symptomata sine noxa concedi possunt.

## §. IX.

A variis subinde causis evenit, ut materia parvior ex pene effluat, & mox pustulæ in corpore hinc inde appareant. Tum vero loca affecta humectare, soty, balneis & cataplasmatibus relaxare atque purgantibus materiam deorsum ducere consultum erit. Juvant quoque eodem sine injectionibus lastis pulvis, & decocti avenæ cum oleo amygdalarum dulc. remixti a quibus ego fluxum saepius iterumque revocatum scio.

## §. X.

Mirum certe est, quod gonorrhoea per salivationem tolli non possit; crebrior enim usus & experientia satis docet, pessima venerica ulcera, quæ in universo corpore radicanter, hac curatione fuisse sanata, sed gonorrhoeam remansisse. Et profecto molestissima hæc fluxio, si male tractata & inveterata fuerit, rarius ad frugem reducit, sed per totam sæpe vitam laborantes comitatur. Latitant quippe nonnunquam in glandulis proflant tam majoribus, quam minoribus scirrhusa & fistulosa ulcera, quæ radicitus tollere, difficillimum est. Nihil tamen minus aliquoties exoptatissimum

*Gonorrhoea inveterata raro per salivationem curatur sed saepe per Mercurium.*

simum

fimum reperi auxilium in usu thermarum Carolinarum interno, quæ licet alias provide in gonorrhœa recenti sint usurpandæ, eo quod debiles partes magis relaxando, majorem materię adfluxum efficiunt; in inveteratamen malo, dum insigni vasorum obstructions tollendi, diuque latentes, incarcerationes & duros tumores resolvendi efficacia polleat, cum fructu dari possent. Sed ut minori quantitate, adhibitis simul in & post curam roborantibus balsamicis internis & injectionibus, bibantur suadeo.

§. XI.

Quando urethra, cujus tunica media valde glandulosa, non modo exulcerata, sed & nimis relaxata est, & longior substantiæ quidpiam adhæret, ex qua postea procedunt urinam valde remorantes caruncule, solam essentialiam opobalsami cum spiritu vini extractam, item balsamum nostrum vitæ cum tribus partibus l' eau d'arquebuse dilutum aliquoties de die fausto cum successu injiciendum curavi. Etenim tali injectione sat vellemus in membro excitatur ardor, qui tamen sensim paulatimque remittit. Speciatim vero de carunculis, quæ nonnisi species verrucarum sent, remedium arbitror, quod pulvere quodam erodente, aut ferro candente optime tollantur. Sed hæc operatio peritum postulat manum, ne forte calignito instrumento vicina pars lædatur.

§. XII.

Ad mundificandam glandis & penis erit sequens epithema præstantis erit efficacie: recipe aquæ calcis vivæ cum aqua rosar. dilutæ uncias duas, l' eau d'arquebuse unciam unam, sacchari saturni grana X. mercurii præcipitat. albi grana VIII. M. Contra ubi simul consolidandi intentio est, balsamum sulphuris antimoniatum & terebinthinatum cum unguento digestivo remixtum meretur commendarı.

§. XIII.

Bubones, si junguntur, quantum fieri potest emplastro emolliente gricollæ cum oleo hyoscyami & saponem malaxato sunt maturandi. Cui scopo etiam emplastrum Barbette saponatum & cum pauxillo oleo hyoscyami subactum egregie infervit.

§. XIV.

Quando scrotum cum testiculis in magnum tumorem agitur, succurrendum est fomentis calidis, siye admissione vaporum ex decoctione herbarum & florum emollientium cum lacte facta abeuntium; qua methodo tempestive adhibita tumor mollior, ut dein emplastra resolyentia majori cum emolumento applicari possint.

ENARRATIONES MORBORUM.

OBSERVATIO I.

F Lagitavit haud ita pridem opem meam vir triginta annorum temperamenti sanguineo-cholericı, qui cum per crebras masturbaciones magnam sibi contraxisset valorum seminalium atoniam, gonorrhœam incidit benignam, per quatuor annos sub alvinarum sordium excretionem, lotique emissionem moleste instantem. Ad sistendum hunc fluxum aliquoties sumit oleum terebinthinæ, unde fluxus quidem cessabat; tantum autem aberat, ut pristinum genitalibus robur, & stimulus ad eorum restitutionem, ut potius hic penitus supprimebatur. Nec ullis per quadriennium remediis poterat revocari, usque tandem naturæ vigore cibisque euepsit pollutiones nocturnæ cum leni quodam stimulo & penis erectione redirent. Sed non multo post pristina ludebatur scena, & materia feminis analoga sub alvi & vesicæ exoneratione rursus e pene profluebat, idque nunc per integros quinque annos. Ego igitur consultus primo omnium suasi, ut æger, seposita omni cerevisia,

crassioribus, quos in deliciis habebat, seculo abstinere, iusculisque utatur tenuioribus cum radice ciehozei, petroselini, asparagi, graminis &c. decoctis; ad meliorem autem digestionem promovendam obtuli elixirum nostrum viscerale inter cibos adsumendum. Dein ad primas vias a cruditatibus & sordibus repurgandas, statimque discutiendos clysteres emollientes & carminativos crebrius adinjci, & pilulas balsamicas ad Becheri mentem confectas, tertia septimana circa decubitum adsumere jussi. Post harum usum sequenti die mane prescripti pulverem ex lapidibus canthor. nitro depurato, tartaro vitriolato, solutione oculorum cancri componendum, desuper bibendo vascula quoddam insuli theiformis ex melissa turcica & citri corticibus conflati. Potus loco ordinavi fontem Selteranum cum tertia parte vini Rhenani remixtum, & circa instans mensium tempus pillulas balsamicas reiterare imperavi. Exteriori succurrendum duxi suffumigiis, & sacculis roborantibus inguinibus applicandis, nec non venesectione ter in anno celebranda.

## EPICRISIS.

Sistit hic casus fluxorem album cum affectu hypochondriaca — hysterico complicatum, de quo copiosus fluxus in abdomine praevenit; pertinaax alvi obstructio, ciborum fastidium; extremorum refrigeratio, totius corporis languor, crebriores capitis dolores cum horrore febriili abunde satis testantur. Originem suam singula haec mala mutare videntur a mensium fluxu valde inordinato, & quoad colorem vitioso, cui in ordinem redigendo omnis impendendus est medentis labor. Docemur praeterea ex hac morbi historia, quantum interius, ut medicus conveniens vitae victusque regimen praescribat, ita prorsus, ut hoc neglecto, frustranea

sit omnis reliqua vel pretiosissima medicina.

Plura hinc inde legantur in Consult. & responsis nostris medicinal.

## CAPUT XVII.

## DE GONORRHOEA BENIGNA ET VIRULENTA.

## THESES PATHOLOGICAE.

**I**nter morbos ex atonia partium solidarum oriundos, referri adhuc jure meritoque debet gonorrhoea, quae nihil aliud est, nisi involuntarium seminis & liquoris semini analogi ex genitalibus stillicidium, a nimia vasorum semen adservantium partiumque adjacentium glandularum laxitate dependens.

## §. II.

Differt gonorrhoea a pollutione, in qua per intervalla vel breviora vel longiora modo seminis puri, modo cum sero chyloso mixti notabilis, ad unam vel duas drachmas accedens quantitas noctu cum insomniis venereis & volupate, interdum ex pulchritudine seminarum adpectu, vel post equitationem, ob nimiam vesicularum seminarum vel glandularum prostaticarum laxitatem lenemque irritationem simul & senecturatur.

## §. III.

Gonorrhoea est vel benigna, vel minus talis. Haec dicitur, si cum ardore, colore vario & exulceratione liquidum guttatum prodit, & plerumque in cacochymia, scorbutis, vel etiam calculosis cum emissionem urinae dolorifica, ob acrimoniam, est conjunctum. Illa vero, seu benigna adesse dicitur, quando sine dolore, ardore, aut excoriatione liquidi aequaliter tincti & albicantis sit fluxus, atque haec species cum bene albo

Gonorrhoea diffinitio.

Differt illa a pollutione.

Species illa vel benigna vel minus talis.

albo mulierum, magnam alit convenientiam, utpote qui itidem nihil aliud est, quam materiz chylosa, ope glandulosa substantia uteri sequatur excretio. Quam in rem legi meretur MASSARIUS, qui lib. IV. p. 267. ego, inquit, sentio, medicus frequenter hallucinati, qui opinantur agrotos proflusione seminis laborare, cum magis aliorum excrementorum fluxione laborent. Siquidem videmus plurimis agrotis hoc profluvium multos annos perdurare, ex quo, profluente semine, necessarium foret, illos ad exremam maciem & corporis consumptionem deduci, sicut illis solet contingere, qui immoderato coitu utuntur, quod tamen non videmus illis evenire.

§. IV.

At vero, non modo ea gonorrhoeae species, de qua Massaria sermo est, diutius protrahitur, sed & de reliquis plura notatu digna existant exempla eorum, qui per multos annos utroque genitalium fluore laborarunt. Vid. BARTHOLINUS historia XXXVI. centur. II. ubi de viro Bergonensi & Anat. lib. I. cap. XXIII. p. 234. de Bavino mentionem facit, quorum ille per decem, hic per triginta annos gonorrhoeam sustinuerat, ille virulentam, hic incertam, an benignam vel malignam. Manserat uterque cetera sanus, nisi quod prior ossibus vix haberet.

§. V.

Datur etiam gonorrhoea virulenta, quae a contagio venereo suos repetit natales, eosque potissimum adficit, qui turpissima libidine intensi scorta sequuntur. Atque talis fluxus virulenta varique coloris & consistentiae materia, nec non summa virium imbecillitate se manifestat. Junguntur quoque, nisi cito occurratur, sat magni testium & glandularum inguinalium tumores, ulcera glandis & preputii inflammatoria, & membri dolorifica incurvatio; & urina mingitur multis resecta filamentis, quae quasi

vermiculos repraesentant. Si ingravescit malum vel inveteraverit, vel minus rite tractatum fuerit, miasma abire per vasa lymphatica ad sanguinem & fluidum tenuissimum sanguinis inquinat; unde venereis luis prodeunt indicia, qualia sunt lancinantes capitis artuumque dolores noctu potissimum exacerbati, faucium ulcera, ossium nasi exesio, pustulae in glandulis canceri naturam emulantes, macies universi corporis cum faciei pallore, oculis concavis, tophis quoque & hujus generis alijs.

§. VI.

Hec sunt generalia, quae malignum hunc fluxum comitantur & excipiunt symptomata, accuratorem tamen ejus historiam sequentibus tradere juvabit. Statim aliquot horas post tam infelicem coitum fluxus leviter incipit, & dein tertio, quarto & sequentibus diebus ingravescit. Glans semine tenuiori incipit madere, postea alba quadam obducitur colluvie, & maculae in indusio reperiuntur. Inter initia color materiz profluentis est albicans, qui, si fluxus paulatim largior emanat, in flavum, & demum in viridem muratur. Quando urina emittitur, primo, in glande tum in radice urethrae, demum per totum canalem dolor percipitur ardens & fere intolerabilis. Interdum continuus urget mingendi conatus, interdum mictio valde impeditur, & pone supprimitur, sine dubio ob molestissimam penis tensionem, quae nocte ut plurimum cum magno cruciatu & duritie ingravescit, & tanta est, ut penis exinde incurvetur. Praeterea insignis ad venerem est stimulus, ut vix a coitu sibi laborantes temperare possint, & ulcera quoque, ut supra dictum est, non raro in glande & preputio latitant seditima.

§. VII.

Quod sedem adfectam attinet, audiamus, quid de ea sentiant, doctores. GRAEVIUS in tractatu de virorum organis generationi dicendis, ipsam

Gonorrhoea virulenta sequitur.

Hic de virulentia de se.

Idem de gonorrhoea virulenta.

in prostaticis collocandam existimat. **VESALIUS** lib. V. anat. cap. XXI. de suspenso quodam & Baravii dissecto, qui ante suspendium involuntario feminis fluxu laboraverat, refert, habuisse eum omnes meatus; atque eos potissimum, qui ex testibus in deferentis semen valis revolutiones pertingunt, apertos ac valde laxos, ideoque hos ipsos accusandos putat. Nos tamen sat gravibus inducti rationibus statuimus, veram sedem in urethra tunica, copiosis glandulis, a **COUPERO** & **LITTRIO** detectis obstrata, esse reponendam; licet non negandum sit, si profundius malum, ut in gonorrhœa virulenta, proserpit, prostaticas simul & vesiculas seminales contagio adfici. Id quod abunde satis testantur anatomicæ sectiones eorum, qui per vitam suam tali fluxu diutius laborarunt. In his enim prostaticas callosas, scirrhasas & exulceratas nonnunquam fuisse observatas abunde constat.

## §. VIII.

*Et m. item.* In feminis infectis ulcuscula proveniunt in glandoso corpore, sive in eo loco, ubi lacunæ circum & in meatus urinarii exitu collocantur, erumpunt. Testis est **GRÆVIUS** in tractatu de mulierum organis generationi dicatis, qui in cadavere mulieris hoc vitio inquinatæ dissecto, corpus glandosum, sive prostaticas urethra circumpositas, utero ejusque vagina innoxias, male affectas ostendit. Et hinc patet ratio, quare feminæ, ut multa testantur exempla, sæcunt in utero gerere possint infentem & tali labe prorsus non infectum. Aliter tamen sentit **PALMARIUS**, qui in libro de lue venerea cap. IX. vesicæ collum adducit, ideo, quod ex ulcere cervicis vesicæ, a gonorrhœa curata residuo per totam vitam purulenta stillaverit materia, parum ab ea dissimilis, quæ in diuturna gonorrhœa a prostaticis ex urethra ferri solet. Cæterum notandum, in mulieribus hoc malum non ita sævire ac in viris, liquidum semi-

nas infectas diu vivere sinit, cum viros contra, nisi curetur, ad lethum ducat.

## §. IX.

Causa gonorrhœæ virulentæ utique *Conf. gonorrhœa ut. valent & ejus sympt. malum.* est miasma, ex impuro coitu cum femina vel gonorrhœa maligna, vel lue venerea infecta ad viri genitalia, & postea per poros ad lympham vel liquorem feminalem translatum, cujus crassi mixtionemque naturalem plane destruit & dissolvit, partem causticam ac erodentem, partem purredinosam indolem inducendo, unde dolores, ardores, tumores, inflammationes & exulcerationes genitalium suam mutantur originem. Nam ita fere procedit hujus miasmatis multiplicatio, ut ab initio tantummodo glans inficiatur, dum contagium per poros apertos in eorum se infinuat, dein, nisi accommodata succurretur medicina, ad urethrae glandulas, tum ad prostaticas poros, deum ad ipsas vesiculas proserpit seminales. Si lymphæ infecta per lymphatica vasa, quæ **COUPERUS** a præputio ad inguina abeuntia demonstravit, glandulis communicatur inguinalibus, tum bubo sit venereus, sive tumor durus lentus sensimque indolens. Si vero gonorrhœa profundior est, & circa initium urethrae, ubi seminales vesiculæ semen effundere solent, inflammatio oritur, tum hæc vascula a tumore comprimuntur, & semen ad has vesiculas deduci nequit; unde testium tumor.

## §. X.

In causis gonorrhœæ benignæ adsi- *Conf. gonorrhœa benigna.* gnanda, tum ipsius genitalis liquidi, tum vasorum seminalium toni, qui plerumque defectus est, habenda est ratio. Et primo quidem, quod semen attinet, attentiori observatione cognitum perspectumque habemus, vel ob nimiam ejus abundantiam in subjectis plenis & in cohabitatu laute viventibus, vel ob ejus acrimoniam in subjectis cacochymicis, scorbuticis & arthriticis hunc fluxum non raro

con-

contingere. Deinceps, si ad labefactum organorum feminalium tonum respicimus, hanc utique a nemine in dubium vocari arbitror; siquidem ea omnia, quæ insignem hæc vasa debilitandi potentiam obtinent momenta, quorum potissima sunt nimix seminis, sive per pollutiones, sive per crediores coitus, vel fœdam manuſuprationem & gonorrhœam virulentam prægreſſam profuſiones, ad gonorrhœam benignam etiam valde diſponunt, idque eo magis in hominibus, qui temperamenti ſunt phlegmatici & natura debiliores.

§. XI.

Progrediendum nunc erit ad ſuppendendam gonorrhœæ tam virulentæ quam benignæ prognofin. Utraque, ſi convenientibus tractatur remediis, brevi tollitur; cum contra, ſi invaleſcis & gravioribus ſtipetur ſymptomatibus, difficilius ſanetur, & non modo viros reddat ſteriles, ſed & progreſſu temporis ad cachexiam & hædicam tabem laborantes ducat. Speciatim vero de virulenta ita ſcire licet: quo major eſt infectionis gradus, eo gravior quoque iſta eſt & rebellior; raro tamen lœm veneream poſt ſe trahit, niſi incongrue per medicamenta ſudorifera & adſtringentia vel externe vel interne adhibita fluxus cohibeatur. Hoc enim ſuppreſſo mox bubones, ſcroci & teſticulorum tumores, caruncula urethram obſidentes, & alia peſſima ſymptomata cum ipſa venerea lœe ſuperveniunt. Ipſe fluxus quo facilius procedit, eo mitiora ſunt ſymptomata: peſſimum contra eſt, ſi parce nimis exſtillat, & urina cum ſummo ſœtore mingitur flavescens & viridis. Denique inter cetera mitigati & in melius converſi mali ſigna referimus, ſi dolorifica membri erecti contrictio & exquisitiſſimus in urethra ſub miſſione ſedoris ſenſus minuitur, depreſſus antea vigor redire incipit, & ipſa facies antea pallida vividior redditur. Curatæ vero gonorrhœæ indicium eſt, ſi li-

quoris limpidi ac tenuis, albumen ſui referentis una alterave guttula compreſſione penis evocatur. Gonorrhœa benigna ſicut plerumque diutius protrahitur, medentique multum faſceſcit negotiũ; ita eo magis medicinz reſiſtit, ſi, ut ſæpiſſime evenire ſolet, gonorrhœam virulentam excipit. Diſſert tamen perinde ac homines diſſerunt, quos invadit, ita e. g. eos longe diutius vexat, qui temperamento ſunt phlegmatico, & catarrhalibus deſluſionibus, alvique fluxibus in pueritia fuerunt obnoxii. Hi enim dum natura fibras obtinent laxiores, iudicatu faciliſſimum eſt, ſi qua parte atonia laborant, hanc longè eſſe graviorem, quam quidem in iſis, qui fibris robuſtioribus ſunt præditi.

C U R A T I O.

§. I.

Q Uum gonorrhœa tam benigna quam virulenta ratione cauſarum valde inter ſe diſſerant differentem quoque poſtulant medendi methodum. Utramque igitur ſeorſim expendamus, ordiendo a curatione benignæ. Hanc autem admodum eſſe arduam & laborioſam, in prognofi jam oſtendimus, neque aliam huius difficultatis cauſam agnoſcimus, quam quod in hoc morbo ad partes adſectas nimis debilitatas & a tono ſuo deſectas, maxime in ſubjectis magna pravorum ſuccorum coluvie ſcatentibus & dyscrasía ſcorbutica infectis, non ſecus quam ad fonticulum ex univerſo corpore humorum impurorum fiat adfluxus. Accedit adhuc, quod generationi inſervientes partes, quæ in noſtro adſectu morboſe adſiguntur, ex meris ſere nervis nervoliſque tunicis ſint conſtata, ad quas remediorum energia experientia teſte, penetras difficillime.

T §. II.

## §. II.

*Indica-  
tiones  
curatio-  
nis.* Absolvitur autem pertinacis haemorrhoeae curatio mali his fere indicationibus. Primo opus est, ut convenientibus laxantibus copia immitti seri, si in corpore abundat, evacuetur, & a parte affecta derivetur. Dein ut partes nimis relaxatae & flaccidae accommodatis tum internis quam externis roborantibus medicamentis confortentur.

## §. III.

*Primam  
indica-  
tionem  
explens  
laxantia.* Primae indicationi satisfaciunt, quae per epicasin operantur laxantia: quo nomine commendari merentur pilulae balsamicae Becheri, & ad ejus mentem confecta Stahlii & nostrae, quae non modo alvum ducendi, sed & egregie roborandi possident efficaciam. Praeterea utilissimum saepe apprehendi infusum laxans, ex sequentibus speciebus compositum. Recipe rhabbarbari Alex. unciam unam, radicis vincetoxici, pimpinellae, rasurae ligni sassafras ana unciam dimidiam, sol. fennae, agarici trochiscati, fibrarum hellebori nigri singulorum drachmas tres, cardamomi, cinnamonoi, ana drachmas duas, passul. minor, uncias tres, tartari crudi unciam dimidiam. M. C. C. D. S. Species, cum duabus vini Rhenani mensuris infundenda. Dosis sit quarta pars mensurae.

## §. IV.

*Quaerit  
indica-  
tionem  
explens  
siccantia.* Huic infuso per octo dierum spatium mane adsumto, ad explendam alteram indicationem, subjungendus est pulvis hic utilissimus: recipe ossis sepiae unciam unam, corall. rubr. succini, spec. de hyacintho, cort. chaccarill. ana drachmas duas M. F. pulvis, cujus dosis ad drachmam unam mane & circa noctem cum decocto cremoris hordei amygdalino sumi potest. Eodem quoque tempore exteriori regioni pubis & perineo, maxime per noctem applicandum suadeo sequens epithema: recipe herbae melissae, menthae, basilicor. rosar. rubr. balausti. ana manip.

num, cort. granat. caryophyllorum, nucistae, cardamomi, mastichis ana unciam dimidiam. M. F. species, quae sacculo inclusa in vino Gallico rubro coquenda.

## §. V.

Cum his invicem conjungendum dieta est accuratum regimen dieteticum, quod ita debet institui. Primo omnium abstineandum est ab omnibus cibis valde piperatis, aromaticis, salitis, leguminosis & inflantibus, nec non ab immoderato vini & cerevisiae potu. Evitetur quoque frequentior cum feminino sexu conversatio, evitetur veneris exercitium & fortior corporis motus, praesertim qui curru sit vel equo. E contrario vero inter cibos commendanda sunt julecula avenacea cum vitello ovi, amygdalis & pistaceis praeparata & in emulsionem redacta, quorum magna est ad acrimoniam lymphae saepe demulcendam efficacia. Convenit quoque pro potu adsumere decoctum ex radice scorzonerae, chinæ, santalo rubro, rasur. lign. sassafras, glycyrrhiza & passulis conflatum.

## §. VI.

Quodsi haec minus sufficiunt, ego balnea: ad malum, praesertim inveteratum tollendum, post horum usum cum fructu hactenus commendare solitus sum balnea ex speciebus nervinis & roborantibus composita, quales sunt abrotanum, majorana, mentha, hyssopus, origanum, persillum, rosmarinum & hujusmodi alia. Post balneum eger lecto se committat lenem expectando sudorem. Nec sine auspicio successu aliquoties usus sum fontibus Lauchstadiensibus, balnei loco per aliquot septimanas adhibitis, utpote quae propter tenuissimum, quem in sinu fovent, martis crocum insignem relaxatas partes roborandi possident virtutem.

## §. VII.

Eadem curandi methodus locum invenit aptissimum in largioribus & fortius valde debilitantibus pollutionibus cohiben-



hibendis, modo hæc observetur cautio, quod purgantia rarios offerantur, siquidem, si alvum molientibus opus est, sola rhabbarbarina & passulata sufficiunt. Præter allata vero remedia in tali casu externe regioni lumbari, seu potius spinæ dorsali circa lumbos adplicandum suadeo sequens emplastrum: recipe emplastri spermatis ranar. uncias duas, sacchari saturni, aluminis usti ana drachmas duas, camphoræ, olei lign. Rhodii ana drachmam dimidiam. M. D. Porro quoque singularem plane effectum in pertinaci hoc morbo annotavi a convenienti balnearum frigidorum usu, modo corpus probe prius fuerit præparatum, nec plethora, cacochymia aut nimia virium dejectio adsit, quæ id prohibeat. Bis autem in die, mane & hora quarta vespertina, infusus fieri potest per horæ dimidium in aquam puram fluviatilem, vel, quod melius est, in Lauchstadiensem, quo peracto in lectum paulisper calefactum se recipere & aliquot intus theiformis vascula bibere juvabit. Et mirum profecto est, quomodo non modo totum corpus inde roboretur, sed & transpiratione internum ad sudorem usque aucta, optime humorum a parte affecta fiat derivatio.

### §. VIII.

Indistincte  
narratio  
de gonorrhœa  
virulenta.

Quod ad gonorrhœæ virulentæ medendi methodum attinet, hæc ipsa quidem in principio, si rite instituantur, non adeo difficilis est. Quodsi vero malum, uti sæpissime evenit, ab empiricis chirurgis perversa methodo per adstringentia tractatum, curandum nobis traditur, magno labore multoque negotio opus est, ita prorsus, ut læm universalem, quam saltem fluxum radicatus exstirpare facilius sit. Genuina autem gravem hunc adfectum sanandi ratio, me iudicæ, in eo versatur, ut primo omnium susceptum in genitalia virus venereum, quod partim acris causticæ, partim putredinosæ indolis est, celer-

rime e corpore expellatur. Dein, quando jam a virulenta materia relaxatæ, erosæ vel ulceratæ fuerint, semini tam conservando quam excernendo dicatæ partes, mundificentur, consolidentur & roborentur, adeoque liberior humorum adfluxus præparetur.

### §. IX.

Quum itaque primum & præcipuum medentis negotium eo dirigi debeat, ut qua fieri potest, celeritate veneni intus suscepti expulsionem corpus ab effectibus perniciosissimis præservetur, consultum omnino arbitror, mox primis a suspecto & contagioso coitu diebus alexipharmacum cum sudorifero regimine exhibere, quo scopo commendari meretur essentia ex spiritus Cornu C. succin: & essent. bezoardicæ æquali portione conflata, quæ singulis diebus mane ad sexaginta guttulas cum infuso scordii, scabiosæ & galegæ potest sumi, expectando postea per horam in lecto sudorem. Neque minorem pollicetur fructum pulvis diaphoreticus ita componendus, recipe pulveris bezoard: Anglicani vel nostrî drachmas duas, bezoard: mineral. regul. antimonii medicinalis ana drachmam dimidiam, nitri grana XV. camphoræ grana IV. M. F. pulvis div: in VI. doses, quarum una circa somni tempus per tres quatuorve dies capiatur. Exteriori vero ad discutendum insidens genitalibus virus commendare soleo aquam d'arquebuse cum essentia succini & spiritu vini camphorato vigoratam in qua lixteum maceratum tepide membro, regioni pubis ac perinæ, etiam sub ipsa diaphoresi potest applicari.

### §. X.

Quodsi vero jam altius venenum radices egerit, sequè intimius insinuando involuntarium seminis fluxum cum ardore, dolore & exaltatione effecerit, præcipuus esse debet labor, ut ejiciatur, corpusque per appropriatam & tam materiam virulentæ correctioni, quæ exspirationis di-

Corallæ  
gonorrhœæ  
per purgationem  
curantur.

cata remedia ab impuris sordibus liberetur. Atque horum remediorum censum recte subeunt, purgantia, quorum primum ingrediens esse debet mercurius dulcis, qui peculiari & specifica sua, qua pollet, virtute in acrimonia ulcerosa caustica temperanda, evacuanda & viscositate resolvenda, reliquis omnibus palmam reddit dubiam. Optime autem cum extracto rhabbarbari, & in subjectis ferrosioribus cum extracto panchymagogi Crollii aequali portione remisceri atque in pilularem formam cum balsamo de Copaiva vel Peruviano potest redigi, dando pro dosi alternis diebus scrupulum unum vel drachmam dimidiam, donec ardor imminuatur, materiaeque profluentis subflavus & viridescens color remittat. Eodem fine eximiam merentur laudem, quae sequuntur pilulae: recipe gummi ammoniaci depurati, sagapeni, extracti hellebori nigri, trochisci alhandal, mercurii dulcis, resinae ligni quajaci, balsami de Copaiva, singulorum drachmam unam M. F. l. a. pilulae ex scrupulo uno no. XX. quae per tres dies mane, vel circa noctem possunt deglutiri. Tum per binos dies, maxime in subjectis phlegmaticis alexipharmaca superius memorata, ea, qua diximus, methodo exhibere, pollea rursus per triduum pilulas adsumere & sudorem movere, idque aertia vice repetere juvabit.

## §. XI.

Post sufficientem impurorum humorem a corpore evacuationem remedia subjungi debent, quae blanda balsamica virtute exsiccant, consolidant, & nimis relaxatas feminales partes roborando, fluxum cohibent. Hae inter jure suo ac merito referri merentur terebinthina cocta, mastix, succinum, myrrha, opoballamum, rhabbarbarum, bolus armena, antimonium diaphoreticum, terra catechu, haematites, & antimonium martiale cachecticum, quae invicem in formam pilularum secundum artis

praecepta possunt redigi. Instar autem omnium esse poterit haec formula, qua ego hactenus insigni eum fructu uti consuevi: recipe terebinthinae Ven. succini, masticis, extracti rhabbarbari, cascariilli, ana drachmas duas, balsami de Copaiva, resinae ligni quajaci ana drachmam unam M. F. ex drachma dimidia pilulae no. XX. quae per decem pluresve dies circa noctem cum emulsione temperante sumenda, superbibendo postero die mane infusum theiforme ex veronantha, melissa, millefolio & consolidida saracenica consilatum, vel etiam decoctum, cujus ingredientia sint radix chinæ, sarsaparill, glycyrrhizæ, cichosei & antimonium crudum in petia ligatum. Nec excludenda hoc loco venit mixtura, quae ad fluxum seminalemoderandum & compescendum praestantissima est virtutis, & ita componitur: recipe tincturae antimonii acris, essent. ligni quajaci, succini, ligni aloes ana unciam unam, tincturae haematit. seu liquoris martialis, qui ex capite mortuo florum salis ammoniac. martialium paratur, drachmam unam M. F. essentia, quae pariratione, alvo prius sufficienter expurgata, bis in die ad XL. guttas sumi potest.

## §. XII.

Verum enim vero, nisi alium remedium internum quocumque secundum, incassum laborabimus. Hae ipsa vero pro symptomatum ratione longe differunt. Ita ad dolorem & ardorem in genitalibus temperandum, vel etiam bubonem, qui saepe jungitur, suppurandum, praclarus usus sunt cataplasmata, quae ex speciebus demulcentibus & emollientibus, ut radice liliorum alborum, althææ, flor. chamomillæ, sambuci, verbasci, semine scæni græci, cymini, anethi, hyoscyami &c. ex lacte vel decocto avenaceo coctis possunt parari calideque crebrius imponi. Ad exulceratas urethrae partes mundificandas & relaxatas roborandas sum-

Externi  
verum  
usum.

max utilitatis sunt injectiones ex mercurii dulcis drachmis duabus in infusi theiformis saturati libra dimidia ad horæ quadrantem decoquenda. Quod si vero magna est erosio, hac cum melis depumato, addito decocto myrrhae ex aqua, ope siphonis injicitur utilissime.

## §. XIII.

Ultimo loco multum quoque interest, ut medicus rectam & accurrantem datam vivendi rationem prescribat, atque agros inprimis a cibis aromatizatis, duris & nimis nutrientibus, nec non a cerevisiæ & vini potu, vehementiori corporis exercitatione, animi adfectibus & mulierum consortio abstinere jubeat; alioquin malum adhuc praesens non modò difficulter evellitur, verum etiam, si curationem jam receperit, ex facili repullulat. Inter cibos itaque julsula tenuiora cum endivia, acetosa, lactuca & cichorea alterata, & pro potu ordinatio decoctum glycyrrhizæ cum hordeo, vel serum lactis commendare juvabit. Nec laude sue carent emulsionem ex amygdalis dulcibus, seminis IV. frigidis majoribus, & papavere albo cum decocto Cornu C. diluto confecta & pro potu assumpta, quibus commodissime adduntur nitrum purif. nec non pulveres leniter diaphoretici ex Cornu C. usso, antimonio diaphoretico sive cerussa antimonii parandis. Hac enim ratione acrimonia humorum temperatur, partiumque genitalium ardor & dolor, si urget, consopitur efficacissime.

## CAUTIONES ET OBSERVATIONES CLINICÆ.

## §. II.

IN gonorrhoea benigna maxime omnium acriora purgantia & illa, quæ mercurialia ingrediuntur, cavetur sunt adhibenda, quod tamen valet de balsamicis fortioribus & diure-

tici; siquidem humores magis commovendo & ad partes genitales debiliatas appellendo, effluxum materiam augent. Multo vero magis hæc singula exulent in subjectis sanguineis & cholericis, quibus longe gravius nocent. Haud aliter sentiendum est de adstringentibus, quæ nunquam sine præmissa sufficienti humorum correctione in usum debent vocari, nisi mali moris gonorrhoeam, maxime in iis, qui magna humorum impuritæ sciant, prorsus velimus.

## §. II.

Venefectio & cura per mediam, quæ potu victuque tenui & exsiccante absolvitur, in plethoricis pinguis & spongiali habitus lauteque viventibus inter morbi initia locum inveniunt apertissimum, cum contra, si fluxus diuturnitate corpus debilitatum nimis fuerit, omitti prorsus debeant; siquidem vires magis exhauriendo sepe cachexiam, tabem dorsalem cum hecticâ febre vel impotentiam virilem inducunt.

## §. III.

In curanda gonorrhoea maligna attendere maxime medicus debet ipsam agrotantis constitutionem. Plurimum namque refert, num laborans complexionis sit cholericæ & sanguineæ aut phlegmaticæ, & an naturalis sit robustioris vel imbecillis ac teneræ. Neque minus probe inquirere oportet, qualis humorum sit conditio. Hæc enim prout differt, variat quoque ratione symptomatum adfectio. Ita si corpus offendit caso-chymicum & ex improba victus ratione vel aliogliscente morbo scabie, purpura scorbutica, vel adfectu hypochondriaci detentum: tunc utrique deteriora curatque difficiliora pertimescenda sunt symptomata.

## §. IV.

Si calidiores sensibilibusque indolis homines pernitiatis hæc fluxio corripit, ab omnibus calidioribus, purgantibus, sudoriferis, diureticis decoctis liquorum, urguajnei, acris-

T 3 abis,

Dieta  
modica.Cura  
per mediam  
& curam  
per la-  
diam.Temperamentum  
agrotantis  
Plurimum  
namque refert  
num laborans  
complexionis  
sit cholericæ  
& sanguineæ  
aut phlegmaticæ  
& an naturalis  
sit robustioris  
vel imbecillis  
ac teneræ.Cautio  
aliter  
purgan-  
tia bal-  
samica  
& diu-  
retica  
valde  
cauti-  
onem  
requirunt.Cautio  
aliter  
purgan-  
tia bal-  
samica  
& diu-  
retica  
valde  
cauti-  
onem  
requirunt.

ribus, etientis balsami Peruviani & opobalsami, maxime in principio usus, abstinere debemus. Novem enim propolifero, & sine convenienti corporis preparatione institute illorum usu, vitiofum humorem retentum, fluxumque suppressum; & loco hujus bubones excitatos, sed non modo circa genitalia, sed in facie quoque pustulas ulcerosas pessimi moris subortas.

C. V.

Qui feigniores & phlegmaticos  
obtinere temperaturam, in his, præ-  
missa sufficienti corporis expurgatione,  
roborantibus & leniter spirituosis  
gonorrhoeam incipientem perfecte cu-  
ratam & hostile virus expulsum me-  
mini. Atque hoc sine nonnunquam  
per aquam vitæ in parciore sed sæpius  
repetita dosi exhibitum potiri licuit,  
qualis ita paratur: recipe herbe men-  
thæ manipulos tres, terebinthine ve-  
netæ unciam unam, balsami Peruviani  
unciam dimidiam, destillentur cum  
vini Rhenani mensuris tribus. Dosis  
sit uncia una ad duas. Cui etiam com-  
mode substituitur hæc formula: reci-  
pe aquæ rosæ, spiritus vini rectificatissi-  
mi mensuram dimidiam, julepi ro-  
sarum uncias duas, balsami nostri vi-  
tæ guttas 60. M.

§. VI.

Quamdiu materia profuens foetida est & subviridis, nunquam danda sunt adstringentia; nam ubi impetive & nimis cito fluxus hisdem supprimitur, aut decocta lignorum validiora eum regimine fudorifero offeruntur, venenum transit in feminis & lymphæ massam, unde symptomata lili venereæ propria resultant. At vero ex nullo prope adstringentis facultatis remedio major redundat noxa, quam a saccharo saturni interne, ut empiricorum mos est, snistre oblato. Vident enim colicam convulsivam, appetitus prostrationem: alvique pertinacissimam obstipationem inde inductam. Idem quoque valet de injectionibus adstringentibus, quæ, nisi fluxus im-

puro correctio, numquam debent adhiberi.

## §. VII.

Inter medicamenta urinae fluxum  
promovendo pessime, ut arbutor, &  
quibusdam referuntur cantharides &  
parata ex iis essentia, siquidem viis  
urinariis admodum sunt infensæ, fa-  
cileque perniciosas renum & vesicæ  
inflammationes cum mixtu cruento,  
nisi convenientibus succurramus re-  
mediis, citere valent.

6. VIII.

Venefectiones in curatione gonorrhoeae virulentae raro exiguuntur, & in sensibilibus, quibus facile materiae sordidae contingit suppressio, magis obsunt, quam profunt; attamen si corpus sanguine turget & juvenile est, ad mitiganda symptomata sine nexa concedi possunt.

## 6. IX

A varijs subinde causis evenit, ut materia parcius ex pene elidatur, & c. *Quid fa- ciendum*  
mox pustule in corpore hinc inde ad- *si fluore*  
pareant. Tum vero loca affecta hu- *pustulae*  
meffare, foij, baldeis & cataplas-  
matibus relaxare atque purgantibus  
materiam deorsum ducere consultum  
erit. Juvant quoque eodem fine in-  
jectiones lactis dulcis, & decocti avenae  
cum oleo amygdalarum dulc. remixti  
a quibus quo fluxum sapius iterumque  
revocatum scio.

6. 2.

Mirum certe est, quod gonorrhoea per falivationem tolli non possit; crebrior enim usus & experientia satis docet, pessima venerea ulcera, quae in univerſo corpore radican- tur, hac curatione fuisse sanata, sed gonorrhoeam remanisse. Et profecto molestissima haec fluxio, si male tractata & inveterata fuerit, rarius ad frugem reduci- tur, sed per totam sepe vitam laborantes comitatur. Latitant quippe nonnunquam in glandulis prostaticis tam majoribus, quam minoribus scirrhus & fistulosi ulcers, quae radicitus tollere, difficillimum est. Ni- hilo tamen minus aliquoties exoptati- sumum

finum reperi auxilium in usu therma-  
rum Carolinarum interno, quæ licet  
alias provide in gonorrhœa recenti  
sint usurpandæ, eo quod debiles par-  
tes magis relaxando, majorem ma-  
toris adfluxum efficiunt; in invete-  
ratamen malo? dum insigni vaso-  
rum obstructions tollendi, diuque  
latentes, intercretores & duros tumo-  
res resolvendi efficacia polleant, cum  
fructu dari possent. Sed ut minori  
quantitate, adhibitis simul in & post  
curam roborantibus balsamicis inter-  
nis & injectionibus, bibantur suadeo.

## §. XI.

Quando urethra, cujus tunica me-  
dia valde glandulosa, non modo exul-  
cerata, sed & nimis relaxata est, &  
longior substantia quidpiam adheret,  
et quæ postea prodeunt urinam valde  
remorantes carunculae, solam essen-  
tiam opobalsami cum spiritu vini ex-  
tractam, item balsamum nostrum vi-  
tæ cum tribus partibus l' eau d'arque-  
busade dilutum aliquoties de die fausto  
cum successe injiciendum curavi.  
Enimvero tali injectione fit vehemen-  
s in membro excitatur ardor, qui  
tamen sensim paulatimque remittit.  
Speciatim vero de carunculis, quæ  
nonnulli species verrucarum sent, te-  
nendum arbitror, quod pulvere quo-  
dam erodente, aut ferro candente  
optime tollantur. Sed hæc operatio  
peritam postulat matrem, ne forte  
taligigno instrumento vicina pars læ-  
datur.

## §. XII.

Ad mundificanda glandis & penis  
ulcera sequens epithema præstantis  
erit efficacie: recipe aquæ calcis vivæ  
cum aqua rosar. dilutæ uncias duas,  
l' eau d'arquebusade unciam unam,  
sacchari saturni grana X. mercurii  
precipit. albi grana VIII. M. Con-  
tra ubi simul consolidandi intentio est,  
balsamum sulphuris antimoniatum &  
terebinthinatum cum unguento dige-  
stivo remixtum mereatur commen-  
dari.

## §. XIII.

Bubones, si junguntur, quantum  
fieri potest emplastro emolliente  
agricola cum oleo hyoscyami & saponi  
malaxato sunt maturandi. Cui scopo  
etiam emplastrum Barbette saponi-  
tum & cum pauxillo oleo hyoscyami  
subactum egregie inservit.

## §. XIV.

Quando scrotum cum testiculis in  
magnum tumorem agitur, succur-  
rendum est fomentis calidis, sive ad-  
missione vaporum ex decoctione her-  
barum & florum emollientium cum  
lacte facta abeuntium; qua methodo  
tempestive adhibita tumor mollior  
ut dein emplastra resolyentia majori  
cum emolumento applicari possint.

ENARRATIONES  
MORBORUM.

## OBSERVATIO I.

Flagitavit haud ita pridem opem  
meam vir triginta annorum  
temperamenti sanguineo-cholericus,  
qui cum per crebras masturbaciones  
magnam sibi contraxisset vasorum se-  
minalium atoniam, gonorrhœam in-  
cidit benignam, per quatuor annos  
sub alvinarum sordium excretionem lo-  
tiique emissionem moleste infestantem.  
Ad sistendum hunc fluxum aliquoties  
sumit oleum terebinthinæ, unde  
fluxus quidem cessabat; tantum au-  
tem aberat, ut pristinum genitalibus  
robur & stimulus ad coitum restitueretur,  
ut potius hic penitus supprime-  
retur. Nec ullis per quatuordecim  
remediis poterat revocari, usque tan-  
dem naturæ vigore cibisque eupeptis  
pollutiones nocturnæ cum leni quo-  
dam stimulo & penis erectione redi-  
rent. Sed non multo post pristina lu-  
debat scena, & materia seminis  
analogæ sub alvi & vesicæ exoneratio-  
ne rursus & pene profluebat, idque  
nunc per integros quinque annos.  
Ego igitur consultus primo omnium  
suasi, ut æger, seposita omni cerevi-  
sia,

ſia, decoctum ex rad. ſcorzoner. chinæ, acetofraſura ligni ſantali rubri, flavi, aloes, lentis ſci &c. mane calidum, dein frigidum biberet, atque in victu carneſtantum aſſatas & ex his conſeſta tenujora juſcula adſumeret vini- que rubri Galliei, pontac dicti, hau- ſtum cum elixirii ex eſſentia corticum aurant. tinctura tartari & pauxillo olei macis conſtati XL. guttulis inter cibos eaperet. Ad alvum apertam ſer- vandam commendavi mala Borſdorf- ſienſia cum paſſulis cocta & prunellas; ante decubitus vero pulverem obtuli ſequentem: ſec. fuccini præp. drach- mam unam, nitri puriſ. drachmam dimidiam, terræ catechu, corticis ca- ſcarillæ ana grana XII. M. F. pulvis div. in doſes IV. Demum quoque re- gioni pubis per noctem calide im- pondum fuſi ſaccum fol. myrthi, lauri, flor. chamamill. roman. roſar. maſliche & ſuccino repletos & ex vino rubro coſtos. Nec dubito, quin æger egregium inde percepturus ſit laxa- men.

### EPICRISIS.

Intempeſtively in noſtro caſu adhibi- tum fuit oleum terebinthinæ. Equi- dem tali remedio fluxus ad tempus ſi- ſtitur, ſed ex ſacili redit, ac ſæpe graviora accedunt ſymptomata. In curatione rite inſtituenda ego maxime omnium reſpexi ad ægotantis natu- ram corporiſque habitum, qui quum valde eſſet obelus, tenujorem victum ſeu curam per inediā præſcribere conſulium putavi. Niſi enim commo- de ſubtrahatur morbi pabulum, pa- rum vel nihil proficitur. Poſthæc ve- ro coſannitendum duxi, ut partes fe- minales nimis relaxatæ & a tono ſuo deſectæ roborentur, id quod tutiſſi- me perſicitur remediis tam internis quam externis ſupra commemoratis.

### OBSERVATIO II.

Vir triginta annorum, conſtitu- tionis ſanguineæ, habitu corporis ſpongiolo præditus, poſt celebratum <sup>Gonorr-  
hoea ob-  
ſervata  
in beſi-  
ſiam  
maſſiam</sup> cum impura coitum, malignum ſe- minis cum dolore, ardore ac moleſta membri & perinæi tenſione junctum incidit profluviū. Chirurgus incon- ſilium adhibitus eſſentiam baſſami de Copaiva ſat larga coſtulit quantitate, indeque eſſecit, ut non modo copio- ſius materiæ purulentiæ cum ſanguine mixta, ſed & iplius puri ſanguinis ex orethra ſuecederet ſtillicidium. In tali rerum ſtatu venæſectionem in manu adminiſtravit, & ad alvum du- eendam pilulas ex panchymago Cro- ſſii & mercurio dulci conſectas adhibe- re juſſit, quo fiebat, ut ſanguinis quidem fluxio ceſſaret, urina vero ſemper ſabuloſa, & liquor ex genita- libus albicans per longum temporis ſpatium promanaret. Ego tandem conſultus decoctum præſcripti tempo- rariuſ bibendum, & ſacculos ex ſpec- iebus roborantibus nervinis repletos in vino rubeo decoctos regioni pubis & peſiaci crebrius adplicare, & ad relaxatas partes roborandas baſſamum noſtrum vitæ cum tribus partibus l' eau d' arquebuſade dilutum injicere imperavi, tam ſelici eventu, ut brevi poſt reſiſta illa liquoris albicantis ex genitalibus fluxio evaneſceret.

### EPICRISIS.

Siſſit hic caſus gonorrhoeam viru- lentam in benignam deſinentem, uri quidem ex liquoris albid' minus puru- lenti proſtudio deprehendere licet. Difficulus admodum ejuſmodi go- norrhoea ſimplex a maligna reſiſta, ſi invaluit, curatur: quæ ut tem- peſtively medicus manuſ auxiliatri- cem adſerere neceſſe eſt. Cæterum taxari omnino meretur perverſa chi- eurg' in tractando hoc ægro methodus.

dam ad virus venereum et corpore cito eliminandum inter initia morbi mox calidiora præbuit remedia, quibus, præfente jam fluxu, nihil datur perniciosius. Hac enim ratione virulenta materia in sanguinis & lymphæ massam invehitur, longeque subtilior redditur, ut facilis inde ad ipsam luem veneream fiat transitus.

### OBSERVATIO III.

*Gonorrhoea.* Vir quinquaginta annorum, temperamenti cholericæ-melancholici, in primis juventutis annis gonorrhoea laboravit virulenta, quæ aliquoties solum, iterumque recruduit. Aliquando tamen mercurialibus & terebinthinaceis profusus fuit sublata, sed aliquod tempus post in utroque inguinum latere prodierunt bubones. His iterum intra tres menses sublatis in cervice, cubitorum articulis, & in ani ossisque sacri commissuris effluerunt maculæ lividæ & squamosæ, quæ, accedente calore, intolerabilem excitarunt pruritum & ardorem. Petiit itaque Carolinas, easque balnei loco adhibuit, sed inde in gonorrhoeam incidit simplicem, tam pertinacem, ut nullis hæcenus remediis tolli potuerit; siquidem a mitioribus injectionibus materia profluens reddita est sordidior, a fortioribus copiosior & sanguinolenta. Post varia adhibita remedia fluxus quidem remisit, sed brevi temporis spatio iterum rediit, denique fuit expugnatus. A quo tempore mox in inguine arger dolorem percepit tractorium & pressorium, cui se associavit febriculosa intemperies & simul cum urina, quæ plerumque cum ardente dolore redditur, alba viscidæque materia præstitur; majori tamen quantitate, si corpus moveret, quam si in quiete continet.

### EPICRISIS.

Ex præfata morbi historia plura in usum nostrum depromere possumus.

1. Perquam notatu dignum est, quod fluxus seminalis crebriores patitur recidivas, ita profusus, ut exactis aliquot annis reverti possit. Ratio inde petenda venit, quod rarius prohi' dolor hoc vitium radicitus tollatur, sed ante convenientem evacuationem sanguiniquæ depurationem adstringentibus tractetur. Quæ methode fluxio quidem ad tempus compescitur, sed materia vitiosa circa loca adfecta intus retinetur, unde novi mali sordes perpetuo in corpore latitant.

2.) Accedit, quod in nonnullis subjectis gonorrhoea perperam curata partium seminis secretioni vacantium magnam post se relinquit infirmitatem, quæ postea facile ab impurorum humorum copia, a balneis nimisque refrigerantibus, vel corpus humectantibus & alio modo debilitantibus, imo ex morbo vel ætate invalescit, ut hinc ejusmodi involuntarium seminis profluvium vel in extrema ætate non raro contingat.

3.) Non dubitandum, quin in nostro hoc casu crebriores injectiones, sicuti omnia topica imprudenter applicata, fuerint perniciosissimæ. Etenim prius per convenientia interna remedia humorum vitiosorum correctioni, evacuationi & a loco affecto derivationi prospicere debet medicus, quam ad externa progreditur; alioquin damnum infert vix ulla medicina reparabile.

## OBSERVATIO IV.

*Ergo  
notandum  
saturat.  
ut ma-  
la tra-  
cta  
symp-  
mata.*

Qui viginti annos habet juvenis generosus ex impuro coitu sibi saniosum ex genitalibus contraxit profluvium, ad quod abigendum chirurgum consuluit, qui præter purgantia saturninis, ut tinctura antiphthifica Grammanni & pulvere quodam ex corall. osse sepiz, succino, terra sigillata & magisterio saturni composito fluxum compescere tentavit; & substitit quoque, sed mox æger acerbissimis adfligebatur ventris torminibus, ut humi serpere, & corpus miris subinde modis torquere cogeretur; alvus simul erat constrictissima & perpetuus sed irritus ad vomendum conatus. Intermittebant quidem singula hæc mala per aliquot horas, sed statim quasi periodis eadem vehementia revertebantur. Ego igitur in consilium adscitis, clysteres infundere jussi mere oleosos, ægrum in balneum descendere & somenta abdomini applicare suasi. Interius vero decoctum mannatum & rhabarbarinum cum oleo amygdalarum dulcium per vices adlumendum obtuli. Alvo sic aperta, flatibus discussis, ingentique sordium expurgata copia, singula quidem remittebant symptomata, sed, quod memorabile est, molestus seminis fluxus redibat.

## EPICRISIS.

1.) Sævisima illa, quæ enumeravimus symptomata non aliunde arcessenda sunt, quam a temerario medicamentorum saturninorum usu, quorum tanta vis est ac vehementia, ut teneras ventriculi & intestinorum membranas nerveas spastice crispando ac constringendo, motum & tonum peristalticum plane invertant, adeoque efficiant, ut sanguis intra sensibiles intestino-

rum tunicas subsilens rosiones, inflammationes & spasmos concitet atrocissimos.

2.) Illud adhuc notandum venit, quod sedatis istis intestinorum spasmis, alvoque relesata, seminis profluvium redierit, aperto indicio, per consensum quasi & sola generis nervosi constrictione talem fluxum antea fuisse cohibitum.

## OBSERVATIO V.

Coronidis loco adhuc commemorare placet, quod non raro misma venereum, nisi tempestive avertatur, ipsam vesicam afficiat ejusque tunicas internas arrodendo, non modo dolorem & spasmus inibi excitet intolerabilem fere, sed & dysuriam inducat, unde urina cum copioso sedimento purulento, quod in fundo conspicitur, emittitur. Neque renes omnino sunt immunes, sed quandoque magnam contrahunt labem, ut chylosa & nutritia materia simul cum urina secernatur; & si incrementa sumit talis exulceratio, febris accedit lenta & hectica, dolor capitis artuumque exquisitissimus, virium jactura, vigilia & ipsa denique mors. Quod si vero incidunt hæc mala, tuta & utilissima deprehendi primo, infusa herbarum vulneraria, qualia ex veronica, agrimonia, urtica, mentha, melissa floribus hyperici, scibus, &c. optime consueuntur. Dein pro potu præscripti decocta temperatoria & quandoque tincturam tartari vel antimonii minus acrem cum balsamo de Copaiva permixtam, nec non pulveres ex osse sepiz, semine lycopodii, corall. & aliquot nutri puris, & cinabaris granis compositos cum emulsione seminis IV. frigid. obtuli. Nec demum omittendas duxi injectiones, quæ ex aqua d'arquebuse cum aqua calcis vivæ, plantag. spermat. ranar. optime con-

*obfusi-  
vatio  
circa lq.  
sua ex  
vesica  
in go-  
norrhœa  
inven-  
tata.*